

আয়ুর্বেদ-শিক্ষা ।

(আয়ুর্বেদ-মতে লাক্ষণিক চিকিৎসা-গ্রন্থ ।)

চতুর্থ খণ্ড ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ।

কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ কর্তৃক-
সঙ্কলিত

ও

১৭ নং কালীনাথ দত্তের ষ্ট্রিট “বন্দেমাতরম ঔষধালয়” হইতে
শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কবিরাজ কর্তৃক প্রকাশিত ।

Ayurved-Shiksha

OR

PRACTICE OF MEDICINE.

BY

KAVIRAJ AMRITA LAL GUPTA KABIVUSAN.

PRINTED BY S. C. CHAKRABARTY AT THE

KALIKA PRESS,

17 Nanda Koomar Chowdhury's, 2nd Lane,

CALCUTTA.

1914

এই খণ্ডের মূল্য ১/ এক টাকা মাত্র ।

ভূমিকা ।

আয়ুর্বেদ-শিক্ষা চতুর্থধণ্ডে সম্পূর্ণ হইল। আয়ুর্বেদ-মতে লাক্ষণিক-চিকিৎসা গ্রন্থের অভাব ছিল, তজ্জন্ত এই গ্রন্থ-প্রচারে ত্রতী হইয়াছিলাম ; এক্ষণে সে অভাব পূর্ণ হইল। গ্রন্থখানি শীঘ্র প্রচারের জন্ত যত্নের ক্রটি করি নাই, কিন্তু তথাপি সম্পূর্ণ করিতে সুদীর্ঘ চারিবৎসর অতিবাহিত হইয়াছে।

এই খণ্ডে মেহ, সোমরোগ, বহুমূত্র, মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী, ত্রণ-শোথ, ত্রণ, বিজ্রম্বি, বিসর্প, স্নায়ুরোগ, বিস্ফোটুক, পিড়কা, অকরোগ, বসন্ত, পানিবসন্ত, হাম, কুষ্ঠ, শিরঃপীড়া, নেত্ররোগ, নাসারোগ, জিহ্বারোগ, দন্ত-রোগ, দন্তবেষ্টরোগ, কণ্ঠরোগ, ওষ্ঠরোগ, তালুরোগ, জীরোগ, স্তনরোগ, গর্ভাবস্থার পীড়া, স্মৃতিকা এবং শিশু ও বালকের সমস্ত পীড়া, ধাতুদোষল, ধ্বজভঙ্গ, স্বপ্নদোষ এবং গনোরিয়া, ডায়াবিটিস, কার্ককল, ব্রঙ্কাইটিস, নিউ-মোনিয়া ও প্লুরিসি প্রভৃতি রোগের লক্ষণ ও লাক্ষণিক চিকিৎসা আছে, বিশেষতঃ ডাক্তারীর সহিত বিবিধ রোগের সমন্বয় এবং বৈজ্ঞানিকমতাবলম্বী প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণের ব্যবহার্য্য বহুসংখ্যক ঔষধের প্রয়োগ-প্রণালী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রত্যেক রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা আরও সরল ও সবিস্তারে লিখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু জনসাধারণের বর্তমান দারিদ্র্যাবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সেই সম্বন্ধে পরিত্যক্ত হইল। ইহা সমধিক আদৃত হইলে, ভবিষ্যতে তদ্রূপ লিখিকার বাসনা রহিল। গ্রন্থখানি জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্ত যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি, এক্ষণে ইহা দ্বারা জনসাধারণের উপকার হইলেই শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক জ্ঞান করিব।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত ।

১৩১৭। চৈত্র ।

দ্বিতীয় সংস্করণের বক্তব্য ।

আয়ুর্বেদ-শিক্ষা চতুর্থধণ্ডে প্রথম সংস্করণের সমস্ত পুস্তক নিঃশেষ হওয়াতে দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইল। সাধারণ্যে ইহা যে সমধিক আদৃত হইয়াছে, তজ্জন্ত আমি নিরন্তর স্তুতী।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত ।

১৩২১। আশ্বিন ।

সূচী ।

—ঃঃ—

(এই সূচীপত্রের সহিত তৃতীয়খণ্ডের সূচীর পত্রাঙ্কের মিল আছে)

[চতুর্থ খণ্ড ।]

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
প্রমেহরোগ-চিকিৎসা ।		প্রমেহ পীড়কার অসাধ্য লক্ষণ	২০৬
চারিপ্রকার বাতিক মেহরোগের		মেহ ও মধুমেহরোগের নিদান ও	
লক্ষণ	২০৩	বিস্তারিত লক্ষণ	... ২০৭
ছয়প্রকার পৈত্তিক মেহরোগের		ডাক্তারিমতে মধুমেহরোগের	
লক্ষণ		লক্ষণ	... ২১১
দশপ্রকার শৈথিল্যিক মেহরোগের		মেহ ও মধুমেহ চিকিৎসা-বিধি	২১৪
		মেহ ও মধুমেহরোগে ঔষধ	২১৯
বাতিক মেহরোগের উপদ্রব	..	ত্রিফলাদি কাথ
পৈত্তিক মেহরোগের উপদ্রব	..	মুস্তকাদি কাথ
শৈথিল্যিক মেহরোগের উপদ্রব	..	অগ্রোধাদিচূর্ণ	... ২২০
মেহরোগের অসাম্য লক্ষণ	ত্রিফলাদিচূর্ণ
মেহরোগের অপর অসাধ্য লক্ষণ ২০৫		কৃণাবলেহ
গনোরিয়া বা সবিন মেহ	মেহকুলাস্তক	... ২২১
মেহরোগের পরিণাম ও মধুমেহের		বিড়ঙ্গাদিলৌহ
নিদান	শুক্রমাতৃকাবটী	... ২২২
জ্বাতিগের মেহরোগ নাহওয়ার		বঙ্গেশ্বর
কারণ		বঙ্গাষ্টক
মধুমেহরোগের উৎপত্তি ও লক্ষণ	..	স্বর্ণবঙ্গ	... ২২৩
প্রমেহরোগীর আরোগ্য লক্ষণ ২০৬		স্বর্ণবঙ্গপঞ্চক
প্রমেহপীড়কার উৎপত্তি, নাম ও		মেহকুঞ্জর কেশরী
লক্ষণ	..	সর্পেশ্বর রস	... ২২৪

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
বৃহৎ বঙ্গেশ্বর	২২৪	মেহরোগে-উদরাময় ও	
অপূর্ণ মালিনী বসন্ত	২২৫	গ্রহণী-চিকিৎসা।	
চন্দ্রকান্তিরস	"	বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র	২৩১
বসন্তকুশুম্বাকর রস	"	মহরাজ নৃপতিবল্লভ	"
মেহমূদগর	২২৬	মেহরোগে-শ্বাস ও কৃম	
চন্দ্রপ্রভাণ্ডিকা	"	চিকিৎসা।	
মহাবঙ্গেশ্বর	"	বৃহৎ বসন্তভিলক	২৩২
বৃহৎ সোমনাথ	২২৭	বৃহৎ কাকনাভ	"
প্রমেহমিহির তৈল	"	মেহরোগে-উদাবর্ত-চিকিৎসা।	
দাড়িমাগ্ন ঘৃত	২২৮	হিঙ্গুদ্বাভাবর্তি	২৩২
বৃহৎ দাড়িমাগ্ন ঘৃত	"	বটপত্রী প্রলেপ	"
বস্তিযোগ	২২৯	বিষিকান্ত প্রলেপ	"
মেহরোগে-বহুমূত্র-চিকিৎসা।		চতুর্মুখ রস	"
কালপূর্ণচন্দ্ররস	২২৯	মেহরোগে-ধাতুদৌর্বল্য	
হেমনাথরস	২৩০	চিকিৎসা।	
মেহরোগে-দাহ-চিকিৎসা।		বৃহৎ অশ্বগন্ধা ঘৃত	২৩৩
চন্দ্রনাদিকাথ	২৩০	অমৃতপ্রাশ ঘৃত	"
ধর্জুরাশচূর্ণ	"	প্রমেহপীড়কা-চিকিৎসা-বিধি।	
কুশাণ্ডতৈল	"	কার্ককল ও বয়েল	২৩৪
প্রমেহরোগে-ভৃগু ও বমন		কার্ককলের লক্ষণ	"
চিকিৎসা।		বয়েলের লক্ষণ	"
কাশ্মর্যাদি পানীয়	২৩০	পীড়কারোগে-ঔষধ।	
ভৃগুপঞ্চমূল পানীয়	২৩১	সোমরাজী লেপ	২৩৫
লাজোদক	"	শারিবাদি কাথ	"
		মুদগপর্ণ্যাদি কাথ	২৩৬

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
বৃহৎ গ্রামাশ্বত ...	২৩৬
মেহ, মধুমেহ ও পিড়কারোগে পথ্যাপথ্য ...	"
গণোরিয়া বা ঔপসর্গিক মেহ চিকিৎসা ...	২৩৮
গণোরিয়ার নিদান ও লক্ষণ	২৪১
প্রথম বা প্রচ্ছন্ন অবস্থা ...	২৪২
দ্বিতীয় বা প্রদাহিক অবস্থা	"
তৃতীয় বা অনতিপ্রবল প্রদাহিক অবস্থা ...	২৪৩
পুরাতন অবস্থা ...	"
গণোরিয়া চিকিৎসা-বিধি	"
প্রথম অবস্থার চিকিৎসা ..	২৪৪
দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থার... চিকিৎসা ...	"
কোষপ্রদাহ ...	২৪৭
গণোরিয়া রোগে ঔষধ ...	২৪৯
মধুকাদি ...	"
তৃণপঞ্চমূল ...	"
প্রমেহ চিকিৎসা ...	"
কুশাবলেহ ...	২৫০
পঞ্চতিক্তবৃত্তগুগ্গুলু ...	"
প্রমেহমিহির তৈল ...	"
মাষবলাদি তৈল ...	"
উত্তর বস্তিযোগ ..	২৫১
চন্দ্রনাদিচূর্ণ ...	"

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
সোমরোগ-চিকিৎসা ।	
মূত্রাভীষারের লক্ষণ ...	২৫২
ডায়াবিটিস্ ইন্সপিডাসের লক্ষণ ...	"
সোমরোগ চিকিৎসা-বিধি	২৫৩
সোমরোগে ঔষধ ...	২৫৪
কদলীযোগ ...	"
ভূমিকুশাণ্ডযোগ ...	"
ধর্জুরযোগ ...	"
শর্করাযোগ ...	২৫৫
তারকেথররস ...	"
চন্দ্রপ্রভা বটিকা ...	"
মেহযুগ্মর রস ...	"
সোমনাথ রস ...	"
সোমেশ্বর রস ...	২৫৬
বৃহৎ সোমনাথ রস ...	"
বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস ...	"
বৃহৎ বঙ্গেশ্বর ...	"
বসন্তকুম্ভাকর রস ...	২৫৭
কদল্যাদি স্নাত ...	"
হেমনাথ রস ...	"
কালপূর্ণচন্দ্ররস ...	২৫৮
সোমরোগে—পথ্যাপথ্য ...	"
মূত্রকৃচ্ছ্র-চিকিৎসা ।	
বাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ	২৫৯
পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ	"

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
শৈল্পিক মূত্রকৃচ্ছের লক্ষণ	২৬০	চতুর্ভুজ ...	২৬৮
সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছের লক্ষণ	"	ষোণেশ্বরস ...	২৬৯
শল্যজ মূত্রকৃচ্ছের লক্ষণ ...	"	তারকেশ্বরস ...	"
পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছের লক্ষণ ..	"	বরুণাভলোহ ...	"
ঔজ্জ্বল্য মূত্রকৃচ্ছের লক্ষণ ...	"	কুশাবলেহ ...	২৭০
অশ্মরীজনিত মূত্রকৃচ্ছের লক্ষণ	"	ত্রিকণ্টকাত্ত ঘৃত ...	"
অশ্মরী ও শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছের	"	উল্লীরাগ তৈল ...	"
প্রভেদ ...	"	উত্তরবস্তিযোগ ...	২৭১
অশ্মরীজনিত মূত্রকৃচ্ছের উপদ্রব	২৬১	মূত্রকৃচ্ছ—পথ্যাপথ্য ...	"
মূত্রকৃচ্ছ-চিকিৎসা-বিধি ...	"	মূত্রাঘাত-চিকিৎসা ।	
মূত্রকৃচ্ছ—ঔষধ ...	২৬৬		
অমৃতাদি কাপ ...	"	বাতকুণ্ডলিকার লক্ষণ ...	২৭২
ভূগপঞ্চমূলক্ষীর ...	"	অষ্টীলার লক্ষণ ...	"
গোক্ষুরাদি কাথ ...	"	বাতবস্তির লক্ষণ ...	"
বৃহত্যাডিকাথ ...	"	মূত্রাভীত মূত্রাঘাতের লক্ষণ ...	"
পাষণভেদাত্ত কাথ ...	"	মূত্রজঠরের লক্ষণ ...	"
ধাত্রীকাথ ...	"	মূত্রোৎসঙ্গের লক্ষণ ...	"
বৃহৎ ধাত্রীকাথ ...	২৬৭	মূত্রক্ষয়ের লক্ষণ ...	২৭৩
বিষিকাত্তপ্রলেপ ...	"	মূত্রগ্রহির লক্ষণ ...	"
বটপত্রীপ্রলেপ ...	"	অশ্মরী ও মূত্রগ্রহির লক্ষণ ...	"
হিঙ্গুস্তাবর্তি ...	"	মূত্র শুক্রের লক্ষণ ...	"
ফলবর্তি ...	"	উষ্ণবাতের লক্ষণ ...	"
নারাচ চূর্ণ ...	"	মূত্রসাদের লক্ষণ ...	"
হিঙ্গুস্তচূর্ণ ...	২৬৮	বিড়বিষাত্তের লক্ষণ ...	২৭৪
বলান্তচূর্ণ ...	"	বন্তিকুণ্ডলেক লক্ষণ ...	"
পথ্যাদিচূর্ণ ...	"	বন্তিকুণ্ডলীর সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ...	"
চিস্তামণি ...	"	মূত্রাঘাত-চিকিৎসা-বিধি...	"

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
মূত্রাঙ্গীলা	... ২৭৫	চিস্তামণি	... ২৮৩
বাতবস্তি	... "	চতুর্দ্বন্দ্ব	... "
মূত্রাতীত	... ২৭৬	যোগেন্দ্ররস	... "
মূত্রজঠর	... "	উশীরাদ্যতৈল	... "
মূত্রোৎসঙ্গ	... "	ত্রিকণ্টকাদ্য স্মৃত	... "
মূত্রক্ষয়	... ২৭৭	মূত্রাঘাতে-পথ্যাপথ্য	... ২৮৪
মূত্রগ্রন্থি	... "	অশ্মরীরোগ-চিকিৎসা ।	
মূত্রাশুক্র	... "	অশ্মরীরোগের লক্ষণ	... ২৮৪
উষ্ণবাত	... "	বাতিক অশ্মরীর লক্ষণ	... ২৮৫
বাতকুণ্ডলিকা	... "	পৈত্তিক অশ্মরীর লক্ষণ	... "
মূত্রসাদ	... ২৭৮	শ্লেষ্মিক অশ্মরীর লক্ষণ	... "
বিড়্‌বিঘাত	... ২৭৯	অশ্মরীর সুখসাধ্য লক্ষণ	... "
বস্তিকুণ্ডল	... "	উক্রাশ্মরীর সম্প্রাপ্তি	... "
মূত্রাঘাতে-ঔষধ	... ২৮০	উক্রাশ্মরীর লক্ষণ	... "
ত্রিফলাকঙ্ক	... "	শর্করা ও সিকতার লক্ষণ	... ২৮৬
তৃণপঞ্চমূলক্ষীর	... "	অশ্মরীর উপদ্রব	... "
গোক্ষুরাদ্য কাথ	... "	অশ্মরী, শর্করা ও সিকতার লক্ষণ	... "
দশমূলকাথ	... ২৮১	অশ্মরীরোগ-চিকিৎসা-বিধি	... "
বরুণাদ্যকাথ	... "	অশ্মরীরোগে-ঔষধ	... ২৮৮
বৃহৎ বরুণাদ্যকাথ	... "	ঔষ্ঠ্যাদিকাথ	... "
ঔষ্ঠ্যাদিকাথ	... "	এলাদিকাথ	... "
কুশাবলেহ	... ২৮২	বরুণাদিকাথ	... ২৮৯
হিঙ্গাদ্যচূর্ণ	... "	বৃহৎ বরুণাদিকাথ	... "
বচাদ্যচূর্ণ (মতান্তরে)	... "	গোক্ষুরযোগ	... "
কাঙ্কায়নগুড়িকা	... "	কুশাবলেহ	... "
বরুণাদ্যলৌহ	... "	তৃণপঞ্চমূলক্ষীর	... "
তারকেশ্বররস	... "		

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
তিলাদ্যাকাথ	... ২৮৯	অশ্মরীরোগে-দ্রোগ-চিকিৎসা	২২৫
পাষাণভেদাদ্য চূর্ণ	... ২৯০	অর্জুনাদিস্কীর	...
বরুণাদ্য চূর্ণ	... "	চিন্তামণি	...
চিন্তামণি	... "	অশ্মরীরোগে—অরুচি-চিকিৎসা	২২৬
যোগেন্দ্ররস	... "	আমলাজ্যযোগ	...
বরুণাদ্যলৌহ	... ২৯১	অশ্মরীরোগে-বমন চিকিৎসা	...
উশীরাদ্যতৈল	... "	চন্দনাদিযোগ	...
শিলোভেদাদি তৈল	... "	অশ্মরীরোগে-ভৃক্ষা-চিকিৎসা	...
বীরতরাজতৈল	... "	ভূগপঞ্চমূল পানীয়	...
কুশাজতৈল	... ২৯২	কাশ্যাদি পানীয়	...
বরুণতৈল	... "	অশ্মরীরোগে-পাণ্ড-চিকিৎসা	...
ভূগপঞ্চমূল ঘৃত	... "	অষ্টাদশাঙ্গলৌহ	...
বরুণাঙ্গ ঘৃত	... "	অশ্মরীরোগে—পথ্যাপথ্য	২২৭
বরুণাঙ্গঘৃত (মতান্তরে)	... ২৯৩	ব্রণ-শোধ-চিকিৎসা ।	
পুনর্লব কক্ক	... "		
অশ্মরীরোগে—দুর্লভতা, অবসন্নতা, কম্প ও কুশতা-চিকিৎসা	...	ব্রণশোধের সাধারণ লক্ষণ	২২৭
ছাগলাঙ্গ ঘৃত	...	বাতিক ব্রণশোধের লক্ষণ	...
বৃহৎ ছাগলাঙ্গ ঘৃত	... ২৯৪	পৈত্তিক ব্রণশোধের লক্ষণ	...
অশ্মরীরোগে-মৃচ্ছা-চিকিৎসা	...	শ্লেষ্মিক ব্রণশোধের লক্ষণ	২২৮
মহেন্দ্রস্বরস	... "	সান্নিপাতিক ব্রণশোধের লক্ষণ	...
চতুর্মুখরস	... "	রক্তজব্রণশোধের লক্ষণ	...
অশ্মরীরোগে—মত্রকৃচ্ছ ও মত্রা- ঘাত চিকিৎসা	... ২৯৫	আগন্তজ ব্রণশোধের লক্ষণ	...
ভূগপঞ্চমূলক্ষীর	...	ব্রণশোধের বিশিষ্ট লক্ষণ	...
কুশাবলেহ	... "	অপক ব্রণশোধের লক্ষণ	...
বরুণাঙ্গলৌহ	... "	পচ্যমান ব্রণশোধের লক্ষণ	...
		পকব্রণশোধের লক্ষণ	২২৯
		গম্ভীরপাকী ব্রণ শোধের লক্ষণ	...

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
ব্রণশোথ-চিকিৎসা-বিধি ...	২২২	দুষ্টব্রণের লক্ষণ ...	১০১৪
ব্রণশোথে ভ্রম ...	১০১০	শুদ্ধব্রণের লক্ষণ ...	"
মাতুলুঙ্গ লেপ ...	"	শুদ্ধব্রণোপন্ন ব্রণের লক্ষণ ...	১০১৫
শাখোটিক লেপ ...	"	শুদ্ধব্রণের লক্ষণ ...	"
পুনর্গবা লেপ ...	"	ব্রণের অপর রুদ্ধসাধ্য লক্ষণ ...	"
পঞ্চবকল লেপ ...	"	ব্রণের সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ ...	"
পঞ্চক্ষীর লেপ ...	১০১১	ব্রণরোগীর অরিষ্ট লক্ষণ ...	"
প্তু-রাদি লেপ ...	"	ব্রণের অপর অসাধ্য লক্ষণ ...	"
চন্দনাদি লেপ ...	"	ব্রণ-চিকিৎসা বিধি ...	১০১৬
দুর্লভাদি লেপ ...	"	অক্ষমুখ ব্রণ ...	১০২০
কটফলাদি লেপ ...	১০১২	পুরাতন দুষ্টব্রণ ...	১০২২
সুরমাদি লেপ ...	"	নালাঁধা ...	"
ভিল লেপ ...	"	সংজ্ঞাব্রণ ...	১০২৩
মরিচ লেপ ...	"	শুকর দংষ্ট্রিক ...	১০২৫
অহিকৈল লেপ ...	"	ব্রণ কচ্ছ ...	১০২৬
জয়ন্তাদি স্বেদ ...	১০১৩	অহিপূতন ...	"
ব্রণশোথে পথ্যাপথ্য ...	"	অরুণ্যক ...	"
ব্রণ-চিকিৎসা ।		শকরাব্দ ...	১০২৭
বাতিকব্রণের লক্ষণ ...	১০১৩	ব্রণরোগে ভ্রম ...	"
পৈত্তিক ব্রণের লক্ষণ ...	১০১৪	হরীতক্যাদি কাথ ...	"
শ্লেষ্মিক ব্রণের লক্ষণ ...	"	তিলাষ্টক লেপ ...	১০২৮
রক্তজ ব্রণের লক্ষণ ...	"	নিষ্পত্রাদি লেপ ...	"
সান্নিপাতিক ব্রণের লক্ষণ ...	"	শারিবা লেপ ...	"
ব্রণের সুখসাধ্য লক্ষণ ...	"	হরিদ্রাত্ত লেপ ...	"
ব্রণের রুদ্ধসাধ্য লক্ষণ ...	"	কুষ্ঠাদি লেপ ...	১০২৯
ব্রণের অসাধ্য লক্ষণ ...	"	ক্ষতকুলাস্তক মলম ...	"
		ক্ষতাস্তক মলম ...	"

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
মুহূর্তাদি বস্তি	... ১০৩০	বাহ্যবিদ্রুপের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ	১০৩৫
নরাস্থি লেপ	... "	অন্তর্বিদ্রুপের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ	"
পঞ্চবকুল লেপ	... "	বিদ্রুপের অপর অসাধ্য লক্ষণ	"
অমৃতাদি কাথ	... "	বিদ্রুপ-চিকিৎসা-বিধি	... ১০৩৬
সপ্তবিংশতিক গুগ্‌গুলু	... ১০৩১	বিদ্রুপেরোগে ঔষধ	... ১০৩১
নবকার্ষিক গুগ্‌গুলু	... "	শোভাজন লেপ	... "
ত্রণগজাক্ষুণ রস	... "	শোভাজন স্নেদ	... ১০৪০
পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগ্‌গুলু	... "	অনুদ্রুপিলেপ	... "
মহাতিক্তক ঘৃত	... ১০৩২	পঞ্চবকুল লেপ	... "
বিষ্যন্দন তৈল	... "	চন্দনাদি লেপ	... "
সোমরাজী তৈল	... "	কঙ্কলী যোগ	... ১০৪১
বৃহৎ সোমরাজী তৈল	... "	পুনর্নবদি কাথ	... "
জীরকাদি তৈল	... "	অমৃতাদি কাথ	... "
কিঞ্চুলক তৈল	... ১০৩৩	বিদ্রুপেরোগে পথ্যাপথ্য	... "
ত্রণরোগে পথ্যাপথ্য	... "	বিসর্প-চিকিৎসা ।	
বিদ্রুপ-চিকিৎসা ।		(হিরসিপিলাস)	
(কার্কঙ্কল)		বাতিক বিসর্পের লক্ষণ	... ১০৪২
বাতিক বিদ্রুপের লক্ষণ	... ১০৩৩	পৈত্তিক বিসর্পের লক্ষণ	... "
পৈত্তিক বিদ্রুপের লক্ষণ	... ১০৩৪	শ্লেষ্মিক বিসর্পের লক্ষণ	... "
শ্লেষ্মিক বিদ্রুপের লক্ষণ	... "	সান্নিপাতিক বিসর্পের লক্ষণ	... "
সান্নিপাতিক বিদ্রুপের লক্ষণ	... "	বাতপৈত্তিক বিসর্পের লক্ষণ	... "
আগন্তজ বিদ্রুপের লক্ষণ	... "	গ্রন্থি বিসর্পের লক্ষণ	... ১০৪৩
ব্রহ্মজ বিদ্রুপের লক্ষণ	... "	পিত্তশ্লেষ্মিক বিসর্পের লক্ষণ	... "
অন্তর্বিদ্রুপের লক্ষণ	... "	ক্ষতজ বিসর্পের লক্ষণ	... "
বিদ্রুপের পঞ্চাপক লক্ষণ	... ১০৩৫	বিসর্পের উৎসর্গ	... ১০৪৪
অন্তর্বিদ্রুপের পৃথিব্যাবের পথ	... "	বিসর্পের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ	... "

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
বিসর্প চিকিৎসা-বিধি	... ১০৪৪	রক্তজ বিস্ফোটের লক্ষণ	... ১০৫৩
বিসর্পরোগে ভ্রম	... ১০৪৮	বিস্ফোটের সাধ্যসাধ্য লক্ষণ	.. "
বমনযোগ	... "	বিস্ফোট চিকিৎসা-বিধি	... "
রাগাদি লেপ	... "	বিস্ফোটে ভ্রম	... ১০৫৬
চন্দনাদি লেপ	... "	রাগাদি লেপ	... "
পঞ্চবকুল লেপ	... "	শিরীষাদি লেপ	... "
মুস্তকাদি লেপ	... ১০৪৯	চন্দনাদি লেপ	... ১০৫৭
দিফলাদি লেপ	... "	পঞ্চবকুল লেপ	... "
দশাঙ্গ লেপ	... "	উৎপলাদি লেপ	... "
পটোলাদি কাথ	... "	মুস্তকাদি লেপ	... "
অমৃতাদি কাথ	... "	দিফলাদি লেপ	... "
কিরাতাদি কাথ	... "	দশাঙ্গ লেপ	... ১১
কঙ্কলী যোগ	... ১০৫০	সিন্দুর যোগ	... ১০৫৮
পদ্ধতিভূত দ্রুত গুগ্‌গূলু	... "	দশমূল্যাদি কাথ	... "
পদ্মদ্রুত	... "	দ্রাক্ষাদি কাথ	... "
বিসর্পরোগে পথ্যাপথ্য	... ১০৫১	কিরাতাদি কাথ	... "
স্নায়ুরোগ-চিকিৎসা ।		বাসাদি কাথ	... ১০৫৯
স্নায়ুরোগের লক্ষণ	... ১০৫১	পটোলাদি কাথ	... "
স্নায়ুরোগ-চিকিৎসা	... ১০৫২	অমৃতাদি কাথ	... "
বিস্ফোটক-চিকিৎসা ।		ব্রণগজাছুশ রস	... "
বাতিক বিস্ফোটকের লক্ষণ	১০৫৩	ব্রণারি গুগ্‌গূলু	... ১০৬০
পৈত্তিক বিস্ফোটকের লক্ষণ	"	পদ্ধতিভূত দ্রুত গুগ্‌গূলু	... "
শ্লেষ্মিক বিস্ফোটের লক্ষণ	...	বিস্ফোটে পথ্যাপথ্য	... "
দ্বন্দ্বজ বিস্ফোটের লক্ষণ	...	স্ফোটক-চিকিৎসা ।	
সান্নিপাতিক বিস্ফোটের লক্ষণ	..	অজুশরীর লক্ষণ ও চিকিৎসা	১০৬১
		কঙ্কার লক্ষণ ও চিকিৎসা	.. "

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
পাশাণগর্দভের লক্ষণ ও চিকিৎসা ... ১০৬২		জতুমণি ... ১০৬৯	
জালগর্দভের লক্ষণ ও চিকিৎসা " ১০৬৩		মাষক ... "	
বল্লীকের লক্ষণ ও চিকিৎসা .. ১০৬৩		স্তিলকালক .. "	
অগ্নিরোহিণীর লক্ষণ ... "		বাস্র ও নীলিকা ... ১০৭০	
অগ্নিরোহিণীর চিকিৎসা ... ১০৬৪		পরিবর্তিকা .. "	
বিদারিকার লক্ষণ ... "		অবপাটিকা ... ১০৭১	
বিদারিকার চিকিৎসা ... ১০৬৫		নিরুদ্ধ প্রকাশ ...	
শ্ফিড়কা-চিকিৎসা ।		সম্মিহ্নগুদ ...	
অজগরীর লক্ষণ ও চিকিৎসা ১০৬৫		গুদভ্রংশ ... ১০৭২	
ববপ্রথ্যা ... ১০৬৬		ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) ... "	
অশ্বালজী ... "		দারুণক ... ১০৭৩	
বিবৃত্তা ... "		পলিত ... "	
ইন্দ্রবিদ্ধা ... "		পদ্মিনীকণ্টক ... ১০৭৪	
গর্দভিকা ... ১০৬৭		কৃষ্ণ (ছলী) ... "	
ইরিবেল্লিকা ... "		দদ ... "	
গন্ধমালা ... "		ধামাচি ... "	
কচ্ছপিকা ... "		পাঁচড়া ... "	
পনসিকা ... "		মসূরিকা-চিকিৎসা ।	
ত্বক্ৰোগ-চিকিৎসা ।		(বসন্ত, পানিবসন্ত ও হাম ।)	
কুন্ধ ও চিপ ... ১০৬৮		বাতিক মসূরীর লক্ষণ ... ১০৭৫	
কদর ... "		পৈতিক মসূরীর লক্ষণ ... "	
পাদদারী ... "		শ্লেষ্মিক মসূরীর লক্ষণ ... "	
অলসক (পাকুই) ... ১০৬৯		রক্তজ মসূরীর লক্ষণ ... "	
যুবানপিড়কা ... "		সান্নিপাতিক মসূরীর লক্ষণ .. "	
		ত্বক্গত মসূরীর লক্ষণ ... ১০৭৬	
		হামের লক্ষণ ... "	

বিষয়	পৃষ্ঠাক	বিষয়	পৃষ্ঠাক
জল বসন্তের লক্ষণ ...	১০৭৬	ক্ষুধাচিন্তামণি ...	১০৯১
রক্তগত মস্তুরীর লক্ষণ ...	"	কন্তু রীভূষণ ...	"
মাংসগত মস্তুরীর লক্ষণ ...	"	কজ্জলীযোগ ...	১০৯২
মেদোগত মস্তুরীর লক্ষণ ...	১০৭৭	সিন্দুরযোগ ...	"
অস্থি ও মজ্জাগত মস্তুরীর লক্ষণ ...	"	দশমূলকাথ ...	"
শুক্লগত মস্তুরীর লক্ষণ ...	"	দ্রাক্ষাদিকাথ ...	"
মস্তুরীর সুখসাধ্য লক্ষণ ...	"	কিরাতাদিকাথ ...	"
মস্তুরীর কষ্টসাধ্য লক্ষণ ...	"	কন্তু রীভূষণ (মতান্তরে) ...	"
মস্তুরীর অসাধ্য লক্ষণ ...	"	গুড়চ্যাদিকাথ ...	১০৯৩
বসন্তরোগের বিস্তৃত বিবরণ ...	১০৭৮	অষ্টাঙ্গাবলেহ ...	"
বসন্তবীজের স্থি ও পুষ্টি ...	"	শঙ্খাদি চূর্ণ ...	"
বসন্তবীজের সংক্রমণ ...	১০৮০	নিষাদিকাথ ...	"
রোগ প্রবণতা ...	"	অমৃতাদিকাথ ...	১০৯৪
রোগের প্রকার ভেদ ...	১০৮১	বাসাদিকাথ ...	"
বিশিষ্ট লক্ষণ ...	"	পটোলাদিকাথ ...	"
বসন্তের চিকিৎসা সম্বন্ধে বক্তব্য ...	১০৮২	খদিরাষ্টককাথ ...	"
বসন্ত-চিকিৎসা-বিধি ...	১০৮৩	জাত্যাদিকাথ ...	"
প্রথমাবস্থার চিকিৎসা ...	১০৮৪	ইন্দুকলা বটী ...	১০৯৫
দ্বিতীয়াবস্থার চিকিৎসা ...	"	সর্বতোভদ্ররস ...	"
তৃতীয়াবস্থার চিকিৎসা ...	১০৮৬	পঞ্চতিক্ত দ্রুত ...	"
বসন্তে-বিকার ...	১০৮৭	পদ্মক দ্রুত ...	"
পঞ্চাবস্থার চিকিৎসা ...	১০৮৮	পঞ্চতিক্ত দ্রুত গুণ-গুল ...	"
উপসর্গ-চিকিৎসা ...	১০৮৯	মধ্বাদি প্রলেপ ও আশ্চ্যাতন ...	১০৯৬
আরোগ্য স্থান ...	১০৯০	বসন্তরোগে-পথ্যাপথ্য ...	"
উষ্ণ ঝোল বস্তু ঝোল ...	"	পানিবসন্ত-চিকিৎসা ...	১০৯৭
বসন্তরোগে—ঔষধ ...	১০৯১	রোমান্তী-চিকিৎসা ...	১০৯৮
স্নেহ লক্ষ্মীবিলাস ...	"	রোমান্তী রোগে ঔষধ ...	১১০২

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
অল্ললক্ষীবিলাস ...	১১০২	পামা, কচ্ছু ও পাচড়া চিকিৎসা ...	১১১২
কফচিক্তামণি ...	"	দদ্র এবং ছুলী বা সিদ্ধকুষ্ঠ ...	১১১৪
কন্তুরীভূষণ ...	"	শিত্রকুষ্ঠ ...	"
নিষাদি কাণ ...	"	কুষ্ঠরোগে ঔষধ ...	১১১৫
বাসাদি কাণ ...	"	দেবদারু লেপ ...	"
কুষ্ঠরোগ-চিকিৎসা ।		কুষ্ঠাদি লেপ ...	১১১৬
কুষ্ঠের প্রকার ভেদ ...	১১০২	তাললেপ ...	"
ক্ষুদ্রকুষ্ঠ ও মহাকুষ্ঠের		বিড়ঙ্গাদি লেপ ...	"
প্রকারভেদ ...	"	পটোলাদি কাণ ...	"
মহাকুষ্ঠের লক্ষণ ...	১১০৩	খদিরাষ্টক ...	"
ক্ষুদ্রকুষ্ঠের লক্ষণ ...	"	মঞ্জিষ্ঠাদি ...	"
সপ্তধাতুগত কুষ্ঠের লক্ষণ ...	১১০৫	বৃহৎ মঞ্জিষ্ঠাদি ...	১১১৭
কুষ্ঠরোগের বিশেষ লক্ষণ ...	"	অমৃতগুগ্গুলু ...	"
কুষ্ঠের সাধ্যসাধ্য লক্ষণ ...	"	কৈশোর গুগ্গুলু ...	"
কুষ্ঠরোগীর অরিষ্ট লক্ষণ ...	১১০৬	ত্রিফলা গুগ্গুলু ...	"
ষিত্রের লক্ষণ ..	"	নিষাদিচূর্ণ ...	১১১৮
দোষভেদে ষিত্রের লক্ষণ ...	"	রসালগুগ্গুলু ...	"
ষিত্রের সাধ্যসাধ্য লক্ষণ ...	"	গলৎকুষ্ঠারি রস ...	"
কিলাস ষিত্রের অসাধ্য লক্ষণ ...	১১০৭	বিশেষ্বর রস ...	"
কুষ্ঠের সংক্রামকতা ...	"	মাণিক্য রস ...	১১১৯
কুষ্ঠ চিকিৎসা বিধি ...	"	কুষ্ঠকালানল রস ...	"
চিকিৎসা সঙ্কেত ...	১১০৮	তালভক্ষ ...	"
এককুষ্ঠ-চিকিৎসা ...	১১১১	মহাতালকেশ্বর রস ...	"
গজচন্দ্র ও কিটিম ...	১১১২	পঞ্চনিষ ...	১১২০
বৈপাদিক, চন্দ্রদল ও বিচর্চিকা-		পঞ্চনিষ (মতান্তরে) ...	"
চিকিৎসা ...	"	অমৃতাস্থর দ্রোহ ...	"
		খেতারি ...	১১২১

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
সোমরাজী ঘৃত	... ১১২১	বৃহৎ কফকেতু	... ১১২৮
মহাখদিরাদি ঘৃত	... ১১২২	শ্লেষ্মসুন্দর রস	... "
বাসারুদ্র তৈল	... "	বৃহৎ কফকেতু (মতান্তরে)	... "
কুষ্ঠকালানল তৈল	... ১১২৩	শ্লেষ্মকালানল রস	... ১১২৯
মরিচাদি তৈল	... "	শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র রস	... "
বিষ তৈল	... ১১২৪	মহাশ্লেষ্মকালানল রস	... "
কুষ্ঠরাক্ষস তৈল	... "	ধুতুর তৈল	... "
কুষ্ঠরোগে পথ্যাপথ্য	... "	কফরোগে পথ্যাপথ্য	... ১১৩০

পিত্তরোগ-চিকিৎসা ।

পিত্তরোগের লক্ষণ	... ১১২৫
পৈত্তিকরোগ চিকিৎসাবিধি	... "
পৈত্তিকরোগে ঔষধ	... ১১২৬
গুড়ুচ্যাদি লৌহ	... "
পিত্তাস্তক লৌহ	... "
পিত্তাস্তক রস	... "
মহাপিত্তাস্তক রস	... "
গুড়ুচ্যাদি তৈল	... "
বৃহৎ গুড়ুচ্যাদি তৈল	... "
পৈত্তিকরোগে পথ্যাপথ্য	... ১১২৭

কফরোগ-চিকিৎসা ।

কফরোগের লক্ষণ	... ১১২৭
কফরোগ চিকিৎসা-বিধি	... "
কফরোগে ঔষধ	... ১১২৮
কফকেতু	... "
কফকেতু (মতান্তরে)	... "
কফচিক্তামণি	... "

শিরোরোগ-চিকিৎসা ।

বাতিক শিরোরোগের লক্ষণ	১১৩০
পৈত্তিক শিরোরোগের লক্ষণ	...
শ্লেষ্মিক শিরোরোগের লক্ষণ	...
সান্নিপাতিক শিরোরোগের লক্ষণ	...
ক্ষতজ শিরোরোগের লক্ষণ	১১৩১
ক্ষয়জ শিরোরোগের লক্ষণ	...
ক্রিমিজনিত শিরোরোগের লক্ষণ	...
স্বর্ধ্যাবর্তরোগের লক্ষণ	... "
অনন্তবাতের লক্ষণ	... "
অর্জাবভেদক শিরোরোগের লক্ষণ	...
শঙ্খক শিরোরোগের লক্ষণ	১১৩২
শিরোরোগ-চিকিৎসা-বিধি	...
শিরোরোগে—ঔষধ	... ১১৩৫
লক্ষ্মীবিলাস	... "
স্বল্প লক্ষ্মীবিলাস	... "
লক্ষ্মীবিলাস (মতান্তরে)	... "
মহা লক্ষ্মীবিলাস	... ১১৩৬

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
বৃহৎ নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস ...	১১৩৬	রক্তজ লিঙ্গনাশের লক্ষণ ...	১১৪১
নারদীয় মহালক্ষ্মীবিলাস ...	"	সান্নিপাতিক তিমিরের লক্ষণ	"
মহা লক্ষ্মীবিলাস (মতান্তরে)	"	পরিণায়ীর লক্ষণ ...	"
শিরোবজ্ররস ...	১১৩৭	দৃষ্টিমণ্ডলের বর্ণের সামান্য লক্ষণ	১১৪২
অৰ্দ্ধনাড়ী নাটকেণ্ডর ...	"	দৃষ্টিমণ্ডলের বর্ণের বিশেষ লক্ষণ	"
নশ্রু ...	"	পিত্ত বিদগ্ধ দৃষ্টির লক্ষণ ...	"
দশমূল তৈল ...	১১৩৮	শ্লেষবিদগ্ধদৃষ্টির লক্ষণ ...	"
মধ্যম দশমূল তৈল ...	"	ধূমদর্শনের লক্ষণ ...	১১৪৩
বৃহৎ দশমূল তৈল ...	"	হৃষ জড়তার লক্ষণ ...	"
বৃহৎ দশমূল তৈল (মতান্তরে)	"	নকুলান্ধ্যরোগের লক্ষণ ...	"
মহা দশমূল তৈল ...	১১৩৯	গম্ভীরকের লক্ষণ ...	"
ষড়্‌বিন্দু তৈল ...	"	নিমিত্তজ দৃষ্টিনাশের লক্ষণ ...	"
শিরোরোগে—পথ্য ...	"	অনিমিত্তজ দৃষ্টিনাশের লক্ষণ	"

নেত্ররোগ-চিকিৎসা ।

(দৃষ্টিগত-রোগ ।)

প্রথম পটলাশ্রিতরোগের লক্ষণ	১১৪০
দ্বিতীয় পটলাশ্রিতরোগের লক্ষণ	"
তৃতীয় পটলাশ্রিতরোগের লক্ষণ	"
দোষের অবস্থান ভেদে রোগের লক্ষণ	...
চতুর্থ পটলাশ্রিতরোগের লক্ষণ	১১৪১
রক্তবর্ণ দৃষ্টিমণ্ডলরোগের নাম ও সংখ্যা	...
বাতিক তিমিরের লক্ষণ	...
পৈত্তিক তিমিরের লক্ষণ	...
শ্লেষিক তিমিরের লক্ষণ	...

(নেত্রকৃৎগতরোগ ।)

রক্তগতরোগের নাম ও সংখ্যা	১১৪৩
সত্রণ্ডক্কের লক্ষণ	...
সত্রণ্ডক্কের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ	১১৪৪
অত্রণ্ডক্কের লক্ষণ	...
অত্রণ্ডক্কের রক্তসাধ্য লক্ষণ	"
অত্রণ্ডক্কের অসাধ্য লক্ষণ	...
অপর অসাধ্য লক্ষণ	...
অন্ধিপাকাত্ম্যের লক্ষণ	...
অজকাজাতের লক্ষণ	...

(নেত্রসন্ধিগতরোগ ।)

সন্ধিগতরোগের নাম ও সংখ্যা	১১৪৫
পৃথালসের লক্ষণ	...

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
উপনাহের লক্ষণ ...	১১৪৫	পোথকীর লক্ষণ ...	১১৪৭
চতুর্বিধ আবেদন সম্প্রাপ্তি ...	"	বহুশর্করার লক্ষণ ...	১১৪৮
পৈত্তিকআবেদন লক্ষণ ...	"	বহুশর্কের লক্ষণ ...	"
ধৈর্যিকআবেদন লক্ষণ ...	"	শুষ্কশর্কের লক্ষণ ...	"
সান্নিপাতিকআবেদন লক্ষণ ...	"	অজ্ঞান দূষিকার লক্ষণ ...	"
রক্তজআবেদন লক্ষণ ...	"	বহুলবহুকের লক্ষণ ...	"
পবনিকার লক্ষণ ...	"	বহুবহুকের লক্ষণ ...	"
অলজীর লক্ষণ ...	১১৪৬	ক্রিষ্টবহুকের লক্ষণ ...	"
ক্রিমিগ্রস্তির লক্ষণ ...	"	বহুবহুকের লক্ষণ ...	"
(নেত্রশুল্লগতরোগ ।)		শ্যামবহুকের লক্ষণ ...	"
শুল্লগতরোগের নাম ও সংখ্যা ...	১১৪৬	প্রক্রিমবহুকের লক্ষণ ...	"
প্রস্তার্যাক্ষরোগের লক্ষণ ...	"	অক্রিমবহুকের লক্ষণ ...	"
শুল্লাক্ষের লক্ষণ ...	"	বাতহতবহুকের লক্ষণ ...	১১৪৯
রক্তাক্ষের লক্ষণ ...	"	বহুবহুকের লক্ষণ ...	"
অধিমাংসাক্ষের লক্ষণ ...	"	নিমেবের লক্ষণ ...	"
ধাতুাক্ষের লক্ষণ ...	"	শোণিতাক্ষের লক্ষণ ...	"
শুল্লিকার লক্ষণ ...	"	নগণের লক্ষণ ...	"
অক্ষুণ্ণের লক্ষণ ...	"	বিষবহুকের লক্ষণ ...	"
পিষ্টকের লক্ষণ ...	১১৪৭	কুণ্ঠনের লক্ষণ ...	"
শিরাজালের লক্ষণ ...	"	(পক্ষ্মগতরোগ ।)	
শিরাজ পিড়কার লক্ষণ ...	"	পক্ষ্মগতরোগের নাম ও সংখ্যা ...	"
বলাসগ্রস্তির লক্ষণ ...	"	পক্ষ্মকোপরোগের লক্ষণ ...	১১৫০
(নেত্রবহুগতরোগ ।)		পক্ষ্মশাতের লক্ষণ ...	"
বহুগতরোগের নাম ও সংখ্যা ...	১১৪৭	(নেত্রসর্বগতরোগ ।)	
উৎসঙ্গপিড়কার লক্ষণ ...	"	অভিযানের নাম ও সংখ্যা ...	১১৫০
কুস্তিকার লক্ষণ ...	"	সর্বপ্রকার অভিযানের সাধারণ লক্ষণ ...	"

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
বাতিক অভিযানের লক্ষণ	১৫০	বিড়ালক	... ১১৫২
পৈত্তিক অভিযানের লক্ষণ	"	পক অভিযানরোগের চিকিৎসা	"
শৈথিল্যিক অভিযানের লক্ষণ	"	অঙ্গন	... "
রক্তজ অভিযানের লক্ষণ ..	"	রাত্র্যাক্রতা	... ১১৬০
অধিমহুরোগের কারণ ও সংখ্যা ১১৫১		ছানি	... "
চতুর্বিধ অধিমহুর সাধারণ লক্ষণ	"	নেত্ররোগে ঔষধ	... "
চতুর্বিধ অধিমহুর বিশেষ লক্ষণ	"	চন্দনলেপ	... "
অধিমহুর অরিত্ত লক্ষণ ...	"	নিম্বপত্রযোগ	... "
শোথবিশিষ্ট অক্ষিপাকের লক্ষণ	"	কপূরযোগ	... "
শোথশূন্য অক্ষিপাকের লক্ষণ	"	নীলযোগ	... ১১৬১
অক্ষির অপক লক্ষণ ...	"	চন্দ্রোদয়বর্তি	... "
অক্ষির পক লক্ষণ ...	"	বৃহৎ চন্দ্রোদয়বর্তি	... "
হতাধিমহুর লক্ষণ ... ১১৫২		কুমারিকাবর্তি	... "
বাতপর্যায়ের লক্ষণ ...	"	কৃষ্টিপ্রদাবর্তি	... "
শুষ্কাক্ষিপাকের লক্ষণ ...	"	চন্দনাত্তাবর্তি	... "
অন্তাতোবাতের লক্ষণ ...	"	চন্দ্রপ্রভাবর্তি	... ১১৬২
অগ্নাধ্বাষিতের লক্ষণ ...	"	পঞ্চশতিকাবর্তি	... "
শিরোৎপাতের লক্ষণ ...	"	কঙ্কাল	... "
শিরাপ্রহর্বরোগের লক্ষণ ...	"	ভৃঙ্গরাজতৈল	... "
নেত্ররোগ-চিকিৎসা-বিধি ..	"	ষড়্বিন্দুতৈল	... "
অপক অভিযানরোগের লক্ষণ ১১৫৫		অভিজিততৈল	... "
সেক, আশ্চ্যোতন, পিণ্ডী, বিড়া-		বাসকাদিকাধ	... "
লক, তর্পণ ও পুটপাক প্রয়োগ	"	বৃহৎ বাসকাদিকাধ	... "
কপূরশোধন প্রণালী ... ১১৫৭		নেত্রাশনি রস	... "
সেক বা সেচন ...	"	নয়নামৃতলৌহ	... ১১৬৪
আশ্চ্যোতন ... ১১৫৮		তিমিরহরলৌহ	... "
পিণ্ডী ... ১১৫৯		ক্ষতশূলহরগুগ্গু	... "

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
সপ্তমৃতলোহ	... ১১৬৪	বাতিক কর্ণরোগের লক্ষণ	... ১১৬৮
ত্রিকলাদ্য ঘৃত	... "	পৈত্তিক কর্ণরোগের লক্ষণ	...
দ্বিতীয় ত্রিকলাদ্য ঘৃত	... "	শ্লেষ্মিক কর্ণরোগের লক্ষণ	...
বৃহৎ ত্রিকলাদ্য ঘৃত	... "	সান্নিপাতিক কর্ণরোগের লক্ষণ	১১৬৯
মহা ত্রিকলাদ্য ঘৃত	... "	পরিপোটকের লক্ষণ	...
নেত্ররোগে—পথ্যাপথ্য	... ১১৬৬	কর্ণোৎপাতের লক্ষণ	...
কর্ণরোগ-চিকিৎসা ।		উন্নয়কের লক্ষণ	...
কর্ণশুলের লক্ষণ	... "	দুঃখবর্জনের লক্ষণ	...
কর্ণশুলের অসাধ্য লক্ষণ	... "	পরিলেহীর লক্ষণ	...
কর্ণনাদের লক্ষণ	... "	কর্ণরোগ চিকিৎসাবিধি	...
বারিষ্যের লক্ষণ	... "	মুষ্টিযোগ	... ১১৭১
বারিষ্যের অসাধ্য লক্ষণ	... ১১৬৭	কর্ণরোগে ঔষধ	... ১১৭৪
কর্ণক্ষেড় রোগের লক্ষণ	... "	ভৈরব রস	...
কর্ণশ্রাবের লক্ষণ	... "	ইন্দুবটী	...
কর্ণকণ্ডুর লক্ষণ	... "	শারিবাতি বটী	...
কর্ণগৃথরোগের লক্ষণ	... "	বিস্মতৈল	... ১১৭৫
প্রতিনাহরোগের লক্ষণ	... "	শদুকাদি তৈল	...
ক্রিমিকর্ণের লক্ষণ	... "	দারুকাদি তৈল	...
কর্ণরন্ধ্র মধ্যে পতঙ্গাদি প্রবেশ	...	কর্ণরোগে পথ্যাপথ্য	...
কর্ণিলে তাহার লক্ষণ	... "	নাসারোগ-চিকিৎসা ।	
দ্বিবিধ কর্ণবিদ্রবির লক্ষণ	... "	পীনসরোগের লক্ষণ	... ১১৭৬
কর্ণপাকের লক্ষণ	... ১১৬৮	পীনসের অগুরু লক্ষণ	...
পুতিকর্ণের লক্ষণ	... "	পীনসের গুরু লক্ষণ	...
কর্ণশোথের লক্ষণ	... "	পুতিনস্যের লক্ষণ	...
কর্ণার্শ্বদ্বয়ের লক্ষণ	... "	নাসাপাকের লক্ষণ	...
কর্ণার্শ্বের লক্ষণ	... "	পুয়রক্তের লক্ষণ	...

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
ক্ষবধুর লক্ষণ ...	১১৭৭	পৈত্তিক ওষ্ঠরোগের লক্ষণ ...	১১৮৪
অগস্ত্য ক্ষবধুর লক্ষণ ...	"	শ্লেষ্মিক ওষ্ঠরোগের লক্ষণ ...	"
ব্রংশধুর লক্ষণ ...	"	সান্নিপাতিক ওষ্ঠরোগের লক্ষণ ...	"
দীপ্তিরোগের লক্ষণ ...	"	রক্তজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ ...	১১৮৫
প্রতিনাহের লক্ষণ ...	"	ষাৎসজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ ..	"
নাসাস্রাবের লক্ষণ ...	"	যেদোজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ	"
নাসা-শোথের লক্ষণ ...	"	অভিঘাতজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ	"
বাতিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ	"	ওষ্ঠরোগের অসাধ্য লক্ষণ ...	"
পৈত্তিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ	"	ওষ্ঠরোগ-চিকিৎসা-বিধি ...	"
শ্লেষ্মিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ	"	দন্তরোগ-চিকিৎসা ।	
সান্নিপাতিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ ১১৭৮		দালানলের লক্ষণ ...	১১৮৭
রক্তজ প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ ...	"	ক্রিমিদন্তের লক্ষণ ...	"
প্রতিশ্যায়ের কৃচ্ছ্রসাধ্য লক্ষণ	"	ভগ্ননকের লক্ষণ	"
প্রতিশ্যায়ের অসাধ্য লক্ষণ	"	দন্তুহর্ষ	"
বর্দ্ধিত প্রতিশ্যায়ের ক্রিমির লক্ষণ	"	দন্তুশর্করা	"
বর্দ্ধিত প্রতিশ্যায়ের অপর লক্ষণ	"	কপালিকা	"
নাসারোগ-চিকিৎসাবিধি	"	গ্ৰাবদণ্ড	"
নাসারোগে ঔষধ ...	১১৮২	করালদণ্ড	১১৮৮
বাসাকায়	"	ফিঙ্গ দণ্ড	"
কটফলাদি চূর্ণ ...	১১৮৩	অসাধ্য লক্ষণ	"
বেগ্যাদি চূর্ণ	"	দন্তরোগ চিকিৎসাবিধি ...	"
শোভাজন নস্য	"	দন্তোদগমকাল	১১৮৯
পঞ্চামৃত রস	"	দন্তরোগে ঔষধ	১১৯০
নাসারোগে পথ্যাপথ্য ...	১১৮৪	দন্তরোগাশনি চূর্ণ	"
ওষ্ঠরোগ-চিকিৎসা ।		দশন সংস্কার চূর্ণ	"
বাতিক ওষ্ঠরোগের লক্ষণ " "		বকুলাদ্য ঠৈল	১১৯১

বিষয় পৃষ্ঠাক.

দন্তবেষ্টরোগ-চিকিৎসা।

দীতাদরোগের লক্ষণ ... ১১১১

দন্তপুঞ্জ টরোগের লক্ষণ ... "

দন্তবেষ্টরোগের লক্ষণ ... "

শৈশিররোগে লক্ষণ ... "

মহাশৈশিররোগের লক্ষণ ... "

পরিদররোগের লক্ষণ ... "

উপকূশরোগের লক্ষণ ... ১১২২

বৈদভরোগের লক্ষণ ... "

খলিবর্ধনরোগের লক্ষণ ... "

অধিমাংসরোগের লক্ষণ ... "

দন্তনালী ... "

দন্তবিদ্রাব ... "

অসাধ্য লক্ষণ ... "

দন্তবেষ্টরোগ-চিকিৎসাবিধি ... "

ঋষিরোগের লক্ষণ ... ১১২৩

দন্তবেষ্টরোগে ঔষধ ... ১১২৫

কালকূর্ণ ... "

বল্লভদির বাটিকা ... "

সুগন্ধদাদি ঝাথ ... "

পটোলাদি ঝাথ ... ১১২৬

রসেন্দ্রবটী ... "

জিহ্বরোগ-চিকিৎসা।

বাতিক জিহ্বরোগের লক্ষণ ১১২৬

পৈত্তিক জিহ্বরোগের লক্ষণ ... "

শ্লেষ্মিক জিহ্বরোগের লক্ষণ ... "

বিষয় পৃষ্ঠাক

অলাসরোগের লক্ষণ ... ১১২৬

উপক্লিষ্টিকা ... ১১২৭

অসাধ্য লক্ষণ ... "

জিহ্বরোগ-চিকিৎসাবিধি ... "

তালুরোগ-চিকিৎসা।

গলগুণ্ডীর লক্ষণ ... ১১২৮

ভুক্তিকেরীর লক্ষণ ... "

অক্ষরোগের লক্ষণ ... ১১২৯

কচ্ছুরোগের লক্ষণ ... "

তাম্বকুদরোগের লক্ষণ ... "

মাংসস্জ্জ্বাতের লক্ষণ ... "

তালুপুঞ্জ টরোগের লক্ষণ ... "

তালুশোষের লক্ষণ ... "

তালুপাক ... "

অসাধ্য লক্ষণ ... "

তালুরোগ চিকিৎসাবিধি ... "

গলরোগ-চিকিৎসা।

বাতিকরোহিণীর লক্ষণ ... ১২০০

পৈত্তিকরোহিণীর লক্ষণ ... "

শ্লেষ্মিক রোহিণীর লক্ষণ ... "

সান্নিপাতিক রোহিণীর লক্ষণ ... "

রক্তজ রোহিণীর লক্ষণ ... ১২০১

রোহিণীরোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ... "

কণ্ঠশালুকের লক্ষণ ... "

অধিজিহ্বকরোগের লক্ষণ ... "

বলয়রোগের লক্ষণ ... "

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
বলাসরোগের লক্ষণ	... ১২০১	কাষাজি	... ১২০৭
একবৃন্দরোগের লক্ষণ	... "	ঘোনি	... "
বৃন্দরোগের লক্ষণ	... "	বৃহৎ ওষ্ঠদ্বয়	... ১২০৮
শতরীরোগের লক্ষণ	... "	ক্ষুদ্র ওষ্ঠদ্বয়	... "
শিলায়ুরোগের লক্ষণ	... ১২০২	ভগাঙ্কুর	... "
গলবিভ্রথির লক্ষণ	... "	মূত্রনলী	... "
গলোঘরোগের লক্ষণ	... "	ঘোনিপটহ বা সতীক্ষুদ্র	... "
স্বরস্ররোগের লক্ষণ	... "	জরায়ু	... "
মাংসতানরোগের লক্ষণ	... "	ভিষ্মাশয় বা অণ্ডাশয়	... "
বিদারীরোগের লক্ষণ	... "	ঘোনি ও ভগ	... "
অসাধ্য লক্ষণ	... ১২০৩	(স্ত্রীজননেদ্রিয়ের রোগ)	
গলরোগ-চিকিৎসা-বিধি	... "	উদাবর্তার লক্ষণ	... ১২০৯
গলরোগে-ঔষধ	... ১২০৫	বক্ষ্যার লক্ষণ	... "
কটুকাদ্যাকাথ	... "	বিপ্লুতার লক্ষণ	... "
কটুকাদি চূর্ণ	... "	পরিপ্লুতার লক্ষণ	... "
রসেন্দ্রবটী	... "	বাতলার লক্ষণ	... "
সর্বসরোগ-চিকিৎসা ।		লোহিতক্ষয়ার লক্ষণ	... "
বাতিক সর্বসরোগের লক্ষণ	১২০৫	প্রস্রংসিনীর লক্ষণ	... "
পৈত্তিক সর্বসরোগের লক্ষণ	"	বামিনীর লক্ষণ	... "
শ্লেষ্মিক সর্বসরোগের লক্ষণ	"	পুল্লরীর লক্ষণ	... "
সর্বসরোগ-চিকিৎসা-বিধি	১২০৬	পিত্তলীর লক্ষণ	... "
মূথরোগে-পথ্যাপথ্য	... "	অত্যানন্দার লক্ষণ	... ১২১০
স্ত্রীরোগ-চিকিৎসা ।		কর্ণিনীর লক্ষণ	... "
(স্ত্রীজননেদ্রিয়)		অচরণার লক্ষণ	... "
বাহুজননেদ্রিয়	... ১২০৭	অতিচরণার লক্ষণ	... "
অন্তর্জননেদ্রিয়	... "	শ্লেষ্মলার লক্ষণ	... "

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
যণ্ডীর লক্ষণ	১২১০	শুদ্ধরক্তঃ বা আর্দ্রবের লক্ষণ	১২১৫
অগ্নিনীর লক্ষণ	...	যোনিরোগ	১২১৬
বিরতীর লক্ষণ	...	বক্ষ্য	১২১৮
স্থিতিবজ্রার লক্ষণ	...	চিকিৎসা	...
সান্নিপাতিক যোনিরোগের লক্ষণ	"	রজোহ্রতা, রজোলোপ, কষ্টরজঃ	"
যোনিরোগের অসাধ্য লক্ষণ	..	ও রজোহ্রিকরোগ	...
যোনিকন্দ	১২১১	যোনিকন্দ	১২২০
বাতিক যোনিকন্দের লক্ষণ...	"	প্রদর	...
পৈত্তিক যোনিকন্দের লক্ষণ ..	"	শ্বেতপ্রদর	১২২২
শ্লেষ্মিক যোনিকন্দের লক্ষণ ..	"	বাধক	১২২৩
সান্নিপাতিক যোনিকন্দের লক্ষণ	"	স্তনরোগ	...
প্রদর	...	স্তনরোগ-চিকিৎসা	১২২৪
প্রদরের সামান্য লক্ষণ	...	স্তনরোগে পথ্যাপথ্য	...
বাতিক প্রদরের লক্ষণ	...	শুভ্রদৃষ্টি	১২২৫
পৈত্তিক প্রদরের লক্ষণ	...	শুভ্রপদীক্ষা	...
শ্লেষ্মিক প্রদরের লক্ষণ	...	শুভ্রদৃষ্টি-চিকিৎসা	...
সান্নিপাতিক প্রদরের লক্ষণ	"	শুভ্রদৃষ্টিরোগে ঔষধ	১২২৬
প্রদরের অসাধ্য লক্ষণ	...	দশমূল কাণ্ড	...
শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিয়া	১২১২	গুড়ুচ্যাতি কাণ্ড	...
বাধক	...	ভার্গ্যাতি কাণ্ড	...
রক্তমাত্রী বাধকের লক্ষণ	...	শুভ্রবর্দ্ধক যোগ	১২২৭
যঙ্গীবাধকের লক্ষণ	১২১৩	আর্দ্রবহুষ্টি, যোনিরোগ, রক্তপ্রদর,	
অজুর বাধকের লক্ষণ	...	শ্বেতপ্রদর ও বাধকরোগে-	
জল কুমারক বাধকের লক্ষণ	"	ঔষধ	...
বাধকের কারণ ও সামান্য লক্ষণ	"	জ্বরোধক যোগ	...
স্ত্রীরোগ চিকিৎসা বিধি	...	রজঃপ্রবর্ত্তিনী বটী	...
রজোদৃষ্টির লক্ষণ	১২১৫	বস্তিযোগ	১২২৮

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
দার্ক্যাদি কাথ	... ১২২৮	গর্ভপাতের কারণ	... ১২৩৯
অশোক কাথ	... "	গর্ভপাতের পূর্ব লক্ষণ	... "
অনস্তাদি কাথ	... "	গর্ভশ্রাবের কাল	... "
চন্দনাদি চূর্ণ	... ১২২৯	গর্ভপাতের উদাহরণ	... "
পুষ্যাচুর্ণ চূর্ণ	... "	গর্ভপাতের উপদ্রব	... ১২৪০
পুষ্কর লহ	... ১২৩০	অকাল প্রসবের লক্ষণ	... "
প্রদরাস্তক লৌহ	... "	নাগোদর গর্ভের লক্ষণ	... "
প্রদরারি লৌহ	... "	গর্ভিণীরোগ চিকিৎসা বিধি	...
নষ্ট পুষ্পাস্তক রস	... ১২৩১	গর্ভশূল ও রক্তশ্রাব	... ১২৪২
প্রদরাস্তক রস	... "	গর্ভিণীরোগে ঔষধ	... ১২৪৬
চন্দ্রাংগু রস	... "	অষ্টাঙ্গাবলেহ	... "
অশোক ঘৃত	... ১২৩২	হ্রীবেরাদি কাথ	... "
ফলকল্যাণ ঘৃত	... "	বৃহৎহ্রীবেরাদি কাথ	... "
বৃহৎ শতাবরী ঘৃত	... ১২৩৩	উৎপলাদি কাথ	... "
সিতকল্যাণ ঘৃত	... "	এরুণ্ডাদি কাথ	... ১২৪৭
কুমার কল্পদ্রুম ঘৃত	... "	শৃঙ্গাদি চূর্ণ	... "
প্রদর, বাধক ও যোনিরোগে- পথ্যাপথ্য	... ১২৩৪	বাসা কাথ	... "
গর্ভিণীরোগ-চিকিৎসা	... ১২৩৫	বৃহৎ অগ্নিকুমার	... "
যৌবন	... "	ভুবনেম্বর	... "
ঋতু বা স্ত্রীধর্ম	... "	শ্বেত চূর্ণ	... "
প্রথম ঋতুদর্শনের কাল	... "	অন্নারি (সাদা চটী)	... ১২৪৮
গর্ভসঞ্চার ও তজ্জনিত উপদ্রব	... ১২৩৬	লবঙ্গাদি চূর্ণ	... ১২৪৯
সতর্কতা	... ১২৩৭	প্রাণবল্লভ রস	... "
শরীর, মন ও পরিশ্রম	... "	গর্ভবিনোদ রস	... "
অকরণীয়	... ১২৩৮	গর্ভচিস্তামণি	... "
পীড়া	... "	স্নগ্ন গর্ভচিস্তামণি	... "
		বৃহৎ গর্ভচিস্তামণি	... "

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
মূঢ়গর্ভ বা অস্বাভাবিক প্রসব ।		সূতিকারোগ-চিকিৎসা ।	
মূঢ়গর্ভের কারণ ও লক্ষণ	১২৫০	সূতিকারোগের লক্ষণ	১২৬২
মূঢ়গর্ভের সংখ্যা	...	সূতিকারোগের অসাধ্য লক্ষণ	..
মূঢ়গর্ভের অসাধ্য লক্ষণ	— ১২৫২	মক্ললগুলের নিদান ও লক্ষণ	..
গর্ভিণীর অপর অসাধ্য লক্ষণ	..	সূতিকা চিকিৎসা বিধি
গর্ভস্থ সন্তান বিনষ্টের কারণ	..	সূতিকারোগে ঔষধ	— ১২৬৬
মূঢ়গর্ভের লক্ষণ	...	দশমূল কাথ
যোনি সম্বরণ রোগের লক্ষণ	..	অমৃতাদি কাথ
মূঢ়গর্ভ চিকিৎসা	—	সূতিকা দশমূল কাথ
স্বাভাবিক প্রসব ।		দেবদার্ব দি কাথ
সূতিকা গৃহ	১২৫৪	পিপ্পল্যাди ও বৃহৎ পিপ্পল্যাди	
ভূমিষ্ঠ সন্তান পরীক্ষা	...	কাথ	১২৬৭
প্রসবকাল	১২৫৫	সূতিকারি রস
আসন্নপ্রসবা স্ত্রীর লক্ষণ	...	সূতিকা বিনোদ রস
ধাত্রীর কর্তব্য	১২৫৭	বৃহৎ সূতিকা বিনোদ রস
নাভিরঙ্জু ছেদন	...	অষ্টাঙ্গাবলেহ	১২৬৮
অমরা বা ফুল	...	শূল্যাди চূর্ণ
গাত্রধাবন	১২৫৮	সূতিকা স্তক রস
সেকতাপ	...	দ্বিতীয় সূতিকা রি রস
রক্তপ্রাব	...	সূতিকা রস	— ১২৬৯
শিশু ও প্রসূতির পান্যাদি	১২৫৯	সূতিকা হর রস
স্তন্যপান বিধি	...	মহাত্র বটী
স্তন্যভাবে অল্প দুগ্ধের ব্যবহা	..	দ্বিতীয় মহাত্রবটী
গর্ভিণীরোগে পথ্যাপথ্য	১২৬০	রসশাদ্দূল	— ১২৭০
মৈথুন	১২৬১	মহারসশাদ্দূল
		বৃহৎ রসশাদ্দূল

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
স্বর্ণসিন্দূর ও মকরধ্বজের		যক্ষ্মারোগে	১২৭৫
প্রয়োগ-প্রণালী	১২৭১	অর্শোরোগে	...
রসসিন্দূর, স্বর্ণসিন্দূর ও মকরধ্বজের		স্বরভঙ্গে	...
অনুপান	১২৭২	অরুচিরোগে	...
সামজ্বরে	.. "	ক্রিমিরোগে	...
জ্বরবিকারে	...	বমনরোগে	...
নিরামজ্বরে ও পুরাতনজ্বরে—	১২৭৩	তৃষ্ণারোগে	... ১২৭৬
প্লীহাজ্বরে	...	দাহরোগে	...
যক্ষ্ম সংযুক্ত জ্বরে	...	মূচ্ছারোগে	...
শোথসংযুক্ত জ্বরে	...	উন্মাদরোগে	...
কাসে বা কাসসংযুক্তজ্বরে	...	অপস্মার ও হিষ্টিরিয়ারোগে	...
শ্বাসে বা শ্বাসসংযুক্ত জ্বরে	...	বাতব্যাধিরোগে	...
হিকারোগে বা হিকাসংযুক্তজ্বরে	...	উরুস্তম্বরোগে	...
মন্দাগ্নিতে	...	আমবাতে	...
আমাজীর্ণে	...	শীতপিত্ত, উদর্দ ও কোঠরোগে	...
বিদগ্ধাজীর্ণে	১২৭৪	অগ্নপিত্তে	...
বিষ্টকাজীর্ণে	.. "	শূলরোগে	... ১২৭৭
জ্বরাতীসারে	...	উদাবর্ত ও আনাহরোগে	...
অতীসারে	...	গুদরোগে	...
গ্রহণীরোগে	.. "	হৃদ্রোগে	...
প্রবাহিকারোগে (আমাশয়ে)	...	মূত্রকৃচ্ছ ও মূত্রাঘাতে	...
রক্তাতীসার ও রক্তপ্রবাহিকা বা		অশ্মরীরোগে	...
রক্তামাশয়রোগে	...	মেহরোগে	... ১২৭৮
বিশ্চিকারোগে	...	সোমরোগে অর্থাৎ বহুমূত্রে	...
পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকরোগে	...	কৃশতারোগে	...
রক্তপিত্ত ও রক্তপিত্তসংযুক্তজ্বরে	...	উদরীরোগে	...
রক্তপিত্তে	১২৭৫	বৃদ্ধি অর্থাৎ মূরগুরোগে	...

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
শ্রীপদ অর্থাৎ গোদরোগে ...	১২৭৮	পিত্তদুষ্টি স্তম্ভপায়ী শিশুরোগের	
বিদ্রবিরোগে ...	"	লক্ষণ ...	১২৮১
ত্রণশোথ ও ত্রণরোগে ...	"	শ্লেষ্মদুষ্টি স্তম্ভপায়ী শিশুরোগের	
ভগন্দরোগে ...	"	লক্ষণ ...	"
ফিরঙ্গ বা গম্ভীরোগে ...	"	দ্বিদোষদুষ্টি স্তম্ভপায়ী শিশুরোগের	
কূষ্ঠরোগে ...	"	লক্ষণ	১২৮২
বসন্তরোগে ...	"	ত্রিদোষদুষ্টি স্তম্ভপায়ী শিশুরোগের	
নাসারোগে ...	১২৭৯	লক্ষণ ...	১২৮২
নেত্র বা চক্ষুরোগে ...	"	কুহ্ননকরোগের লক্ষণ ...	"
শিরোরোগে ...	"	পারিগর্ভিকরোগের লক্ষণ ...	"
প্রদররোগে ...	"	তালুকটক ...	"
বাধকে ...	"	মহাপদ্মকরোগের লক্ষণ ...	"
গর্ভিণীরোগে ...	"	তুণ্ডী বা নাভিশোথের লক্ষণ	১২৮৩
স্থতিকারোগে ...	"	নাভিপাক ...	"
বালরোগে ...	"	গুহ্যপাকের লক্ষণ ...	"
বিষাধিকারে ...	১২৮০	অহিপ্তনরোগের লক্ষণ ...	"
রসায়নে ...	"	অজগল্লী ...	"
বাস্ত্রীকরণে ...	"	আক্ষেপ অর্থাৎ ভূতে পাওয়া	"
স্বর্ণসিন্দূর ও রসসিন্দূর ...	"	দন্তোদগমজনিতরোগ ...	১২৮৪
মকরধ্বজ ...	"	শিশুরোগ-চিকিৎসা-বিধি ...	"
স্থতিকারোগে পথ্যাপথ্য ...	"	শিশুর উপযোগী ঔষধ ...	১২৮৯
		ঔষধ খাওয়াইবার প্রণালী ..	১২৯০
		মাত্রার নিয়ম ...	"
		বয়স অনুসারে মাত্রার সংক্ষিপ্ত	
		নিয়মাবলী ...	১২৯১
		সংক্ষিপ্তনিয়মাবলীর ব্যাখ্যা	১২৯২
		শিশুর ক্রাথ প্রস্তুতের নিয়ম	"

শিশু-চিকিৎসা ।

(শিশু ও বালকের পীড়া)

বাস্তদুষ্টি স্তম্ভপায়ী শিশুরোগের
লক্ষণ ... ১২৮১

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
স্তম্ভপান-বিধি	... ১২২৫	গ্ৰীহা, যজ্ঞ ও অগ্রমাস	... ১৩০৪
শিশুর লজ্বন	... ১২২৬	শোধ	... ১৩০৫
স্তম্ভদৃষ্টজনিতরোগের চিকিৎসা	..	পাণ্ডু	... "
কুষ্ঠনকরোগ	... "	জ্বরাতীসার	... "
পারিগর্ভিকরোগ	... ১২২৭	জ্বর, অতীসার ও বমন	... "
তালুকণ্টক	... "	প্রবল অতীসার	... "
মহাপান	... "	আমাতীসার ও আমাশয়	... "
তুণ্ডী বা নাভিশোধ	... "	রক্তাতীসার ও রক্তামাশয়	... "
নাভিপাক	... "	গ্রহণী	... "
গুহপাক	... ১২২৮	অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ	... "
অহিপ্তন	... "	কাস	... ১৩০৬
অজগল্লী	... "	কাস ও শ্বাস	... "
আক্কেপ	... "	হিকা ও শ্বাস	... "
দন্তোদ্যমজনিতরোগ	... ১২২৯	ফোস ও তমকশ্বাস	... "
রোদন	... ১৩০০	হিকা ও বমি	... "
মুখপাক ও মুখজিহ্বাদির ক্ষত	..	বমি	... "
শ্রাব	... "	দুগ্ধবমন	... "
দুধতোলা	... "	ক্রিমি	... "
প্রশ্রাববন্ধ	... ১৩০১	রক্তবমন	... "
উদরাগ্নান	... "	মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত	... ১৩০৭
বমনযোগ	... "	তৃষ্ণা	... "
কোষ্ঠকাঠিন্য	... "	আমাশয়	... "
মল	... ১৩০২	সর্দি	... ১৩০৮
কোষ্ঠকাঠিন্য-চিকিৎসা	... "	নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস্ ও	
জ্বরাদিরোগ-চিকিৎসা	... ১৩০৩	প্লুরিসি	... ১৩১১
সততক বা দ্বৈকালীন জ্বর...	..	সন্নিপাতজ্বর	... ১৩১২
নবজ্বর-চিকিৎসা	... ১৩০৪	বাতিক কাস ও হপিং কফের লক্ষণ	..

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
বৃংরি বা ক্রুপ	... ১৩১৪	কুমারকল্যাণরস	... ১৩২০
মাসীপিসী	... "	হিঙ্গুলেপ	... "
হাম	... ১৩১৫	লবঙ্গযোগ	... "
পানিবসন্ত	... "	রসোনযোগ	... "
বসন্ত	... "	মুসকরযোগ	... "
নেত্রাভিযান্দ	... "	গোময়-স্বেদ	... ১৩২১
ব্রণশোধ	... ১৩১৬	যক্লং মর্দন চূর্ণ	... "
ব্রণ	... "	শঙ্খস্বেদ	... ১৩২২
পোড়া নারঙ্গী	... "	শিশুচাতুর্ভদ্রিকা	... "
ঘামাচি ও চুলকণা	... "	বিশ্বপঞ্চক	... "
ক্লমতা	... "	ধাতক্যাতি	... "
পক্ষাঘাত	... "	নাগরাদি	... "
বালকরোগে ঔষধ	... ১৩১৭	বিড়ঙ্গাদি চূর্ণ	... "
দশমূলকাথ	... "	লবঙ্গচতুঃসম	... ১৩২৩
গুড়চ্যাতি কাথ	... "	দাড়িম্বচতুঃসম	... "
ভার্গ্যাতি কাথ	... "	ক্রিমিল্বরস	... "
ত্রিফলাদি কাথ	... "	মহাগন্ধক	... "
পটোলাদি কাথ	... ১৩১৮	শিশুকুটজাবলেহ	... ১৩২৪
মুস্তকাতি কাথ	... "	বৃহৎ অগ্নিকুমার	... "
কস্তুরীভূষণ	... "	ভূবনেশ্বর	... "
স্বল্প অগ্নিমুখ-চূর্ণ	... "	বচাদি চূর্ণ	... ১৩২৫
হিঙ্গু ষ্টক চূর্ণ	... "	তিসি অর্থাৎ মসিনা বা ভূসির	... "
মনঃশিলাগুঞ্জন	... "	পোলটিস	... "
হরীতক্যাতি-চূর্ণ	... ১৩১৯	কণ্টকার্যাদি চূর্ণ	... ১৩২৬
বালক রস	... "	ধাত্বাদি পানক	... ১৩২৭
দ্বিতীয় বালকরস	... "	জাঙ্কাদি চূর্ণ	... "
কফচিষ্টামণি	... "	প্রাণবল্লভ রস	... "

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
আত্মাহুি যোগ	... ১৩২৭	ত্বকবিষ, সারবিষ ও নির্ঘাস	
পঞ্চকোল চূর্ণ	... ”	বিষের ক্রিয়া	... ১৩৩১
বাসা কাথ	... ”	ক্ষীরবিষের ক্রিয়া	... ”
পর্ণবৃন্ত কাথ	... ১৩২৮	ধাতুবিষের ক্রিয়া	... ”
অন্নরি (সাদা চটী)	... ”	কন্দবিষের ক্রিয়া	... ”
নীল লেপ	... ”	মূলাদি নয়টী বিষের অসাধ্য	
শৃঙ্গাদি চূর্ণ	... ”	লক্ষণ	... ১৩৩২
অষ্টাঙ্গাবলেহ	... ”	জঙ্গম বিষের ক্রিয়া	... ”
দন্তোন্তেদয়েগাস্তক	... ১৩২৯	লুতাবিষের ক্রিয়া	... ”
অখগন্ধাস্বত	... ”	মুণিকবিষের ক্রিয়া	... ”
শয্যামূত্র চিকিৎসা	... ”	রুকলাসবিষের ক্রিয়া	... ”
কারণ	... ”	বৃশ্চিকবিষের ক্রিয়া	... ”
লক্ষণ	... ১৩৩০	মণ্ডুকবিষের ক্রিয়া	... ”
চিকিৎসা	... ”	মৃগশুবিষের ক্রিয়া	... ১৩৩৩
বিষ-চিকিৎসা ।		জলৌকাবিষের ক্রিয়া	... ”
বিষের প্রকার ভেদ	... ১৩৩০	গৃহগোষ্ঠিকাবিষের ক্রিয়া	... ”
স্থাবর ও জঙ্গম বিষের সংখ্যা ও		শতপদীবিষের ক্রিয়া	... ”
প্রকারভেদ	... ”	মশকবিষের ক্রিয়া	... ”
স্থাবর বিষের সাধারণ		মক্ষিকাবিষের ক্রিয়া	... ”
ক্রিয়া	... ১৩৩১	ব্যাঘ্রাদিবিষের ক্রিয়া	... ”
জঙ্গম বিষের সাধারণ ক্রিয়া		সর্পদষ্ট ব্যক্তির অসাধ্য লক্ষণ	... ”
স্থাবর বিষের ক্রিয়া	... ”	বিষযুক্ত মানবের লক্ষণ	... ”
মূল বিষের ক্রিয়া	... ”	বিষচিকিৎসাবিধি	১৩৩৪
পত্র বিষের ক্রিয়া	... ”	সূরা, ধূতুরা ও অহিকেনের	
ফল বিষের ক্রিয়া	... ”	বিষ ক্রিয়া	... ১৩৩৮
পুষ্প বিষের ক্রিয়া	... ”	চিকিৎসা	... ”
		কুচিলার বিষ-ক্রিয়া	১২৩৯

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
চিকিৎসা	... ১৩৩৯	মন্মথান্ন রস	... ”
জঙ্গমবিষ চিকিৎসা	... ”	নারসিংহ চূর্ণ	... ১৩৪৭
কুকুরবিষ	... ১৩৪০	গোন্ধুরাঙ্ক-চূর্ণ	... ”
বুশ্চিকবিষ	... ”	রতিবল্লভ মোদক	... ”
মক্ষিকাবিষ	... ”	কামাগ্নিসন্ধীপনমোদক	... ১৩৪৮
মূষিকবিষ	... ”	মহাকামেশ্বর মোদক	... ”
দুধিবিষ চিকিৎসা	... ”	বৃহৎ শতাবরীমোদক	... ১৩৪৯
বিষে ঔষধ	... ”	বীৰ্য্যস্তুভ ।	
সৈন্ধবাদি চূর্ণ	... ”	চটকাণ্ডযোগ	... ১৩৪৯
কৃষ্ণাদি চূর্ণ	... ১৩৪১	অহিফেনযোগ	... ১৩৫০
বিষবজ্রপাত রস	... ”	নাগবল্ল্যাতি চূর্ণ	... ”
ভীষকরূপ রস	... ”	কামিনীবিজ্ঞাপন রস	... ”
বিষে পথ্যাপথ্য	... ”	পুংজননেন্দ্রিয়ের রোগ ।	
রসায়ন ।		পুংজননেন্দ্রিয়	... ১৩৫০
রসায়ন সেবন না করার		অণ্ডকোষ	... ১৩৫১
দোষ	... ১৩৪২	শুক্রকোষ	... ”
উষাপান	... ১৩৪৪	ধাতুদৌৰ্বল্য ও লিঙ্গশৈথিল্য ।	
ঋতুহরীতকী	... ”	পুরুষের বন্ধাতা	... ১৩৫১
ধাত্বী রসায়ন	... ”	চিকিৎসা	... ১৩৫২
গুড়চ্যাদিচূর্ণ	... ”	শুক্রমেহ	... ”
শাস্ত্রালী রসায়ন	... ”	চিকিৎসা	... ১৩৫৩
বার্জীকরণ ।		কামোদ্ভাদ	... ১৩৫৩
মকরধ্বজ রস	... ১৩৪৬	হস্তমৈথুন	... ”
বল্ল-চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ	... ”	বৃহৎ	... ১৩৫৪
বৃহৎ চন্দ্রোদয়-মকরধ্বজ	... ”		

(୧୧୦)

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠାଙ୍କ	ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠାଙ୍କ
ଧରଜଭଙ୍ଗ ...	୧୦୫୪	କାମିନୀ ଦର୍ପଣ ...	୧୦୫୬
ଧରଜଭଙ୍ଗ-ଚିକିତ୍ସା-ବିଧି ...	୧୦୫୫	କାମଦୀପକ ...	,,
		ନିକ୍ଷାଭୀକରଣ ...	,,
ଧରଜଭଙ୍ଗେ—ଓଷଧ ।			
ଗୋକୁରାଘଯୋଦକ ...	୧୦୫୫		

—
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ।

আয়ুর্বেদ-শিক্ষা ।

চতুর্থ খণ্ড ।

প্রমেহরোগ-চিকিৎসা

চারিপ্রকার বাতিক মেহরোগের লক্ষণ । যে মেহরোগে বসার
গ্রায় বর্ণবিশিষ্ট ও বসামিশ্রিত মূত্র বারংবার নির্গত হয়, তাহাকে বসামেহ
কহে । ১ । যে মেহরোগে মজ্জার গ্রায় বর্ণবিশিষ্ট ও মজ্জামিশ্রিত মূত্র
নির্গত হয়, তাহাকে মজ্জামেহ কহে । ২ । যে মেহরোগে কষায় ও মধুর-
রসযুক্ত অথচ রুক্ষ (মেষশূ) মূত্র নির্গত হয়, তাহাকে ক্ষৌদ্রমেহ কহে ।
৩ । যে মেহরোগে রোগী মত্তহস্তীর গ্রায় অনবরত প্রস্রাব করিতে থাকে
এবং প্রস্রাবের সময় বেগ থাকে না ও প্রস্রাবকালে মূত্রসহ লসীক। নির্গত হয়,
তাহাকে হস্তিমেহ কহে । ৪ ।

ছয়প্রকার পৈত্তিক মেহরোগের লক্ষণ । যে মেহরোগে ক্ষার জলের
গ্রায় গন্ধ, বর্ণ ও রসযুক্ত মূত্র নির্গত এবং ঐ মূত্র স্পর্শ করিলে পিচ্ছিল বোধ
হয়, তাহাকে ক্ষারমেহ কহে । ১ । যে মেহরোগে নীলবর্ণ মূত্র নির্গত হয়,
তাহাকে নীলমেহ কহে । ২ । যে মেহরোগে মসী অর্থাৎ কালীর গ্রায়
বর্ণবিশিষ্ট মূত্র নিঃসৃত হয়, তাহাকে কালমেহ বা কৃষ্ণমেহ কহে । ৩ । যে
মেহরোগে হরিদ্রাবর্ণ ও কটুরসবিশিষ্ট মূত্র নির্গত হয়, অথচ প্রস্রাব-কালে
জ্বালা থাকে, তাহাকে হারিদ্রমেহ কহে । ৪ । যে মেহরোগে আমগন্ধযুক্ত
এবং মজ্জিষ্ঠাধোত জলের গ্রায় মূত্র নির্গত হয়, তাহাকে মাজ্জিষ্ঠমেহ কহে । ৫ ।
যে মেহরোগে আমগন্ধযুক্ত, উষ্ণ, লবণরসবিশিষ্ট রক্তবর্ণ মূত্র নির্গত হয়,
তাহাকে রক্তমেহ কহে । ৬ ।

দশপ্রকার শ্লেষ্মিক মেহরোগের লক্ষণ । যে মেহরোগে নির্মল, শুক্রবর্ণ, নীতল, গন্ধবিহীন এবং কিঞ্চিৎ আবিল (বোলাটে) ও পিচ্ছিল জলের ভায় মূত্র নির্গত হয়, তাহাকে উর্দ্বকমেহ কহে । ১ । যে মেহরোগে ইক্ষুরসের ভায় অত্যন্ত মধুর (মিষ্টাশ্বাদ) মূত্র নির্গত হয়, তাহাকে ইক্ষুমেহ কহে । ২ । যে মেহরোগে প্রস্তাব কোন পাত্রে পঘূর্ণিত (বাসি) করিয়া রাখিলে গাঢ় হইয়া যায়, তাহাকে সান্ধ্রমেহ কহে । ৩ । যে মেহরোগে উপরিভাগের মূত্র সুরার ভায় স্বচ্ছ ও নিম্নভাগের মূত্র গাঢ় হয়, তাহাকে সুরামেহ কহে । ৪ । যে মেহরোগে রোগী রোমাঙ্কিত হয় ও পিষ্টের ভায় (চাউলের গুড়া অন্ন জলে মিশ্রিত করিলে যেমন বর্ণ হয়) শুক্রবর্ণ অত্যধিক পরিমাণে মূত্র ত্যাগ করে, তাহাকে পিষ্টমেহ কহে । ৫ । যে মেহরোগে রোগী শুক্রের ভায় বর্ণবিশিষ্ট বা শুক্রমিশ্রিত মূত্র ত্যাগ করে, তাহাকে শুক্রমেহ কহে । ৬ । যে মেহরোগে রোগী মূত্রের সহিত বালুকাকণার ভায় কঠিন ও ময়লাযুক্ত মূত্র ত্যাগ করে, তাহাকে সিকতামেহ কহে । ৭ । যে মেহরোগে মধুর রসবিশিষ্ট অত্যন্ত নীতল মূত্র অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হয়, তাহাকে নীতমেহ কহে । ৮ । যে মেহরোগে পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প মূত্র নির্গত হয়, তাহাকে শনৈর্মেহ কহে । ৯ । যে মেহরোগে লালাতন্তুযুক্ত অথচ পিচ্ছিল মূত্র নির্গত হয়, তাহাকে লাল মেহ কহে । ১০ ।

বাতিক মেহরোগের উপদ্রব । উদাবর্ত, কম্প, হৃদয়ে বেদনা, কটুতিজ্ঞাদি সর্গপ্রকার রসবিশিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণেচ্ছা, শূল বেদনা, শোথ (ক্ষয়), শ্বাস ও কাস ; এই সকল বাতিক মেহরোগের উপদ্রব ।

পৈত্তিক মেহরোগের উপদ্রব । মূত্রাশয় ও শিশ্নে বেদনা, মুষ্ণুঘর্ষাৎ অঙ্ককোষে বিদারণবৎ বেদনা এবং রোগীর জ্বর, দাহ, পিপাসা, অন্নোদ্যোগ, মুচ্ছা ও মলভেদ ; এই সকল পৈত্তিকমেহরোগের উপসর্গ ।

শ্লেষ্মিক মেহরোগের উপদ্রব । অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, বমি, অতি নিদ্রা, কাস ও নাসা-স্রাব ; এই সকল শ্লেষ্মিক মেহরোগের উপসর্গ ।

মেহরোগের অসাধ্য লক্ষণ । মেহরোগে ঐসকল উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এবং অতিশয় ষাণ্ড ও মূত্র নিঃসৃত ও রোগীর গাত্রে শরাবিকা

কচ্ছপিকানি প্রমেহ-পীড়ক বহির্গত হইলে, রোগীর জীবনের আশা থাকে না ।

মেহরোগের অপর অসাধ্য লক্ষণ । মূচ্ছা, বমি, জ্বর, শ্বাস, কাস, বীসর্প এবং গাত্র-গুরুতা ; এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলেও যোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয় । অপর বীজ-দোষে অর্থাৎ পিতা, পিতামহ হইতে যে প্রমেহ উৎপন্ন হয়, তাহাও অসাধ্য । কুলজ অর্থাৎ বংশ পরম্পরাগত মেহ ও কুষ্ঠাদি সমস্তরোগই অসাধ্য ।

গণোরিয়া বা সবিষ মেহ । গণোরিয়াও মেহ মধ্যে পরিগণিত এবং উহা হইতেও পরিণামে মধুমেহ উৎপন্ন হইতে পারে ।

মেহরোগের পরিণাম ও মধুমেহের নিদান । যথাসময়ে চিকিৎসা না করিলে, সমস্ত মেহরোগই কালবিলম্বে মধুমেহরোগে পরিণত ও অসাধ্য হইয়া থাকে ।

স্ত্রীদিগের মেহরোগ না হওয়ার কারণ । স্ত্রীদিগের মাসে মাসে রজোরক্ত প্রবর্তিত হয় বলিয়া শারীরিক সমস্ত দোষই দূরীকৃত হয়, একজন্ম,— তাহাদের প্রমেহরোগ উৎপন্ন হয় না কিন্তু গণোরিয়া ও প্রদর উৎপন্ন হয় ।

মধুমেহরোগের উৎপত্তি ও লক্ষণ । মধুমেহ দুই প্রকার । ধাতু-ক্ষয়বশতঃ বায়ু কুপিত হইলে, একপ্রকার উৎপন্ন হয় এবং পিত্ত ও কফ বায়ুর পথ রুদ্ধ করিলে এক প্রকার উৎপন্ন হয় । মধুমেহরোগে মধুর আশ্রয় প্রদ্রাব হয় । ধাতুক্ষয়বশতঃ বায়ু প্রকুপিত হইলে, যে মধুমেহ উৎপন্ন হয়, তাহাতে কেবলমাত্র বায়ুর প্রকোপই দৃষ্ট হয় ; কিন্তু পিত্ত ও কফ দ্বারা বায়ুর গতি রুদ্ধ হইলে, যে মধুমেহ উৎপন্ন হয়, তাহাতে ত্রিদোষের প্রকোপ-লক্ষণ অকস্মাৎ উপস্থিত হয় ; পরন্তু বায়ুর পথ অবরুদ্ধ হওয়া মাত্রই রোগ বদ্ধিত হয় ও আবার বায়ুর ক্ষীণতা উপস্থিত হইলেই মূত্র-পথ পরিষ্কার হয় এবং বায়ু চলাচল করিতে পারে, এইরূপ ক্ষণে ক্ষণে বায়ুর ক্ষীণতা ও পূর্ণতা দৃষ্ট হয়, এই রোগ কষ্টসাধ্য । মানব-শরীর মধুরসবিশিষ্ট বলিয়া সকল প্রকার মেহরোগেই প্রায়শঃ মধুরসযুক্ত প্রদ্রাব হয়, সুতরাং সর্ব-প্রকার মেহরোগকেই মধুমেহ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে ।

প্রমেহরোগীর আরোগ্য-লক্ষণ। মেহরোগীর মূত্রের আবিলতা (ঘোলাটেভাব) ও পিচ্ছিলতা বিনষ্ট হইয়া নির্যল এবং তিক্ত ও কটুরসবিশিষ্ট মূত্র নির্গত হইলে, রোগ আরোগ্য হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

প্রমেহ-পিড়কার উৎপত্তি, নাম ও লক্ষণ। উপযুক্ত সময়ে প্রমেহ-রোগের চিকিৎসা না করিলে, ঐ রোগ হইতে কালে দশপ্রকার পিড়কা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ সকল পিড়কা সন্ধি, মর্ষ (মস্তক ও অণ্ডকোষ প্রভৃতি স্থান) ও মাংসসংযুক্ত স্থানেই উৎপন্ন হয়। ১। যে পিড়কার চতুর্দিকের বেঠেন শরীরে ঝায় উন্নত এবং মধ্যস্থান উন্নত, সেই পিড়কার নাম শরাবিকা। ২। যাহার আকৃতি ও পরিমাণ শ্বেত-সর্ষপের ঝায়, তাহাকে সূর্যপিকা কহে। ৩। যে পিড়কা কঙ্কপের ঝায় আকৃতিবিশিষ্ট ও দাহযুক্ত, তাহাকে কঙ্কপিকা কহে। ৪। যে পিড়কা মাংস-জালে আবৃত ও অত্যধিক দাহযুক্ত, তাহার নাম জালিনী। ৫। যে পিড়কা দেখিতে নীলবর্ণ, আকারে বড়, বেদনা বিশিষ্ট এবং পৃষ্ঠে বা উদরে জন্মে ও যাহা হইতে রক্ত স্রাব হয়, তাহাকে বিনতা কহে। ৬। যে পিড়কা দেখিতে নীলবর্ণ অথচ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা দ্বারা আবৃত, তাহাকে পুন্ড্রিকা কহে। ৭। যে পিড়কার আকৃতি ও পরিমাণ মশরের ঝায়, তাহার নাম মশরিকা। যাহার উপরিভাগে রক্তবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ পিড়কা সঞ্চিত হয়, তাহাকে অলঙ্ঘী কহে। ৮। যে পিড়কা ভূমিকুম্মাণ্ডের ঝায় গোলাকার ও কঠিন হয়, তাহাকে বিদারিকা কহে। ৯। যে পিড়কা বিদ্রবিরোগের লক্ষণবিশিষ্ট হয়, তাহাকে বিদ্রবি কহে।

পিড়কার অসাধ্য লক্ষণ। মন্দাগ্নিযুক্ত ব্যক্তির মলদ্বার, হৃদয়, মস্তক, স্কন্ধ ও মর্ষস্থানে পিড়কা উৎপন্ন হইলে এবং তৎসঙ্গে, পিপাসা, শ্বাস, মাংস-সঙ্কোচ, মেহ, হিকা, মত্ততা, জ্বর, বিসর্প ও মর্ষাবরোধ প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, তাহার রোগ অসাধ্য।

মেহরোগ হইতে উক্ত দশপ্রকার পিড়কা জন্মে; সুতরাং মেহরোগ যে দোষ হইতে উৎপন্ন হয়, পিড়কাতেও সেই দোষেরই অঙ্কুর থাকে, অর্থাৎ বাতিক মেহরোগে পিড়কা উৎপন্ন হইলে, বাতের প্রকোপ, পৈত্তিক মেহ হইতে পিড়কার উৎপত্তি হইলে, পিত্তের প্রকোপ এবং স্নায়িক মেহ

ইহাতে পিড়কা উৎপন্ন হইলে, তাহাতে শ্লেষ্মার প্রকোপ থাকে। প্রমেহ-ব্যতীত মেদ দূষিত হইলেও ঐসকল পিড়কা উৎপন্ন হইতে পারে। যে পর্য্যন্ত পিড়কা-সকল স্বীয় স্বীয় আকার ধারণ না করে, সেই পর্য্যন্ত উহাদের সম্পূর্ণ-লক্ষণ প্রকাশ পায় না।

মেহ ও মধুমেহ রোগের নিদান ও বিস্তারিত লক্ষণ ।

মেহ রোগের নিদান ও উৎপত্তির যে সকল কারণ আয়ুর্বেদে উক্ত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে, মনে হয় যে, মেহ একটি সাধারণ রোগমাত্র; কিন্তু চিকিৎসায় অভিজ্ঞতা থাকিলেত কথাই নাই; বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলেও বুঝিতে পারা যায়, মেহ অতি কঠিন ও মারাত্মক ব্যাধি। মাধব-নিদানে উক্ত হইয়াছে;—পরিশ্রম বা শ্রমজনক কৰ্ম্ম না করিয়া কেবল বসিয়া থাকা, শয়ন করা বা নিদ্রা বাওয়া, দধি, গ্রাম্য মাংস (ছাগ, মেঘ প্রভৃতি), ঔদক মাংস (কচ্ছপ প্রভৃতি) ও আহুপ মাংস (সজল ভূমিজাত প্রাণীর মাংস) ভক্ষণ, নূতন তণ্ডুলের অন্ত্যোজন, হৃদ্ধ ও নূতন জল পান, গুড় হইতে প্রস্তুত দ্রব্য অর্থাৎ চিনি, মিষ্টী প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য ও কফ-জনক যে কোন দ্রব্যই হউক, তাহা ভক্ষণ করিলে, মেহরোগ উৎপন্ন হয়। ইহাই নিদানোক্ত মেহ উৎপত্তির কারণ।

সুশ্রুত বলেন,—দিবা-নিদ্রা, পরিশ্রম না করা, অলসভাবে কালযাপন, শীতল, স্নিগ্ধ, মধুর, মেদ-জনক ও তরল দ্রব্য পান বা ভক্ষণ করিলে, বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা পরিপাক নহা হইয়াই (ডাক্তারী মতে ডায়াবিটিস্ মেলিটাসের উৎপত্তির সহিত ইহার বেশ মিল আছে) মেদধাতুর সহিত একত্র হইয়া মূত্র-বাহিনী নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ পূর্বক অধোভাগে গমন করে এবং তথায় মূত্রাশয়ের মুখ আশ্রয় করিয়া ভেদ বা বিদারণবৎ বেদনাসহ মূত্র-মার্গ দ্বারা ক্ষরিত হইয়া থাকে। ইহাই সুশ্রুতোক্ত মেহ-রোগের নিদান।

মেহরোগের এই নিদান পাঠ করিলে, মেহরোগ যে অতি কঠিন, তাহা মনে হয় না। কিন্তু কারণ, সামান্য হইলেও গভীর ঠাণ্ডাকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহা যেমন দুরারোগ্য বা হুঃসাধ্য, তেমনি মারাত্মক,

একবার শরীরে বদ্ধমূল হইয়া মধুমেহে পরিণত ও তাহা হইতে বিদ্রবিনামক পিড়কা উৎপন্ন হইলে, রোগী প্রায়শঃ মৃত্যুমুখে পতিত হয় ।

মেহরোগ সাধারণতঃ তিন প্রকার বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক । পুৰ্ব্বোক্তকারণে দূষিত শ্লেষ্মা মূত্রাশয়স্থিত মেদ, মাংস ও শরীরস্থ ক্লেদ দূষিত করিয়া শ্লেষ্মিক মেহ উৎপাদন করে । এইরূপ উষ্ণবীৰ্য্য দ্রব্য-ভোজন ও রৌদ্রে বা অগ্নির তাপ সেবনে পিত্তপ্রকৃপিত হইয়া মূত্রাশয়স্থিত মেদ, মাংস ও শরীরস্থ ক্লেদ দূষিত করিয়া পৈত্তিকমেহ উৎপাদন করে । নানাকারণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পিত্ত ও শ্লেষ্মা লজ্জ্বনাদি দ্বারা ক্ষীণ হইলে অথচ ঐ কারণে (লজ্জ্বনাদি দ্বারা) বায়ু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বসা, মজ্জা (অস্থিমধ্যগত মেহ) ওজ ও লসীকা-নামক ধাতুসমূহ দূষিত এবং মূত্রাশয়ের মুখে আনয়ন ও মূত্রমার্গ দ্বারা নিঃসারিত করিয়া বাতিকমেহ উৎপাদন করে ।

উক্ত বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিকমেহ আবার বিংশতিভাগে বিভক্ত । শ্লেষ্মিক দশপ্রকার, পৈত্তিক ছয়প্রকার এবং বাতিক চারিপ্রকার । এক্ষণে প্রশ্ন এই, বাতজাদি ত্রিবিধ মেহ আবার নানাভাগে বিভক্ত ও বিভিন্ন নামে অভিহিত হওয়ার কারণ কি ? তদুত্তরে বক্তব্য এই,—যেমন খেত, পীত, কৃষ্ণ, শ্যাম ও লোহিত প্রভৃতি বর্ণের ন্যূনাধিক্য ও সংযোগ-বিশেষে পিঙ্গলাদি নানাবর্ণের উৎপত্তি ও নাম কল্পিত হয়, তদ্রূপ দোষ ও দূষ্যের ভুল্যতা সত্ত্বেও তাহাদিগের (দোষ ও দূষ্যের) সংযোগের ন্যূনাধিক্য বশতঃ মেহরোগে মূত্রের বর্ণাদির বিভিন্নতা হয় বলিয়া এক দোষজনিত (বায়ু, পিত্ত বা শ্লেষ্মা) মেহরোগ আবার বহুভাগে বিভক্ত ও বহুনায়ে অভিহিত হয় । দোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফ । দূষ্য অর্থাৎ মেদ, রক্ত ওজ, অস্থি (দৈহিক জলীয় পদার্থ), বসা (মাংস-মেহ), লসীকা (চৰ্ম্ম ও মাংসের অভ্যন্তরস্থ জলীয় পদার্থ) মজ্জা (অস্থি-মধ্যস্থিত মেহ), রস, ওজঃ (সৰ্ব্বধাতুর সার পদার্থ) ও মাংস । ত্রিদোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফ ঐসকল দূষ্য পদার্থকে দূষিত করিয়া সৰ্ব্বপ্রকার মেহ উৎপাদন করে ।

ঔষধের ক্রিয়ার সমতাহেতু অর্থাৎ কটুতিক্তাদি যে যে ঔষধ শ্লেষ্ম-প্রশমক, সেই সেই ঔষধই মেদ-নাশক বলিয়া শ্লেষ্মিক দশপ্রকার মেহ সাধ্য । ঔষধের ক্রিয়ার বিষমতাহেতু অর্থাৎ মধুরাদি যে সকল ঔষধ পিত্ত-

প্রশমক, তাহারাই মেদ-বর্দ্ধক বলিয়া পৈত্তিক ছয় প্রকার মেহ যাপ্য এবং বায়ু অতিশীঘ্র গন্তীর খাছু সমূহকে (বসা, মজ্জা, ওজঃ ও লসীকা প্রভৃতিকে) আশ্রয় করিয়া বিষম অনিষ্টোৎপাদন করে বলিয়া কোনও ঔষধেই তাহার প্রতীকার হয় না, এজন্ত, বাতিক চারি প্রকার মেহ অসাধ্য ।

মেহরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বে রোগীর দন্ত, জিহ্বা, চক্ষু ও কর্ণাদিতে অধিক মল-সঞ্চয়, হস্ত ও পদের জ্বালা, দেহের চিক্ণতা (তৈলমর্দনবৎ চাক্চিক্য) এবং পিপাসা ও মুখের মধুরতা (মিষ্টাশ্বাদ), এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে । ইহাই মেহরোগের পূর্বরূপ ।

আবিলমুত্র অধিক পরিমাণে নির্গত হওয়া সর্বপ্রকার মেহরোগের সাধারণ লক্ষণ ।

মেহরোগের উৎপত্তির কারণ, পূর্বরূপ ও সামান্য লক্ষণ বর্ণিত হইল । মেহ সাধারণতঃ তিন প্রকার, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু উহা হইতে বিংশতি প্রকার মেহরোগ কল্পিত হইয়া থাকে । ঐসকল মেহরোগের বিশিষ্ট লক্ষণও পৃথক্ রূপে ইতঃপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে এবং বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক মেহরোগের উপসর্গও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উক্ত হইয়াছে, যাবৎ উপসর্গ উপস্থিত না হয়, তাবৎ ঐ অবস্থাকে প্রথম অবস্থা, উপসর্গবিশিষ্ট হইলে দ্বিতীয় অবস্থা ও পীড়কাগুক্ত বা মধুমেহরোগে পরিণত হইলে, তাহাকে রোগের তৃতীয় অবস্থা বলা যাইতে পারে ।

কতকগুলি রোগে মেহ উপসর্গরূপে প্রকাশ পায় । যক্ষ্মা, অর্শ ও আম-বাত প্রভৃতি রোগে মেহরোগের লক্ষণ প্রায়শঃ উপস্থিত হইতে দেখা যায় ।

মধুমেহ স্বতন্ত্র রোগ নহে, মেহরোগেরই প্রবদ্ধ অবস্থা বা তৃতীয় অবস্থা মাত্র । যথাসময়ে চিকিৎসা না করিলে, সর্বপ্রকার মেহরোগই কালবিলম্বে মধুমেহে পরিণত হয় ; কারণ, মানব-দেহ সাধারণতঃ মধুর রসবিশিষ্ট, আমরা যে সকল মধুর রসবিশিষ্ট দ্রব্য-দ্রব্য পান বা আহাৰ করি, তাহাই পরিপাক ও মধুজাতীয় শর্করায় পরিণত হইয়া শরীরে পুষ্ট ও মধুর রসসংযুক্ত হয় । এ অবস্থায় মেহরোগের পরিণামে যখন সেই শরীরে পোষণকারী মধু-জাতীয় শর্করা নির্গত হয়, তখন শরীরও তৎসঙ্গে ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে । শর্করা বা চিনি অত্যন্ত মেহরোগেও নির্গত হইতে পারে, কিন্তু তাহা প্রকৃত মধুমেহ

নহে। ঐ শর্করা মধু-জাতীয় বলিয়া পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইলে, তাহাকে মধুমেহ কহে। তবে অম্লজাতীয় শর্করাও পরিণামে মধুজাতীয় শর্করায় পরিণত হইতে পারে, ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য। যখন মধুজাতীয় শর্করা মূত্রনালী দ্বারা নির্গত হইতে থাকে, তখনই প্রকৃতপক্ষে ক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ ও শরীরের দুর্বলতা দিন দিন বৃদ্ধি পায়, পিপাসা নিবারণের জন্ত অত্যধিক জলপান করিলেও পিপাসার নিবৃত্তি হয় না, অত্যধিক আহার সত্ত্বেও ক্ষুধাবৃদ্ধি এবং শরীর-ক্ষয়, পেশী ও স্নায়ু মণ্ডলীর শিথিলতা, অলসতা, দুর্বলতা, ক্লান্ততা, মুখ-শোথ, কোষ্ঠবদ্ধতা, গাত্র-দাহ মস্তক-বর্ণন ও দুর্বলতা, মানসিক ব্যাকুলতা, শারীরিক অবসাদ, মূত্রাধিক্য, মধুর ঞায় মূত্রের বর্ণ ও আন্বাদ প্রভৃতি নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়। অবশেষে বায়ু, পিত্ত ও কফ রক্ত, মেদ ও মাংসাদি দুষ্য ধাতুসমূহকে গভীররূপে আক্রমণ ও দূষিত করিয়া প্রমেহ-পিড়কা জন্মায়। প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থায় যে পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহা তত যন্ত্রণা-দায়ক বা শীঘ্র মারাত্মক নহে; কিন্তু রোগের বর্ধিত অবস্থায় বিজ্জি-নামক যে ভয়ঙ্কর পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহা সদ্যো মৃত্যুপ্রদ, অনেকস্থলে ঐ পিড়কা অন্ত্র করিবার সময়েই রোগীর জীবন বহির্গত হইতে দেখা গিয়াছে। শীতমেহ ও ইক্ষুমেহ উভয়রোগেই মধুর-রসবিশিষ্ট মূত্র নির্গত হইলেও উহা মধুমেহ বাচ্য নহে, তবে স্মরণ রাখা উচিত যে, উহা হইতেও পরিণামে মধুমেহ উৎপন্ন হইতে পারে। মধুর ঞায় বর্ণযুক্ত মূত্র, মধুর ঞায় সেই মূত্রের আন্বাদ এবং তাহা হইতে মধুজাতীয় শর্করা নির্গত হইলে, তাহাই মধুমেহবাচ্য। এই মধুমেহ আবার দুই প্রকার। ধাতুক্ষয় বশতঃ বায়ু অত্যন্ত প্রকুপিত হইয়া বায়ু বা পিত্তপ্রধান, ক্ষীণ বা ক্লেশশরীরে এক প্রকার মধুমেহ উৎপাদন করে এবং অত্যন্ত শ্লেষ্ম-বর্দ্ধক অন্নপানীয় প্রচুর পরিমাণে সেবন দ্বারা অত্যধিক মেদ বর্দ্ধিত হইয়া মেদ বা শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে অম্ল প্রকার মধুমেহ উৎপাদন করে। প্রথমোক্ত মধুমেহে অত্যধিক বায়ুর প্রকোপ বর্তমান থাকে, বায়ু অতি শীঘ্র অনিষ্ট উৎপাদনে সমর্থ, বিশেষতঃ বসা, মজ্জা, ওজ ও লসীকা প্রভৃতি ধাতু অত্যধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, শরীরের সেই ক্ষয়িত অংশ ঔষধ দ্বারা সহজে পূরণ করা অসম্ভব এবং প্রত্যহ যদি অধিক পরিমাণে মধুজাতীয় শর্করা

নির্গত হইতে থাকে, তবে তাহার বহির্গতি রোধ করাও সাধ্যাতীত ; এই সকল কারণে উহা অসাধ্য ; কিন্তু শেথোক্ত মধুমেহে অত্যধিক মেদ-বৃদ্ধিবশতঃ প্লেয়ার সহিত পিত্ত প্রকুপিত হইয়া বায়ুর গমন-পথ রোধ করিলে কেবলমাত্র বায়ুর প্রকোপ লক্ষণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহাও স্থায়ী নহে, আবার মেদ বা প্লেথ্রনাশক ক্রিয়াধারা প্লেয়া ও পিত্ত প্রশমিত হওয়া মাত্রই বায়ুর গমন পথ পরিষ্কার হয় ও বায়ু সহজে গমনাগমন করিতে পারে, এইজন্যই ঐ রোগ অসাধ্য নহে ; কষ্টসাধ্য । এই রোগে রোগীর শরীর স্থলাকার দৃষ্ট হইলেও ক্রমশঃ এত অধিক দুর্বলতা অসিয়া উপস্থিত হয় যে, উঠিতে বসিতেও কষ্টবোধ হয়, পরন্তু মেদ-বৃদ্ধি বশতঃ এইরূপরোগীর পুনঃ পুনঃ বিদ্রুপি হওয়ার সমধিক সম্ভাবনা ।

ডাক্তারি-মতে মধুমেহ রোগের লক্ষণ ।

ডাক্তারী মতে বাহাকে ডায়াবিটিস্ কহে, তাহা সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত । ডায়াবিটিস্ মেলিটাস্ ও ডায়াবিটিস্ ইন্সপিডাস্ । আয়ুর্ক্বেদে যাহা মধুমেহ নামে অভিহিত, ডাক্তারী মতে তাহাই ডায়াবিটিস্ মেলিটাস্ এবং আয়ুর্ক্বেদমতে যাহা সোমরোগ নামে বিখ্যাত, ডাক্তারী মতে তাহাই ডায়াবিটিস্ ইন্সপিডাস্ । ডাক্তারীমতে ডায়াবিটিস্ মেলিটাসের এবং ডায়াবিটিস্ ইন্সপিডাসের যেসকল নিদান ও লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, আয়ুর্ক্বেদোক্ত মধুমেহরোগের ও সোমরোগের নিদান ও লক্ষণের সহিত তাহার বিলক্ষণ সোসাদৃশ্য বিদ্যমান । এস্থলে অগ্রে ডায়াবিটিস্ মেলিটাসের নিদান ও লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে ।

ডাক্তারি মতে নানাকারণে এ রোগ হইতে পারে । শৈত্যক্রিয়া, উত্তপ্ত শরীরে শীতল জল পান বা শৈত্যক্রিয়া, অধিক পরিমাণে শর্করা বা মিষ্টদ্রব্য কিম্বা শ্বেতসার (ভাত, ময়দা, আটা প্রভৃতি) ভক্ষণ, অলস ও নিষ্ক্রিয়ভাবে কাল-যাপন, মানসিক-পরিশ্রম, মস্তক, মেরুদণ্ড ও অগ্রাঙ্গ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আঘাত, মানসিক দুশ্চিন্তা ও তজ্জনিত উবেগ এবং স্নায়ুস্বক্ষীয় পীড়া প্রভৃতি নানাকারণে মস্তিষ্ক ও স্নায়ু-বিধানের বিকৃতি-বশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হয় । মেডুলা হইতে উৎখিত স্নায়ু-বিধান মেরু-মজ্জার মধ্য দিয়া

বহির্গত হইয়া, তাহারই একটি শাখা যকৃত ও অন্ত্রটি মূত্র-গ্রন্থির সহিত মিলিত হইয়া উভয়কে পরিচালিত করিতেছে, সুতরাং উপরোক্ত কারণে মেরুমজ্জা-ব্যাপী রায়ুবিধানের বিকৃতি বশতঃ শর্করায়ুক্ত (ডায়াবিটিস্ মেলিটাস্) বা শর্করানুজ (ডায়াবিটিস্ ইন্সপিডাস্) বহুমূত্ররোগ উৎপন্ন হয়। ঐ উভয় রোগেই মেরুমজ্জাব্যাপী রায়ু-বিধানের একই প্রকার বিকৃতি ঘটে।

আমরা সচরাচর যে সকল বস্তু আহার করি, তন্মধ্যে খেতসারের অংশ সর্বাপেক্ষা অধিক, পরন্তু ঐ খেতসার মধুররসবিশিষ্ট, সুতরাং তন্মধ্যে শর্করার অংশ থাকে। আবার যে সকল মিষ্টদ্রব্য আহার করি, তন্মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে বহুল পরিমাণে নানাজাতীয় শর্করা থাকে, সুস্থশরীরে যকৃত দ্বারা ঐ শর্করার কিয়দংশ দ্রাক্ষা বা আঙ্গুরজাতীয় শর্করায় পরিণত হয় ও তদ্বারা শরীরের পুষ্টি সাধিত হয় এবং অবশিষ্টাংশ যকৃত-কোষে সঞ্চিত থাকে, ইহাকে ইংরাজীতে গ্লাইকোজেন কহে। অনন্তর শরীরের পোষণকার্যে শর্করার অভাব হইবামাত্র, উক্ত যকৃত-কোষস্থিত সঞ্চিত গ্লাইকোজেন নামক পদার্থ হইতে আঙ্গুর-জাতীয় শর্করা উৎপন্ন হইয়া, তদ্বারা ঐ অভাব পূরণ হয়। এখানে স্মরণ রাখা উচিত, ইক্ষুজাতীয় শর্করা দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে শরীর পোষণ হয় না; নানাজাতীয় শর্করা আঙ্গুরজাতীয় শর্করায় পরিণত হইলেই, তদ্বারা শরীর পোষণ হইয়া থাকে, কিন্তু বহুমূত্ররোগে রায়ু-বিধানের বিকৃতি ও যকৃতের দুর্বলতাবশতঃ যকৃতের কোষসকলও দুর্বল এবং শিথিল হয় ও তাহাদের মুখরন্ধ্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তখন যকৃত শর্করাংশসকল স্বীয় আয়ত্তাধীন রাখিতে ও ঐ শর্করা হইতে গ্লাইকোজেন উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না, তজ্জন্ম উহা শরীরের পোষণ-কার্যে ব্যবহৃত না হইয়া মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়; কিন্তু অত্যধিক শর্করা সঞ্চিত হইলে, লাল বা ঘর্ষের সহিত নির্গত হইতে পারে। ইহাই ডায়াবী মতে বহুমূত্ররোগের সংপ্রাপ্তি।

এই রোগে ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষ এবং বৃদ্ধ ও তরুণ-বয়স্ক অপেক্ষা প্রবীণ ব্যক্তিরা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। যুবকেরা এই রোগে আক্রান্ত হইলে, রোগ সাংঘাতিক হইয়া পড়ে; কিন্তু ৪৫ বৎসরের পর হইলে তাদৃশ

সাংঘাতিক হয় না । ২৫, ৩০ বৎসরের পর ৬০। ৬৫ বৎসর বয়সের মধ্যেই এই রোগের আধিক্য দৃষ্ট হয় । ইহা কুলজব্যাদি ।

লক্ষণ । রোগের প্রথম অবস্থায় স্ত্রী ও পুংজনেজ্জিয়ার এক প্রকার চর্মরোগ (পামা বা এক্জিমা) হয় এবং ঐ লক্ষণদ্বারা ই অধিকাংশস্থলে রোগ নির্ণীত হইয়া থাকে । এক প্রকার ডায়াবিটিস আছে, তাহার প্রবল আক্রমণ সহসা দৃষ্ট হয়, কিন্তু তদ্যতীত এই রোগ প্রায়শঃ ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতে থাকে । প্রথমাবস্থায় বিশেষ যক্ষণা অনুভূত হয় না, (আম্বর্ষেদেরও এই মত) অনন্তর ক্রমশঃ তৃষ্ণা বৃদ্ধি, ক্ষুধা বৃদ্ধি, কোষ্ঠ-বদ্ধতা, ঘন ঘন মূত্র-ত্যাগ, মূত্রাধিক্য ও মূত্রের সহিত অধিক পরিমাণে শর্করা নির্গত হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় ; পরন্তু প্রস্রাব ও শর্করা যতই অধিক পরিমাণে নির্গত হইতে থাকে, ততই বলক্ষয় ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা বলবতী হয় এবং ভূরিভোজনেও অতৃপ্তি ও দুর্বলতা বৃদ্ধি পায় । অতঃপর সর্বদা জল পান করিলেও পিপাসার শাস্তি হয় না, মুখ-শোথ, জিহ্বার শুষ্কতা, রক্তাৱতা ও তজ্জনিত হস্ত, পদ ও চক্ষু জ্বালা এবং শোথযুক্ত হয় । রোগের পরিণত অবস্থায় নানাবিধ ফোটক ও কার্কঙ্কল উৎপন্ন হয় এবং ওজঃক্ষয় (গ্যালভুমিনিউরিয়া নির্গত) হইয়া থাকে । মূত্র পরীক্ষা করিলে, তাহাতে ড্রাক্সা বা আঙ্গুরজাতীয় শর্করা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয় । মূত্রের মধুরতাবশতঃ মিষ্টগন্ধ নির্গত হয় । মূত্রে পিপৌলিকা বা মাছি বসে, মূত্র পাত্রে করিয়া রাখিয়া দিলে, তাহার তলায় এক প্রকার পদার্থ জমিয়া যায় এবং গরমস্থানে রাখিয়া দিলে ফেণা বা গ্যাক্সা উথিত হয় । রোগী জল যত বেশী পান করে, তত বেশী পরিমাণে মূত্র নির্গত হয় । শর্করা বহুল-দ্রব্য বা শ্বেতসারময় পদার্থ যত বেশী আহার করে, মূত্রে শর্করার পরিমাণও ততই অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, আবার মাংসাদি আহার করিলে, শর্করার পরিমাণ কমিয়া যায় ।

এই রোগের পরিণামে রোগীর কুস্কুস্ প্রদাহ ও অজ্ঞানতা বা ডায়াবিটিস কোমা উপস্থিত হইয়া সহসা মৃত্যু হইতে পারে । ইহাই ডাক্তারী মতে ডায়াবিটিস মেলিটাসের অর্থাৎ মধুমেহের লক্ষণ । আম্বর্ষেদোক্ত মধু-মেহের সহিত এই রোগের মিল করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে,

ঐ দুইটি একই ব্যাধি । ডায়াবিটিস্ ইন্সপিডুসের লক্ষণ অতঃপর সোম-রোগে বর্ণিত হইবে ।

বিশেষ লক্ষণ । রোগীর দুর্বলতা, অলসতা, শীর্ণতা, অত্যধিক পিপাসা, আহারান্তে (বিশেষতঃ দিবাভাগে) পিপাসার বৃদ্ধি, ক্ষুধাধিক্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, রাত্তিকালে প্রস্রাব-বৃদ্ধি, অনিদ্রা বা নিদ্রা হইলেও ঘন ঘন প্রস্রাবত্যাগ ও পিপাসার জ্ঞাত নিদ্রাভঙ্গ, রতিশক্তির হীনতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রায়শঃ মধুমেহ রোগে প্রকাশ পায় এবং এই সকল লক্ষণ দ্বারা সহজে রোগ নির্ণয় করা যায় ।

মেহ ও মধুমেহ চিকিৎসা-বিধি ।

মেহরোগগ্রস্ত ব্যক্তির দুই শ্রেণিভুক্ত । এক প্রকার স্থূল ও বলবান, অত্র প্রকার কৃশ ও দুর্বল । স্থূলকায় ও বলবান্ ব্যক্তিদিগকে অগ্রে বমন ও বিরেচন প্রদান পূর্বক উদ্ধাধঃ শোধন করিয়া পশ্চাৎ ঔষধ প্রয়োগ করিবে । কৃশ ও দুর্বল মেহরোগীর পক্ষে বমন ও বিরেচন প্রশস্ত নহে, তাহাদিগকে সংশমন অর্থাৎ দোষ-প্রশমক এবং সংরূহণ বা বল ও রক্ত-মাংসাদি বর্দ্ধক ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থা করা কর্তব্য ; কারণ কৃশ ও দুর্বল শরীর স্বভাবতঃ বাতপিত্তাধিক, সূত্রাত্ম তদবস্থায় মেহরোগে ধাতুপ্রাণ প্রযুক্ত তাহাদের শরীর অত্যধিক বায়ু প্রধান হইয়া পড়ে, এই জ্ঞাত তাহাদের বল-রক্ষা, কৃশতা বিনাশ করা ও শরীরের ক্ষয়িত অংশ পূরণ করা সর্বপ্রায়ে আবশ্যক । বলরক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত না করিলে মারাত্মক লক্ষণ উপস্থিত ও তদ্ব্যবহারে রোগী শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে । স্থূলকায় ও বলবান ব্যক্তিদিগের প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থায়, তদ্রূপ লক্ষণ প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু কৃশ ও দুর্বল ব্যক্তিদিগের পক্ষে অধিকাংশস্থলে প্রথম অবস্থায়ই তৎ-বিপরীত লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় । অনেকস্থলে দেখা গিয়াছে, এই প্রকৃতির লোক মেহরোগের কিছুমাত্র প্রকোপ বৃদ্ধিতে বা অনুভব করিতে পারে নাই, অথচ ইঠাৎ মধুমেহের লক্ষণ উপস্থিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ।

সর্বপ্রকার রোগেই রোগের লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা না করিলে,

আশাহুত্ব ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, পরন্তু অধিকাংশস্থলেই বাতজ্বাদি বিবিধ রোগে একই ঔষধ প্রয়োগে অনিষ্ট হইয়া থাকে । বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক প্রত্যেক মেহরোগের লক্ষণ ও উপসর্গ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, কোনও একটির লক্ষণের বা উপসর্গের সহিত অপরটির লক্ষণের বা উপসর্গের মিল নাই । রহৎ ব্লেথার এই রোগে একটি প্রসিদ্ধ ঔষধ, কিন্তু পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহা দ্বারা শ্লেষ্মিক মেহে যেমন উপকার হয়, বাতিক বা পৈত্তিক মেহে তদ্রূপ উপকারত হয়ই না ; পরন্তু বাতিক মেহরোগে উপর্যুপরি কিছু দিন প্রয়োগ করিলে, মলরোধের এবং পৈত্তিকমেহে মূত্র-রোধের লক্ষণ প্রকাশ পায় । আবার প্রমেহচিহ্নামণি একটি প্রসিদ্ধ ঔষধ, তদ্বারা পৈত্তিক ও বাতিকমেহে যেমন উপকার হয়, শ্লেষ্মিকমেহে, তাদৃশ উপকার হয় না, বরং শ্লেষ্মিক মেহে নাসাস্রাব প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয় । এই জগ্গই লক্ষণভেদে দোষের বলাবল বিচারপূর্বক ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত । সামান্য ফোড়া প্রভৃতিতেও লক্ষণ অনুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ না করিলে, উপকারের পরিবর্তে বিপরীত ফল হয়, ইহা বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, যে প্রলেপ দ্বারা শ্লেষ্মিক স্ফোটক প্রশমিত হয়, সেই প্রলেপ দ্বারা পৈত্তিক স্ফোটকের দাহ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, এই জগ্গ শাস্ত্রকারগণ মেহ-জ্বনিত পিড়কার পর্য্যন্ত বাতাদি দোষভেদে লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন । দশ, বিণ বা তদধিক 'সংখ্যক দ্রব্য দ্বারা আয়ুর্বেদীয় একটি ঔষধ প্রস্তুত হয়, সুতরাং তাহা যে অশেষ গুণযুক্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি ? কিন্তু সাধারণ-ভাবে ঐ ঔষধ আবার বায়ু পিত্তাদি বর্দ্ধক কি প্রশমক তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক । ইহাই চিকিৎসকের কৃতিত্ব ।

মেহরোগে আমাশয়, পকাশয় ও বন্তি বা মূত্রাশয়গত বায়ু প্রকুপিত হইয়া যাহাতে নানাবিধ উপসর্গ উৎপাদন করিতে না পারে, মেহরোগ-চিকিৎসা-কালে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য । আমাশয়গত বায়ু কুপিত হইলে, তরল দান্ত, পকাশয়গত বায়ু কুপিত হইলে, মলরোধ ও বন্তিগত বায়ু প্রকুপিত হইলে, মূত্র-রোধ বা পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের প্রবৃত্তি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং তাহা হইতে ক্রমশঃ কঠিন মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাঘাত ও অগ্ন্যরী প্রভৃতি অতি কঠিন ও মারাত্মক রোগ উপস্থিত হইতে পারে । এই

জন্ম রহং বঙ্গেশ্বর বাতিকমেহে প্রয়োগ করিতে হইলে, তৎসঙ্গে বায়ুনাশক অথচ বিরেচক অপর একটি যোগ প্রয়োগ করা উচিত, ঐ অবস্থায় চন্দ্র-প্রভাণ্ডিকা বা মেহমূদগর দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এইরূপ পৈত্তিক মেহে প্রয়োগ করিতে হইলে, একবেলা কুশাবলেহ বা প্রমেহ-চিস্তামণি ব্যবস্থা করিবে। আবার প্রমেহ-চিস্তামণি শ্লেষ্মিকমেহে প্রয়োগ করিতে হইলে, একবেলা রহং বঙ্গেশ্বর বা চন্দ্রপ্রভাবটী কিম্বা মেহমূদগর ব্যবস্থা করা উচিত। রহং বঙ্গেশ্বর রসে মূত্রের পরিমাণ অতি শীঘ্র হ্রাস পায়। রহং সোমনাথরস যে কোন অবস্থায় প্রয়োগ করা বাইতে পারে, ইহা দ্বারা প্রমেহের জ্বালা বস্তুণী, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রাধিক্য বা বহুমূত্র ও সর্বপ্রকার মেহ-রোগে আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়। চন্দ্রকান্তিরস প্রস্তুতের উপাদান সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে মনে হয়, ঔষধটি একটু উষ্ণবীৰ্য্য, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, উহার উপকরণ একটু উষ্ণবীৰ্য্য হইলেও ভাবনার দ্রব্যগুলি একটু শীতবীৰ্য্য বলিয়া উষ্ণবীৰ্য্যের প্রভাব নষ্ট করে; সুতরাং উহা সকল অবস্থায়ই প্রযোজ্য। ফলতঃ ঐ দুইটি ঔষধ যেমন মেহের উপসর্গ নাশক, তেমনি ধাতু পোষক, সুতরাং ধাতুক্ষয়জনিত মেহরোগে অনুতের জায় উপকারী; আবার অজ্ঞাত মেহরোগেও প্রয়োগ করিলে, শীঘ্রই ধাতু পুষ্ট হয় ও তন্নিবন্ধন মধুমেহের লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে না। বসন্তকুশ্মাকররস সকলের সহ হয় না, কোন কোন ধাতুতে শরীর একটু গরম হইয়া পড়ে, কিন্তু অল্পপান পরিবর্তন করিয়া দিলে, সহজেই সহ হয়। ইহা ধাতুক্ষয় নাশক ও গুণবর্দ্ধক, সুতরাং মধুমেহের অবস্থায় সর্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী।

বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক মেহের প্রথম অবস্থায় ত্রিফলাদি কাথ বা মুস্তকাদি কাথ প্রত্যহ প্রাতে, ত্র্যগ্রোধাদি চূর্ণ বা ত্রিফলাদি চূর্ণ মধ্যাহ্নে ও মেহকুলাস্তক বা কুশাবলেহ বৈকালে সেবন করিতে দিবে, কিম্বা একবেলা বিড়ঙ্গাদিলৌহ ও একবেলা গুক্রমাতৃকা বটী ব্যবস্থা করিবে। সাধারণতঃ এই সকল ঔষধ প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করিলেই আরোগ্যের সম্ভাবনা। কিন্তু প্রথম অবস্থায় চিকিৎসার অভাবে রোগ কিঞ্চিৎ পুরাতন বা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, নানাবিধ উপসর্গ শীঘ্র প্রশমনের জন্ম কাথ ও চূর্ণ প্রভৃতি প্রয়োগ করিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায় ও উপসর্গ প্রশমিত হয়; কিন্তু ধাতু-

ঘটিত ঔষধের ফল সর্বাংগে স্থায়ী ও ধাতুঘটিত ঔষধই রোগ সমূলে আরোগ্য করিতে সক্ষম । প্রথম অবস্থায় কাথ চূর্ণাদি প্রয়োগ করিলেও রোগ নির্মূল হইতে পারে । প্রথম অবস্থায় প্রাতে বঙ্গেশ্বর, মধ্যাহ্নে বঙ্গাষ্টক বা স্বর্ণবঙ্গ ও বৈকালে কুশাবলেহ যথোচিত অমুপানে সেবন করিতে দিবে । এই সকল ঔষধে মূত্রের আবিলতা ও পরিমাণের আধিক্য অথবা মূত্রের বিভিন্ন বর্ণতা ক্রমশঃ বিনষ্ট হয় ও দুর্বল শরীর সবল হইয়া থাকে । দ্বিতীয় অবস্থায় মেহকুঞ্জরকেশরী বা সর্বেশ্বর রস, ঔষধে রোগ বিনষ্ট হইতে পারে । প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যে অবস্থায়ই প্রসাবে অত্যধিক জ্বালা যন্ত্রণা ও মূত্রকৃষ্ণতা বা মূত্রাঘাতের লক্ষণ লক্ষিত হউক, কুশাবলেহ ব্যবস্থা করিবে ; ইহা ঐ সকল অবস্থায় প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ উৎকৃষ্ট ঔষধ । মূত্রমার্গদ্বারা রক্ত নির্গত বা মূত্রের আবিলতা ও বিভিন্ন বর্ণতা নষ্ট ও মূত্রাশয়ের দোষ সংশোধন করিতে সুলভ ঔষধের মধ্যে ইহা অতি শ্রেষ্ঠ । মেহরোগ মধুমেহে পরিণত হইলে বা হওয়ার লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, যাহাতে মধুজাতীয় শর্করার বহির্গমন রহিত হয় এবং শর্করা নির্গমন জন্ত শরীরের ক্ষয়িত ধাতব পদার্থের অভাব পূর্ণ হয়, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে । শর্করা নির্গত হইলেই সতর্ক হওয়া উচিত ; ঐ অবস্থায় শর্করা বহির্গমনের গতিরোধ না করিলে, অবিলম্বে মধুমেহে পরিণত হইয়া শরীর ধারণোপযোগী বিশিষ্ট উপাদানগুলি ক্ষয় করিতে থাকে । রসরক্তাদি ধাতুসমূহ ক্ষয়িত হইলেও বরং তাহা ঔষধাদি দ্বারা পূরণ করা সম্ভব, কিন্তু ওজ সর্বাধাতুর সার, যাহাতে উহা ক্ষয়িত হইতে না পারে, তৎপ্রতি সূতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত । এইজন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় যে সকল ঔষধ উক্ত হইল, তাহা প্রয়োগে তৃতীয় অবস্থায় উপকার না হইলে, বৃহৎ বঙ্গেশ্বর, বৃহৎ সোমনাথ, চন্দ্রকান্তিরস, বৃহৎ হরিশঙ্কররস বা বসন্তকুসুমাকররস প্রভৃতি অবস্থাভেদে যথোচিত অমুপানে প্রয়োগ করিবে । কোষ্ঠ-কাঠিঙ্গ থাকিলে, চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা, মেহমুলাগ বা শুক্রমাতৃকাবটী রাত্রে সেবন করিতে দিবে । ষাণ্ডুগত জীর্ণজ্বর থাকিলে, অপূর্ণমালিনীবসন্ত প্রয়োগ করা উচিত । দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় জননেদ্রিয়ে বা মূত্রাশয়ে দাহ থাকিলে, বস্তিযোগ দ্বারা পিচ্কারী প্রয়োগ করিবে । ইহাতে সত্ত্ব জ্বালা যন্ত্রণার লাঘব হয় ;

পরন্তু গণোরিয়া বা বিযাক্ত মেহ হইলে, ইহা প্রয়োগে তাহার জীবাণু ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু কোষবৃদ্ধি থাকিলে বা রোগের প্রথমাবস্থায় ব্যবহার্য্য নহে । মেহরোগে স্বর্ণবঙ্গ একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ । ইহা সর্বাবস্থায় উপযোগী ও সর্বপ্রকার মেহরোগ বিনাশ করিতে সক্ষম । শুক্র উৎপাদন করিতে, পাতলা শুক্র গাঢ় করিতে, বল, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি ও সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করিতে ও শুক্রমেহ বিনষ্ট করিতে সহজ ও সুলভ ঔষধের মধ্যে ইহার শক্তি অসীম । স্বর্গীয় ৮ রমানাথ কবিরাজ মহাশয় একটি যোগ প্রায়শঃ ব্যবস্থা করিতেন, আমরাও উহা প্রয়োগ করিয়া আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হইয়াছি । উহা স্বর্ণবঙ্গ-পঞ্চক নামে অভিহিত । সর্ব-প্রকার মেহরোগের যে কোন অবস্থায় উহা প্রয়োগে আশাতীত ফললাভ হয় । মধুমেহের পুরাতন অবস্থায় যখন অত্যন্ত ঔষধে প্রস্রাবের দুর্দমনীয় বেগ প্রশমিত না হয়, তখন আফিং ঘটিত ঔষধে অত্যন্ত উপকার হয় । চিকিৎসক শিরোমণি স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় এই অবস্থায় একটি ঔষধ ব্যবস্থা করিতেন, উহার নাম হেমনাথরস, উহার একমাত্র দোষ এই আফিং মিশ্রিত বলিয়া কিঞ্চিৎ ধারক, গ্রহণীর অবস্থায় মেহ, মধুমেহ কিম্বা সোমরোগ উপস্থিত হইলে, অতি উপকারী, কিন্তু অত্যাঁত অবস্থায়ও বিরেচক অল্পপান সহযোগে কিম্বা চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা বা মেহনুদগর বটিকা একবেলা ব্যবস্থা করিলে, অত্ৰ বেলা ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে । স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয় একটি ঔষধ এই অবস্থায় ব্যবস্থা করিতেন, উহার নাম কালপূর্ণচন্দ্র, উহাও আফিং মিশ্রিত ও আন্ত ফলপ্রদ, কিন্তু গরম ষাভূতে শৈত্যগুণবিশিষ্ট ও কোষ্ঠ কাঠিন্বে মূহু বিরেচক অল্পপান সহযোগে ব্যবস্থা করিতে হয় । তিনি আরও একটি যোগ ব্যবস্থা করিতেন, তাহার নাম লাল পূর্ণচন্দ্র । উহা সর্বপ্রকার মেহ বিনাশক ; তবে প্রথম অবস্থায়ই উহা প্রয়োগে, বিশেষ ফল পাওয়া যায় । মেহরোগের যে অবস্থায় যে অল্পপানে কালপূর্ণচন্দ্র ও স্বর্ণবঙ্গ পঞ্চক ব্যবস্থা করা যায়, ঠিক সেই অবস্থায় ও সেই অল্পপানে বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । ইহা মেহনাশক, গ্রহণী বা অগ্নিমান্দ্য বিনাশক, বলকর ও পুষ্টিকর, পরন্তু প্রস্রাবের দুর্দমনীয় বেগ প্রশমন করিতে সক্ষম, তবে গরম ষাভূতে

কোষ্ঠ-কাঠিষ্ঠ উপস্থিত না হয়, তজ্জন্ত ত্রিফলার জল অল্পপানে প্রয়োগ করা উচিত । মেহরোগের যে কোন অবস্থায় মূত্রাশয়ে দাহ, প্রস্রাবে জ্বালা, গাত্রদাহ, মূত্রকৃষ্ণ বা মূত্রাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, প্রমেহমিহির তৈল তলপেটে বা সহ্য হইলে সর্বাস্থে মর্দন করিতে দেওয়া যায়, কিন্তু জ্বর বা শৈথিল্যকমেহে নাসাশ্রাব প্রভৃতি শ্লেষ্ম-বৃদ্ধির লক্ষণ বর্তমানে প্রযোজ্য নহে । রোগের পুরাতন অবস্থায় এবং জ্বর না থাকিলে, দাড়িমাণ্ডয়ত, বা বৃহৎ দাড়িমাণ্ডয়ত প্রয়োগে সফললাভ হয় । অনেকস্থলে পুরাতন অবস্থায় কেবল মাত্র ঐসকল স্নাত প্রয়োগে রোগ আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে । মধু-মেহ হইতে যক্ষ্মা বা ক্ষয়ের লক্ষণ এবং জ্বর, কাস ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, ক্ষয়রোগোক্ত বৃহৎ বসন্ততিলক বা বৃহৎকাঞ্চনাক্ত যথোচিত অল্পপানে সেবন করিতে দিবে এবং ঐসকল উপদ্রব প্রশমিত ও শরীর সবল হইলে, বৃহৎ চন্দ্রনাদিতৈল গাত্রে মর্দন ও তৎসঙ্গে ছাগলাণ্ডয়ত বা বৃহৎ-ছাগলাণ্ডয়ত অথবা বৃহৎ অশ্বগন্ধায়ত বৈকালে সেবন করিতে দিবে ।

মেহ ও মধুমেহরোগে—ঔষধ ।

ত্রিফলাদি কাথ । বাতিক, পৈত্তিক বা শৈথিল্যক মেহরোগের প্রথম অবস্থায় মূত্রের আবিলতা ও পরিমাণের আধিক্য এবং মূত্রনির্গমনকালে জ্বালা যক্ষ্মণা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে ।

ত্রিফলাদি কাথ । হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দেবদারু, দারুহরিদ্রা ও মুখা ; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । প্রক্ষেপ হরিদ্রা-চূর্ণ ও মধু ।

মুস্তকাদি কাথ । বাতিক, পৈত্তিক বা শৈথিল্যক মেহের প্রথম অবস্থায় মূত্রের আবিলতা, পরিমাণের আধিক্য, পিচ্ছিলতা, হরিদ্রাভা ও ধাতুকরণ প্রভৃতি দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে ।

মুস্তকাদি কাথ । মুখা, রাখালশা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ; প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । প্রক্ষেপ হরিদ্রা-চূর্ণ । ১০ আনা ও মধু । ১০ আনা ।

অগ্নোদাদি চূর্ণ । বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লেষ্মিক মেহরোগে প্রস্রাবে জ্বালা-যন্ত্রণা, বৃহস্পৃহঃ প্রস্রাবের বেগ, মূত্রের আধিক্য, আবিলতা এবং ধাতু-প্রাণ প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে মধ্যাহ্নে সেবন করিতে দিবে । ইহার বিশেষ গুণ এই যে, ইহা সেবনে প্রস্রুত হইলে, মেহ-জনিত পিড়কা বহির্গত হইবার আশঙ্কা থাকে না । অল্পপান—পাথর কুটির পাতার রস ও হরিদ্রা-চূর্ণ বা ত্রিফলার জল ।

অগ্নোদাদিচূর্ণ । বটহাল, যজ্ঞদ্রুমহাল, অশ্বখহাল, শোণাহাল, সোন্দালেরআঠা, পীতহাল, (অভাবে শাল), আমের আঁটি, আমের আঁটি, কয়েংবেল, পিয়াল, অর্জুনহাল, ধববৃক্ষ, বোয়া, ষষ্টিমধু, লোধ, বরুণহাল, পালিধানাদারের ছাল, পলতা, মেঘশৃঙ্গী, দন্তীমূল, চিতা, অড়হর, করঞ্জ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কুড়টী ও শোধিত ভেলা ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগে মিশ্রিত করিবে । মাত্রা—চারি আনা ।

ত্রিফলাদি চূর্ণ । প্রমেহরোগে মূত্ররোধ অথবা পুনঃ পুনঃ মূত্রতাগের প্রস্রুতি বা মূত্রবন্ধ এবং তৎসঙ্গে জননেজ্রিয়ে ও বস্তিদেহে জ্বালা যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে বৈকালে বা মধ্যাহ্নে সেবন করিতে দিবে । ইহা মূত্রকৃচ্ছ্রে ও প্রয়োগ করা যায় । অল্পপান—ত্রিফলার জল ।

ত্রিফলাদি চূর্ণ । হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সৈন্ধবলবণ ও কাঁকড় বীজ-চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগে মিশ্রিত করিবে । মাত্রা—চারি আনা ।

কুশাবলেহ । বিংশতিপ্রকার মেহ, বিষাক্ত মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগে প্রস্রাবে অসহ জ্বালা-যন্ত্রণা, জননেজ্রিয়ের বা মূত্রাশয়ের প্রদাহ, কোঁটা কোঁটা প্রস্রাব, সুরুধারে প্রস্রাব, প্রস্রাবের সহিত রক্ত বা পুঁথ নির্গমন অথবা প্রস্রাবের পরিমাণের অল্পতা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ অসাধারণ ফলপ্রদ । গণোরিয়্যার জ্বালা-যন্ত্রণা প্রশমনে ইহার ঔষ্য সত্যঃ ফলপ্রদ ঔষধ সচরাচর দৃষ্ট হয় না । মেহরোগজনিত বাতিক ও পৈত্তিক শিরোরোগে ইহা প্রয়োগে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায় । মেহ বা গণোরিয়্যাজনিত চক্ষুরোগে অর্বাং চক্ষু-জ্বালা, চক্ষু করকর করা, চক্ষু লাল হওয়া, চক্ষুতে পিচুট পড়া প্রভৃতি উপসর্গ, ইহা সেবনে অচিরে প্রশমিত হয় । আদার রসের সহিত ব্যবস্থা করিলে ঋণ, মুড়ি ভিজান জলসহ হিঙ্গা ও বম্বি, ডাবের জলসহ ব্যবস্থা করিলে, অগ্নিগিত ও শূলরোগে অসাধারণ

উপকার হয়, এমন কি এই ঔষধের প্রভাবে মধুমেহে মধুজাতীয় শর্করার বহির্গমন রোধ এবং শস্তসাধ্য অশ্মরী পর্য্যন্ত নির্গত হইতে দেখা গিয়াছে। স্বর্গীয় কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন একটি রোগীকে এই ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কয়েকদিন ঔষধ প্রয়োগের ফলে একটি রহৎ পাথরী প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত হইয়াছিল, এইরূপ রহৎ পাথরী যে ক্ষুদ্র মূত্রমার্গদ্বারা কি প্রকারে বহির্গত হইল, তাহা ভাবিয়া উপস্থিত দর্শকগণ সকলেই বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ইহা সেবনে বহুমূত্ররোগজনিত দাহ ও পিপাসার শান্তি হয়। ফলতঃ ইহা মূত্রাশয়ের শোধক ও পৈতিক লক্ষণাক্রান্ত মেহরোগে অম্বিতীয়। সাধারণ অন্নপান—ত্রিফলার জল।

কৃশাবলেহ। কৃশ, কাশ, বেণা, কৃষ্ণ ইক্ষু ও বাগড়া, ইহাদের প্রত্যেকের মূল ৮০ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। এই কাথ ছাঁকিয়া তাহাতে দুই সের ইক্ষু চিনি গুলিয়া পুনর্বার ছাঁকিয়া পাক করিবে এবং লেহবৎ গাঢ় হইলে, পাঁচ নামাইয়া যষ্টিমধু, কাকুড়বীজ, কুমড়া-বীজ, শশাবীজ, বংশলোচন, আমলকী, তেজপত্র, দারুচিনি, এলাইচ, নাগেশ্বর, বরুণছাল, গুলঞ্চ ও প্রিয়ঙ্গু; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া সূতাক্ত পাত্রে রাখিবে। মাত্রা—অদ্ধতোলা হইতে এক তোলা।

মেহকুলান্তক। বাতিক, পৈতিক বা শৈথিল্যিক মেহরোগের প্রথম অবস্থায় প্রস্রাবে জ্বালা-যন্ত্রণা, ধাতু-স্রাব, মূত্রের আবিলতা ও বিভিন্ন বর্ণতা, মূত্রাশয়ের প্রদাহ, পিপাসা, মূত্রকৃচ্ছতা, অগ্নিমান্দ্য, শরীরের পাণ্ডতা, অরুচি ও মূত্রাঘাতের লক্ষণ লক্ষিত হইলে, বিশেষতঃ কোষ্ঠ-কাঠিন্য বিद्यমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগেও মহোপকারী। অন্নপান—আমলকীর রস বা আমলকীর জল কিম্বা কুলথকলায়ের কাথ।

মেহকুলান্তক। বঙ্গ, অত্র, গারদ, গন্ধক, চিরতা, পিপুলমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঠ, পিপুল, মরিচ, তেউড়ী, রসায়ন, বিড়ঙ্গ, মুখা, বেলশুঠ, গোছুর ও লাড়িম-বীজ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা ও বিত্তক শিলাজতু ৮ তোলা একত্র করিয়া বনকীকুড়ের মলের রসে মর্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

বিড়ঙ্গাদি লৌহ।* সহজ ও সুলভ ঔষধের মধ্যে ইহা উৎকৃষ্ট ও

সর্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ, তবে মেহরোগের প্রথম অবস্থায়ই বেশী ফলপ্রদ । সর্বপ্রকার মেহ ও মূত্রদোষে ইহা ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু রোগ ধাতুগত হইয়া পড়িলে, ইহা দ্বারা তাদৃশ উপকার হয় না । অল্পপান—মেহরোগে হরিদ্রার রস ও মধু ।

বিড়ঙ্গাদি লৌহ । বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মৃতা, পিপুল, শুঠ, জীরা ও কৃষ্ণজীরা; এতোকৈ সমভাগ ও সর্বসমান লৌহ একত্র মিশ্রিত করিবে । বটী—৬ রতি ।

শুক্রমাতৃকাবটী । বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক মেহের প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থায় নানাবিধ লক্ষণ, বিশেষতঃ কোষ্ঠ কাঠিষ্ঠ ও পিপাসা বা দাহ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । সাধারণ ঔষধের মধ্যে ইহার উপকারিতা উল্লেখযোগ্য । মেহরোগে ক্ষুধামান্দ্য বা জ্বরভাব প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, ইহা সেবনে বেশ উপকার হয় । দুর্বল শরীরে বল রক্ষার্থ এবং মূত্রকৃচ্ছ ও অশ্মরীরোগে ইহা প্রয়োগ করা যায় । অল্পপান—শ্লেষ্মিকমেহে—দাড়িমের রস, পৈত্তিক ও বাতিকমেহে—ছাগীছক ।

শুক্রমাতৃকা বটী । গোক্ষুর, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তেজপত্র, এলাচি, রসায়ন, ধনে, চৈ, জীরা, তালীশপত্র, সোহাগার গৈ ও দাড়িম বীজ ; ইহাদের প্রত্যেককে ৪ তোলা ও বিশুদ্ধ গুগ্গুলু ২ তোলা ; একত্র মর্দন করিয়া তৎসহ পারদ, পঙ্কক, অত্র ও লৌহ, প্রত্যেককে ৮ তোলা মিশ্রিত করিবে, অনন্তর দাড়িমের রসে মর্দন করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে । বটী—এক আনা ।

বঙ্গেশ্বর । মেহরোগের প্রথম অবস্থায় ইহা প্রয়োগে জ্বালা-মত্ততা ও ধাতুপ্রাব প্রভৃতি উপসর্গ প্রশমিত হয় । অল্পপান—মধু ।

বঙ্গেশ্বর । বঙ্গ ও রসসিন্দূর সমভাগে লইয়া জলে মর্দন করিবে । বটী—২ রতি ।

বঙ্গাষ্টক । বাতিক ও পৈত্তিক মেহরোগের প্রথমাবস্থায়, বিশেষতঃ শ্লেষ্মিকমেহরোগে অগ্নিমান্দ্য, আমদোষ ও পৈত্তিকমেহে তরলদান্ত বা মেহরোগে জ্বর-ভাব থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সন্ধ্যার সময় সেবন করিতে দিবে । অল্পপান—আমলকীর রস, হরিদ্রাচূর্ণ ও মধু । প্রবল বহুমূত্রেও ইহা প্রয়োগ করা যায় ।

বঙ্গাষ্টক । প্রস্তুতবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

স্বর্ণবঙ্গ । বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক মেহের প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় রোগীর মেহ-দোষ-নাশ এবং বল, কান্তি, শুক্র, স্মৃতিশক্তি ও অগ্নিবৃদ্ধি বা সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানার্থ এই ঔষধ সর্বদা ব্যবহার্য্য । ইহা প্রয়োগে শুক্রমেহ ও বিষাক্তমেহে সফল পাওয়া যায় ।

স্বর্ণবঙ্গ । শোধিত বঙ্গ ২ তোলা, লৌহপাত্রে রাখিয়া চুল্লীর উপর স্থাপন করিবে, অনন্তর বঙ্গ গলিয়া গেলে, তাহাতে ২ তোলা শোধিত পারদ নিক্ষেপ করিয়া, তন্মূহূর্ত্তে ২ তোলা নিশাদলচূর্ণ নিক্ষেপ করিবে এবং পরক্ষণে আবার ২তোলা গন্ধকচূর্ণ দিবে এবং গন্ধক গলিয়া গেলেই অতি শীঘ্র পাত্র নামাইয়া গলে উত্তমরূপে মর্দন করিয়া কঙ্কলীর গায় করিবে । অনন্তর বোতলে পুরিয়া ঐ বোতল সূক্ষ্ম বস্ত্র ও কর্দমদ্বারা লিপ্ত ও শুষ্ক করিয়া খড়ী দ্বারা বোতলের মুখ বন্ধ করিবে ও রসসিন্দূরের গায় ৪ প্রহর জ্বাল দিয়া নামাইবে । পশ্চাৎ শীতল হইলে, বোতল ভাঙ্গিয়া স্বর্ণবৎ পদার্থ গ্রহণ করিবে । রসসিন্দূর প্রস্তুত প্রণালী দ্রষ্টব্য ।
মাত্রা—২ রতি ।

স্বর্ণবঙ্গ পঞ্চক । স্বর্ণবঙ্গ যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, বিশেষতঃ যখন মেহ-জনিত দুর্বলতা ও ক্ষয় উপস্থিত হয়, তখন এই ঔষধ অতি উপকারী । ইহা প্রাতঃস্মরণীয় চিকিৎসকপ্রবর রমানাথ ঐ সকল অবস্থায় প্রায়শঃ ব্যবস্থা করিতেন ।
অনুপান—ঘৃত ও মধু ।

স্বর্ণবঙ্গ-পঞ্চক । স্বর্ণবঙ্গ ১০ চারি আনা, শিলাজতু ১০ চারি আনা, লৌহ দুই আনা, অভ্র এক আনা ও মকরদ্বীপ বা স্বর্ণসিন্দূর এক আনা ; একত্র মিশ্রিত করিবে । মাত্রা—২ রতি ।

মেহকুঞ্জরকেশরী । বিংশতিপ্রকার মেহ ও বিষাক্ত মেহরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় বা মেহ হইতে ক্ষয়, দুর্বলতা, মধুজাতীয় শর্করা নির্গমন, অগ্নিমান্দ্য, পিড়কা, প্রস্রাবে ও মূত্রাশয়ে জ্বালা, মূত্রকৃষ্ণ, মূত্রোষাত, সক্রমারে বা দুইধারে প্রস্রাব, প্রস্রাবের আবিলতা বা বিভিন্ন বর্ণতা, এবং অজ্ঞাত উপসর্গ উপস্থিত হইলে, তাহা প্রশমন করিতে ইহা অদ্বিতীয় । পরন্তু ইহা অগ্নি, বল, কান্তি, রসরজাদি ধাতু এবং ওজ পরিবর্দ্ধক ।
অনুপান—

পিত্তাধিক শরীরে আমলকী ভিজান জল ও মধু । শ্লেষপ্রধান শরীরে মধু, বায়ুপ্রধান শরীরে ঘৃত ও মধু ।

মেহকুঞ্জরকেশরী । পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, সীসা, বঙ্গ, সোণা, হীরা ও মুক্তা ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া শতমূলীর রসে মর্দনপূর্বক মৃদামণ্ডে স্থাপন করিবে, অনন্তর কৰ্দম ও বস্ত্রখণ্ডদ্বারা মৃদা লিপ্ত করিয়া দুটিয়ার অগ্নিতে পুটপাক করিবে । বটী—২ রতি ।

সর্বেশ্বররস । বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লেষ্মিক মেহের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় শর্করা নির্গমন, হরিদ্রা বা অগ্ন্যাগ্ন বর্ণের প্রস্রাব, প্রস্রাবে জ্বালা-যন্ত্রণা, কিম্বা হস্তিমেহ, শীতমেহ, ইক্ষুমেহ ও ক্ষৌদ্রমেহ উপস্থিত হইলে বা ঐ সকল মেহ মধুমেহে পরিণত হইলে এবং তজ্জাত মধু-জাতীয় শর্করা বহির্গত, মূত্রকৃচ্ছতা ; মূত্রাধাত, অগ্নরী, মেহজনিত দুর্বলতা, শাতু বা ওজস্কর এবং কুশতা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা অত্যন্ত পুষ্টিকারক । অস্থপান—আমলকীচূর্ণ ও মধু ।

সর্বেশ্বর রস । সোণা, রূপা, মুক্তা, শিলাজতু, লৌহ, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, ঘটমধু, মরিচ, পিপূল ও গুঁঠ ; সমভাগে লইয়া একত্র মর্দনপূর্বক কেশুভাতা, ভীষরাজ ও শিঙ্গির রসে বা কাথে পৃথক্ পৃথক্ মর্দন করিবে । বটী ২ রতি ।

বৃহৎ বঙ্গেশ্বররস । বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লেষ্মিক মেহের শুষ্ক-ক্ষরণ, মূত্রাধিক্য, মূত্রের আবিলতা ও অগ্ন্যাগ্ন বর্ণাভা, মূত্রকৃচ্ছতা, প্রস্রাবে জ্বালা, মূত্রাশয়ে দাহ, শর্করা নির্গমন, প্রমেহজনিত পাণ্ডুতা, ধাতুগত জ্বর, প্রস্রাবে রক্তনির্গত, গ্রহণী, আমদোষ, মন্দাগ্নি, অরুচি, ক্ষীণতা, ওজস্কর বা তেজস্কর প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায় । মধুমেহ হইতে ক্ষয়ের লক্ষণ উপস্থিত হইলে, ইহা দ্বারা ক্ষয়িত ধাতুর পূরণ এবং কুশ ও দুর্বল শরীর পুষ্ট ও বলবান হয় । সোমরোগে ও মূত্রাতীসারে ইহা দ্বারা আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায় । অস্থপান—গব্যাহুষ্ক ও মধু, বহুমূত্রে যজ্ঞ-ডুমুর চূর্ণ ও মধু, মেহরোগে গ্রহণী বা তরলদান্ত থাকিলে মুখার রস বা জীরা-চূর্ণ ও মধু ।

বৃহৎ বঙ্গেশ্বর রস । প্রস্তুতবিধি ২৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

অপূর্বমালিনীবসন্ত । বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিকমেহের নানাবিধ লক্ষণ উপস্থিত হইলে, বিশেষতঃ মেহ হইতে মধুমেহ ও ক্ষয়, জীর্ণজ্বর এবং কাস প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা বল ও পুষ্টি-কারক এবং রসরক্তাদি ধাতু-বর্দ্ধক । অমুপান—গুলঞ্চের রস ও মধু ।

অপূর্ব মালিনীবসন্ত । প্রস্তুতবিধি ২৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

চন্দ্রকান্তিরস । বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক মেহরোগে শুক্রক্ষরণ, মূত্রাধিক্য, প্রস্রাবে জ্বালা, রক্তনির্গমন, কাস, জ্বর, পিপাসা, গাত্রদাহ, মূত্রাশয়ে জ্বালা, অগ্নিমান্দ্য এবং রসরক্তাদিধাতু ও ওজস্ব প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে ক্ষীণ রোগী স বল ও দৃঢ়পুষ্ট হয়। মধুমেহে মধুজাতীয় শর্করা নির্গমন রোধ করিয়া শরীর নীরোগ করিতে ইহা অদ্বিতীয়। মেহ হইতে ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি উৎকট ব্যাধি উপস্থিত হইলে, তাহাও ইহাতে বিনষ্ট হইয়া থাকে। মধুমেহ হইতে ক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দিলে ইহা অতীব উপকারী। অমুপান—আমলকীর রস ।

চন্দ্রকান্তি রস । প্রস্তুতবিধি ২৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বসন্তকুসুমাকর রস । বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক মেহে প্রস্রাবে জ্বালা যন্ত্রণা, শুক্রক্ষরণ, শর্করা নির্গমন, ইক্ষুরসের ঞায় মধু নির্গত হওয়া, প্রস্রাবের নীচে চূণের ঞায় পদার্থ সঞ্চিত হওয়া, মূত্রের আবিলতা, পিচ্ছিলতা, মধুরতা, খেতাভা, হরিদ্রাভা, জ্বরভাব, দাহ, তৃষ্ণা, মলভেদ, বিশেষতঃ মধুমেহে ক্ষয়ের লক্ষণ উপস্থিত হইলে ও তজ্জনিত বিদ্রুপি, কাস, রক্তহীনতা, দুর্বলতা, ক্লেশতা, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, ঝাস, রক্তসংযুক্ত মূত্রত্যাগ কিম্বা অনবরত বহুলপরিমাণে বা দুর্দমনীয় বেগে মূত্র নির্গত হওয়া এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বিষাক্ত মেহ-রোগের বিষ নষ্ট করিতে ইহা অদ্বিতীয়। মধুজাতীয় শর্করার বহির্গমন রোধ করিয়া রসরক্তাদিধাতু ও শরীর পোষণ করিতে ইহার শক্তি অসীম। আয়ুর্কৌদ অনন্ত ঔষধ রত্নের ভাণ্ডার, কিন্তু ইহার ঞায় অদ্বুত শক্তিশালী ঔষধ আয়ুর্কৌদেও নাই বলিলে অত্যাক্তি হয় না। ইহা সেবনে জ্বর, বলী, পলিত

পর্যন্ত বিনষ্ট হয়। অম্বুপান—ঘৃত, চিনি ও মধু বা ষজ্জডুঘুর চূর্ণ ও মধু, গরম ষাভুতে ত্রিকলার জল।

বসন্তকুম্ভাকর রস। প্রস্তুতবিধি ২৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মেহ-মূদগর-বটিকা। মেহরোগের প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থায় প্রস্রাবের সহিত শুক্র-নির্গমন, ঘোলাটে বা লালবর্ণের প্রস্রাব অথবা প্রস্রাবের নিম্নে চূণের ঞায় পদার্থ সঞ্চয় ও প্রস্রাবে জালাযন্ত্রণা ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, বিশেষতঃ কোষ্ঠকাঠিন্য উপস্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। মেহরোগে অরুচি, মূত্রকৃচ্ছতা, মূত্রাঘাত, পিড়কা কিম্বা মধুমেহরোগে রক্তহীনতা, পাণ্ডুতা, অরুচি বা বিজ্রমি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। বৈকালে সেব্য। অম্বুপান—ছাগীদুগ্ধ।

মেহমূদগর বটিকা। প্রস্তুতবিধি ৪৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা। মেহরোগে ঘোলাটে বা হরিদ্রাবর্ণের মূত্রনির্গত হওয়া, প্রস্রাবের নীচের চূণের ঞায় পদার্থ সঞ্চয় এবং প্রস্রাবে জালাযন্ত্রণা ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। মেহ বা মধুমেহরোগে রোগীর কাস, অরুচি, জীর্ণজ্বর, পাণ্ডুতা, দাহ, পিপাসা বা অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি থাকিলেও ইহা ব্যবস্থা করা যায়।

চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা। প্রস্তুতবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহা বঙ্গেশ্বর। বাতিক, পৈতিক বা গ্ৰৈন্থিক মেহের যে কোন অবস্থায়, বিশেষতঃ মেহ বা সোমরোগ হইতে মধুমেহের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, কিম্বা ষাভুক্কর বশতঃ ক্ষীণকায় ব্যক্তির সহসা মধুমেহের লক্ষণ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে রসরক্তাদি ষাভুর ও শরীরের পোষণার্থ প্রয়োগ করিবে। প্রস্রাবে জালা-যন্ত্রণা, নানাবর্ণাভা, মূত্রকৃচ্ছতা, শুক্র-নির্গমন, মূত্রাঘাত বা অশ্মরী ও শর্করা নির্গমন প্রভৃতি উপসর্গ ইহা সেবনে অচিরে প্রশমিত হয়। পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ ঐ সকল অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বৃহৎ বঙ্গেশ্বর বা বৃহৎ সোমনাথ রস যে যে

অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, 'এই ঔষধও সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায় ।
অল্পপান—গব্যদুগ্ধ ও মধু ।

মহা বঙ্গেশ্বর । প্রস্তুতবিধি ৪৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বৃহৎ সোমনাথরস । মেহরোগের প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থায় বস্তি-
গত বায়ুর প্রকোপবশতঃ মূত্রক্লেদতা, পিত্তের প্রকোপ বশতঃ মূত্রাশয়ে বা
জননেদ্রিয়ে দাহ এবং পিপাসা, মূত্রের আধিক্য, সোমরোগ বা বহুমূত্র,
মূত্রের নানাবর্ণাভা, আবিলতা, সুরুধারে বা ছইধারে মূত্র নির্গত হওয়া অথবা
মধুমেহ জনিত ক্ষয়, মধুজাতীয় শর্করা-নির্গমন, কাস, অরুচি, অলসতা,
অবসাদ, পাণ্ডুতা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ
রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা মূত্রক্লেদ, মূত্রাশাত এবং অশ্মরীরোগেও
মহোপকারী । অল্পপান—বায়ু-পিত্ত-প্রধান শরীরে ত্রিফলার জল ও মধু ।
শ্লেষপ্রধান শরীরে আমলকীচূর্ণ ও মধু ।

বৃহৎ সোমনাথ রস । প্রস্তুতবিধি ৪৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

প্রমেহমিহির তৈল । বাতিক ও পৈত্তিক মেহরোগের প্রথম,
দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় এবং শৈথিল্যমেহরোগের তৃতীয় অবস্থায় বা মেহ
মধুমেহে পরিণত হইলে, মেহদোষ নিবারণের জন্ত এই তৈল উদরে বা সর্কাস্ত্রে
মাশিশের ব্যবস্থা করিবে । পিত্তের প্রকোপ বশতঃ মেহরোগের উপসর্গ
অর্থাৎ হাত-পা-জ্বালা, গাত্র-দাহ, প্রবল পিপাসা, মুখশোথ, তালু-শোথ,
বস্তি-প্রদাহ, জননেদ্রিয়-প্রদাহ, বস্তিগত বায়ুর প্রকোপবশতঃ উদরাগ্নান,
মূত্রক্লেদতা, মূত্র-নির্গমনে জ্বালা-যন্ত্রণা, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, বমি, ঘৃষ্মণ্ডে জ্বর,
অক্ষুধা এবং মধুমেহরোগে ধাতুক্ষয় বশতঃ রসরক্তাদি বৃদ্ধি ও শরীরের পুষ্টি-
বিধানার্থ এই তৈল মর্দনের ব্যবস্থা করা যায় । বস্তিগত বায়ু ও পিত্তের
প্রকোপের আধিক্যে উদরে এবং শরীর পোষণার্থ ও গাত্র-দাহ বা মেহরোগ
বিনাশের জন্ত সর্কাস্ত্রে মাশিশের ব্যবস্থা করিবে ।

প্রমেহমিহির তৈল । তিলতৈল ৮ সের । কঙ্ক^৭—শুল্কা, দেবদারু, মুখা, হরিদ্রা,
দারুহরিদ্রা, মূর্খা-মূল, কুড়, অশগন্ধা, যেতচন্দন, রেণুক, চটুকী, যষ্টিমধু, রান্না, দারুচিনি,

এলাচি, বামনহাটী, চৈ, ধনে, ইল্লবব, করঞ্জ-বীজ, অণুর, তেজপত্র, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া নালুকা, বালা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, যজ্ঞিষ্ঠা, সরলকাঠ, পদ্মকাঠ, লোধ, মৌরী, বচ, জীরা, বেণার মূল, জায়ফল, বাঙ্গ-ছাল ও তপসপাত্রকা; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা।
কাথাক্রব্য—লাক্ষা ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; শতমূলীর রস ৮ সের, দুধ ৮ সের, দধির মাত ১৬ সের। বথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

দাড়িমাধ্য ঘৃত । মেহরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় মূত্রকৃচ্ছতা, স্বত্রের বিবদ্ধতা, দাহ, পিপাসা, মুখ-শোষ, তালু-শোষ ও রক্তহীনতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। জ্বর বা উদরাময়সঙ্গে সেবন নিষেধ। অল্পপান—উষ্ণদুগ্ধ।

দাড়িমাধ্য ঘৃত । গব্যঘৃত ৮ সের। কঙ্করব্য—দাড়িমবীজ, বিড়ঙ্গ, হরিজ্ঞা, চৈ, জীরা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঠ, পিপুল, গোক্ষুর, যমানী, ধনে, পিপুল-মূল, লোধ ও সৈন্ধবলবণ, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা, পাকার্থ জল ১৬ সের। বথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। যাত্রা—অর্দ্ধতোলা।

বৃহৎ দাড়িমাধ্য ঘৃত । মেহ রোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় বিশেষতঃ মধুমেহরোগে কাস, শ্বাস, হৃদ্রোগ, পিডিকা বা বনফার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে শর্করা-নির্গমন ও মূত্রকৃচ্ছতা প্রভৃতি নানারোগের শান্তি হয় এবং মেহজনিত ক্ষয় রোগ বিনষ্ট ও রসাদি ধাতুর পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। জ্বর কিম্বা অজীর্ণ বা উদরাময় সঙ্গে সেবন নিষেধ।

বৃহৎ দাড়িমাধ্য ঘৃত । গব্য ঘৃত ৮ সের। কঙ্করব্য—দাড়িমবীজ, চৈ, জীরা, বিড়ঙ্গ, হরিজ্ঞা, দারুহরিজ্ঞা, কিসুম্বি, শিঙ খেজুর, তালের মাখী, নীলোৎপল, গজপিপুল, বনযমানী, মহা নিম, কাকোলা, শুঠ, বচ, দেবদারু, চৈ, কুড়, গাভারীমুলের ছাল, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, রাখালশশা, মুরী, বংশলোচন, কাকড়াশৃঙ্গী, ধনে, কুলথকলায়, মহামেদ, নিমছাল, বৃহতী (ব্যাকুড়), কটকারী, ডানকুনী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বাঙ্গছাল ও ছাতিবছাল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১ সের। কাথাক্রব্য—দাড়িমবীজ ৮ সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের। বথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। যাত্রা—অর্দ্ধ তোলা হইতে এক তোলা।

বস্তিযোগ । মেহরোগে অত্যধিক জ্বালা যন্ত্রণা থাকিলে কিম্বা জননে-
জ্রিয়ের মধ্যে ক্ষত উৎপন্ন হইলে, এই যোগদ্বারা জননেজ্রিয়ে পিচ্কারী
প্রয়োগ করিবে। ইহা মেহ বিশেষতঃ বিষাক্ত-মেহরোগের জ্বালা-যন্ত্রণা ও
ক্ষত প্রশমিত এবং জীবাণু নষ্ট করিতে অধিতীৰ্ণ। এইরূপ আশু-প্রতীকারক
ঔষধ সচরাচর দৃষ্ট হয় না। কলিকাতার প্রসিদ্ধ চিকিৎসকেরা এই ধ্বস্তরি
সদৃশ ঔষধ ঐ সকল অবস্থায় প্রায়শঃ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। মেহ বা
গণোরিয়্যার কিঞ্চিৎ পুরাতন অবস্থায় প্রযোজ্য, কিন্তু কোষ-বৃদ্ধি থাকিলে
প্রয়োগ করিবে না।

বস্তিযোগ। শোধিত তুতে ভষ্ম দধির মাত সহ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। এরূপ
পরিমাণে তুতে ভষ্ম মিশ্রিত করিবে, যেন দধির মাত দেখিতে ঈষৎ সবুজ বা তুতিয়ার
বর্ণযুক্ত হয়, পরে পরিষ্কার সূক্ষ্ম কাপড় দিয়া ছাকিয়া লইবে এবং তদ্বারা পিচ্কারী প্রয়োগ
করিবে। সকালে ও বৈকালে একবার প্রয়োজ্য। যাবৎ জ্বালা যন্ত্রণা বা ক্ষত
প্রশমিত না হয়, তাবৎ প্রয়োজ্য। তুতিয়ার পরিমাণ বেশী হইলে জ্বালা করিতে পারে।
এইরূপ ত্রিফলার জলে বা জীবিত শামুক অথবা গুগ্গলীর জলে তুতিয়া মিশাইয়া পিচ্কারী
প্রয়োগ করা যায়। জীবিত শামুক পাথরে রাগিয়া দিলে, তাহা হইতে যে জল বাহির হয়,
তাহাই লইবে।

মেহরোগে—বহুমূত্র-চিকিৎসা ।

কালপূর্ণচন্দ্ররস । মেহরোগে মূত্রাধিক্য প্রকাশ পাইলে কিংবা মধু-
মেহরোগে মূত্রের পরিমাণ হ্রাসের জন্ত এই ঔষধ রাত্রিতে প্রয়োগ করিবে।
ইহা প্রয়োগে অতি শীঘ্র মূত্রের পরিমাণ হ্রাস পায়। এই ঔষধ একবার
প্রয়োগ করিবে এবং সকালে মধ্যাহ্নে ও বৈকালে অত্যন্ত ঔষধ প্রয়োগ
করিবে। এই ঔষধ প্রয়োগে মূলরোগ ও প্রস্রাবের পরিমাণ হ্রাস পাইলে,
ঔষধের মাত্রা ক্রমশঃ হ্রাস করিয়া আনিবে ও কিছুকাল পরে বন্ধ করিবে।
কারণ আফিং মিশ্রিত ঔষধ চিরাত্যস্ত করা কর্তব্য নহে। অল্পপান—যজ্ঞ-
ডুমুরচূর্ণ ও মধু বা ঘোচোর ফুলের কাথ ।

কালপূর্ণচন্দ্ররস। লৌহ, বঙ্গ, অত্র ও রসসিন্দুর প্রত্যেকে ১ তোলা এবং আফিং ১০ আনা,
আফিং জলে ভিজাইয়া তদ্বারা মর্দন করিয়া ১ রতি বটী করিবে।

হেমনাথরস । মেহরোগে মূত্রাধিক্য প্রকাশ পাইলে কিম্বা মধুমেহ-
রোগে মূত্রের পরিমাণ হ্রাসের জন্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে । ইহা প্রয়োগে
মূত্রের পরিমাণ হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ধাতুশ্রাব বা হৃদার ত্রায় গুরুশ্রাব, শর্করা-
বহির্গমন, প্রস্রাবের দুর্দমনীয় বেগ, হাত পা জ্বালা, জননেদ্রিয়ার প্রদাহ,
খোলাটে প্রস্রাব, প্রস্রাবের সঙ্গে খড়ীগোলার ত্রায় ধাতুশ্রাব প্রভৃতি প্রশমিত
হয় । ইহা বল, পুষ্টি ও গুরুবর্দ্ধক । অহুপান—মোচার রস বা যজ্ঞ-
ডুমুরের রস ।

হেমনাথরস । পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে ১ তোলা এবং লৌহ, কপূর,
প্রবাল ও বঙ্গ প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা । আক্টিফের কাথ, মোচার কাথ ও যজ্ঞডুমুরের রসে
সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে । বটী ২ রতি ।

মেহরোগে—ভৃগু ও বমন-চিকিৎসা ।

চন্দনাদি কাথ । মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী প্রভৃতি রোগে
পিত্তের প্রকোপ বশতঃ অত্যধিক দাহ উপস্থিত হইলে, এই কাথ রোগীকে
সেবন করিতে দিবে । ইহাতে মেহজনিত দাহ, মলভেদ, জ্বর ও পাণ্ডুতা
নষ্ট হয় ।

চন্দনাদি কাথ । প্রস্তুতবিধি ৪৩৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

খজ্জুরাশু চূর্ণ । প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগে পিত্তের
প্রকোপবশতঃ অত্যধিক দাহ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে মধ্যে মধ্যে
অল্প অল্প মাত্রায় সেবন করিতে দিবে ।

খজ্জুরাশু চূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ৪৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

কুশাদ্য তৈল । প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগে পিত্তের
প্রকোপবশতঃ অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হইলে, এই তৈল রোগীর সর্কাসে,
বিশেষতঃ উদরে মালিসের ব্যবস্থা করিবে ।

কুশাশু তৈল । প্রস্তুতবিধি ৪৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

মেহরোগে—দাহ-চিকিৎসা ।

কাশ্মর্যাদি পানীয় । মেহ, মধুমেহ, মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ ও অশ্মরী-

রোগে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ পুনঃপুনঃ পিপাসা উপস্থিত হইলে এবং তৎসঙ্গে ঘৃষ্মে জ্বর, দাহ, কাস ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, জলের পরিবর্তে এই পানীয় অল্প অল্প মাত্রায় রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে মধুমেহ রোগে দ্রাক্ষাজাতীয় শর্করা-নির্গমনরোধ হয়। মেহ হইতে ক্ষয়কাসের লক্ষণ উপস্থিত হইলে, ইহা অত্যন্ত উপকারী।

কাণ্ডায়াদি পানীয়। প্রস্তুতবিধি ৪৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তৃণপঞ্চমূল পানীয়। মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাধাত, অশ্মরী বা মধুমেহ-রোগে অত্যধিক পিপাসা প্রকাশ পাইলে, জলের পরিবর্তে এই পানীয় রোগীকে পান করিতে দিবে।

তৃণপঞ্চমূল পানীয়। প্রস্তুতবিধি ৪৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লাজোদক। মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাধাত ও অশ্মরী প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠকাঠিন্য ও বমন উপস্থিত হইলে, এই পানীয় অল্প অল্প পরিমাণে পান করিতে দিবে।

লাজোদক। প্রস্তুতবিধি ৪৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মেহরোগে—উদরাময় ও গ্রহণী-চিকিৎসা।

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্রস। মেহ বা মধুমেহরোগে রোগীর দাহ, হাত পা জ্বালা, হৃৎশূল, পার্শ্বশূল, কটিশূল ও তৎসঙ্গে আমসংযুক্ত পাতলা দান্ত এবং শরীর নিত্যন্ত কৃশ, দুর্বল ও বায়ুপিত্তপ্রধান হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অম্লপান—ভাজা জীরা চূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস। প্রস্তুত-বিধি ৩৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহারাজ নৃপতিবল্লভ। মধুমেহরোগে প্রবল উদরাময় বা গ্রহণীর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, অথবা পুনঃপুনঃ পাতলা বা আমমিশ্রিত দান্ত উদরে-বেদনা, কাস, শ্বাস, পার্শ্ব ও মস্তকে বেদনা, কাসে অত্যধিক রক্ত বা শ্লেষ্ম-নির্গমন, অরুচি ও দাহ প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অম্লপান—ভাজা জীরা চূর্ণ ও মধু।

মহারাজ নৃপতিবল্লভ। প্রস্তুতবিধি ২৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মেহরোগে—খাস ও ক্ষয়-চিকিৎসা ।

বৃহৎ বসন্ততিলক । মধুমেহরোগে ক্ষয়ের লক্ষণ উপস্থিত হইলে, এবং তৎসঙ্গে অল্প জ্বর, কাস, খাস প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা শারীরিক বল ও পুষ্টি বিধানার্থ এবং রসরক্তাদি ক্ষয়িত ধাতুর পূরণার্থ প্রয়োগ করা কর্তব্য । অমুপান—পিপুল-চূর্ণ ও মধু বা ছাগীহৃৎ ।

বৃহৎ বসন্ততিলক । প্রস্তুতবিধি ২৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বৃহৎ কাঞ্চনাদ্র । মেহরোগে ক্ষয়ের বা খাসের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে জ্বর, পিপাসা, দাহ এবং অকুচি প্রভৃতি থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে । রসরক্তাদি ক্ষয়িত ধাতুর পুষ্টি বিধানার্থ ইহা অতি উপকারী । অমুপান—ছাগীহৃৎ ।

বৃহৎ কাঞ্চনাদ্র । প্রস্তুতবিধি ২৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

মেহরোগে—উদাবর্ত-চিকিৎসা ।

হিঙ্গাদ্যাবর্তি । মেহরোগে উদাবর্তের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ও তজ্জন্ম মলরোধ, কটিশূল, পৃষ্ঠশূল, জংশূল ও বস্তিশূল প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই বর্তি রোগীর গুহদেশে প্রয়োগ করিবে ।

হিঙ্গাদ্যাবর্তি । প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বটপত্রী প্রলেপ । মেহরোগে রোগীর প্রস্রাব বন্ধ ও বস্তিদেশ ক্ষীত হইলে, এই প্রলেপ বস্তিদেশে প্রয়োগ করিবে ।

বটপত্রী প্রলেপ । প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বিস্বিকাদ্য প্রলেপ । মেহরোগে রোগীর প্রস্রাব বন্ধ ও বস্তিদেশ ক্ষীত হইলে, এই ঔষধ বস্তিদেশে লাগাইবে ।

বিস্বিকাদ্য প্রলেপ । প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

চতুস্মুখরস । মেহরোগে রোগীর উদরাগ্নান বা আমাশয়, পকাশয় ও বস্তিদেশ ক্ষীত এবং তজ্জন্ম মলমূত্ররোধ হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন

করিতে দিবে। ইহা মেহনাশক এবং তজ্জনিত মলমূত্ররোধক ও মূত্রকৃচ্ছতা নাশক। বিবিধ বায়ুপিত্তজন্ম বিকার ইহার দ্বারা বিনষ্ট হয়। অল্পপান—চাউলধোয়া জল।

চতুর্থধরস। প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রমেহরোগে—ধাতুদৌর্বল্য-চিকিৎসা।

বৃহৎ অশ্বগন্ধাসূত্র। মেহরোগে রসরক্তাদি ধাতুক্কর বশতঃ ক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তজ্জন্য রোগীর শরীর অত্যন্ত ক্লেশ ও দুর্বল হইলে, তাহার বল ও পুষ্টিবিধানার্থ এই সূত্র প্রয়োগ করিবে। ইহা যেমন ক্লেশতা ও দুর্বলতা নাশক, তেমনি মেহ ও তজ্জনিত বাতনাশক। মধুমেহের অবস্থায়ও অত্যন্ত উপকারী, কিন্তু উদরাময়, শোথ বা অগ্নিমান্দ্য থাকিলে, প্রয়োগ নিষেধ। অল্পপান—উষ্ণদুগ্ধ।

বৃহৎ অশ্বগন্ধাসূত্র। ২৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রাশ সূত্র। মেহরোগে রসরক্তাদি ধাতুক্কর বশতঃ ক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তজ্জন্য রোগীর শরীর অত্যন্ত ক্লেশ ও দুর্বল হইলে, এই সূত্র প্রয়োগে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। ইহা যেমন পুষ্টি ও বলকারক, তেমনি মেহ, মধুমেহ ও তজ্জনিত নানাবিধ বাতনাশক; কিন্তু উদরাময়, জ্বর বা শোথ থাকিলে প্রয়োগ করিবে না। অল্পপান—উষ্ণদুগ্ধ।

অমৃতপ্রাশসূত্র। প্রস্তুতবিধি ৬৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রমেহ-পিড়কা—চিকিৎসা-বিধি।

যেমন সশর্কর মেহ বা বহুমূত্ররোগ, শর্করাশূত্র মেহ বা বহুমূত্ররোগে কিম্বা শর্করাশূত্রমেহ বা বহুমূত্ররোগ সশর্করমেহ বা বহুমূত্রে পরিণত হইতে পারে, তেমনি উভয়রোগ হইতেই পিড়কার উৎপত্তি হইতে পারে, সুতরাং মেহরোগের প্রথম অবস্থায়ই পিড়কা উৎপন্ন হইতে না পারে, তজ্জন্য একটি ফলপ্রদ ঔষধ পৃথক্ প্রয়োগ করা উচিত। এই কারণেই স্ত্রোগোষাদি-চূর্ণ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা যেমন মেহ ও বহুমূত্র বিনাশক, তেমনি পিড়কার প্রতিষেধক। প্রমেহ পিড়কা দশ প্রকার, তন্মধ্যে নয় প্রকার

অসাধ্য না হইলেও কষ্টসাধ্য বা কষ্টে আরোগ্য হয়, কিন্তু বিদ্রুহি নামক পিড়কা অসাধ্য বলিলেও অতুক্তি হয় না। বক্ষ্যমাণ বিদ্রুহি নামক রোগে তাহার লক্ষণ ও চিকিৎসা পৃথক্ বর্ণিত হইবে। পিড়কা বহির্গত হইলে, সোমরাজীলেপ, বা উড়ুস্বর লেপ তত্পরি প্রয়োগ করিবে ও শারিবাди কাথ সকালে এবং ত্র্যগোখাদিচূর্ণ বৈকালে সেবন করিতে দিবে। এই সকল ঔষধেই সাধারণতঃ পিড়কা বিনষ্ট হয়, কিন্তু উহা দ্বারা স্থায়ী ফললাভ না হইলে, রুহং শ্যামাস্বত বা পঞ্চতিক্তস্বত গুগ্গুন্ডু ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এই দুইটি স্বত যেমন প্রমেহাদি রোগনাশক, তেমন পিড়কানাশক, রক্তদুষ্টি-নাশক, কোষ্ঠশোধক ও স্থায়ী ফললাভের উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রমেহরোগে যেসকল ধাতুঘটিত ঔষধ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেই সকল ঔষধেরও পিড়কা ও রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নাশ করিবার শক্তি অসাধারণ।

কার্কঙ্কল ও বয়েল।

ডাক্তারেরা বলেন,—ডায়াবিটিস্ হইতে দুই প্রকার ফোটকের উৎপত্তি হয়। ১। কার্কঙ্কল। ২। বয়েল।

কার্কঙ্কলের লক্ষণ। কার্কঙ্কল ত্রণ-শোধের দ্বারা উৎপন্ন হয়, অনন্তর ক্রমশঃ উহার নিম্নস্থ স্বক্রে প্রদাহ বিস্তৃত হয় এবং সেই পীড়িতস্থান কঠিন, বেদনায়ুক্ত ও সটান হয়। পরে স্বক্রে ক্রমশঃ ক্ষীত এবং উচ্চ ও ধূস্রবর্ণ হইয়া উঠে। ত্রণ গলিত হইলে, উহা হইতে অত্যন্ত পুষ্টি নির্গত হয় ও কতকগুলি ছিদ্র দেখা যায় এবং ঐ ছিদ্রের মধ্যেও ত্রণের উপরে পুচ্ছা সঞ্চিত থাকে। কোন কোন কার্কঙ্কল কতকস্থানে বিস্তৃত হইয়া স্থগিত থাকে, আবার কোন কোনটি ক্রমশঃ চতুর্দিকে বিস্তৃত হয় এবং তাহার মাংসাদি কোমল অংশসকল বিগলিত হইতে থাকে। এই অবস্থা হইতে নালীঘাও হইতে পারে। ইহা শরীরের মাংসলস্থানে উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু সচরাচর পৃষ্ঠে, গ্রীবার ও নিতম্বে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পৃষ্ঠদেশে হইলে বাঙ্গলার তাহাকে পৃষ্ঠত্রণ এবং গ্রীবার হইলে ষাড়মাণ্ডা কহে। মুখমণ্ডলে হইলে, অত্যন্ত মারাত্মক হইয়া পড়ে।

বয়েল। ইহা এক প্রকার ফোটক, দেখিতে ধূস্রবর্ণ ও প্রশস্ত, কিন্তু

কখনও কখনও রথের চুড়ার স্থায়ী ভীক্ষাগ্র দৃষ্ট হয় । ইহাতে বেদনার আধিক্য থাকে এবং অল্প অল্প করিয়া পৃথক উৎপন্ন হয় । উহা উৎপন্ন হইলে শীঘ্র আরোগ্য হয় না ; পরন্তু উহা শুষ্ক হইতে না হইতে আবার কয়েকটি নূতন উদ্গত হইয়া থাকে । এই স্ফোটকের আরম্ভে উহার উপরে একটি লোম দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা উৎপাটন করিলে অনেক সময়ে বেশ উপকার হয় । ইহা সচরাচর স্বয়ং বিদীর্ণ হইয়া যায় । রক্তপ্রধান শরীরে বা যুবকদিগের শরীরে ইহার প্রাবল্য দৃষ্ট হয় । গ্রীষ্মকাল প্রায়শঃ ইহার উৎপত্তির সময় । কখনও কখনও ইহা সংক্রামক হইয়া উঠে । ইহাকে কেহ কেহ ম্যান্জোবয়েল অর্থাৎ আমফোড়া নামে অভিহিত করেন ।

আয়ুর্বেদোক্ত দশবিধ পিড়কার মধ্যে কোন্ কোন্টির সহিত কার্কঙ্কল ও বয়েল নামক স্ফোটকের সাদৃশ্য আছে, তাহার নির্দেশ করা দুঃস্থ । বন্ধ্যীক-নামক স্ফোটকের সহিত কার্কঙ্কলের অনেক সাদৃশ্য থাকিলেও কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে । বন্ধ্যীক বিসর্পের স্থায় চলিয়া বেড়ায় আয়ুর্বেদে এইরূপ কথিত হইয়াছে, কিন্তু কার্কঙ্কল চতুর্দিকে বিস্তৃত হইলেও অগ্রাগ্র গমন করে না । বিসর্পের গতি দুই প্রকার । ১। কোন একটি স্থানে স্ফোটক হইলে, তাহা ক্রমশঃ চতুর্দিকে বিস্তৃত হওয়া । ২ । কোন একটি স্থানে স্ফোটক হইলে, অবিলম্বে তৎলক্ষণ ও আকৃতিবিশিষ্ট স্ফোটকের অগ্রাগ্রস্থানে উৎপত্তি । কার্কঙ্কল প্রথম প্রকারের গতিবিশিষ্ট । বন্ধ্যীক যদি কার্কঙ্কলের স্থায় গতিবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে, উভয় একই ব্যাধি ।

• পিড়কারোগে—ঔষধ ।

সোমরাজীলেপ । মেহরোগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা উৎপন্ন হইলে, এই লেপ রোগীর রোগ স্থানে লাগাইবে ।

সোমরাজী লেপ । সোমরাজী বীজ গোমুত্রসহ বাটিয়া লাগাইবে ।

শারিবাতি কাথ । মেহরোগে পিড়কা উৎপন্ন হইলে, এই কাথ প্রত্যহ প্রাতে রোগীকে পান করিতে দিবে ।

শারিবাতি কাথ । আমালতা, অনন্তমূল, কিস্মিস্, তেউড়ী, সোণামুখী, কটকী, হরীতকী, বাসকছাল, নিমছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গোক্ষুর ; এই সকল দ্রব্য সমভাপে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

মুদগপর্ণ্যাদি কাথ । মেহরোগে পিড়কা উৎপন্ন হইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

মুদগপর্ণ্যাদি কাথ । মুগাণী, মায়ানী, তেউড়ী মূল, সোন্দাল, শটী, বিভারকবীজ, নীল-বৃক্ষেয় মূল, এলাইচ, হরীতকী, শ্যামালতা, অনন্তমূল ও লবঙ্গ ; ইহারা সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

বৃহৎ শ্যামাঘৃত । মেহরোগে পিড়কা উৎপন্ন হইলে, এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা দ্বারা যেমন পিড়কা বিনষ্ট হয়, তেমনই নানাবিধ মেহ, মধুমেহ, বাতরক্ত, শুক্রক্ষয়, প্রস্রাবের সহিত রক্ত নির্গত হওয়া, হৃদ্রোগ এবং রসরক্তাদি ধাতুক্ষয় প্রভৃতি উপসর্গও প্রশমিত হইয়া থাকে ।
অমুপান—উষ্ণদ্রব্য ।

বৃহৎ শ্যামাঘৃত । গব্যঘৃত ৪ সের । ককদ্রব্য—শ্যামালতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বেড়েলা, পদ্মকাঠ, ভূমিকুখাণ্ড, নীলোৎপল, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ; কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, বটমধু, অথগন্ধা, শতমূলী, বনযমানী, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, ধেতচন্দন, রক্তচন্দন, কিসুমিসু, গান্ধাইল, শঠ ও কটুকী ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা । কাথ্যদ্রব্য—শ্যামালতা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের । শত-মূলীর রস ৪ সের, ইক্ষুরস ৪ সের ও ভূমিকুখাণ্ডের রস ৪ সের । ছাগদুগ্ধ ৪ সের । যথা-নিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা—অর্দ্ধতোলা হইতে দুই তোলা ।

মেহরোগে এতদ্ভিন্ন আরও উপসর্গ উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহা বিবরণ, সরচরাচর দৃষ্ট হয় না । মেহরোগে মূত্রকৃচ্ছতা প্রায়শঃ উপস্থিত হয়, যে সকল ঔষধ বর্ণিত হইল, তাহাতেই মূত্রকৃচ্ছতা বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু যদি পৃথক্ চিকিৎসার আবশ্যকতা হয়, তবে বক্ষ্যমাণ মূত্রকৃচ্ছরোগের ভায়, চিকিৎসা করিবে । মূচ্ছা উপস্থিত হইলে, মূচ্ছারোগ চিকিৎসার ভায় ঔষধ ব্যবস্থা এবং রোগীর চৈতন্য সম্পাদন করিবে । মেহরোগে যে সকল উপসর্গের চিকিৎসা পৃথক্ বর্ণিত হইবে, সেই সকল উপসর্গ প্রায়শঃ সর্বদা উপস্থিত হইয়া থাকে ।

মেহ, মধুমেহ ও পিড়কারোগে—পথ্যাপথ্য ।

পথ্য । পুরাতন শালিতুলের অন্ন, কুলথকলায়, যুগ, অড়হর ও ছোলার ডাইল, তিলের বড়া, চড়ুই, পায়রা, শশক, ভিত্তির, লাব, ময়ূর, এণ, বর্তক

প্রভৃতির মাংসযুষ, শর্জিনা, পটোল, করলা, উচ্ছে, কাঁকড়া, ডুমুর, কাঁচকলা, মোচা প্রভৃতির তরকারী, খৈ, পুরাতন মত্ত, যবমণ্ড, ঘোল, তাল, বৃহতীফল, কয়েং বেল, কেশুর, পানিফল, খেজুর, জাম, বেদানা, দাড়িম, আঙ্গুর, পেস্তা, পক্কদলী ও গাব প্রভৃতি ফল মেহ, মধুমেহ ও পিড়কারোগে সুপথ্য। এতদ্ভিন্ন হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শতমূলী, আমলকী প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া চিনির রসের পরিবর্তে মধুর রসে ভিজাইয়া মোরসা করিয়া খাওয়া যায়। তিক্ত কষায়রসবিশিষ্ট সমস্ত দ্রব্য, অত্যধিক ভ্রমণ ও ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম এই রোগে সুপথ্য।

চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের পক্ষে শারীরিক পরিশ্রম অধিক উপযোগী। কেবল বসিয়া থাকা বা অলসভাবে কালযাপন অনেকস্থলে এই রোগের উৎপত্তির কারণ, সুতরাং রোগের নিদান পরিবর্তন সর্বাগ্রে অবশ্যক। এ দেশের কত চিন্তাশীল সুসন্তান যে শারীরিক পরিশ্রমের অভাবে মধুমেহ রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই রোগে দুগ্ধ উপকারী নহে, তবে মাখনতোলা দুগ্ধ বা ঘোল ব্যবস্থা করা যায়। পাঠা ও ঘূরগী প্রভৃতির মাংসের যুষ এ রোগে অত্যধিক উপকারী। মাংস ভোজন করিলে, শর্করার পরিমাণ শীঘ্র কমিয়া যায়। মধু এই রোগে একটি সর্বশ্রেষ্ঠ পথ্য, কিন্তু পুরাতন হইলেই ভাল হয়, তদভাবে নূতনও সেবন করা যায়। ডাক্তারেরা মধুমেহ রোগে মধুর-দ্রব্য বা খেতসারবিশিষ্ট দ্রব্য স্বাত্রেই এমন কি ভাত, আটা, ময়দা, সুজি পর্য্যন্ত কুপথ্য বলিয়া নির্দেশ করেন, আয়ুর্বেদের মত ঠিক তদ্রূপ নহে। আয়ুর্বেদ-মতে মধু বা পুষ্ণজাতীয় শর্করা সর্বাদা অপকারী নহে। এই রোগের পথ্যাপথ্য ও সোমরোগের পথ্যাপথ্য একই। বিস্তারিত পথ্যাপথ্য সোমরোগে দৃষ্টব্য।

অপথ্য। নূতন তড়ুলের অন্ন, দুধ, দধি, মৈথুন, তৈল বা তৈল দ্বারা সঙ্গলিত দ্রব্য, ঘৃত, গুড়, চিনি, ইক্ষু, বিরুদ্ধ ভোজন, রোহিত ও মাগুর-ব্যতীত অস্ত্রাঙ্গ মৎস্ত, দুগ্ধিত জল এবং মধু, পাকাকলা, মধুর ও অন্নরস বিশিষ্ট ফল ব্যতীত অস্ত্রাঙ্গ মিষ্টদ্রব্য বিশেষতঃ গুড় ও চিনি দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য এবং লবণরসবিশিষ্ট দ্রব্য ও অভিব্যাদি বা পিত্ত-বর্জক দ্রব্য এই রোগে

কুপথ্য । সর্বদা বসিয়া থাকা, পরিশ্রম না করা ও দিবা-নিদ্রা এই রোগে বর্জন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য ।

গনোরিয়া বা উপসর্গিক মেহরোগ— চিকিৎসা ।

গনোরিয়া এবং মেহরোগের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য ।

গনোরিয়া আধুনিক ব্যাধি । চরক ও সূত্রত সংহিতায় এ রোগের উল্লেখ নাই । সিফিলিসের ঝায়, ইহাও সবিষ ও সংক্রামক, পরন্তু পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের রোগ নহে, ইয়ুরোপে উৎপন্ন ও তদেশাগত ব্যাধি । আয়ুর্বেদে বিংশতিপ্রকার মেহরোগের উল্লেখ আছে এবং তাহার নিদান ও চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু গনোরিয়ার উল্লেখ নাই । চরক সূত্রাদি মুনিগণের প্রাদুর্ভাবকালে, ভারতবর্ষে এই রোগের অস্তিত্ব থাকিলে, সম্ভবতঃ তাঁহারা গনোরিয়ার লক্ষণের উল্লেখ করিয়া একবিংশতি প্রকার মেহরোগের সংখ্যা নির্দেশ করিতেন । কেহ কেহ এই রোগকে পিত্তজ মেহরোগ নামে অভিহিত করেন, কিন্তু গনোরিয়া পিত্তজ মেহ নহে । কেবল পিত্তজ মেহরোগের সহিত গনোরিয়ার উপসর্গের অর্থাৎ দাহ প্রভৃতির কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে মাত্র ।

মিহধাতু,—ক্ষরণে এই অর্থে মূত্রনালীর ক্ষরণধর্ম্মযুক্ত ব্যাধিমাত্রই মেহ-রোগ-মধ্যে পরিগণিত, সূত্রবাং গনোরিয়াও মূত্রনালীর ক্ষরণধর্ম্মযুক্তব্যাধি, এই জন্ত উহাকে মেহ-মধ্যে নিবেশ করা যায়, কিন্তু তথাপি গনোরিয়া যে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ব্যাধি, ইহা স্বরণ রাখা উচিত । অতিরিক্ত শুক্রাদিক্ষয় প্রভৃতি নানা কারণে মেহ উৎপন্ন হয়, কিন্তু এই রোগের উৎপত্তির কারণ কুসংসর্গ । মেহ নির্দ্বিধ, কিন্তু ইহা সবিষ ও সংক্রামক । তদ্ব্যতীত গনোরিয়া ও মেহ এই উভয় রোগের নিদান ও লক্ষণাদি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, মেহ অপেক্ষা সিফিলিসের সহিত বরং ইহার যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান, এমন কি—উভয় প্রায় একই জাতীয় ব্যাধি বলিলেও অত্যাক্তি হয় না, কারণ গনোরিয়াও সবিষ ও সংক্রামক এবং সিফিলিসও সবিষ ও সংক্রামক । সিফিলিসও দূষিত সহবাসের ফলে

উৎপন্ন হয়, গনোরিয়াও হুমিত সংসর্গের ফলে উৎপন্ন হয়, সিফিলিসেও জননেদ্রিয়ে ক্ষত হয়, গনোরিয়ায়ও জননেদ্রিয়ে ক্ষত হয়, সিফিলিসেও রক্তদৃষ্টি হয়, গনোরিয়ায়ও রক্তদৃষ্টি হয়, সিফিলিসেও বাত হয়, গনোরিয়ায়ও বাত হয়, সিফিলিসেও জ্বর, শিরোরোগ, ধাতুদৌর্বল্য ও বাগী হয়, এই রোগেও হইতে পারে। সিফিলিসের বিষ যে রূপ উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে পরিণামে ধাতুগত হয়, গনোরিয়া উপেক্ষিত হইলেও তাহার বিষ ধাতু-পরিব্যাপ্ত হয়। সিফিলিসও পুরুষ হইতে স্ত্রীতে এবং স্ত্রী হইতে পুরুষে সংক্রামিত হয়, ইহাও স্ত্রী হইতে পুরুষে ও পুরুষ হইতে স্ত্রী-শরীরে এবং পিতা মাতা দ্বারা সম্ভানে সংক্রামিত হয়। বরং গনোরিয়ার সংক্রামকতা সিফিলিস অপেক্ষাও অধিক। সিফিলিসের বীজ পুরুষের জননেদ্রিয়ের ত্ত্ব বিদীর্ণ হইলে, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু গনোরিয়ার বীজ সংক্রমণ-কালে ত্ত্ব বিদীর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করে না, গনোরিয়া রোগগ্রস্তা স্ত্রী সহবাস-কালে পুরুষের জননেদ্রিয়ের মূত্র-নালীর সহিত রোগ-বীজের সংস্পর্শমাত্রই রোগ উৎপন্ন হয়। তবে গনোরিয়া ও সিফিলিসের মধ্যে পার্থক্য এই—গনোরিয়া রোগে শিশুর অভ্যন্তরে মূত্রনালীতে ক্ষত হয়, গর্ভমিতে শিশুর মুখে বা আবরক চর্মের নীচে যা হয়, গর্ভমিতে যে রূপ রক্তদৃষ্টিজনিত নানা প্রকার পিড়কা, চর্মরোগ বা কুষ্ঠ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, ইহাতে তাহা হয় না। গর্ভমীতে যে স্থানে বাগী হয়, ইহাতে সেই স্থানে বাগী হয় না, বক্ষণ-সন্ধি অর্থাৎ কুচ্-কীতেই এই বাগী উৎপন্ন হয়। গর্ভমির বাগী সহজে পাকে না ও তাহাতে সহজে পুষোৎপত্তি হয় না, কিন্তু এই বাগী সহজেই পাকে ও পুষ-পরিপূর্ণ হয়। সর্বপ্রকার বাগীই বক্ষণ-গ্রন্থি আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, তবে বিভিন্নতা এই—সিফিলিসের বাগী বক্ষণ-সন্ধির কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে জন্মে, অথ বাগী কিঞ্চিৎ নিম্নে জন্মে।

মেহরোগ যে কারণে উৎপন্ন হয়, গনোরিয়ার উৎপত্তির কারণ, তাহা-হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পাঠকগণ মেহরোগের নিদানের সহিত গনোরিয়ার নিদানের মিল করিয়া দেখিলেই তাহা সহজে বুঝিতে পারিবেন। আবার অতিশয় উষ্ণবীৰ্য্য দ্রব্য (যেমন লঙ্কা সর্ষপাদি) ভক্ষণ, অতিরিক্ত মাদক-দ্রব্য-সেবন কিম্বা রৌত্র বা অগ্নি-সেবন প্রভৃতি কারণে পিত্তজ মেহ-রোগের উৎপত্তি হয়, এবং তাহাতে পৈত্তিক মেহরোগের উপসর্গ অর্থাৎ মূত্রাশয়ে, শিশ্নে

এবং কোষদ্বয়ে বিদারণব্যবধান, অর, মূত্রনালীর দাহ, পিপাসা, অগ্নোপসার, মুচ্ছা ও মলভেদ প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, কিন্তু উহা ঠিক গনোরিয়া নহে। ঐ রোগে গনোরিয়ার জ্বায়া সপুষ্য ধাতু নির্গত হয় না। যাহারা গনোরিয়াকে পিত্তজ মেহ বলিয়া নির্দেশ করেন, তাঁহারা যদি পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের বিরচিত গ্রন্থ পাঠ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, আয়ুর্বেদ-মতে যাহাকে পিত্তজ মেহ কহে এবং যে কারণে তাহা উৎপন্ন হয়, অবিকল সেই সকল কারণে উৎপন্ন ও তুল্য লক্ষণযুক্ত ব্যাধির উল্লেখ করিয়া তাঁহারা লিখিয়াছেন,—ঐ সকল কারণে সাধারণতঃ মূত্রনালীর যে সহজ প্রদাহ উপস্থিত হয়, তাহা গনোরিয়া বা সংক্রামক রোগ নহে। এক্ষণে বক্তব্য এই—যাহারা দেশের আশা ভরসা ও শিক্ষার স্বল, তাঁহারা ই যদি এইরূপভাবে রোগ নির্ধারণ করেন এবং বিশিষ্টরূপে অগ্নুসন্ধান না করিয়া গনোরিয়াকে পিত্তজমেহ বলিয়া নির্দেশ ও শিক্ষার্থীদিগকে তথ্যবিধ উপদেশ প্রদান করেন, তদপেক্ষা আর ক্ষোভের বিষয় কি হইতে পারে? আয়ুর্বেদ-মেহরোগের সাধারণ লক্ষণে উক্ত হইয়াছে,—“সকল মেহরোগেই আবিলবর্ণ মূত্র নির্গত হয়। দোষ ও দূষের তুল্যতা সত্ত্বেও, তাহাদিগের (দোষ ও দূষের) সংযোগের আধিক্য বা অল্পতা অগ্নুসারে মূত্রের বর্ণাদির বিভিন্নতা বশতঃ মেহরোগেরও প্রকারভেদ কল্পিত হইয়া থাকে।” গনোরিয়ায় আবিলবর্ণ-মূত্র নির্গত হয় এবং গনোরিয়াও মূত্রনালীর ক্ষরণধর্মশীল ‘ব্যাধি, সুতরাং তাহাকে বরং মেহরোগ-মধ্যেই সন্নিবেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু পিত্তজমেহ বলা যায় না, কারণ পিত্তজমেহরোগে সপুষ্য বা হরিদ্রাবর্ণ ধাতু নির্গত হয় বা মূত্রনালীতে ক্ষত হয়, শাস্ত্রে কুত্রাপি একথার উল্লেখ নাই, কেবলমাত্র ২।৪ টি উপসর্গের সহিত তুল্যতা দৃষ্ট হয় মাত্র। ইদানীং সিকিলিস ও গনোরিয়া বিরল রোগ নহে। ঐ রোগসম্বন্ধে যাহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা ই জানেন;—কু-সঙ্গমই উভয় রোগের মুখ্য বা প্রধান কারণ। প্রথমতঃ কুসঙ্গম হইতেই রোগের উৎপত্তি হয়, পশ্চাৎ সংক্রামকতা বশতঃ একদেহ হইতে দেহান্তরে বিধবীজ প্রবেশ করে, পরন্তু এইরূপে গোণ বা অপ্রধান কারণেও ঐ উভয় রোগই উৎপন্ন হইতে পারে। মেহ-রোগও সংক্রামক কিন্তু বিষাক্ত নহে। মেহরোগের সংক্রামকতাবারা

সন্তানসন্ততিমাত্র আক্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু সহবাসের ফলে জ্বর আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু গনোরিয়া দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই সমভাবে আক্রান্ত হইয়া থাকে, এমন কি ঐ অবস্থায় জাতসন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই হরিদ্রাবর্ণ সপুষ্প ষাটু নির্গত হইতে দেখা গিয়াছে । এতাবৎকাল চিকিৎসা-দ্বারা যে সামান্য অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাই এস্থলে যথাযথ লিপিবদ্ধ হইল, এক্ষণে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের বহুগবেষণার ফলস্বরূপ গনোরিয়ার নিদান ও লক্ষণাদি যে সকল তত্ত্ব এতাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে ।

গনোরিয়ার নিদান ও লক্ষণ । ইহা জননেত্রিয়ার সংক্রামক রোগ । ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এই রোগ যুরোপে প্রথম দৃষ্টিগোচর হয় । সিফিলিস অপেক্ষা এই রোগ অধিক সংক্রামক । বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণ বলেন, গনোরিয়ার বীজে গণোকোকাই নামক একপ্রকার জীবাণু থাকে, তাহার প্রভাবেই এইরোগ উৎপন্ন ও অতদেহে সংক্রামিত হয় । ঐ জীবাণু নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত গনোরিয়া শরীরে অবস্থান করে । গনোরিয়ার তৃতীয় বা চতুর্থ অবস্থায় বাহ্য লক্ষণ বর্তমান না থাকিলেও ঐ জীবাণু গুপ্তভাবে শরীরে অবস্থিতি করে । ব্যাধিগ্রস্ত জননেত্রিয়ার সহিত সুস্থ জননেত্রিয়ার সংস্পর্শ মাত্রই রোগবীজ সুস্থ জননেত্রিয়ে সংক্রামিত হয়, সিফিলিসের দ্বারা তৎ বিদীর্ণ হইয়া তন্মধ্যে রোগ-বীজ প্রবেশের অপেক্ষা করে না । পুরুষের মূত্রনালী, স্ত্রী-জননেত্রিয়, মলদ্বার ও অন্ধিঝিল্লীসমূহ গনোরিয়ার বিষ সংস্পর্শ মাত্রই সংক্রামিত হইয়া থাকে । কেহ কেহ বলেন ঐ বিষ অত্যাশ্চর্য্য মৈথুনিক ঝিল্লীও সংক্রামিত হইতে পারে । এই বিষ একবার শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, চিকিৎসা দ্বারা তাহার বাহ্য লক্ষণগুলি অদৃশ্য হয়, কিন্তু রোগ-বীজ একবারে বিনষ্ট না হইলে, প্রকল্পভাবে শরীরে অবস্থান করে এবং অতিশয় রতি-ক্রিয়া, মাদক-দ্রব্য-সেবন ও উষ্ণদ্রব্য (লব্ধ-সর্বপাদি) ভক্ষণাদি পিত্তবর্দ্ধক অথচ উত্তেজক কারণের প্রভাবে রোগ বর্দ্ধিত হইয়া বাহ্যলক্ষণ প্রকাশ করে । সিফিলিসের দ্বারা ইহারও তরুণাবস্থায় যথারীতি চিকিৎসা দ্বারা রোগের বীজ নষ্ট না করিলে, অবিলম্বে ষাটুগত রোগে পরিণত হয়, পরন্তু ঐ অবস্থায় রোগের মূলোচ্ছেদ করা কষ্টকর হইয়া উঠে । তখন রোগীর নিম্নত নানাপ্রকার যন্ত্রণা, অসাহ্যতা, বিষমতা,

উদ্ভবরাহিত্য এবং আলস্য প্রভৃতি নানাবিধ উপদর্গ উপস্থিত হয়। ইহা জ্বী হইতে পুরুষে, পুরুষ হইতে জ্বীতে ও জ্বী-পুরুষের দ্বারা সম্ভবসম্বন্ধিতে সংক্রামিত হয়। জ্বীলোকের হইলে, তাহার লজ্জাবশতঃ প্রকাশ করে না, তাহার ফলে আজীবন জননেজ্জিরের প্রদাহ অমুভব করে। ঐ অবস্থায় গর্ভ হইলে গর্ভস্রাব হইতে পারে। জ্বী-পুরুষের মধ্যে রোগের লক্ষণ বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। জ্বীলোকের মূত্রনালী পুরুষের অপেক্ষা ক্ষুদ্র, একারণে রমণীগণ ঐ রোগে আক্রান্ত হইলে, তাহাদের মূত্রনালীর প্রবল প্রদাহ, সন্ধোচ এবং প্রেষ্টেট গ্রন্থি না থাকায়, তাহার প্রদাহ উপস্থিত হইতে পারে না। তবে অন্তান্ত লক্ষণ অর্থাৎ মলদ্বারে ও কুচকীতে বেদনা, জ্বরভাব ও কুচকীতে প্রদাহ বা তাহার ফলে বাগীর উৎপত্তি ও মূত্রনালীর অল্প প্রদাহ হইতে পারে। গনোরিয়া যথারীতি চিকিৎসার অভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থা অতিক্রম করিলে প্রায়ই প্রচ্ছন্নভাবে শরীরে অবস্থান করে, অনন্তর কোন প্রকার অনিয়ম বা উত্তেজক কারণের সহায়তা পাইলেই বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ করে। এই অবস্থায় প্রস্রাবের অল্প জ্বালা, অল্প পুষ্ণ বা হরিদ্রাবর্ণ ধাতু নির্গত হয় ও কঠিন বাতব্যাদি উপস্থিত হইয়া থাকে।

প্রথম বা প্রচ্ছন্ন অবস্থা। রোগের বীজ-সংক্রমণের পর একদিন একরাত্রি বা দুইদিন দুইরাত্রির মধ্যে সাধারণতঃ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, আবার কখনও ঐ নিয়মের ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয়। চারি দিন হইতে সাত দিনের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগের লক্ষণ যাবৎ প্রকাশিত না হয়, তাবৎ ঐ অবস্থাকে প্রচ্ছন্ন বা গুপ্তাবস্থা বলা যায়।

দ্বিতীয় বা প্রদাহিক অবস্থা। রোগ প্রকাশ পাইলে, মূত্র-নালীর মুখ সুড় সুড় করে, সর্সদা চুলকাইতে ইচ্ছা এবং ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ উপস্থিত হয়, কিন্তু যথোচিত পরিমাণে বা যথারীতি প্রস্রাব হয় না, সুরু-ধারে অতিশয় কষ্ট ও জ্বালা-যন্ত্রণার সহিত অল্প মূত্র ও শ্লেষ্মা বা দুগ্ধবৎ তরল পদার্থ নির্গত হয়। মূত্রনালীর ওষ্ঠদ্বয় কিঞ্চিৎ ক্ষীত ও রক্তবর্ণ হয়, পরন্তু মূত্রনালী টিপিলে দুগ্ধবৎ তরল অল্প স্রাব নির্গত হইয়া থাকে। অনন্তর রোগ ক্রমশঃ বর্ধিত হয়, তখন অত্যধিক জ্বালা-যন্ত্রণার সহিত প্রচুর পরিমাণে সপুষ্ট ধাতু নির্গত হয়। মূত্রাশয়ে, অণ্ডকোষে ও কোমরে বেদনা এবং ভার-

বোধ হইয়া থাকে । এই অবস্থার ব্যাপ্তিকাল সাধারণতঃ ১০।১৫ দিন ; তবে কোন কোন স্থলে রোগের প্রাবল্য বা রোগীর প্রকৃতিভেদে ঐ অবস্থা ২।৩ সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে দেখা যায় ।

তৃতীয় বা অনতিপ্রবল প্রদাহিক অবস্থা । অতঃপর রোগের অবস্থা পরিবর্তিত হয় । প্রবল প্রদাহ, মূত্রকৃচ্ছতা প্রভৃতি উপসর্গগুলি হ্রাস পায় । প্রস্রাবের সময় অল্প জ্বালা অনুভূত হয় ও হরিদ্রাবর্ণের ধাতু নির্গত হইয়া থাকে ।

পুরাতন অবস্থা । এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, উহা ধাতুগত পীড়ায় পরিণত হয়, তখন রোগের মূলোচ্ছেদ করা কঠিন হয় । সময় সময় দুগ্ধ বা শ্বেদার ঞ্জার ধাতু নির্গত হয় । বেশী জ্বালা-যন্ত্রণা থাকে না ।

গনোরিয়ারোগে নানাবিধ উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে, তন্মধ্যে সচরাচর যে সকল উপসর্গ দৃষ্ট হয়, তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত হইল । নিম্ননালের প্রদাহবশতঃ লিম্ফনাল শোথগুলে, রক্তবর্ণ ও জ্বালাবিশিষ্ট হয় । লিম্ফহর্ব, অণ্ডকোষ প্রদাহ ও অত্যধিক শোথবশতঃ কোষের বিবৃদ্ধি ও আরক্তিম-ভাব, মূত্রনালীর সঙ্কোচবশতঃ মূত্রাঘাত, মূত্রাশয়ের প্রদাহ, লিম্ফের চর্মদ্বারা লিম্ফনালের মুদ্রিতাবস্থা (মুদো), পুনঃ পুনঃ মূত্র-ত্যাগের ইচ্ছা, মূত্রকৃচ্ছ, শোণিত বিষীকরণ, গনোরিয়ার পূয়ময় পদার্থ রসগ্রন্থিদ্বারা শোষিত হইলে, বক্ষণ-গ্রন্থির প্রদাহ ও তাহা হইতে বাগীর উৎপত্তি ইত্যাদি উপসর্গ সচরাচর দৃষ্ট হয় । এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা বিরল, সচরাচর দৃষ্ট হয় না । মূত্রনালীর ক্ষত ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া উর্দ্ধদিকে গমনপূর্বক বস্তি বা মূত্রাশয়ে ক্ষত উৎপন্ন ও তাহা হইতে অত্যধিক পূয়রক্তাদি স্রাব, মূত্রের অবরোধবশতঃ স্ফোটকের উৎপত্তি ও তাহা বিদীর্ণ হইলে, তাহা হইতে রক্তপূষাদি সংযুক্ত মূত্রস্রাব, পুংজননেঞ্জিয় অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের সহিত অত্যধিক কঠিন ও ধূসর ঞ্জার বক্র হওয়া এবং ঐ অবস্থায় জননেঞ্জিয়ার শিরা ছিন্ন হওয়া প্রভৃতি উপসর্গ বিরল ।

গনোরিয়া বা বিষাক্ত মেহরোগ-চিকিৎসা-বিধি ।

অনেকে কোন প্রকারে গনোরিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় জ্বালা-যন্ত্রণার উপশম হইলেই রোগ আরোগ্য হইয়াছে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, কিন্তু

প্রথমাবস্থায় সূচিকিৎসা না করিলে, কিছুদিন পরে, তুলার আশের ঝায়, হত্যার ঝায় কিম্বা পেঁপের আঠার ঝায় ধাতু নির্গত হইতে থাকে, পরন্তু রোগীর দুর্বলতা, বাত, শিরোরোগ, ধাতুদৌর্বল্য ও শুক্রভারল্য প্রভৃতি কঠিন রোগ দেখা দেয় ।

প্রথম অবস্থা । বিষাক্ত মেহরোগের প্রথম অবস্থায় বিশেষ বিবেচনার সহিত চিকিৎসা করা কর্তব্য । ঐ অবস্থায় কোন উগ্র বা শ্রাববন্ধকারক ঔষধ সহসা প্রয়োগ করা উচিত নহে, করিলে হঠাৎ শ্রাব বন্ধ হইয়া রোগীর রোগযন্ত্রণা দ্বিগুণিত হইতে পারে । মূত্রনালীর মুখ স্ফুট্ স্ফুট্ করা, কণ্ঠয়ন (চুলকাইতে ইচ্ছা), মূত্রনালী হইতে দুধের ঝায় ফোটা ফোটা শুক্র-নিঃসরণ, প্রস্রাবে সামান্য জ্বালা, মূত্রনালীর ওষ্ঠদ্বারের ক্ষীততা ও আরক্তিমভাব এবং মূত্রনালী টিপিলে দুগ্ধবৎ পদার্থ ক্ষরণ, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইবামাত্র মধুকাদিকাথে হরিদ্রাচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সকালে, চন্দনাদিচূর্ণ হরিদ্রার রসসহ মধ্যাহ্নে এবং প্রমেহচিন্তামণি হিমসাগরের পাতার রসসহ বৈকালে সেবন করিতে দিবে । প্রথমাবস্থায় কেবলমাত্র এই নিয়মে চিকিৎসা করিয়া শত শত রোগীকে নিরাময় হইতে দেখা গিয়াছে । উক্ত ঔষধ তিনটি যেমন সহজলভ্য, তেমন অত্যধিক উপকারী । প্রমেহ-চিন্তামণি যেমন পিত্ত-জনিত উপজর্গনাশক, তেমন স্বর্ণলৌহাদি ঘটিত বলিষ্ঠা বিষ নষ্ট এবং শোণিত ও মূত্রাশয় সংশোধন করে, মূত্রের আবিলতা ও পিচ্ছিলতা নষ্ট করে । এই রোগে তুঁতে আশ্চর্য্য ফলপ্রদ, উহা জীবাণুনাশক । গনোরিয়ার যে জীবাণু থাকে, বিজ্ঞান-সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলেও তাহা সহজে উপলব্ধি হয় । কারণ তুঁতে প্রয়োগে গণোকোকাই নামক গনোরিয়ার জীবাণু অতি শীঘ্র বিনষ্ট হয় । পরন্তু প্রথম অবস্থায় উহা প্রয়োগ করিলে ক্ষত হওয়ার সম্ভাবনা বা ক্ষত হইলেও তাহা বর্জিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না । সংবাদ পত্রাদির পাঠকেরা অবশ্যই অবগত আছেন যে, নানাপ্রকার জীবাণু নষ্ট করিতে তুঁতিরার কেমন অদ্ভুত ক্ষমতা । সেই হিসাবে তুঁতেচূর্ণের সংযোগ আমাদের কল্লিত, বলা বাহুল্য পরীক্ষা দ্বারা উহার অদ্ভুত শক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । যাহারা বলেন, গনোরিয়ার ঔষধ আয়ুর্বেদে নাই, তাঁহাদের বাক্য নিতান্তই অসার, প্রলাপমাত্র । পৃথিবীর যাবতীয় ঔষধভাণ্ডারের মধ্যে

কেবলমাত্র আয়ুর্বেদই প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ উৎকৃষ্ট ঔষধরত্নের শ্রেষ্ঠতম ভাণ্ডার, ঔষধবিজ্ঞানে অভিজ্ঞমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। তবে যে সকল রোগ আধুনিক, তাহার লক্ষণদৃষ্টে কোনও কোনও ঔষধের কিঞ্চিৎ সংযোগ বিরোগ করিতে হয় মাত্র। নচেৎ শারীরবিজ্ঞা সম্বন্ধে অভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদির আকৃতি, প্রকৃতি ও ক্রিয়া-বিষয়ে আধুনিক আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের যেরূপ প্রত্যক্ষ বা দার্শনিক জ্ঞানের অভাব, তাহাতে আয়ুর্বেদীয় ঔষধগুলি যতপি হীনগুণ বা অল্পগুণ বিশিষ্ট হইত, তাহা হইলে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার নাম-পর্যন্ত এতদিনে বিলুপ্ত হইত, সন্দেহ নাই। কাহারও কাহারও প্রথম অবস্থায়ই সামান্য জালাযন্ত্রণা ও মূত্রকৃচ্ছ্রতা ঘটিয়া থাকে। এই অবস্থায় ঐ তিন পদ ঔষধ প্রয়োগ করিলেই চলে, তবে রাত্রিতে একমাত্র কুশাবলেহ ত্রিকলার জলসহ প্রয়োগ করিলে আরও উপকার হয়। প্রথমে ও বিবাক্ত মেহরোগে লিঙ্গ-নালের জালাযন্ত্রণা, মূত্রাঘাত ও মূত্রকৃচ্ছ্র, বিনাশের জ্ঞাত তৃণপঞ্চমূল-কাথ মহোপকারী, তবে কুশাবলেহ প্রয়োগ করিলে, উহা প্রয়োগ না করিলেও চলে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থা। দ্বিতীয় অবস্থার সম্যক-প্রকারে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঐ অবস্থায় তাচ্ছিল্য বা অজ্ঞানতাবশতঃ কিম্বা সূচিকিৎসা বা প্রকৃত ঔষধপ্রয়োগের অভাবে অথবা রোগের প্রাবল্যে রোগীর প্রকৃতি-ভেদে বা যথোচিত নিয়ম-পালন ও সুপথ্যের অভাবে রোগের তৃতীয় অবস্থার লক্ষণ প্রকাশিত হয়। তখন অবিলম্বে প্রমেহ-চিন্তামণি, মধুকাদিকাথ, চন্দনাদিচূর্ণ ও কুশাবলেহ প্রয়োগ করা উচিত। দ্বিতীয় অবস্থায় জননেন্দ্রিয়ে কণ্ডুয়ন (চুলকাইতে ইচ্ছা) ও সন্তাপ বোধ, মূত্রনালীর মুখের ক্ষীণতা ও রক্তবর্ণতা, শ্রাব ও প্রশ্রাবকালীন জালাযন্ত্রণা, মূত্রগ্রস্থিতে বেদনা ও ভারবোধ, কোমরে, অণ্ডকোষে ও মূত্রাশয়ে বেদনা, সর্বদা মূত্র-ত্যাগের ইচ্ছাসত্ত্বেও যথোচিত প্রশ্রাব না হওয়া এবং সপুষ্প ধাতু নির্গত হওয়া প্রভৃতি উপসর্গগুলির প্রাবল্য দৃষ্ট হয়, এই সময়ে রোগী প্রায়শঃ স্বীয় অজ্ঞতাবশতঃ অথবা অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোকের পরামর্শ মত অতিরিক্ত শৈত্য-ক্রিয়া করিয়া জ্বর, বজ্রগ্ৰন্থির বেদনা, বাগী ও বাত প্রভৃতি রোগদ্বারা মার্কান্ত হয়। কালের অপ্রতিহত প্রভাব। তাই অনেকস্থলে রোগী

হিতোপদেশ বা সুপারামর্শ গ্রাহ্য করে না, সূচিকিৎসকের উপর নির্ভর করিতে চায় না, যেস্থলে রোগ আরোগ্য হইতে দুই মাসের আবশ্যক, সেস্থলে দুই মাসের কথা না বলিয়া দুই দিনে অ্যারোগ্যের আশ্বাসপ্রদান না করিলে, রোগী ভুট্ট হয় না,—ঐর্ষ্যাচ্যুতি হয়, সূত্রাং প্রায় অধিকাংশস্থলেই রোগী ও চিকিৎসক উভয়েরই বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। চিকিৎসকদিগের পক্ষে ইহাপেক্ষা অত্যধিক দুঃখের কারণ আর কিছুই নাই। যেহেতু অনেক স্থলে ঔষধের ফলাফল উপলব্ধি করারও অবসর পাওয়া যায় না। তৎপূর্বেই রোগী হয়ত অল্প অল্প চিকিৎসকের হস্তগত হইয়া পড়ে। ইহাতে রোগীর পক্ষে যেমন রোগ-আরোগ্যে বিলম্ব ঘটে অথবা কুচিকিৎসায় রোগ বর্ধিত বা কঠিন হইয়া পড়ে, চিকিৎসকের পক্ষেও তেমনি রোগীর অসৎ ব্যবহারের ফলে রোগ-আরোগ্যসম্বন্ধে প্রবল উদ্ভ্রম ও বলতী ইচ্ছার প্রভাব বিনষ্ট হয়। এস্থলে এবিষয়ের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও কোন রোগী এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সতর্ক হইতে পারেন, এইরূপ অভিপ্রায়ে লিপিবদ্ধ হইল, বিশেষতঃ চিকিৎসাকার্যে যাহারা ব্রতী, তাহারা এই প্রবন্ধ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রায় সকল চিকিৎসকই একই প্রকার অবস্থাপন্ন, এইরূপ বিবেচনার ফলে তাহাদের দুঃখের কিঞ্চিৎ প্রতীকার হইতে পারে। অতিরিক্ত শৈত্যক্রিয়াদ্বারা যে যে অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। (শৈত্যক্রিয়া শব্দের বিশদ ব্যাখ্যা তৃতীয়খণ্ডে সিফিলিস্ বা কিরলরোগে দ্রষ্টব্য।) এই অবস্থায় শৈত্যক্রিয়া করিয়া কেহ বিপন্ন না করেন, এইজন্য এত কথা বলিতে হইল। জালাবন্ত্রণায় অস্থির হইয়া শৈত্যক্রিয়া না করিয়া বরং চিন্তামগ্নি, বৃহৎ চিন্তামগ্নি, চিন্তামগ্নি-চতুর্মুখ ও পঞ্চতিস্তম্বত-গুণ্ণলু প্রভৃতি বায়ুপিত্তনাশক স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট ঔষধ সেবন প্রশস্ত। এই অবস্থায় প্রমেহ-চিন্তামগ্নি প্রভৃতি ঔষধে জালাবন্ত্রণার নিবৃত্তি না হইলে, তৎসঙ্গে এক বেলা কুশাবলেহ, ত্রিফলার জল বা কুলথকলায়ের কাষসহ সেবন করিতে দিবে। জালাবন্ত্রণা অত্যধিক এবং পুংজননেন্দ্রিয় ক্ষীণ ও রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইলে, শীতলজলে বা তৃণপঞ্চমূল বা মধুকাদিকাথে পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয় তদ্বারা লিঙ্গনাল আবৃত করিয়া রাখিলে আশু বন্ত্রণার লাঘব হয়। এই অবস্থা তৃণপঞ্চমূলকাথ পান করাইলে উদ্বেগ সিদ্ধ হইতে পারে। জননেন্দ্রিয়ে

আবরক চর্ম্মদ্বারা লিঙ্গ-নাল আচ্ছাদিত হইলে, ঈষদৃষ্ণজলের দ্বারা ঐ আবরক চর্ম্মের নিম্নে পিচ্কারী দিবে, এই প্রকার দিবসে ৩।৪ বার পিচ্কারী দ্বারা ধোত করিলে বেশ উপকার হয়। লিঙ্গ নাল অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের সহিত ধনুুর আয় বক্র হওয়ার আশঙ্কা ঐ সকল ঔষধেই প্রায়শঃ তিরোহিত হয়, কিন্তু তথাপি ঐ রোগ উপস্থিত হইবে, এরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, অবিলম্বে মাষবলাদিতৈলে বা শিরাগত বাতরোগের অপর কোনও একটি তৈলে পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া তদ্বারা লিঙ্গ আবৃত করিয়া রাখিবে। উপরোক্ত ঔষধ প্রয়োগেই মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ, পূষ, রক্ত বা সপুষ ধাতুস্রাব, পুনঃ পুনঃ মূত্র-ত্যাগের ইচ্ছা, ফোটা ফোটা বা সরু ধারায় মূত্র-নির্গমন প্রভৃতি উপসর্গগুলি দূরীভূত হইয়া থাকে। আয়ুর্বেদীয় ঔষধ ডাক্তারী ঔষধ হইতে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। যে কয়েকটি ঔষধ এইরোগে ব্যবস্থা করা গেল, তাহা বহু পরীক্ষিত, স্মৃতরাং দেড় বা দুই মাস সেবন করিলে, গনোরিয়া সমূলে বিনষ্ট হইবে, পুনরাক্রমণের আশঙ্কা আর থাকিবে না।

কোমপ্রদাহ। ইহাতে ক্রমশঃ অণুকোষ ফুলিতে থাকে ও ৪।৫ দিনে স্বাভাবিক আকার অপেক্ষা ৩।৪ গুণ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত এবং রক্তবর্ণ ও বেদনা-বিশিষ্ট হয়। এই অবস্থায় কেহ কেহ অজ্ঞতাবশতঃ পিচ্কারী প্রয়োগ করিয়া থাকেন, এবং তাহা হইতে মুখ্যতঃ দুইটি কুফলের উৎপত্তি হয়। প্রথমতঃ, ঐ অবস্থায় পিচ্কারী প্রয়োগ করিলে, পিচ্কারী-প্রক্ষিপ্ত তরল পদার্থের বেগ-প্রভাবে মূত্রনালীস্থিত জীবাণু দ্রুতগতিতে মূত্রাশয়ে (বস্ত্রদেশে) বিক্ষিপ্ত ও তাহার ফলে সমগ্র ধাতুতে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিষম অনিষ্ট সংঘটন করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ কোষ অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। স্মৃতরাং রোগের দ্বিতীয় বা প্রদাহিক অবস্থায় বিশেষতঃ কোষবৃদ্ধি থাকিলে পিচ্কারী প্রয়োগ কদাপি সঙ্গত নহে, তৃতীয় বা পুরাতন অবস্থায় প্রযোজ্য। পিচ্কারী প্রয়োগের ফলে গণোকোকাই জীবাণু বিনষ্ট ও তজ্জনিত ক্ষত শুষ্ক এবং আলা যন্ত্রণার আশু নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল অবস্থায় মধুকাদিক্রাথ ও চন্দনাদিচূর্ণ সেবন করিতে দিলেই পিচ্কারী প্রয়োগের উদ্দেশ্যসিদ্ধ হয়, তবে কোষবৃদ্ধি না থাকিলে সত্তর আরোগ্যের জন্ত পিচ্কারী প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

যে যে কারণে দ্বিতীয় অবস্থা তৃতীয় অবস্থায় পরিণত হয়, সেই সেই কারণেই তৃতীয় হইতে পুরাতন অবস্থার পরিণতি ঘটয়া থাকে । তৃতীয় অবস্থায় দ্বিতীয় অবস্থার প্রবল প্রকোপ অর্থাৎ জ্বালায়ন্ত্রণা ও অজ্ঞাত উপসর্গ প্রশমিত হয় । এই সময়ে প্রস্রাবকালে সামান্য জ্বালায়ন্ত্রণা অল্পভূত ও হরিদ্রাবর্ণের ধাতু নির্গত হইয়া থাকে । কোন কোনস্থলে ঔষধাদি যথারীতি প্রয়োগের অভাবে, এই অবস্থায়ও অধিক জ্বালায়ন্ত্রণা হইয়া থাকে, সুতরাং পিচ্কারী প্রয়োগদ্বারা আশাতীত ফললাভ করা যায় । এই পিচ্কারীর ঔষধ অতি সাধারণ উপকরণে প্রস্তুত অথচ অসাধারণ ফলপ্রদ, কলিকাতার অনেক আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকেন । যাবৎ ক্ষত বিস্তারিত থাকে বা পুণ্য নির্গত হয়, তাবৎ পিচ্কারী প্রয়োগ করা কর্তব্য, এবং যে পর্য্যন্ত হরিদ্রাবর্ণের ধাতুনির্গমন বন্ধ না হয়, সেই পর্য্যন্ত দ্বিতীয় অবস্থার ঔষধ প্রযোজ্য, তবে প্রয়োজন হইলে ফিরঙ্গ-রোগোক্ত কোনও একটি মশলার জল বা পঞ্চতিক্ত দ্বত গুগ্গুলু সেবন ও সন্ধ্যাে মর্দনার্থ প্রমেহমিহির-তৈল ব্যবস্থা করা যায় ।

গনোরিয়া পুরাতন হইলে, প্রথমতঃ দুগ্ধ বা শ্লেষ্মার গায় শুক্রস্রাব হয়, কিন্তু রোগ অতি পুরাতন হইলে, শুক্রমেহ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় অর্থাৎ সময় সময় মূত্র বা পেপের আঠার গায় শুক্রস্রাব হইয়া থাকে । এই অবস্থায় শুক্রমেহরোগে ব্যবস্থিত নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগ করা যায় । তবে গনোরিয়ার বীজ নষ্ট বা রক্তের দোষ সংশোধনের জন্ত কিস্মা স্বাস্থ্য ও বল-লাভের নিমিত্ত মশলার জল বা পঞ্চতিক্ত দ্বত গুগ্গুলু ব্যবস্থা করা কর্তব্য । এইরূপ ব্যবস্থা করিলে অল্প কোন ঔষধেরই প্রয়োজন হয় না । যাবৎ মেহরোগীর মূত্র আবিলতা ও পিচ্ছিলতা পরিত্যাগ করিয়া নির্মল ও কটুরসভাবাপন্ন না হয়, তাবৎ ঔষধ প্রয়োগ কর্তব্য, কারণ বীজদোষ কিঞ্চিৎমাত্রও অবশিষ্ট থাকিলে, তাহাই শরীরে অবস্থানপূর্বক পরিণামে মধুমেহে পরিণত হইয়া অসাধ্য হইতে পারে, ইহা স্মরণ রাখা উচিত । সিকিলিস ও গনোরিয়ার যে জীবাণু অবস্থিতি করে, তাহার প্রভাবে শুক্রধাতুস্থিত জীবাণু বিনষ্ট বা নিস্তেজ হয়, সুতরাং সেই শুক্রধাতু গর্ভ হয় না বা হইলেও প্রায়শঃ স্রাব হইয়া থাকে ।

গনোরিয়া বা সংক্রামক বিষাক্তমেহরোগে—ঔষধ।

মধুকাদি কাথ। বিষাক্তমেহরোগের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পুরাতন অবস্থায় যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ পান করিতে দিবে। ডাক্তারীমতে গনোরিয়ায় চন্দনের তৈল ব্যবহৃত হয়, মধুকাদি কাথও চন্দন-সংযুক্ত, সুতরাং স্যাণ্ডেল অয়েলের কার্য উহা দ্বারাই সংসাধিত হইতে পারে। যাবৎ জীবাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয় বা মেহরোগীর মূত্র আবিলতা ও পিচ্ছিলতা পরিত্যাগ করিয়া নির্মল ও কটুরসবিশিষ্ট না হয়, তাবৎ প্রয়োগ করা উচিত। সর্বপ্রকার মেহরোগ আরোগ্যের উহাই প্রধান লক্ষণ।

মধুকাদি কাথ। প্রস্তুতবিধি। ১:২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তৃণপঞ্চমূলকাথ। বিষাক্ত মেহরোগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় লিঙ্গনালে অত্যন্ত প্রদাহ এবং রোগীর মূত্রকৃচ্ছ ও মূত্রাঘাতের লক্ষণ উপস্থিত হইলে, এই কাথ সেবন করিতে দিবে। এই কাথ-জলে ঝাকড়া ভিজাইয়া লিঙ্গনাল আর্দ্র করিয়া রাখিলে লিঙ্গনালের দাহ শীঘ্র প্রশমিত হয়। প্রমেহ, অশ্মরী, মূত্রাঘাত ও মূত্রকৃচ্ছরোগে ইহা মহোপকারী।

তৃণপঞ্চমূলকাথ। কৃণমূল, কাশমূল, নলের মূল, উলুখড়মূল ও খাগড়ামূল প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ছাকিয়া পান করিতে দিবে।

প্রমেহ চিন্তামণি। ইহা সর্বপ্রকার মেহরোগে বিশেষতঃ পৈত্তিক মেহরোগের জ্বালা বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রশমিত করিতে অসাধারণ শক্তিশালী। বহুমূত্র, সোমরোগ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাঘাতরোগেও মহোপকারী, পরন্তু বল ও পুষ্টিকারক। বিষাক্ত মেহরোগের যে কোন অবস্থায় যাবতীয় লক্ষণ বিশেষতঃ লিঙ্গ-নালে জ্বালা-বৃদ্ধি ও বস্তি প্রদাহ প্রভৃতি প্রকাশিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অল্পপান—হিমসাগর বা পাথর-কুটির পাতার রস ও মধু, অরতাব থাকিলে আতপ তণ্ডুলের জল বা গুলঞ্চের রস ও মধু।

প্রমেহ চিন্তামণি। রসসিন্দূর, অভ্র, বঙ্গ, স্বর্ণ, লৌহ, মুক্তা, প্রবাল ও স্বর্ণমাক্ষিক ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ; শুভকুমারীর রনে মর্দন ও ছায়ায় শুক করিবে। বটী ২ রতি।

কুশাবলেহ । বিষাক্ত মেহরোগের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পুরাতন যে কোন অবস্থায় মূত্রকৃষ্ণ বা মূত্রাঘাতের লক্ষণ বিশেষতঃ মূত্রত্যাগে জ্বালা-যজ্ঞা, মূত্রের অন্নতা, সন্ধারায়, মূত্রনির্গমন ও মূত্রের আবিলতা প্রভৃতি উপ-সর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে রাত্রে সেবন করিতে দিবে । অমু-পান—ত্রিফলার জল ।

কুশাবলেহ । প্রস্তুতবিধি ২২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগ্‌গুলু । বিষাক্ত মেহরোগের যে কোন অবস্থায় যে কোন লক্ষণ প্রকাশিত হইলে, বিশেষতঃ জ্বালা, যজ্ঞা, রক্তস্রাব, সপুষ বা পুষ্পাধাতুনির্গমন প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে বা মধ্যাহ্নে সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবনে গণোরিয়াধারা শোণিত বিনীকরণের সম্ভাবনা থাকে না ও ক্ষত শুষ্ক হয় । জরভাব সহ্যে সেবন করাইলে, জ্বর বিনষ্ট এবং কোষ্ঠ-কাঠিখ থাকিলে, কোষ্ঠভৃদ্ধি হইয়া থাকে । অমুপান—উষ্ণদুগ্ধ ।

পঞ্চতিক্তঘৃত গুগ্‌গুলু । প্রস্তুতবিধি ১০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

প্রমেহমিহির তৈল । বিষাক্ত মেহরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় বস্তিদেহে (মূত্রাশয়ে) অত্যধিক প্রদাহ উপস্থিত হইলে এবং জরভাব না থাকিলে, মূত্রাশয়ে প্রদাহ নিবারণার্থ রোগীর তলপেটে এবং পুরাতন অবস্থায় সর্বাঙ্গে মালিশের ব্যবস্থা করিবে ।

প্রমেহমিহির তৈল । প্রস্তুতবিধি ২২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

মাষবলাদি তৈল । বিষাক্ত মেহরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় সহসা অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের সহিত লিঙ্গনাল কঠিন ও বক্র হইলে এবং তজ্জন্ম রোগীর যজ্ঞা প্রকাশ পাইলে, এই তৈলে বা অভ্যন্তরায়াম ও বহি-রায়াম অর্থাৎ শিরাগত বাতরোগের যে কোন তৈলে ঝাকড়া ভিজাইয়া তদ্বারা লিঙ্গনাল আবৃত করিয়া রাখিবে । এই অবস্থা অত্যন্ত যজ্ঞাপ্রদ ও মারাত্মক, অর্থাৎ ঐ লক্ষণের আধিক্যে লিঙ্গনালের শিরা ছিন্ন হইয়া বিপদ ঘটবার আশঙ্কা, সুতরাং ঐ লক্ষণ লক্ষিত হইবামাত্র, তৈলসিক্ত ঝাকড়া প্রয়োগ করিবে ।

মাষবলাদি তৈল । প্রস্তুতবিধি ৬২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

উত্তরবস্তি যোগ । বিষাক্ত মেহরোগের তৃতীয় বা পুরাতন অবস্থায় কোষবৃদ্ধি না থাকিলে, এই ঔষধের সহিত তুতিয়াভক্ষ্য মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা লিঙ্গে বস্তি প্রয়োগ করিবে । যে পরিমাণে তুতিয়াভক্ষ্য জলে মিশ্রিত করিলে, জল জীবাৎ সবুজবর্ণ হয়, সেই পরিমাণ মিশ্রিত করিবে । গণোরিয়ার বীজ বিনাশ করিয়া ক্ষত ও তজ্জনিত পুণ্য রক্তাদির আব স্ফঃ প্রশমন করিতে ইহার অসীম ক্ষমতা । বৈদী মিশ্রিত করা সম্ভব নহে । অধিক পুণ্য ও রক্ত-স্রাব থাকিলে এবং কোষবৃদ্ধি না থাকিলে, দ্বিতীয় অবস্থায়ও প্রয়োগ করা যায় ও তৎক্ষণাৎ প্রাণান্তকর যন্ত্রণা প্রশমিত হয় । ঔষধ একরূপভাবে পিচ্কারীতে পূর্ণ করিবে, যেন পিচ্কারীর মধ্যস্থল মোটেই খালি না থাকে, খালি থাকিলে, তন্মধ্যস্থ বায়ু লিঙ্গ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিষম অনিষ্ট সংঘটন করিতে পারে । পিচ্কারী পূর্ণ করিয়া জাণ্ডেল ধরিয়া ঠেলিলে যখন ২৪ ফোটা বহির্গত হইবে, তখন পিচ্কারী প্রয়োগ করিবে ।

উত্তরবস্তিযোগ । প্রস্তুতবিধি ৯২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

চন্দনাদি চূর্ণ । বিষাক্ত মেহরোগে লিঙ্গে অত্যধিক জ্বালা যন্ত্রণা ও ক্ষত থাকিলে এবং তজ্জন্ম মুত্রকুস্কতা ও লিঙ্গহর্ষ প্রভৃতি যে কোন লক্ষণ উপস্থিত হইলে, ইহা প্রয়োগ করা যায় ও আশাস্বরূপ উপকার হয় । বিশেষতঃ জীবাণু নষ্ট করিতে ইহা মধুকাদি কাথের ত্রায় শক্তিশালী । ইহা প্রয়োগ করিলে, আর মধুকাদি কাথ প্রয়োগ না করিলেও চলে ।
অমুপান—ত্রিফলার জল ।

চন্দনাদি চূর্ণ । রক্তচক্ষু, শিমুলফুল, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্রামালতা, মুখা, বেণার মূল, যষ্টিমধু, আমলকী, সোণামুখী, বংশলোচন, বামনহাটী, দেবদারু, হরীতকী ও শোধিত তুতিয়া ভক্ষ্য ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ ভাগ ও সর্বসমনান লৌহ-ভক্ষ্য একত্র করিবে । মাত্রা এক আনা বা দুই আনা ।

সোমরোগ-চিকিৎসা ।

অধিক মৈথুন, শোক, অত্যন্ত পরিশ্রম, আভিচারিকদোষ অথবা বিষপ্রয়োগ, কিম্বা মেহ, বিষাক্তমেহ ও খেতপ্রদর প্রভৃতি কারণে জী ও পুরুষের সর্বশরীরস্থ

জলীয় পদার্থ আলোড়িত ও স্বস্থানচ্যুত হইয়া মূত্রমার্গে উপস্থিত হয় এবং মূত্রমার্গদ্বারা অত্যধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া যায়, ঐ মূত্র পরিষ্কার, নির্মল, শীতল, শুভ্র ও গন্ধবিহীন। মূত্র-নির্গমনকালে কোন প্রকার যন্ত্রণা অনুভূত হয় না, কিন্তু অত্যধিক মূত্র-স্রাবহেতু অত্যন্ত দুর্বলতা, গমনাগমনে অক্ষমতা, মস্তকদৌর্বল্য বা ঘূর্ণন এবং মুখ ও তালুর শুষ্কতা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। সোমশুণ্ডবিশিষ্ট শরীরস্থ জলীয় বাতুর ক্ষয়বশতঃ ইহাকে সোমরোগ কহে। এই রোগের প্রথমাবস্থায় শর্করা নির্গত হয় না, কিন্তু রোগ পুরাতন বা বর্ধিত হইলে, সশর্কর বহুমূত্রে পরিণত হইতে পারে, তখন দেহের ক্লান্ততা, হস্তপদে দাহ, অঙ্গের শিথিলতা, অরুচি, কণ্ঠ ও তালুর শুষ্কতা, দেহের পাতুতা, বিনা-শ্রমে শ্রম বোধ এবং মূত্রে শর্করানির্গমন, মূত্রের পীতাস্তা ও মূত্রে মক্ষিকাদির উপবেশন প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়, কিন্তু ঐ রোগের নিত্যন্ত বর্ধিত বা পুরাতন অবস্থায়ও মধুজাতীয় শর্করা নির্গত হইতে দেখা যায় না।

মূত্রাতীসারের লক্ষণ। সোমরোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, অত্যধিক মূত্র নির্গত হয়, এই অবস্থার নাম মূত্রাতীসার। ইহা বহুমূত্রের চরম অবস্থা।

ডাক্তারী মতে ডায়াবিটিস ইন্সসিপিডাসের নিদান ও লক্ষণ। অধিক মানসিক চিন্তা ও মস্তিষ্কে আঘাত লাগা প্রভৃতি কারণে মূত্রগ্রন্থির অত্যধিক বিকৃতি বশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হয়। ডায়াবিটিস মেলিটােসেও যেমন অভ্যন্ত পিপাসা হয়, এই রোগেও তদ্রূপ অত্যধিক পিপাসা হয়, কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রথমোক্ত রোগে জলপান করিলে, কিঞ্চিৎকাল পিপাসার নিবৃত্তি হয়, আর এই রোগে জলপান করিবার পরই রোগী পিপাসায় অভিভূত হয়, পরন্তু ঐ জল অবিকৃত অবস্থায়ই মূত্রমার্গদ্বারা নিঃসৃত হইয়া যায়। রোগের শেষাবস্থা ব্যতীত কণ্ঠ, তালু ও মুখ-শোথ এবং ক্ষুধামাশ্ব্য, মূর্ছা, প্রলাপ, চর্মের ক্লান্ততা উপস্থিত হয় না। মূত্র-যন্ত্র বৃহদাকার হয়। সশর্কর বহুমূত্র, শর্করাশূণ্ড বহুমূত্রে ও শর্করাশূণ্ড বহুমূত্র সশর্কর বহুমূত্রে পরিণত হইতে দেখা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় যে পরিমাণ মূত্র নির্গত হয়, সোমরোগে বা মূত্রাতীসারে তদপেক্ষা চারিগুণ পর্যন্ত প্রস্রাব হইতে পারে। সশর্কর বহুমূত্রে ২৪ ঘণ্টায় দুই ছটাক (১০ তোলা) হইতে অর্দ্ধ সের পর্যন্ত শর্করা নির্গত হইতে দেখা যায়। গাত্রোত্তাপ সাধারণতঃ ৯৬ হইতে ৯৮.৬ পর্যন্ত।

সোমরোগ-চিকিৎসা-বিধি ।

ইংরাজীতে যাহাকে ডায়াবিটিস্ ইন্সপিডাউস্ কহে, আয়ুর্বেদে তাহাই সোমরোগ নামে অভিহিত ।

সোমরোগ বহুমূত্রেরই নামান্তর । ইহা শর্করা-বিহীন বহুমূত্র । প্রথমাবস্থায় ইহাতে শর্করা লক্ষিত না হইলেও, শেষ অবস্থায় যখন ইহা মূত্রাতীসারে পরিণত হয়, তখন মধুমেহের লক্ষণ প্রকাশ পায় ও পিড়কা উৎপন্ন, প্রবল পিপাসা, মুহুমুহুঃ জলপানের ইচ্ছা ও অত্যধিক বলক্ষয় প্রভৃতি হইয়া থাকে । মেহ-রোগের সহিত ইহার বিভিন্নতা এই ;—মেহরোগে প্রথম হইতেই গুরুক্ষরণ ও নানাবর্ণের মূত্র নির্গত হয়, কিন্তু এই রোগের প্রথম অবস্থায় তাহা হয় না, কেবল শরীরস্থ সোমগুণযুক্ত জলীয়পদার্থ বহুল পরিমাণে নির্গত হয় । সাধারণ কথায় বলিতে গেলে বেশী মূত্র নির্গত হয় বলিয়া, ইহা বহুমূত্র নামে অভিহিত । ঐ মূত্র আবিলতাবিহীন, স্বচ্ছ ও গন্ধরহিত । এই রোগ প্রায়শঃ স্থল্যাকার বা মেদপ্রধান ব্যক্তিদিগেরই উৎপন্ন হইয়া থাকে । অত্যধিক জলীয় পদার্থ নির্গমনহেতু কোষ্ঠকাঠিষ্ঠ ও পিপাসা হওয়া এই রোগের প্রধান লক্ষণ । এই রোগের প্রবল বা শেষ অবস্থা ব্যতীত প্রস্তাবে মক্ষিকার উপবেশন দৃষ্ট হয় না । রোগের প্রথম অবস্থায় যাহাতে ক্রমশঃ মূত্রের পরিমাণের আধিক্য হ্রাস পায়, তদ্রূপ ঔষধ ব্যবস্থা করিবে, হঠাৎ মূত্রবন্ধের ঔষধ বা আকিং প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে । নানাপ্রকার যোগ প্রথমে প্রয়োগ করিবে । কন্দলী-যোগ, ঋজুরোগ, শতমূলী যোগ বা শর্করায়োগ একবেলা এবং তারকেশ্বর বা তালকেশ্বর রস এক বেলা সেবন করিতে দিবে । কোষ্ঠকাঠিষ্ঠ এই রোগের একটি প্রধান উপসর্গ, যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে, তাহার বিহিত করা অত্যাवশ্যক, এই জন্য চন্দ্রপ্রভা-বটিকা বা মেহমূত্রের একবেলা ব্যবস্থা করা উচিত । এই সকল ঔষধেই প্রথম অবস্থায় প্রবল প্রকোপ হ্রাস পায় । অনন্তর রোগ নির্মূল হওয়ার জন্য, সোমনাথরস বা সোমেশ্বররস ব্যবস্থা করিবে । দান্ত পরিষ্কারের জন্য পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগ করিবে । মূত্রাতীসার বা মধুমেহের লক্ষণ ও পিড়কা প্রভৃতি প্রকৌশ পাইলে, হেমনাথরস, বৃহৎসোমনাথরস, বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস, বৃহৎ বলেশ্বর বা বসন্তকুম্ভাকর প্রভৃতি যথোচিত

অল্পপানে সেবনের ব্যবস্থা করিবে । মধুমেহের লক্ষণ উপস্থিত হইলে যেমন ঐ সকল ঔষধ উপকারী, তেমনি কদল্যাদিদ্রুত মহোপকারী, ইহা দ্বারা যেমন মূত্রের পরিমাণ হ্রাস পায়, তেমনি মধুজাতীয় শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া শরীরের বলপুষ্টি বর্দ্ধিত হয় । যেহ বা মধুমেহরোগে এই দ্রুত প্রয়োগে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায় । সোমরোগে আফিং সংযুক্ত ঔষধ মহোপকারী, কিন্তু স্বরণ রাখা উচিত, আফিং প্রয়োগে যেন কোষ্ঠকাঠিন্য উপস্থিত না হয় । কালপূর্ণচন্দ্র রস বা হেমনাথরস আফিং সংযুক্ত । কেহ কেহ এই রোগে আফিং সেবন করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন, কিন্তু আফিং শোষণগুণবিশিষ্ট বলিয়া উহা দ্বারা মূত্রের পরিমাণ সহসা হ্রাস পাইলেও রোগ নির্মূল হয় না, বরং আফিং অভ্যস্ত হইলে, অল্প কোন ঔষধেই ক্রিয়া করে না । সুতরাং আফিং সেবনের পরিবর্তে আফিং সংযুক্ত ঔষধ ব্যবহার প্রশস্ত, মেহরোগোক্ত অন্যান্য ঔষধও বিবেচনাপূর্ব্বক এই রোগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে ।

সোমরোগে বা মূত্রাতীসারে—ঔষধ ।

কদলীযোগ । সোমরোগের লক্ষণ বা শুভ্রবর্ণ ও গন্ধবিহীন মূত্র বহুল পরিমাণে নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রত্যহ সকালে সেবন করিতে দিবে ।

কদলীযোগ । পাকা মর্ন্তমান বা টাপা কলা ১ টা, মধু অর্দ্ধতোলা, ইন্ধুচিনি অর্দ্ধতোলা, আমলকীর রস ১ তোলা ও গব্যদুগ্ধ ১ পোয়া একত্র চটকাইয়া সেবন করিতে দিবে ।

ভূমিকুন্ডাণ্ডযোগ । সোমরোগে বহুলপরিমাণে মূত্র নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

ভূমিকুন্ডাণ্ড যোগ । ভূমিকুন্ডাণ্ড ও শতমূলীর রস প্রত্যেকে ১ তোলা ও পাকা কলা ১ টা একত্র করিয়া এক পোয়া ছকের সহিত চটকাইয়া সেবন করিতে দিবে ।

খর্জুরযোগ । সোমরোগে বা মূত্রাতীসারে অপরিমিত মূত্র নির্গত হইলে, যাবৎ মূত্রের পরিমাণ হ্রাস না হয়, তাবৎ এই যোগ প্রত্যহ প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

খর্জুরযোগ । কচি তাল ও খেজুর গাছের শাখী চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ প্রত্যেকে চারি আনা, ১ পোয়া ছকের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে ।

শর্করাযোগ । সোমরোগে অধিক পরিমাণে মূত্র নির্গত ও জ্বালা-যন্ত্রণা থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে ।

শর্করাযোগ । ইক্ষুচিনি ১০ তোলা, মধু ১০ তোলা, মানকলাই চূর্ণ ১০ আনা, যষ্টিমধু চূর্ণ ১০ আনা ও ভূমিকুখাও চূর্ণ ১০ আনা, একপোয়া ছন্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে ।

তারকেশ্বর রস । সোমরোগে বহুপরিমাণে মূত্র নিঃসরণ ও সেই মূত্রের বর্ণ আবিলতাবিহীন এবং শুভ্র হইলে, পরন্তু রোগীর পিপাসার আধিক্য থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে বৈকালে সেবন করিতে দিবে । অহুপান—যজ্ঞডুমুর চূর্ণ ও মধু ।

তারকেশ্বর রস । রসসিন্দূর, অত্র ও বিশুদ্ধ গন্ধক সমভাগে লইয়া মধুর সহিত একদিন মর্দন পূর্বক বটী প্রস্তুত করিবে । মাত্রা—এক আনা ।

তালকেশ্বর রস । বহুমূত্ররোগে রোগীর মূত্রাধিক্য প্রকাশ পাইলে এবং জ্বালাযন্ত্রণাদি থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রত্যহ বৈকালে সেবন করিতে দিবে । অহুপান—মধু বা যজ্ঞডুমুর চূর্ণ ।

তালকেশ্বর রস । শোধিত হরিতাল, পারদ, গন্ধক, লৌহ, অত্র ও বঙ্গ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মধুরা মর্দন করিয়া বটী করিবে । মাত্রা—এক আনা ।

চন্দ্রপ্রভা-বটিকা । বহুমূত্র রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তারকেশ্বর প্রভৃতি ঔষধে উপকার না হইলে কিম্বা রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধির নিমিত্ত এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । ইহাতে মেহরোগেরও শাস্তি হয় ।

চন্দ্রপ্রভাবটিকা । প্রস্তুতবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

মেহমুদগার । বহুমূত্রের লক্ষণ এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে একবেলা সেবন করিতে দিবে । ইহা প্রমেহ বিনাশক ।

মেহমুদগার । প্রস্তুতবিধি ৪৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

সোমনাথ রস । বহুমূত্র রোগে অত্যধিক মূত্রনির্গমন, পিপাসা ও দুর্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । অহুপান—দুগ্ধ ও মধু ।

সোমনাথ রস । লৌহ ২ তোলা, পারদ, গন্ধক, এলাইচ, তেজপত্র, হরিত্রা, দারুহরিত্রা, জাম্বেরবীচি, বেণারমূল, গোক্ষুর, বিড়ঙ্গ, জীরা, আকুনাডি, আমলকী, দাড়িমেরখোসা, সোহাগার থৈ, রক্ত-চন্দন, গুণ্ণুলু, লোধ, শাল, অর্জুনছাল ও রসাগুন ; প্রত্যেকে এক তোলা । ছাগদুগ্ধে মর্দন । বটিকার মাত্রা ৬ রতি ।

সোমেশ্বর রস । বহুমূত্রে মূত্রের আধিক্য, দুর্বলতা, কোষ্ঠকাঠিণ্ড, পিপাসা ও অঙ্গের শিথিলতা প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহাতে মেহ, মূত্রকৃচ্ছ ও মূত্রাঘাত এবং নানাপ্রকার পিড়কা বিনষ্ট হয় । অমুপান—স্বত ও মধু ।

সোমেশ্বর রস । শাল, অর্জুন, লোধ, কদম্ব, অশুর, রক্তচন্দন, হরিত্রা, দারুহরিত্রা, আমলকী, দাড়িমের খোসা, গোক্ষুর, জাম্বের বীচি, বেণার মূল ও গুণ্ণুলু ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা ও পারদ, গন্ধক, ধনে, মুখা, এলাইচ, তেজপত্র, অন্ন, লৌহ, রসাগুন, আকুনাডি, বিড়ঙ্গ, সোহাগার থৈ ও জীরা ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা । স্বতের সহিত মর্দন । বটিকার মাত্রা ৬ রতি ।

বৃহৎ সোমনাথ রস । সোমরোগের প্রথম অবস্থায় ঐ সকল ঔষধে উপকার না হইলে কিম্বা রোগ সশরীর বহুমূত্রে বা মধুমেহে পরিণত হইলে, রোগীর রোগ-বিনাশ এবং বল ও পুষ্টিবৃদ্ধির জন্ত এই ঔষধ ব্যবস্থা করিবে । অমুপান—যজ্ঞডুমুরচূর্ণ ও মধু ।

বৃহৎ সোমনাথ রস । প্রস্তুতবিধি ৪৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস । সোমরোগে মূত্রের আধিক্য, দুর্বলতা, পিপাসা, কিম্বা সোমরোগ মূত্রাভীসারে বা মধুমেহে পরিণত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে । ঐ সকল অবস্থায় অগ্নিমান্দ্য, তরলদান্ত বা আমসংযুক্ত দান্ত হইলে, এই ঔষধে তাহারও উপকার হইয়া থাকে । ইহা বল ও পুষ্টিকারক । অমুপান—যজ্ঞডুমুরচূর্ণ ও মধু বা পানের রস ও মধু ।

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস । প্রস্তুতবিধি ৩০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বৃহৎ বজ্রেশ্বর রস । সোমরোগে ঘন ঘন বা অধিকপরিমাণে প্রস্রাব হইলে কিম্বা ঐ রোগ মূত্রাভীসারে বা মধুমেহে পরিণত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা মূত্রের পরিমাণ, তৃষ্ণা, বলকর প্রভৃতি

হাস ও শরীরের পুষ্টিসাধন করিতে অসামান্য ফলপ্রসূ। অহুপান—যজ্ঞদুগ্ধ-
চূর্ণ ও মধু বা ঝিলাপোড়ার রস ও মধু।

বৃহৎ বক্তের রস। প্রস্তুতবিধি ২৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বসন্তকুসুমাকর রস। বহুমূত্রের প্রবল আক্রমণ, নানাবিধ মেহ ও
মধুমেহ, শর্করা নির্গমন, তৃষ্ণা, দাহ, তালুশোথ, মুখশোথ, অর, ক্ষয় ও
মূত্রাতীসার প্রভৃতি বিনষ্ট করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করিতে ইহার দ্বারা
শক্তিশালী ঔষধ আয়ুর্কেদে নাই বলিলেই চলে। অহুপান—মধু।

বসন্তকুসুমাকর রস। প্রস্তুতবিধি ২৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কদল্যাদি ঘৃত। সোমরোগে বা ঐ রোগ মূত্রাতীসারে অথবা মধু-
মেহে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা দৃষ্ট হইলে, এই ঘৃত রোগীকে বৈকালে সেবন
করিতে দিবে। অহুপান—গরম দুধ।

কদল্যাদি ঘৃত। ঘৃত ৪ সের। কঙ্কসব্য—রক্তচন্দন, সরলকর্ষ, জটামাংসী, কদলীমূল,
এলাচি, লবঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কয়েদবেল, পদ্মমূল, কেশরমূল, নীলোৎপলমূল,
পানিকলেরমূল, বটছাল, যজ্ঞদুগ্ধ ছাল, অশ্বখছাল, পিয়াল, পাকুড়, বেতস, আম, বড় জাম,
ক্ষুদ্রজাম, তুল, মৌল, গাব, অর্জুন, চোরগজ, কটকী, কদম্ব, পলাশ, বট্টিমূল আমড়া,
কোষাজ, তেজপাতা লোণ, শাবরলোণ, ডেলা ও নন্দীবৃক্ষ; ইহাদের প্রত্যেকের ছাল ২
তোলা। কাথ্যজব্য—কদলীপুষ্ণ ১২৪০ গাড়ে বার সের, কদলীমূলের রস ৬৪ সের, শেষ
১৬ সের। বথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। যাত্রা অর্ধতোলা হইলে ১ তোলা।

সোমরোগে ও মূত্রাতীসারে—আফিংযুক্ত ঔষধ।

হেমনাথ রস। সোমরোগে বা মূত্রাতীসারে অত্যধিক মূত্রনির্গমন
এবং তজ্জন্ত রোগীর তৃষ্ণা, দাহ, বলক্ষয়, মুখশোথ ও তালুশোথ প্রভৃতি উপ-
সর্গ উপস্থিত হইলে, অস্ত্রান্ত ঔষধপ্রয়োগে তাদৃশ উপকার না হইলে, সত্ত্বর
রোগ ও তদুপসর্গ প্রশমনের জন্ত এই ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। ইহা আফিং
মিশ্রিত বলিয়া শীঘ্র প্রস্রাবের পরিমাণ হ্রাস করে, কিন্তু এই ঔষধে কোষ্ঠ-
কাঠিগ উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা, তজ্জন্ত আবশ্যক হইলে বিরেচক ঔষধের
ব্যবস্থা করা উচিত। অহুপান—যজ্ঞদুগ্ধচূর্ণ ও মধু।

হেমনাথ রস। প্রস্তুতবিধি ২৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কালপূর্ণচন্দ্র রস । সোমরোগে বা মূত্ৰাভীসারে অস্ত্রান্ত ঔষধ প্রয়োগে তাদৃশ উপকার না হইলে কিম্বা অত্যধিক প্রস্রাবহেতু রোগীর দুর্বল, ক্লশ ও গমনাগমনে অক্ষম হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা দ্বারা শীঘ্র প্রস্রাবের পরিমাণ হ্রাস ও উপসর্গ সকল প্রশমিত হয় । ইহা দ্বারা তাদৃশ উপকার না হইলে, হেমনাথ রস প্রয়োগ করিবে । স্বর্গীয় গন্ধা-প্রসাদ এই যোগ প্রায়শঃ ব্যবস্থা করিতেন । ইহাতে দান্ত বদ্ধ হইবার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, অল্প বেলা চন্দ্রপ্রভাবটিকা বা অল্প বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্তব্য । অতুপান—যজ্ঞডুমুরচূর্ণ ও মধু ।

কালপূর্ণচন্দ্ররস । প্রস্তুতবিধি ১২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

সোমরোগের প্রথম অবস্থায় দুর্বলতা, গমনাগমনে অক্ষমতা, মস্তকের শিথিলতা, মুখশোষ, তালুশোষ ও পিপাসা প্রভৃতি এবং বহুমূত্র রোগ প্রবৃদ্ধ বা পুরাতন হইলে, ক্লশতা, ঘর্ম্ম, কাস, অরুচি, পিড়কা, কঠ, ওষ্ঠ, মুখ ও তালুশোষ, অত্যধিক তৃষ্ণা ও বলক্ষয় এবং মধুমেহের উপসর্গ প্রকাশ পায়, ঐ অবস্থায় মেঘরোগের উপসর্গের স্থায়, ঐ সকল উপসর্গের চিকিৎসা করিবে । অনাবশ্যকবোধে এস্থলে পৃথক উপসর্গ-চিকিৎসা লিখিত হইল না । সোম-রোগের প্রবৃদ্ধ অবস্থার নাম মূত্ৰাভীসার, সূত্রাং চিকিৎসার বিভিন্নতা নাই ।

সোমরোগে—পথ্যাপথ্য ।

বহুমূত্র রোগে মধ্যাহ্নে কুই, মাগুর, খলিশা, শিঙ্গী বা কই মাছের ঝোল, মুখ, ছোলা, মশর, অড়হর বা কুলখ কলায়ের দাইল, পটোল, ডুমুর, কাচ-কলা, মোচা, কষায় রসবিশিষ্ট বা তিজুরসমৃদ্ধ দ্রব্যের তরকারী ও পুরাতন শালিতগুলের অন্ন পথ্য দিবে । রাত্রিতে সহ মত কুটী বা লুচি, মাংসের ঝোল বা উক্ত তরকারীর ব্যঞ্জন কিম্বা ডাইল পথ্য দিবে । রোগ অতিশয় প্রবল হইলে, অন্নপথ্য বন্ধ করিয়া দুই বেলা কুটী বা লুচি পথ্য দিবে । মাংসের ঘুষ বা লুচি পথ্য দিলে মূত্র ও শর্করার পরিমাণ অতি শীঘ্র কমিয়া যায় । মৎস্য এ রোগে অপথ্য নহে, তবে নিতান্ত আবশ্যক হইলে, উক্ত মৎস্যের ঝোল অন্ন দিবে । মৎস্য সাধারণতঃ গ্লেয়া ও পিত্তবর্দ্ধক, সূত্রাং মৎস্য ভোজনে মূত্রের পরিমাণ ও পিপাসা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । কিন্তু রোহিত ও মাগুরমাছ

শ্লেষ্মা ও পিত্তবর্দ্ধক নহে । শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য মাত্রই মূত্রবর্দ্ধক এবং পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্যমাত্রই তৃষ্ণাবর্দ্ধক, স্মৃতরাং এতদ্ব্যয় গুণবিশিষ্ট দ্রব্যমাত্রই এই রোগে কুপথ্য । পিপাসা বা দাহশাস্তির নিমিত্ত কমলালেবু, আনারস, আঙ্গুর, কিসমিস, ডালিম ও বেদানা প্রভৃতি সুপক ফল অল্প ব্যবস্থা করা যায় । অত্যন্ত অম্লরসবিশিষ্ট দ্রব্য রোগীর মুখপ্রিয় হইলেও তাহা ব্যবস্থা করিবে না, কারণ অম্লরস পিত্ত-বর্দ্ধক, স্মৃতরাং পিপাসা বৃদ্ধি পায়, আবার মধুর রসবিশিষ্ট দ্রব্য অত্যন্ত শ্লেষ্মবর্দ্ধক বলিয়া, তদ্বারা মূত্রের ও শর্করার পরিমাণও বৃদ্ধি পায় ; তবে যে আয়ুর্ষেদীয় চিকিৎসকেরা মধু ও কলা পথ্য ব্যবস্থা করেন, তাহার অন্য কারণ আছে ; মধু মিষ্টদ্রব্য হইলেও ককবর্দ্ধক নহে, বিশেষতঃ পুরাতন হইলে, পিত্তবৃদ্ধি বা তজ্জন্ম দাহ বা তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায় না । মধুমেহে মধুজাতীয় শর্করা অনবরত বহির্গত হইতে থাকিলে, তজ্জন্ম শরীর ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, স্মৃতরাং মধুদ্বারা সেই ক্ষয়িত মধুজাতীয় শর্করার অভাব পূরণ হয় এবং তৃষ্ণা ও দাহ প্রশমিত হইতে পারে । আর পাকাকলা মধুররস বলিয়া অল্প শ্লেষ্মবর্দ্ধক হইলেও, উহা অত্যন্ত পিপাসা-নাশক, বিশেষতঃ মর্তমান ও টাপাকলা সর্বা পেক্ষা নিদোষ ও সমধিক গুণবিশিষ্ট । বলমূত্র বা মধুমেহ রোগে পাকাকলা ও মধুপথ্য দিয়া সর্বত্র সুফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । দুই মাখনতোলা হইলেই ভাল হয় । তরকারী রসপক ব্যবস্থা করিবে । মেহ, মধুমেহ, সোম-রোগ বা মূত্রাত্মিনারে একই প্রকার পথ্য ব্যবস্থা করা যায় । এ রোগে কি কি অপথ্য, তাহা মেহ রোগে দ্রষ্টব্য ।

মূত্রকৃচ্ছরোগ-চিকিৎসা

বাতিক মূত্রকৃচ্ছর লক্ষণ । বাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে কুচক্ষী, বস্তি ও লিঙ্গনাশে অত্যন্ত বেদনা হয় ও বার বার অল্প অল্প করিয়া প্রস্রাব নির্গত হইয়া থাকে ।

পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছর লক্ষণ । পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রে দাহ ও বেদনার সহিত পীতবর্ণ বা রক্তবর্ণ মূত্র অতি কষ্টে নির্গত হইয়া থাকে ।

শ্লেষ্মিক মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ । শ্লেষ্মিক মূত্রকৃচ্ছ্রে বস্তি ও শিশ্ন গুরু ও শোথযুক্ত হয় এবং পিচ্ছিল মূত্র নির্গত হইয়া থাকে ।

সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ । সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পায় । এই রোগ অতিশয় কষ্টসাধ্য ।

শল্যজ মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ । মূত্রবাহি স্রোত কণ্টকাদি দ্বারা ক্ষত বা আহত হইলে, অতিশয় কঠিন মূত্রচ্ছ্ররোগ উৎপন্ন হয় । ইহাকে শল্যজ মূত্রকৃচ্ছ্র কহে । ইহার লক্ষণ বাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রের ত্রায় ।

পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ । মলের বেগধারণ করিলে, বায়ু কুপিত হইয়া মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ উৎপাদন করে । ইহাতে উদরাগ্নান, বাতজনিত বেদনা ও মূত্ররোধ হইয়া থাকে ।

শুক্রজ মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ । দোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফদ্বারা দূষিত শুক্র মূত্রপথে ধাবিত হইলে, রোগী বস্তি ও শিশ্নের বেদনায় অভিভূত হইয়া কষ্টের সহিত শুক্রমিশ্রিত মূত্র ত্যাগ করে, এই রোগ শুক্রজ মূত্রকৃচ্ছ্র নামে অভিহিত ।

অশ্মরীজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ । অগ্রে অশ্মরী (পাথরী) রোগ উৎপন্ন হইয়া, পশ্চাৎ তাহা হইতে যে মূত্রকৃচ্ছ্র (মূত্ররোধ) উপস্থিত হয়, তাহাকে অশ্মরীজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র কহে ।

সুশ্রুতে শর্করাজনিত আর এক প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং মূত্রকৃচ্ছ্র সর্বসমেত নয় প্রকার ; কিন্তু অশ্মরী ও শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রের কারণ ও লক্ষণ প্রায় একই, উভয় রোগেই মূত্রনালী অবরুদ্ধ হইয়া মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মে, এই জন্য মূত্রকৃচ্ছ্র প্রকৃত পক্ষে নয় প্রকার না বলিয়া আট প্রকার বলাই সম্ভব ।

অশ্মরী ও শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রের প্রভেদ । অশ্মরী যখন পিত্ত-দ্বারা শক, বায়ুদ্বারা শোষিত (শুষ্ক) ও শ্লেষ্মার সংস্রববিহীন হইয়া চিনির ত্রায় আকারে মূত্রনালী হইতে নির্গত হয়, তখন উহাকে শর্করা কহে । অশ্মরী ও শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে প্রস্রাব কালে রোগীর দুঃসহ যন্ত্রণা হয় ।

অশ্মরীজনিত মূত্রকৃচ্ছ উপদ্রব । এই রোগে হৃদয় ও কৃন্দিশে বেদনা, কম্প, অগ্নিমান্দ্য, মুর্ছা এবং প্রস্রাবকালে রোগীর দৃঃসহ যন্ত্রণা হইয়া থাকে । মূত্রের সহিত শর্করা নির্গত হইলে, মূত্রপথ পরিষ্কার হয় বলিয়া রোগী প্রস্রাবান্তে কিছুকাল সস্থ থাকে, কিন্তু আবার যেমন শর্করা মূত্রমার্গ রোধ করে, তেমনি রোগী অসহ যন্ত্রণায় অভিভূত হয়, পরন্তু মূত্র সহজে নির্গত হয় না । অশ্মরী ও শর্করার বিস্তৃত লক্ষণ অশ্মরী রোগে দ্রষ্টব্য । অশ্মরী ও শর্করাজনিত উপদ্রবের লক্ষণেরও কোন পার্থক্য নাই, উভে লক্ষণ ও উপদ্রব একই প্রকার ।

মূত্রকৃচ্ছ-চিকিৎসা-বিধি ।

নানাকারণে বস্তিগত বায়ু প্রকুপিত হইলে, মূত্রকৃচ্ছ ও মূত্রাঘাত রোগ উৎপন্ন হয় । অত্যন্ত পরিশ্রম, ভীক্ষবীৰ্য্য ঔষধ ও রুক্ষদ্রব্য সেবন, অতিশয় মৈথুন, অধিক মত্তপান, হস্তী বা ঘোটকাদি যানে দ্রুতবেগে গমন, জলপ্লাবিত দেশজাত প্রাণীর মাংস ভক্ষণ, উপযু্যপরি ভোজন এবং অজীর্ণ প্রভৃতি কারণে বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রত্যেকে স্বতন্ত্ররূপে বা দোষত্রয় এককালীন প্রকুপিত হইয়া মূত্রকৃচ্ছ এবং মূত্রের বেগধারণাদি কারণে বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া মূত্রাঘাত রোগ উৎপাদন করে । মূত্রকৃচ্ছ আট প্রকার ও মূত্রাঘাত ত্রয়োদশ প্রকার । মূত্রকৃচ্ছ ও মূত্রাঘাত উভয়রোগেই সাধারণতঃ দোষত্রয় প্রকুপিত হয়, সন্দেহ নাই । তথাপি উভয় রোগেই বায়ুর প্রবলতা থাকে এবং প্রধানতঃ বস্তিগত বায়ুই প্রকুপিত হয় ; পরন্তু বস্তিগত বায়ু-নাশক ঔষধ প্রয়োগেই উভয়রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে । মূত্রকৃচ্ছ ও মূত্রাঘাত এই উভয়রোগের পার্থক্য এই যে, মূত্রকৃচ্ছরোগে অত্যধিক যন্ত্রণার সহিত অল্পে অল্পে মূত্র নির্গত হয়, কিন্তু বিবদ্ধতা কম এবং মূত্রাঘাতরোগে মূত্রনিঃসরণ কালে যন্ত্রণা কম, কিন্তু বিবদ্ধতা অধিক । উভয়রোগের লক্ষণের মধ্যে এই সামান্য পার্থক্য থাকিলেও চিকিৎসা-বিষয়ে কোনরূপ পার্থক্য নাই । মূত্রকৃচ্ছের ঔষধ প্রয়োগে মূত্রাঘাত ও মূত্রাঘাতের ঔষধ প্রয়োগে মূত্রকৃচ্ছ আরোগ্য হইয়া থাকে ।

মূত্রকৃচ্ছ আট প্রকার,—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সামিপিত্তিক, শল্যজ,

পুরীষজ, শুক্রজ ও অশ্মরীজনিত । তন্মধ্যে বাতাদি ত্রিবিধ ও সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্র যে যে কারণে জন্মে, শল্যজ, পুরীষজ, শুক্রজ ও অশ্মরীজ, এই চতুর্বিধ মূত্রকৃচ্ছ্রের কারণ, তাহা হইতে পৃথক্ বা স্বতন্ত্র । শল্যজ মূত্রকৃচ্ছ্র কণ্টকাদি দ্বারা মূত্ররন্ধ্র ক্ষত বা আহত হইলে, উৎপন্ন হয় । ইহার লক্ষণ ও চিকিৎসা বাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রের জ্ঞায় । মলের বেগ ধারণ করিলে, বায়ু প্রকুপিত হইয়া পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মায় । এই রোগে রোগীর উদরাগ্ধান, বাতজন্ম-বেদনা ও মল মূত্র রোধ হইয়া থাকে । পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্র প্রথমতঃ পকাশয়-গত বায়ু প্রকুপিত হয়, অনন্তর পকাশয়গত বায়ুর প্রকোপ বশতঃ বস্তিগত বায়ু প্রকুপিত হইয়া থাকে । শুক্রজ মূত্রকৃচ্ছ্র শুক্রজ বাতরোগ মধ্যে গণ্য, কারণ বায়ু শুক্রকে আশয় করিয়া এই রোগ উৎপাদন করে । এই প্রকার উদাবর্তরোগের সহিত মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতের লক্ষণের সাদৃশ্য আছে । বায়ুরোধজনিত উদাবর্তের সহিত বাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রের, মলরোধজনিত উদাবর্তের সহিত পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রের, মূত্ররোধজনিত উদাবর্তের সহিত বাত-বস্তি নামক মূত্রাঘাতের এবং শুক্ররোধজনিত উদাবর্তের সহিত শুক্রজ মূত্র-কৃচ্ছ্রের লক্ষণের সাদৃশ্য আছে । প্রকৃতপক্ষে উদাবর্ত ও আনাহ রোগের জ্ঞায় মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত রোগও বায়ুবিকার ব্যতীত আর কিছুই নহে । পরন্তু পকাশয় ও বস্তিগত বাতরোগের চিকিৎসা ও ঔষধ দ্বারা যেমন উদাবর্ত ও আনাহ রোগের উপকার হয়, তেমনি ঐসকল ঔষধ প্রয়োগে মূত্রকৃচ্ছ্র এবং মূত্রাঘাতেরও উপকার হয় । এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে উদাবর্ত, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত এই সকল রোগ যদি বায়ুবিকারই হয়, তবে উহাদিগকে বাতব্যাধির অঙ্গভুক্ত না করিয়া পৃথক্ অধিকারভুক্ত করা হইল কেন ? তদুত্তরে বক্তব্য এই—উহারা বায়ুবিকার হইলেও, দোষ, দূষ্য ও আশয়ভেদে বিশিষ্টরূপে চিকিৎসার জ্ঞাত উহাদিগকে স্বতন্ত্র অধিকার-ভুক্ত করা হইয়াছে । বধন এই সকল রোগের প্রকোপ বর্দ্ধিত হয়, তখন বাতরোগের ঔষধ ব্যতীত অজ্ঞাত ঔষধও প্রয়োগ করিতে হয় । আবার অশ্মরী বা শর্করা হইতে যে মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মে, তাহা বায়ুবিকার হইলেও নূতন অবস্থায়ই ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য হয়, পুরাতন হইলে অস্ত্র-চিকিৎসার প্রয়োজন হইয়া থাকে ।

কেহ কেহ অশ্মরী ও শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছকে পৃথক নামে অভিহিত করিয়া নয়প্রকার মূত্রকৃচ্ছের সংখ্যা নির্দেশ করেন ; কিন্তু তাহা না করিলেও ক্ষতি নাই, কারণ শর্করা, অশ্মরী রোগেরই প্রকার ভেদমাত্র, পরস্তু উভয়েরই উৎপত্তির কারণ ও লক্ষণ প্রায় একই, সামান্য প্রভেদমাত্র । অশ্মরী যখন পিত্তদ্বারা পক, বায়ুদ্বারা শুষ্ক ও শ্লেষ্মার সংশ্লেষ বিহীন হইয়া চিনির আয় ধণ্ডীকৃত হয়, তখন উহাকে শর্করা এবং বায়ুকার আয় হইলে, তাহাকে সিকতা বলা যায়, সুতরাং অশ্মরী হইতেই শর্করা ও সিকতার উৎপত্তি হইয়া থাকে । পরস্তু শর্করা ও সিকতার চিকিৎসাও একই প্রকার, শর্করাও যে ঔষধে আরোগ্য হয়, সিকতাও সেই ঔষধেই আরোগ্য হইয়া থাকে ।

বাতিক মূত্রকৃচ্ছ বায়ুনাশক মধ্যমনারায়ণ তৈল, বিষ্ণুতৈল বা মধ্যম-বিষ্ণুতৈল প্রভৃতি অথবা উশীরাণ্ড তৈল রোগীর সর্কাসে বিশেষতঃ উদরে মর্দনের এবং গোক্ষুরাণ্ড ঘৃত, বরুণাণ্ড ঘৃত কিম্বা বাতনাশক বৃহৎ ছাগলাণ্ড ঘৃত পানের ব্যবস্থা করিবে । তৎসঙ্গে বায়ুনাশক তৈলদ্বারা মলদ্বারে পিচ্কারী উদরে গরম জলের সেক ও নানাপ্রকার প্রলেপ প্রয়োগ করিবে । পুনঃপুনঃ বৃহৎ বন্ধ হইলে, জননেন্দ্রিয়ে পিচ্কারী প্রয়োগ করিবে ও হৃৎসহ বলাগুচূর্ণ বা পথ্যাদিচূর্ণ সেবন করিতে দিবে । রোগীর একবারে মূত্র বন্ধ হইলে, বৎসর চূর্ণ (সোঁরা) ২ রতি মাত্রায় লইয়া কিঞ্চিৎ ইক্ষুচিনির সহিত সেবন করিতে দিবে এবং শশার বীজ, কুমড়ার বীজ, কাঁকড়বীজ অথবা গোক্ষুর ও কাঁকড়বীজ কিম্বা আমলকী পেষণ করিয়া উদরে মূত্রাশয়ের উপরে প্রলাপ দিবে । বিম্বিকাণ্ড প্রলেপ বা বটপত্রী প্রলেপ দিলেও অনেকস্থলে বিশেষ উপকার হয় । প্রথমতঃ উদরে তৈল মর্দন, উষ্ণ জলের সেক, নানাপ্রকার প্রলেপ প্রয়োগ করা কর্তব্য ; অনন্তর তাহাতে রোগের প্রতীকার না হইলে, পিচ্কারী দিবে । বায়ুনাশক ঐসকল তৈলের অভাবে তিলতৈলও ব্যবস্থা করা যায় । অমৃতাদিক্রাণ্ড একবেলা ও চিস্তামণি বা চতুর্ধুধ অল্পবেলা আতপ চাউলের জল বা ত্রিফলার জলসহ ব্যবস্থা করিবে ।

পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ পিত্তনাশক প্রমেহমিহির বা উশীরাণ্ড তৈল সর্কাসে ও উদরে মর্দন, বাতিক মূত্রকৃচ্ছোক্ত নানাবিধ প্রলেপ প্রয়োগ, স্নান ও ষোল প্রভৃতি শীতল দ্রব্য পানের ব্যবস্থা করিবে । তৎসঙ্গে তৃণপঞ্চমূল কাথ

(৯৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) ও চিন্তামণি, চতুর্শ্লুখ বা প্রমোহ চিন্তামণি (৯৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) ব্যবস্থা করিবে ।

শৈথিল্য মূত্রকৃচ্ছ্রে বাতিক ও পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রের ত্রায় শৈত্যক্রিয়া বা তৈলাদি মর্দনের ব্যবস্থা করা কৰ্ত্তব্য নহে, তবে বাতিক ও পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রোক্ত প্রলেপের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । অধিক শৈত্যক্রিয়া দ্বারা রোগীর জ্বর হইবার সম্ভাবনা, জ্বর হইলে, রোগ অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়ে, সুতরাং এই অবস্থায় উদরে ঐসকল প্রলেপ, উষ্ণ গোমূত্র বোতলে পূর্ণ করিয়া শুদ্ধাঙ্গ সেক, ২ রতি এলাচিচূর্ণ গোমূত্র বা কদলীমূলের রস সহ অথবা ২ রতি প্রবালচূর্ণ, আতপ চাউলের জলসহ ও গোস্কুরাদি কাথ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে । ইহাতে চিন্তামণি বা চতুর্শ্লুখ ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু একটু সতর্কতার সহিত প্রয়োগ করা উচিত এবং ক্রমান্বয়ে বেশীদিন প্রয়োগ করা কৰ্ত্তব্য নহে, কারণ শৈত্যগুণবশতঃ উদরে ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর হইতে পারে । যে পর্য্যন্ত রোগের প্রবল আক্রমণ রহিত না হয়, তাবৎ প্রয়োগ করা যাইতে পারে ।

সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে যে দোষের প্রবলতা দৃষ্ট হইবে, সেই দোষনাশক চিকিৎসা করিবে । সাধারণতঃ বাতিক, পৈত্তিক ও শৈথিল্য রোগোক্ত তৈলাদি সর্কাসে বা উদরে মর্দন, সেক প্রদান, নানাপ্রকার প্রলেপ প্রয়োগ করা যায় । চিন্তামণি বা চতুর্শ্লুখ ও বৃহত্যাদিকাথ প্রভৃতি এই রোগে অতি উপকারী ।

শল্যজ মূত্রকৃচ্ছ্রে সর্কাসে শল্য বাহির করিবে, পশ্চাৎ বাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রোক্ত তৈল সর্কাসে ও উদরে মর্দন, বস্তিপ্রয়োগ, উদরে গরমজলের সেক ও নানাপ্রকার প্রলেপ প্রয়োগ করিবে । মূত্রের সহিত রক্ত নির্গত হইলে তৃণ পঞ্চমূলকাথ বা তৃণপঞ্চমূলকীর ব্যবস্থা করিবে ।

পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে পকাশয়গত বায়ু প্রথমতঃ প্রকুপিত হয়, তদনন্তর বস্তিকে আশ্রয় করিয়া মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মায়, সুতরাং এই রোগে পকাশয়গত বাতের চিকিৎসা করিবে । এই রোগে উদরাঙ্গান, উদরে শুড়্ শুড়্ শব্দ, বেদনা, বায়ুর শুক্লতা, অত্যধিক বস্ত্রণার সহিত অল্প অল্প মূত্র নিঃসরণ ও মলমূত্রের ক্লবতা প্রভৃতি প্রকাশ পায় । মূত্ররোধ হইলে, ত্রিষিকাদ্য প্রলেপ বা ঝটপত্রী প্রলেপ, চিন্তামণি, চতুর্শ্লুখরস বা যোগেন্দ্ররস, মলরোধ হইলে, নারাচচূর্ণ, হিঙ্গাশু-

বর্তি বা ফলবর্তি প্রয়োগ করু উচিত, ইহাতে আশ্রানও নিরুজ্জি হয়, কিম্বা বায়ুনাশক তৈল অথবা তারপিন তৈল উদরে মালিস করিয়া উষ্ণজলের সেক, যাবৎ আশ্রান হ্রাস ও দান্ত না হয়, তাবৎ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা যায়। এই অবস্থায় গোক্ষুরের কাথে যবক্ষারচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে কিম্বা হিঙ্গুচূর্ণ প্রয়োগেও ফললাভ হয়। সাধারণতঃ জলবায়ুর দোষ, কৃষ্ণ বা তীক্ষ্ণ দ্রব্যাদি ভোজন এই রোগের কারণ, অতএব যাহাতে কারণ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ চিকিৎসা ও পথ্যাদি ব্যবস্থা করিবে। এই সকল ক্রিয়াদ্বারা যদি আশ্রান হ্রাস না পায় অথবা মলমূত্র নির্গত না হয়, তবে বাতব্যাধি-রোগোক্ত বারিস্বেদ, নিরুহ বস্তি ও অমুবাসন বস্তি প্রয়োগ করিবে।

শুক্ল মূত্রকৃচ্ছ্রে প্রমেহমিহির তৈল বা উশীরাদ্য তৈল সর্বদা ও উদরে মর্দন করিতে দিবে এবং প্রমেহ চিস্তামণি, চিস্তামণি বা চতুঃস্থরস সেবন করিতে দিবে ও রুহং ছাগলাদি দ্বত প্রভৃতি শুক্রবর্দ্ধক ঔষধ সেবন করাইবে। মধুর সহিত শিলাজতু লেহন করিলে অসীম উপকার হয়। রোগী শিশ্ন ও বস্তিবেদনায় অস্থির হইলে, ঐ সকল তৈল উদরে মর্দন ও বলাদ্যচূর্ণ বা পথ্যাদি চূর্ণ দুগ্ধ সহ ব্যবস্থা করিবে। জ্বর সত্ত্বে দ্বত প্রয়োগ নিষেধ।

অশ্মরী ও শর্করা জনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে বায়ুনাশক তৈল উদরে মর্দন, উষ্ণজলের সেক প্রদান ও চিস্তামণি, চতুঃস্থর বা প্রমেহ চিস্তামণি এবং পাষাণভেদাঙ্ক-কাথ প্রয়োগ করিবে কিম্বা তৃণপঞ্চমূল ক্ষীর (২৭৭ পৃষ্ঠোক্ত) বা তৃণপঞ্চমূল-কাথ ও কুশাবলেহ সেবন করাইবে। এই কাথ ও অবলেহ প্রয়োগ করিয়া শর্করা ও অশ্মরী (পাথরী) নির্গত হইতে দেখা গিয়াছে। অশ্মরী ও শর্করা-জনিত মূত্রকৃচ্ছ্রের চিকিৎসা বক্ষ্যমাণ অশ্মরী চিকিৎসায় দ্রষ্টব্য।

মূত্রকৃচ্ছ্রে যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করা গেল, তদ্বারাই রোগের প্রতীকার হয়, কিন্তু এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ আছে, তাহা আটপ্রকার মূত্রকৃচ্ছরোগের যে কোন অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। ধাত্রীকাথ, রুহং ধাত্রীকাথ, তারকেশ্বর রস, বরুণাদ্য লৌহ ও ত্রিকটকাদ্য দ্বত যে কোন অবস্থায় নির্দিষ্টারে প্রয়োগ করা যায়। তারকেশ্বর, বরুণাদ্য লৌহ, ত্রিকটকাদ্য দ্বত ; এই সকল ঔষধ প্রয়োগে-রোগ সমূলে আরোগ্য হয়, পুনরাক্রণের আশঙ্কা থাকে না।

মূত্রকৃচ্ছ্র—ঔষধ †

অমৃতাদি কাথ । বাতিক ও শল্যজ মূত্রকৃচ্ছ্রে কূচকী, মূত্রাশয় ও লিঙ্গে তীব্র বেদনা এবং পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প মূত্র নির্গত হইলে, রোগীকে এই কাথ সেবন করিতে দিবে ।

অমৃতাদি কাথ । গুলক, তুঁঠ, আমলকী, অথগন্ধা ও গোক্ষুর ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

তৃণপঞ্চমূল ক্ষীর । পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রে লিঙ্গে ও বস্তিদেশে বেদনা ও দাহ থাকিলে, অথবা দাহ ও বেদনার সহিত পীতবর্ণ, রক্তবর্ণ কিম্বা রক্ত-মিশ্রিত মূত্র নির্গত হইলে বা শল্যজ মূত্রকৃচ্ছ্রে আঘাতাদি বশতঃ মূত্রসহ রক্ত নিঃসৃত হইলে, রোগীকে এই কাথ সেবন করিতে দিবে ।

তৃণপঞ্চমূলক্ষীর । প্রস্তুতবিধি ২৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

গোক্ষুরাদি কাথ । শ্লেষ্মিক মূত্রকৃচ্ছ্রে মূত্রাশয়ে ও লিঙ্গে ভার বোধ, শোথ এবং পিচ্ছিল মূত্র অল্প অল্প নির্গত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে ।

গোক্ষুরাদি কাথ । গোক্ষুর ও তুঁঠ প্রত্যেকে ১ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

বৃহত্যাди কাথ । সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

বৃহত্যাদি কাথ । বৃহতী, কণ্টকারী, আকনাদি, ষষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

পাষাণভেদাদ্য কাথ । অশ্মরী ও শর্করা জনিত মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

পাষাণভেদাদ্য কাথ । পাথরকুচি, হরীতকী, ছুরালভা, কুশ, কাশ, সোন্দালশাণ্ড ও গোক্ষুর ; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

ধাত্রীকাথ । বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক, অভিঘাতজ, শুক্রজ এবং অশ্মরীজ বা শর্করা জনিত মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

ধাত্রীকাথ । আমলকী, কিসুম্বিস, ভূমিকুখাণ্ড ও বটমধু, প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

বৃহৎ ধাত্রীকাথ । বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক প্রভৃতি আট প্রকার মূত্রকৃচ্ছরের যে কোন প্রকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ সেবন করিতে দিবে ।

বৃহৎ ধাত্রীকাথ । আমলকী, কিসুম্বিস, বটমধু, ভূমিকুখাণ্ড, গোকুর, কুশম্বুল, কৃষ্ণ ইক্ষু-মূল ও হরীতকী ; ইহারা সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

বিশ্বিকাদ্য প্রলেপ । পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ উদরাগ্নান এবং মূত্ররোধ বা পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে মূত্র নির্গত হইলে, এই প্রলেপ মূত্রাশয়ের উপরে লাগাইবে । অন্ত্যন্ত মূত্রকৃচ্ছ্রেও মূত্রাশয়ের দোষ-শোধন ও মূত্র সঞ্জননার্থ ইহা প্রয়োগ করা যায় ।

বিশ্বিকাদ্য প্রলেপ । প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বটপত্রী প্রলেপ । পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ রোগীর উদরাগ্নান ও মূত্ররোধ বা পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প মূত্র নির্গত হইলে, এই প্রলেপ রোগীর বস্তুর উপরে লাগাইবে । অন্ত্যন্ত মূত্রকৃচ্ছ্রেও ইহা প্রয়োগ করা যায় ।

বটপত্রী প্রলেপ । প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

হিস্পাদ্যাবর্তি । পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে পকাশয়গত বায়ুর প্রকোপ বশতঃ বস্তিদেহ ক্ষীত ও মলরোধ হইলে, এই বর্তি রোগীর মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে ।

হিস্পাদ্যাবর্তি । প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

ফলবর্তি । পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে পকাশয়গত বায়ুর প্রকোপবশতঃ বস্তি-দেহ ক্ষীত ও মলরোধ হইলে কিম্বা দাপ্ত পরিষ্কার সত্ত্বেও আগ্নান থাকিলে, এই বর্তি রোগীর মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে ।

ফলবর্তি । প্রস্তুতবিধি ৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

নারাচচূর্ণ । পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ বা কোষ্ঠকাঠিন্য উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।
অনুপান—জল ।

নারাচূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ৪৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

হিঙ্গুদ্রাচূর্ণ । পুরীষজ মূত্রকৃষ্ণে রোগীর বলরোধ বা কোষ্ঠকাঠিন্য প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে । অন্নপান—উষ্ণজল ।

হিঙ্গাদ্য চূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ৫০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বলাদ্রাচূর্ণ । মূত্রকৃষ্ণে রোগীর অন্ন অন্ন মূত্র পুনঃ পুনঃ নির্গত হইলে এবং প্রস্রাবে জ্বালাযন্ত্রণা বা সহসা প্রস্রাব বন্ধ হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অগ্নাত মূত্রকৃষ্ণে এবং মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগেও ইহা উপকারী । অন্নপান—দুগ্ধ ।

বলাদ্য চূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ৫০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

পথ্যাদি চূর্ণ । মূত্রকৃষ্ণে রোগীর পুনঃ পুনঃ অন্ন অন্ন প্রস্রাব, মূত্রাশয়ে ও জননেন্দ্রিয়ে বেদনা, প্রস্রাবে যন্ত্রণা বা সহসা প্রস্রাব বন্ধ হওয়া প্রভৃতি উপসর্গ হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা মূত্রাঘাত এবং অশ্মরীরোগেও উপকারী ।

পথ্যাদি চূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ৫০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

চিন্তামণি । পুরীষজ, শুক্রজ, বাতজ ও পিত্তজ মূত্রকৃষ্ণের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবনে বায়ুর অহুলোমতা ও কোষ্ঠতৃষ্ণা হয় এবং পিত্তপ্রশমিত, বস্তি ও জননেন্দ্রিয়ের দাহ বিনষ্ট ও সরলভাবে মূত্র নির্গত হইয়া থাকে । অগ্নাত মূত্রকৃষ্ণে এবং মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগেও ইহা উপকারী । শৈথিল্য মূত্রকৃষ্ণে রোগের প্রবলতা বিদ্যমানে ইহা প্রয়োগ করা যায় । অন্নপান—আতপ চাউলের জল বা ত্রিফলার জল কিম্বা পাথর কুচির রস ও মধু ।

চিন্তামণি । প্রস্তুতবিধি ৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

চতুর্মুখ রস । মূত্রকৃষ্ণে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ বা মুহুমূহুঃ অন্ন পরিমাণে মূত্র নির্গত হইলে, অথবা তক্ষণ জ্বালাযন্ত্রণা, বস্তি বা জননেন্দ্রিয়ে প্রদাহ উপস্থিত হইলে, বিশেষতঃ শুক্রজ, পিত্তজ, বাতজ ও অভিঘাতজ মূত্রকৃষ্ণে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে । ইহা মূত্রাঘাত এবং অশ্মরীরোগেও প্রয়োগ করা যায় ।

মেহরোগে মূত্রকৃচ্ছ এবং কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, ইহাদ্বারা উপকার হয় । অমু-
পান—চাউলের জল বা পাথর কুচির পাতার রস ও মধু ।

চতুর্গুণরস । প্রস্তুতবিধি ৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

যোগেন্দ্ররস । মূত্রকৃচ্ছের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং অগ্নাত্ত ঔষধে
উপকার না হইলে কিম্বা স্থায়ী ফললাভ অথবা দুর্বল ও ক্লেশ শরীরের বল ও
পুষ্টিবিধানার্থ ইহা প্রয়োগ করিবে । বাতিক, পৈতিক, শ্লেষ্মিক, অভিঘাতজ,
শুক্ৰজ, অশ্মরীজ ও শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাঘাত এবং অশ্মরীরোগে কিম্বা
মেহরোগে মূত্রকৃচ্ছের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধে মহোপকার সাধিত
হয় । অমুপান—ত্রিফলার জল বা আমলা ভিজান জল ও মধু ।

যোগজ রস । প্রস্তুত-বিধি ৬০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

তারকেশ্বর রস । মূত্রকৃচ্ছরোগে পুনঃপুনঃ অল্প অল্প মূত্র নির্গত ও
তৎসঙ্গে জ্বালা যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে,
ইহাতে জ্বালা যন্ত্রণা মূত্রসহ রক্তস্রাব ও অগ্নাত্ত উপসর্গ শীঘ্রই প্রশমিত হয় ।
ইহা মূত্রাঘাত এবং অশ্মরীরোগেও উপকারী । অমুপান—যজ্ঞডুমুরের চূর্ণ
ও মধু ।

তারকেশ্বর রস । পারদ, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, তুরালতা, ববক্ষার, গোক্ষুর ও হরীতকী,
ইহাদের প্রত্যেক সমভাগে লইয়া সাড়ি কুমড়ার জলে, তৃণপক্ষ্মুলের কাথে (কৃষ্ণ, কাশ,
শর, উগু ও কৃষ্ণ ঈক্ষু) এবং গোক্ষুরের কাথে যথাক্রমে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে ।
এটা ২ রতি ।

বরুণাদ্য লৌহ । ইহা একটি সন্দা ব্যবহার্য্য উৎকৃষ্ট ঔষধ । মূত্র-
কৃচ্ছ, মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগের যে কোনও অবস্থায় প্রয়োগ করা যায় ও
সমুদায় ফল পাওয়া যায় । মেহরোগে মূত্রকৃচ্ছের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে,
ইহা প্রয়োগে মূত্রকৃচ্ছ ও মেহ উভয়ই বিনষ্ট হয় । বিশেষতঃ ইহা বল ও
পুষ্তিকারক এবং ঐ সকল রোগে জ্বর থাকিলে, সেই অবস্থায়ও প্রয়োগ
করা যায় ও উপকার হয় । অমুপান—আমলাভিজান জল ।

বরুণাদ্য লৌহ । বরুণছাল ১৬ তোলা, আমলাকী ১৬ তোলা, ধাইফুল ৮ তোলা, হরীতকী
৪ তোলা, চাকুলে ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা ও অভ্র ২ তোলা ; এই সকল চূর্ণ মিশ্রিত
করিয়া লইবে । মাত্রা চারি আনা ।

কুশাবলেহ । ইহা একটি সর্বদা ব্যবহার্য উৎকৃষ্ট ঔষধ । মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী প্রভৃতি রোগে সদ্যঃ ফলপ্রদ । বাতিক, পৈত্তিক, শল্যজ, অশ্মরীজ বা শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছ এবং প্রস্রাবের সহিত রক্ত নির্গত হইলে, ইহা প্রয়োগে অসীম উপকার হয়, জ্বালা-যন্ত্রণা সত্ত্বে প্রশমিত হইয়া থাকে । মেহরোগে মূত্রকৃচ্ছ বা মূত্রাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, প্রয়োগ করা যায় । এতদ্ব্যতীত মেহ বিনষ্ট করিবার শক্তিও ইহার অসাধারণ । অল্পপান—ত্রিফলার জল ।

কুশাবলেহ । প্রস্তুতবিধি ২২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত । মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাঘাত এবং অশ্মরী প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অল্পপান—উষ্ণদুগ্ধ ।

ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত । গব্যঘৃত /৪ সের । যথাবিধি মুচ্ছা পাক করিবে । কাথ্যদ্রব্য—গোক্ষুর /২ সের, জল ১৬ সের, শেব /৪ সের । এরও মূল /২ সের, জল ১৬ সের, শেব /৪ সের । তৃণপঞ্চমূল অর্থাৎ কুণ, কাশ, শর, উলু ও কৃষ্ণ ইক্ষু সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেব /৪ সের । শতমূল্যের রস /৪ সের, চালকুমড়ার রস /৪ সের ও ইক্ষুর রস /৪ সের । যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া তন্মধ্যে /২ সের ইক্ষুগুড় বা ইক্ষুচিনি এক্ষেপ দিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে । যাত্রা—অর্দ্ধতোলা ।

উশীরাদ্যতৈল । বাতিক, পৈত্তিক, শল্যজ, ভূকৃচ্ছ, শর্করাজ ও অশ্মরীজনিত মূত্রকৃচ্ছ, অল্প অল্প মূত্র নির্গমন, বস্তি বা জননেদ্রিয়ে প্রদাহ, গাত্রদাহ, বস্তিদেশের ক্ষীততা ও মলরোধ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল রোগীর সর্বক্ষেপে বিশেষতঃ উদরে মর্দনের ব্যবস্থা করিবে । সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ স্নেহের প্রবলতা থাকিলে ও শৈথিল্য মূত্রকৃচ্ছ কেবল উদরে মর্দনের ব্যবস্থা করিবে । সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ, বায়ু বা পিত্তের আধিক্য থাকিলে, গাত্রে মর্দনের ব্যবস্থা করা যায় । এতদ্বিল্ল, মূত্রাঘাত, অশ্মরী এবং মেহরোগেও ইহা দৃষ্ট ফলপ্রদ ।

উশীরাদ্যতৈল । তিলতৈল /৪ সের । যথাবিধি মুচ্ছা পাক করিবে । কঙ্কাদ্রব্য—বেণারমূল, তণ্ডুলপত্রিকা, কুড়, বটমধু, রক্তচন্দন, বহেড়া, শতমূলী, পদ্মকান্ঠ, নীলোৎপল, অনন্তমূল, বেড়োলা, অম্বগন্ধা, শালপাণী, চাকুলে, ব্যাকুড়, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেলছাল, গোণাছাল,

গাম্ভীর্যহাল, পারুলহাল, গণিকুলী-হাল, ভূমিকুণ্ডাণ্ড, কাকোলী, গুলঞ্চ, গোরক্ষচাকুলের হাল, গোকুর, গুল্ফা, খেতবেড়োলা, মোরী ও মহাশতাবরী (অভাবে শতমূলী) ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা । কাথ্যাদ্রব্য—পত্র, ফল ও মূল সহিত গোকুর ১২৥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, বেণারমূল ১২৥০ সের ; জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । ঘোল ৮ সের । যথা-নিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা—অঙ্গতোলা হইতে ১ তোলা ।

উত্তরবস্তি যোগ । মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে মূত্র নির্গমনকালে বস্তি ও জন-নেদ্রিয়ে অত্যধিক জ্বালা-যন্ত্রণা বিশেষতঃ ক্ষত থাকিলে, এই ঔষধ দ্বারা জন-নেদ্রিয়ে পিচকারী প্রয়োগ করিবে । ক্ষত না থাকিলে কেবল দধির মাত বা ত্রিফলার জল দ্বারা পিচকারী দিবে ।

উত্তরবস্তি যোগ । প্রস্তুতবিধি ৯২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

অশ্মরী ও শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে নানাপ্রকার উপদ্রব উপস্থিত হয়, উহাদের বিস্তারিত চিকিৎসা বক্ষ্যমাণ অশ্মরীরোগে দ্রষ্টব্য । মূত্রকৃচ্ছ্রে অধিক শৈত্যক্রিয়া বশতঃ জ্বর হইলে, শৈত্যক্রিয়া বন্ধ করিয়া পুরাতন বা জীর্ণজরোক্ত জয়মঙ্গল রস প্রভৃতি স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট জ্বরনাশক অগ্ন্যাগ্নি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে ।

মূত্রকৃচ্ছ্রে—পথ্যাপথ্য ।

মূত্রকৃচ্ছ্রের প্রথম অবস্থায় অন্ন বন্ধ করিয়া দুগ্ধ-সাগু অথবা দুগ্ধ, সাগু ও কিস্মিস্ দ্বারা পায়স প্রস্তুত করিয়া আহার করিতে দিবে, কিম্বা ঐশ্বর্যমণ্ড দুগ্ধ সহ আহার করিতে দিবে ; ইহাতে বায়ু অনুলোম ও কোষ্ঠগুন্ধি হয় । এতদ্ব্যতীত সুপক কমলালেবু, আনারস, আতা, পেপে, ডালিম, বেদানা, আঙ্গুর, কিস্মিস্, খেজুর, তালশাস, ডাবের জল ও কোমল নারিকেল প্রভৃতি উপকারী । রোগের বর্ধিত বেগ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে, পুরাতন রক্ত-শালি তণ্ডুলের অন্ন, ঘৃতপক তরকারী ও মূগের দাইল, প্রভৃতি পথ্য দিবে ।

মূত্রকৃচ্ছ্রে মদ্যপান, পরিশ্রম, পথ-পর্যটন, হস্তী-অশ্বাদিয়ানে আরোহণ, মৎস্য, লবণ, আদা, হিঙ্গু, তৈল, মাষকলাই, তৈলে ভাজ্যাদ্রব্য, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও বিদাহী এবং রুক্ষ ও অম্লদ্রব্য পরিত্যাজ্য ।

মূত্রাঘাত-চিকিৎসা

বাতকুণ্ডলিকার লক্ষণ । শরীরের ক্লান্ততা কিম্বা মলমূত্রের বেগ-ধারণ বশতঃ বায়ু প্রকুপিত হইয়া মূত্রাশয়ে বেদনা উৎপাদন ও মূত্রনালা আচ্ছাদিত করে এবং বায়ু দ্বারা মূত্রাশয়ের মূত্র ঘূর্ণিত হইতে থাকে, স্মৃতরাং মূত্র সরলরূপে বহির্গত হইতে না পারিয়া অল্প অল্প করিয়া নির্গত হয় । ইহাকে বাতকুণ্ডলিকা মূত্রাঘাত কহে । ১ ।

অঞ্জীলার লক্ষণ । প্রকুপিত বায়ুদ্বারা মূত্রাশয় ও মলদ্বার অবরুদ্ধ হইলে, আশ্রয় উপস্থিত হয় এবং মলমূত্র নির্গত হইতে পারে না ; পরন্তু ঐ অবস্থায় বাঁতাঞ্জীলার গায় সঞ্চরণশীল, উন্নত ও তীব্র বেদনায়ুক্ত অঞ্জীলা উৎপন্ন হয়, ইহাকে অঞ্জীগানামক মূত্রাঘাত কহে । ২ ।

বাতবস্তির লক্ষণ । মূত্রের বেগ-ধারণ বশতঃ বস্তিগত বায়ু কুপিত হইয়া মূত্রাশয়ের মুখ রুদ্ধ করিলে, মূত্ররোধ হয় এবং ঐ অবস্থায় মূত্রাশয় ও কুক্ষিদেশে বেদনা হইয়া থাকে, ইহাকে বাতবস্তি নামক মূত্রাঘাত কহে । এই রোগ কষ্টসাধ্য । ৩ ।

মূত্রাভীত মূত্রাঘাতের লক্ষণ । বহুক্ষণ মূত্রের বেগ ধারণ করিলে, শীঘ্র মূত্র নির্গত হয় না, অথবা নির্গত হইলেও অল্পে অল্পে নির্গত হয়, ইহাকে মূত্রাভীত মূত্রাঘাত কহে । ৪ ।

মূত্রজঠর মূত্রাঘাতের লক্ষণ । মূত্রের বেগ ধারণ করিলে, উদাবৰ্গ-রোগের লক্ষণ উপস্থিত হয়, তখন বায়ু অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ হইয়া উদর পরিপূর্ণ ও নাভির অধোভাগে তীব্র বেদনায়ুক্ত আশ্রয় উৎপাদন এবং মূত্রাশয়ের অধো-দেশের পথ রোধ করে, ইহাকে মূত্রজঠর নামক মূত্রাঘাত কহে । ৫ ।

মূত্রোৎসঙ্গের লক্ষণ । কুপিত বায়ুদ্বারা মূত্রাশয়ে, শিশ্নে বা শিশ্নের অগ্রভাগে মূত্ররুদ্ধ হয় এবং অতিশয় ক্রুদ্ধনে বারংবার বেদনার সহিত অল্প অল্প রক্তসংযুক্ত মূত্র নির্গত হয় বা মূত্রভ্যাগকালে বেদনা হয় না, তাহাকে মূত্রোৎসঙ্গ কহে । ৬ ।

মূত্রক্ষয়ের লক্ষণ । যে রোগে রক্ত ও কাস্ত ব্যক্তির মূত্রাশয় স্থিত কুপিত বায়ু ও পিত্ত মূত্রাশয়ে দাহ, বেদনা ও মূত্রক্ষয় (মূত্রের অন্ততা) জন্মায়, তাহাকে মূত্রক্ষয় কহে । ৭ ।

মূত্রগ্রন্থির লক্ষণ । মূত্রাশয়ের মুখমধ্যে পাথরীর আয় গোলাকার, অচল গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইট সহসা উৎপন্ন হইলে, তাহাকে মূত্রগ্রন্থি কহে । ৮ ।

অগ্নরী ও মূত্রগ্রন্থির প্রভেদ । অগ্নরী ও মূত্রগ্রন্থির প্রভেদ এই যে, ক্রমশঃ দোষ সঞ্চিত হইলে, অগ্নরী উৎপন্ন হয়, কিন্তু মূত্রগ্রন্থি সহসা উৎপন্ন হয় এবং কোন প্রকার দোষসঞ্চয়ের অপেক্ষা করে না, বিশেষতঃ অগ্নরী পিত্তাধিক্য ও মূত্রগ্রন্থিরোগ রক্তাধিক্য । তন্মাস্তরে উক্ত হইয়াছে যে, বায়ু ও কফ প্রকুপিত হইয়া মূত্রাশয়ের দ্বারে অতিশয় কষ্টপ্রদ গ্রন্থি উৎপাদন করে এবং ঐ গ্রন্থিদ্বারা মূত্রাশয়ের পথ অবরুদ্ধ হওয়াতে কষ্টের সহিত মূত্র নির্গত হয় ।

মূত্রশুল্কের লক্ষণ । মূত্রের বেগ ধারণ করিয়া স্ত্রীসঙ্গম করিলে, বায়ুদ্বারা শুক্র স্বস্থানচ্যুত হইয়া উর্দ্ধগামী হয়, তদনন্তর প্রস্রাবের অগ্রেই হউক বা পরেই হউক ভস্মমিশ্রিত জলের আয় মূত্রমার্গ দ্বারা নির্গত হইয়া থাকে, ইহাকে মূত্রশুল্ক কহে । ৯ ।

উষ্ণবাতের লক্ষণ । ব্যায়াম, পথপর্যটন ও রৌদ্রসেবন প্রভৃতি কারণে প্রকুপিত বায়ু, পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া মূত্রাশয় আশ্রয়পূর্বক মূত্রাশয়, শিশ্ন ও মলদ্বারে দাহ জন্মায় এবং ঐ অবস্থায় অতিশয় কষ্টের সহিত হরিদ্রাবর্ণ বা দীর্ঘ লোহিতবর্ণ মূত্র অথবা কেবল রক্তই নির্গত হয় । এই রোগকে উষ্ণবাত কহে । ১০ ।

মূত্রসাদের লক্ষণ । প্রকুপিত বায়ুদ্বারা পিত্ত ও কফ এককালীন উভয়ই ঘনীভূত হইয়া পীত, রক্ত বা শ্বেতবর্ণ গাঢ়মূত্র কষ্টের সহিত নির্গত হইলে, তাহাকে মূত্রসাদ কহে । এতদ্ভিন্ন কেবল পিত্ত ঘনীভূত হইলে, গোয়োটমার আয়, কফ ঘনীভূত হইলে, শল্যচূর্ণের বর্ণের আয় এবং সান্নিপাতিক মূত্রসাদে উক্ত সকল প্রকার বর্ণযুক্ত অল্প প্রস্রাব নির্গত হইয়া থাকে । ১১ ।

বিড়্‌বিঘাতের লক্ষণ । ক্রুদ্ধ ও দুর্বল ব্যক্তির মল বায়ুদ্বারা পক্ষাশয় হইতে উৰ্দ্ধগত হইয়া মূত্রপথে নীত হইলে, মলসংযুক্ত বা মলের গন্ধযুক্ত মূত্র কষ্টের সহিত নির্গত হয়, এই রোগকে বিড়্‌বিঘাত নামক মূত্রাঘাত কহে । ১২

বন্তিকুণ্ডলের লক্ষণ । দ্রুতবেগে পথ পর্য্যটন, পরিশ্রম, আঘাত ও পীড়ন প্রভৃতি কারণে মূত্রাশয় স্বস্থান হইতে উৰ্দ্ধগত হইয়া গর্ভের ত্রায় গোলাকারে অবস্থান করিলে রোগীর শূলবেদনা, স্পন্দন ও দাহসহ অল্পমূত্র নিঃসৃত হয়, কিন্তু মূত্রাশয় পীড়ন করিলে (টিপিলে) ধারাবাহিক প্রস্রাব হইয়া থাকে, এই রোগকে বন্তিকুণ্ডল কহে । ইহা শত্রু ও বিধের ত্রায় মারাত্মক । বন্তিকুণ্ডলরোগে প্রায়ই বায়ুর প্রবলতা থাকে । এই রোগ পিত্তান্বিত হইলে দাহ, শূল ও মূত্রবিবর্ণ, শ্লেষ্মান্বিত হইলে, শরীরের গুরুতা এবং শোথ হয়, পরন্তু স্নিগ্ধ, শ্বেতবর্ণ ও গাঢ় মূত্র কষ্টে নির্গত হইয়া থাকে । ১৩ ।

বন্তিকুণ্ডলীর সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ । বন্তিকুণ্ডলীরোগে মূত্রাশয়ের মুখের ছিদ্র শ্লেষ্মাদ্বারা আবৃত কিম্বা মূত্রাশয়ে পিত্ত সঞ্চিত হইলে, ঐ রোগ অসাধ্য এবং মূত্রাশয়ের মুখরন্ধ্র কফদ্বারা আবৃত ও মূত্রাশয়ে বায়ু কুণ্ডলীভূত না হইলে, সাধ্য । মূত্রাশয়ের মধ্যে বায়ু কুণ্ডলীভূত হইলে, রোগীর পিপাসা, শ্বাস ও মোহ উপস্থিত হইয়া থাকে ।

মূত্রাঘাত-চিকিৎসা-বিধি । ✓

মূত্রকৃচ্ছ্র এবং মূত্রাঘাত উভয়ই বন্তি (মূত্রাশয়) গত বায়ুর প্রকোপ বশতঃ উৎপন্ন হয়, কিন্তু বিভিন্নতা এই—মূত্রকৃচ্ছ্রে অত্যধিক যন্ত্রণার সহিত মূত্র নির্গত হয়, বিবদ্ধতা কম, কিন্তু মূত্রাঘাতে মূত্র নির্গমন কালে যন্ত্রণা কম, কিন্তু বিবদ্ধতা অধিক । মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত বায়ুবিকার মাত্র । বন্তিগত বায়ু যাবৎ অম্ললোম বা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তাবৎ যথারীতি মলমূত্রাদি নির্গত হয়, শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ থাকে, কিন্তু নানা কারণে বায়ু প্রকুপিত হইলেই প্রতিলোম বা উৰ্দ্ধগামী হয়, সুতরাং মলমূত্র রোধ ও নানা উপসর্গ উপস্থিত হয় এবং যাহাতে বায়ু সরল অর্থাৎ অধোগামী হয় বা মলমূত্র যথারীতি নির্গত হয়, এই সকল রোগে ভ্রূপ ক্রিয়া সর্বাগ্রে করা কর্তব্য । মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত বাহ্যদৃষ্টিতে সামান্য রোগ বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু উহারা অত্যন্ত

কঠিন রোগ । উভয়ের মধ্যে জ্বাবার লক্ষণের সোসাদৃশ্য এত অধিক যে সহজে রোগ নির্ণয় করাই কঠিন । মূত্রাধারোগে, মূত্রকৃচ্ছের জ্বায় নানাপ্রকার বায়ুনাশক তৈল মর্দন অথবা তৈল ও ঘৃত পান, শ্বেদ, প্রলেপ বিশেষতঃ মলদ্বারে ও জননেন্দ্রিয়ে বস্তি অর্বাং পিচ্কারী প্রয়োগ এবং শিষ্ণু বিরোচন বা কোষ্ঠভুজ্জিকারক ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্তব্য ।

মূত্রাধীলা । বায়ু যদি মূত্রাশয় ও মলদ্বারকে অবরোধ করে, তাহা হইলে মলমূত্র নির্গত হইতে পারে না, সূতরাং আশ্রয় ও সঞ্চরণশীল অথচ উন্নত ও তীব্র বেদনামুক্ত অধীলা উৎপন্ন হয়, এই রোগ অত্যন্ত কঠিন । বাত-ব্যাদি রোগোক্ত বাতাদীলার জ্বায় ইহার চিকিৎসা করা উচিত । রোগের প্রথম অবস্থায় হিঙ্গুচূর্ণ, অগ্নিমুখ চূর্ণ বা বচাচূর্ণ (মতান্তরে) প্রয়োগ করিবে । অনন্তর তাহাতে উপকার না হইলে বা রোগ কঠিন হইলে, রোগীর উদরে তারপিন বা অত্যাচ্ছ বায়ুনাশক তৈল মাখাইয়া রোগীকে উষ্ণজলপূর্ণ-পাত্রে বসাইবে । তাহাতেও যদি তীব্র বেদনার লাঘব কিম্বা মলমূত্র নির্গমন না হয়, তবে বাতব্যাদিরোগোক্ত হিঙ্গুচূর্ণ বা শুণ্ডারোগোক্ত কাকায়ন-শুড়িকা রোগীকে সেবন করিতে দিবে অথবা দান্ত ও বায়ুর অহুলোমতার জন্য হিঙ্গুচূর্ণবর্তি বা ত্রিকটুকাচ্ছাবর্তি, নারাচূর্ণ বা বৈশ্বানর চূর্ণ প্রয়োগ করিবে । বায়ুনাশক তৈল অথবা উশীরাজ তৈল বা বরুণাজ তৈল রোগীর সর্দাঙ্গে বিশেষতঃ উদরে মর্দন করিতে দেওয়া উচিত । বায়ুনাশক তৈল বা রেড়ীর তৈল দ্বারা মলদ্বারে এবং বস্তিযোগ দ্বারা জননেন্দ্রিয়ে পিচ্কারী দিবে । আশ্রয় নিবৃত্তির জন্য দারুণটক প্রলেপ বা যবপ্রলেপ ও মূত্র প্রব-
র্তনের জন্য বিশ্বিকাচ প্রলেপ বা বটপত্রী প্রলেপ প্রয়োগ করা যায় । চিন্তামপি, চতুশ্রুথ অথবা যোগেন্দ্র রস প্রভৃতি ঔষধ এবং রোগের প্রকোপ হ্রাস পাইলে, বরুণাজ ঘৃত বা ত্রিকটুকাচ ঘৃত ব্যবস্থা করিবে ।

বাতবস্তি । মূত্রের বেগ ধারণ করিলে, বস্তিগত বায়ু প্রকুপিত হইয়া মূত্রাশয়ের মুখ অবরুদ্ধ করে, তজ্জন্ত মূত্র নির্গত হয় না ; পরন্তু মূত্রাশয় ও কুন্দিদেশে বেদনা হয় । এই রোগের প্রথম অবস্থায় মূত্রনিঃসারক বিবিধ প্রলেপ প্রয়োগ করিবে এবং দশমূল্যের কাথে শিলাজতু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে অথবা বরুণাদিকাথ, বৃহৎ বরুণাদিকাথ কিম্বা শুষ্ঠাদিকাথ

রোগীকে পান করিতে দিবে। উশীরাগ্ধ তৈল, শিলোত্তেদাদি তৈল অথবা ঘায়ুনাশক কোন তৈল সর্সাদে মর্দন করাইয়া রোগীকে স্নান করাইবে। ঐ সকল তৈল উদরে মর্দন করিলেও যথেষ্ট উপকার হয়। মূত্রক্লেচ্ছাক্ত বক্রগাণ্ডলোহ বা তারকেশ্বর রস, কিষা চিন্তামণি, চতুশ্রুধ বা যোগেন্দ্র রস ব্যবস্থা করিবে। রোগ পুরাতন হইলে ত্রিকটকাক্ত ঘৃত বা বাতব্যাদি-রোগোক্ত কোন ঘৃত পান করিতে দিবে। এই রোগ অতিশয় কঠিন, স্ততরাং সমস্তে চিকিৎসা করা কর্তব্য।

মূত্রাতীত । দীর্ঘকাল মূত্রের বেগ ধারণ করিলে শীঘ্র মূত্র নির্গত হয় না কিষা হইলেও অতি অল্প পরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে। এই রোগ সুখসাধ্য, অনেকস্থলে একটু শৈত্যক্রিয়া অর্থাৎ বায়ুনাশকতৈল মর্দন কিষা স্নান অথবা ডাবের জল বা বেদানা ও ডালিম প্রভৃতি ফল ভক্ষণেই রোগ প্রশমিত হয়। তাহাতে স্থায়ী উপকার না হইলে, চিন্তামণি, চতুশ্রুধ প্রভৃতি ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

মূত্রজঠর । মূত্র-বেগ ধারণ করিলে প্রথমতঃ মূত্র বেগরোধ জনিত উদাবর্তের লক্ষণ প্রকাশ পায়, অনন্তর অপান বায়ু অত্যন্ত প্রকুপিত হইয়া উদরকে স্ফীত করে এবং নাভির অধোভাগে অসহ্য তীব্র বেদনায়ুক্ত আশ্বান উৎপাদন করে ও মূত্রাশয়ের নিম্নদেশে বিবন্ধ (মূত্র রোধ) জন্মায়, ইহাকে মূত্রজঠর কহে। এই রোগে বাতবস্তি ও মূত্রনিরোধজনিত উদাবর্তের চিকিৎসাপদ্ধতি অবলম্বন করিবে।

মূত্রোৎসঙ্গ । এই রোগে মূত্রাশয়ে, শিশ্নুনালা কিষা শিশ্নু-গ্রন্থিতে মূত্র আবদ্ধ থাকে, নির্গত হয় না এবং বেগ দিলে বা কুহন করিলে, মূত্রাশয় বা শিশ্নুনালায় গাত্র ভেদ হইয়া বেদনার সহিত কিষা বেদনাবিহীন অবস্থায় রক্ত মিশ্রিত মূত্র অল্প অল্প করিয়া নির্গত হয়। বিগুণ অর্থাৎ প্রতিলোম অথবা উর্দ্ধগামী বায়ুদ্বারা এই রোগ জন্মে। এই রোগে বায়ুনাশক কোন তৈল সর্সাদে ও উদরে মর্দন করিতে দিবে ও স্নানের ব্যবস্থা করিবে। চিন্তামণি, চতুশ্রুধ বা যোগেন্দ্ররস প্রয়োগ করিকে এবং রক্তের বহির্গমন নিবারণার্থ তুণ-পঞ্চমূলকীর বা কুশাবলেহ প্রয়োগ করিবে।

মূত্রক্ষয় । রুক্ষ ও ক্লান্ত দেহ ব্যক্তির মূত্রাশয়স্থিত পিত্ত ও বায়ু প্রকুপিত হইয়া মূত্র ক্ষয় বা শোষণ করে, স্নাতরাং বেদনা ও দাহের সহিত অল্প অল্প মূত্র নির্গত হইতে থাকে । এই রোগে বায়ুনাশক চিন্তামণি, চতু-
মুখ বা যোগেন্দ্ররস সেবন ও উশীরাদি তৈল বা বরুণাণ্ড তৈল উদরে ও সর্বাঙ্গে মর্দনের ব্যবস্থা করিবে । অনন্তর রোগ প্রশমিত হইলে, ত্রিকণ্টকাণ্ড-
দ্রত ব্যবস্থা করিবে ।

মূত্রগ্রন্থি । এই রোগে মূত্রাশয়ের মুখের অভ্যন্তর ভাগে গোলাকার, স্থির অথচ ক্ষুদ্র আমলকীর আকৃতি বিশিষ্ট ও অশ্মরীর স্তায় বেদনায়ুক্ত গ্রন্থি সহসা উৎপন্ন হয় । এ রোগ অল্পকালোদ্ভূত হইলে, ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য হয় না । বরুণাণ্ড লৌহ, তৃণপঞ্চমূলক্ষীর, কুশাবলেহ ও চিন্তামণি বা চতুর্মুখ প্রভৃতি ঔষধ সেবনের এবং বরুণাদ্যৈতল অথবা উশীরাদ্যৈতল মালিশের জ্ঞাত ব্যবস্থা করিবে । প্রলেপাদি দ্বারা এ রোগে তাদৃশ উপকার হয় না ।

মূত্রশুক্ল । মূত্রের বেগ সবেম্বী-সঙ্গম করিলে, শুক্ল বায়ুদ্বারা স্বস্থান হইতে ক্ষরিত ও উর্দ্ধগামী হয়, অনন্তর ভস্মমিশ্রিত জলের স্তায় প্রস্রাবের অগ্রে বা পশ্চাৎ নির্গত হয় । এই রোগে কদলী-মূলের রসসহ এলাচি-চূর্ণ এবং গোক্ষুরাদি কাথ ও ত্রিকণ্টকাদ্যয়ুত ব্যবস্থা করিবে । বস্তি-শোধনার্থ তৃণপঞ্চমূল ক্ষীর বা কুশাবলেহ অথবা চিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধও প্রয়োগ করা যায় ।

উষ্ণবাত । অধিক পরিশ্রম, পথপর্যটন ও রৌদ্র সেবন দ্বারা বায়ুর সহিত পিত্ত প্রকুপিত হইয়া মূত্রাশয় আশ্রয় করিয়া মূত্রাশয়, শিশ্ন ও মলদ্বারে দাহ উৎপাদন করে, এবং কণ্ঠের সহিত পুনঃ পুনঃ ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ, ঈষৎ লোহিতবর্ণ অথবা কেবলমাত্র রক্তবর্ণ মূত্র নির্গত হয়, ইহাকে উষ্ণবাত কহে । এইরোগে রক্তবর্ণ বা রক্তমিশ্রিত অথবা কেবল মাত্র রক্ত নির্গত হইলে, তৃণপঞ্চমূল ক্ষীর বা কুশাবলেহ সেবন করিতে দিবে । চন্দনঘষা চাউলের জলসহ খাওয়াইলে জ্বালাযন্ত্রণা প্রশমিত হয় । এই সকল ঔষধ সেবনে মূত্রাশয় বিশোধিত এবং দাহ প্রশমিত হয়, পরন্তু রক্তবর্ণ বা রক্তসংযুক্ত অথবা কেবল রক্তপ্রস্রাবের পরিবর্তে শুভ্রবর্ণ স্বাভাবিক মূত্র নির্গত হইয়া থাকে ।

এতদ্ব্যতীত শীতলজল একটা টবে রাখিয়া তন্মধ্যে রোগীকে বসাইয়া তাহার বস্তি বা মূত্রাশয় পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিলেও যথেষ্ট উপকার হয়। অত্যধিক ক্রী-সংসর্গ হেতু মূত্রমার্গ দ্বারা শোণিত নির্গত হইলে, অধোগত রক্তপিভ-নাশক ঔষধ অর্থাৎ ফল্গুযোগ, তৃণপঞ্চমূলক্ষীর বা কুশাবলেহ প্রভৃতি কিম্বা দ্রাক্ষাকক্ক সেবন করিতে দিবে, অনন্তর রক্তবদ্ধ হইলে, গুরুবর্ধক ও পুষ্টি-কারক রুহং অশ্বগন্ধায়ত প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে।

বাতকুণ্ডলিকা।। নানাকারণে দেহ রুদ্ধতা প্রাপ্ত হইলে কিম্বা মল-মূত্রের বেগ ধারণ করিলে, বায়ু অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া এই রোগে মূত্রাশয়ে বেদনা ও মূত্রনিঃসরণে বাধা জন্মায় ; স্মৃতরাং যাহাতে শরীর ক্রমশঃ স্নিগ্ধ ও মলমূত্র যথারীতি নির্গত হয়, তজ্জন্ম বায়ুনাশক চিন্তামণি, চতুর্গুধ, যোগেন্দ্ররস অথবা তারকেশ্বর রস ও বরুণাদ্যালৌহ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। উদরে নানা-প্রকার তৈল মর্দন করিয়া উষ্ণজলের সেক দেওয়া যায়। বায়ুনাশক বিষ্ণু-তৈল, মধ্যম-বিষ্ণুতৈল বা উশীরাদ্য তৈল সর্কাসে, বিশেষতঃ বস্তিদেশে মর্দনের এবং বরুণাদ্যায়ত, ত্রিকণ্টকাদ্যায়ত বা রুহং ছাগলাদ্যায়ত প্রভৃতি সেবনের ব্যবস্থা করিবে, কিন্তু জ্বরসম্মে দ্ব্যত তৈল ব্যবস্থা করিবে না। বটপত্রী প্রলেপ বা বিম্বিকাদ্য প্রলেপ বস্তিদেশে প্রয়োগ করা যায়। মূত্রকৃচ্ছ-রোগে যে সকল যোগ ব্যবস্থা করণ হইয়াছে, মূত্রাঘাতেও অবস্থাবিশেষে তাহা প্রয়োগ করা যায়। মূত্রসংজননার্থ শশাবীজ, চালকুমড়াবীজ বা কাকুড়-বীজ কিম্বা আমলা বাটিয়া উদরে প্রলেপ দেওয়া যায়। কাকুড় বীজের শাস আধ তোলা বাটিয়া কাঁজির সহিত, ত্রিফলাকক্ক সৈন্ধবলবণ সহ, এলাচিচূর্ণ ডালি-মের বা বেদানার রসসহ অথবা কুড়ুম জলে গুলিয়া মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দেওয়া যায়। নল, কুশ, কাশ ও ইক্ষুর শিকড়ের কাথে চিনি মিশা-ইয়া পান করিতে দেওয়া যায় অথবা তৃণপঞ্চমূল ক্ষীর, গোয়ালিয়া লতার কাথ, অশোকবীজচূর্ণ শীতল জলসহ কিম্বা শিবজটার মূল ঘোলের সহিত বাটিয়া খাওয়ান যায়। মূত্র একবারে বদ্ধ হইলে স্তম্ভ কপূরচূর্ণ দুর্লভাসের কাণ্ড দ্বারা লিঙ্গ বা যোনির মূত্রমার্গে প্রবিষ্ট করাইলে সদ্যঃ মূত্র নির্গত হয়। এই অবস্থায় আরও নানাপ্রকার ঔষধ মূত্রনির্গমনের জন্ম প্রয়োগ করা যায়।

মূত্রসাদ। পিত্ত বা কফ স্বতন্ত্ররূপে কিম্বা উভয়ই বায়ু দ্বারা এককালীন

ঘনীভূত (গাঢ়) হইলে, খেত, পীত বা লোহিতবর্ণ মূত্র অল্পে অল্পে নির্গত হয়। পিত্তপ্রধান মূত্রাঘাতে গোরোচনার বর্ণের ত্রায় অথচ দাহসহ, শ্লেষ্ম-প্রধান মূত্রাঘাতে শস্মচূর্ণের ত্রায় এবং সান্নিপাতিক মূত্রাঘাতে উল্লিখিত সমস্ত বর্ণযুক্ত অল্পমূত্রে নির্গত হয়। পিত্তপ্রধান মূত্রসাদে কুশাবলেহ, তৃণপঞ্চমূল-ক্ষীর বা কাথ, গোক্ষুরাচ্চ কাথ ও চিস্তামণি বা যোগেন্দ্ররস প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। উশীরাচ্চ তৈল অথবা বায়ুনাশক কোন তৈল রোগীর সর্বাঙ্গে বিশেষতঃ বস্তিদেহে মাখিতে দিবে; উত্তর বস্তি প্রয়োগ করিবে ও নানা প্রকার মূত্রকারক যোগ সেবন করিতে দিবে। শ্লেষ্মপ্রধান মূত্রসাদে গাস্তারী-কাথ ও গোক্ষুরাচ্চ কাথ বা বৃহৎ বরুণাচ্চ কাথ এবং বরুণাচ্চ লৌহ, এলাচি-চূর্ণ ও চিস্তামণি প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে, তৎসঙ্গে উশীরাচ্চ তৈল সর্বাঙ্গে বিশেষতঃ উদরে মালিশ করিতে দিবে। এই অবস্থায় ত্রিকণ্টকাচ্চ ঘৃত অতি উপকারী। সান্নিপাতিক মূত্রসাদে যে দোষের প্রবলতা দৃষ্ট হইবে, সেই দোষনাক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

বিড়-বিঘাত। শরীর অত্যন্ত রুক্ষ ও দুর্বল হইলে, পুরীষ (মল) উর্দ্ধগামী হইয়া মূত্রমার্গে উপস্থিত হয়, তজ্জন্ম মলের গন্ধযুক্ত বা মলমিশ্রিত মূত্র অতি কষ্টে নির্গত হইয়া থাকে। এই রোগে পুরীষ যাহাতে স্বপথগামী হয়, তাহার চেষ্টা করিবে। সাধারণতঃ মলবেগ রোধজনিত উদাবর্তরোগের চিকিৎসা-পদ্ধতি অবলম্বন করিলেই রোগ আরোগ্য হইতে পারে। উদরে তৈলাদি মর্দন, বস্তি-প্রয়োগ, দান্ত পরিকারের জন্ম বাতাম্বলোমক বৈশ্বানরচূর্ণ বা নারাচচূর্ণ প্রভৃতি সেবন এবং রেড়ীর তৈলদ্বারা বিরচন প্রয়োগ করিলেও যথেষ্ট উপকার হয়। দান্ত পরিকার ও মূত্র সরলরূপে নির্গত হইলে, দেহ সরল ও স্নিগ্ধ হওয়ার জন্ম ঘৃতাди ব্যবস্থা করিবে।

বস্তিকুণ্ডল। ক্রতবেগে পরিভ্রমণ, অতিশয় পরিশ্রম, বস্তি বা মূত্রাশয়ে কোনপ্রকার আঘাত প্রাপ্তি ও মূত্রাশয়ের পীড়ন (টেপা টিপি) দ্বারা মূত্রাশয় স্থান হইতে উর্দ্ধগামী হইয়া গর্ভের ত্রায় স্থলাকারে অবস্থান করে এবং রোগী বেদনা, দাহ ও কম্পের সহিত অল্প অল্প মূত্রত্যাগ করে, কিন্তু নাভির অধোদেশ পীড়ন করিলে, স্বাভাবিক মূত্রধারা নির্গত হয়। ইহা অত্যন্ত কঠিন রোগ। এই রোগে প্রথমতঃ বায়ুনাশক তৈল উদরে মর্দনপূর্বক

হস্তদ্বারা আন্তে আন্তে বস্তিকে স্বস্থানে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিবে এবং বায়ুপ্রশমনের জন্ত নানাপ্রকার বাতাস্থলোমক ক্রিয়া ও ঔষধ প্রয়োগ করিবে । চিন্তামণি বা যোগেন্দ্ররস এবং দশমূলের কাথে শিলাজতু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে । বায়ুপ্রশমনার্থ বর্ত্তিপ্ৰয়োগ বা স্নিগ্ধ বিরেচন ব্যবস্থা করিবে । দাহ, শূল ও মূত্রের বিবর্ণতা বিনাশের জন্ত কুশাবলেহ বা বরুণাশ্র লৌহ ও রুহং বরুণাদিকাথ ব্যবস্থা করিবে । এই রোগে শ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে, দেহের গুরুতা ও শোথ হয় এবং স্নিগ্ধ, স্বেতবর্ণ অথচ গাঢ় মূত্র নির্গত হইয়া থাকে । এই অবস্থায় শ্লেষ্মপ্রধান মূত্রসাদোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে । এই রোগে মূত্রাশয়ের মুখ-রন্ধু শ্লেষ্মাদ্বারা আবৃত কিম্বা মূত্রাশয়ে পিত্ত সঞ্চিত হইলে, কুশাবলেহ, তৃণপঞ্চমূল ক্ষীর, চিন্তামণি বা যোগেন্দ্র রস, রুহং বরুণাদি কাথ ও উশীরাশ্র তৈল ব্যবস্থা করিবে, কিন্তু তাহাতে উপকার না হইলে বা শ্লেষ্মা বায়ু দ্বারা শুষ্ক হইয়া অশরীরে গায় হইলে, অন্তপ্রয়োগ করা কর্তব্য ।

মূত্রাঘাতে-ঔষধ ।

ত্রিফলাকঙ্ক । মূত্রাঘাতে মূত্রের বিবদ্ধতা থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অমুপান—ত্রিফলার জল বা আতপ চাউলের জল ।

ত্রিফলাকঙ্ক । হরীতকী, আমলা ও বহেড়া প্রত্যেকে ১ তোলা ও সৈন্ধব লবণ ১ তোলা একত্র বাটিয়া লইবে । যাত্রা—তাই আনা বা চারি আনা ।

তৃণপঞ্চমূল-ক্ষীর । উষ্ণবাতে ও মূত্রগ্রস্থিতে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ লিঙ্গে বা বস্তিদেহে দাহ বর্ত্তমান থাকিলে কিম্বা মূত্রমার্গ দ্বারা রক্ত নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । মূত্রাঘাতে মূত্রের বিবদ্ধতা বিনাশের জন্তও ইহা ব্যবস্থা করা যায় ।

তৃণপঞ্চমূল ক্ষীর । প্রস্তুতবিধি ২৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

গোক্ষুরাদি কাথ । মূত্রাঘাতরোগে মূত্রাশয়ে ও লিঙ্গে ভার বোধ শোথ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

গোক্ষুরাদি কাথ । প্রস্তুতবিধি ২৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

দশমূল কাথ । বাতবন্তি ও বন্তিকুণ্ডল নামক মূত্রাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধে কিঞ্চিৎ শিলাজতু ও চিনি বা যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে পান করিতে দিবে ।

দশমূল কাথ । প্রস্তুতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বরুণাদি কাথ । বাতবন্তি, মূত্রজঠর, অগ্নীলা, মূত্রসাদ, মূত্রোৎসঙ্গ, মূত্রগ্রন্থি ও মূত্রক্ষয় নামক মূত্রাঘাতে এবং শ্লেষ্মপ্রবল বন্তিকুণ্ডলরোগে বেদনার সহিত অল্পে অল্পে মূত্র নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে পান করিতে দিবে ।

বরুণাদি কাথ । বরুণছাল, শুঠ, পাথরকুচি ও গোক্ষুর সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ২২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । প্রক্ষেপ যবক্ষার ৩ রতি ।

বৃহৎ বরুণাদি কাথ । বাতবন্তি, মূত্রজঠর, অগ্নীলা, মূত্রসাদ, মূত্রোৎসঙ্গ, মূত্রগ্রন্থি ও মূত্রক্ষয় মূত্রাঘাতে এবং শ্লেষ্মপ্রবল বন্তিকুণ্ডলরোগে বেদনা ও যন্ত্রণার সহিত মূত্র নির্গত হইলে, উষ্ণবাত ও মূত্রগ্রন্থিতে এবং পিত্ত-প্রবল বন্তিকুণ্ডলরোগের পিত্তের প্রকোপ বশতঃ লিঙ্গে বা মূত্রাশয়ে দাহ-ধাকিলে ও মূত্রমার্গ দ্বারা রক্ত নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে । ইহা অস্ত্রাঘ মূত্রাঘাতে এবং মূত্রকৃচ্ছ ও অশ্বরী-রোগেও প্রয়োগ করা যায় ।

বৃহৎ বরুণাদি কাথ । বরুণছাল, শুঠ, গোক্ষুর, তালমূলী, কুলথকলাই, কৃশমূল, কাশ-মূল, শরমূল, উলুখড়ের মূল ও কৃষ্ণ ইক্ষুমূল ; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ২২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । প্রক্ষেপ যবক্ষার ৩ রতি এবং চিনি ১০ চারি আনা ।

শুষ্ঠ্যাদি কাথ । বাতকুণ্ডল, মূত্রাগ্নীলা, বাতবন্তি, মূত্রাভীত, মূত্রজঠর, মূত্রোৎসঙ্গ, মূত্রক্ষয়, মূত্রগ্রন্থি, মূত্রশুক্ল, উষ্ণবাত, মূত্রসাদ, বিড়্‌বিঘাত ও বায়ু প্রবল বন্তিকুণ্ডলরোগে মূত্রের বিবদ্ধতা এবং তজ্জন্ম কোষ্ঠ, কটি, উরু, মলদ্বার, বন্তি ও শিশ্নে বেদনা থাকিলে, এই কাথে হিং, যবক্ষার ও সৈন্ধব-লবণ প্রত্যেকে ১/৪ রতি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে । ইহা মূত্রকৃচ্ছ ও অশ্বরী-রোগেও প্রয়োগ করা যায় । ইহা বায়ুর অহুলোমক, কোষ্ঠভঙ্গিকারক ও অশ্বরীভেদক ।

শুভ্রাদি ক্কাথ । শুঠ, গণিয়ারীছাল, পাথরকুচি, শজিমাছাল, বরুণছাল, গোক্ষুর, হরী-
তকী ও সোন্দাল ফলের শাস ; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২
তোলা, শেব ৮ তোলা ।

কুশাবলেহ । মূত্রাঘাতে কষ্টের সহিত মূত্র নির্গমন, বস্তি বা লিঙ্গনাগে-
বেদনা, মূত্রাশয়ের ক্ষীততা ও দাহ, মূত্রমার্গদ্বারা রক্ত বা স্রবস্ত মূত্রনির্গমন,
অরুচি ও দুর্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন
করিতে দিবে । অমুপান—পাথরকুচি পাতার রস বা ত্রিফলার জল ।

কুশাবলেহ । প্রস্তুতবিধি ৯২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

হিঙ্গুদ্রুচূর্ণ । মূত্রাঙ্গীলারোগে বায়ুর আধিক্যবশতঃ মলমূত্ররুদ্ধ, উদরা-
গ্নান এবং উন্নত, সঞ্চরণশীল ও তীব্র বেদনায়ুক্ত অঙ্গীলা উৎপন্ন হইলে, রোগের
প্রথম অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অমুপান—

হিঙ্গুদ্রুচূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ৫৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বচাচূর্ণ (মতান্তরে) । অঙ্গীলারোগের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ
পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অমুপান—উষ্ণজল ।

বচাচূর্ণ (মতান্তরে) । প্রস্তুতবিধি ৫৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

কাক্ষায়ন-গুড়িকা । অঙ্গীলা নামক মূত্রাঘাতে উদরাগ্নান, মলমূত্র-
রোধ ও বেদনা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে
দিবে । ইহাদ্বারা রোগ সমূলে বিনষ্ট হয় । ইহা কোষ্ঠভৃঙ্গি ও মূত্রকারক ।
অমুপান—ত্রিফলার জল ।

কাক্ষায়ন গুড়িকা । প্রস্তুতবিধি ৭৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বরুণাচলৌহ । মূত্রাঘাতের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, অথচ
কোষ্ঠকাঠিগ্ন থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অমুপান—
ত্রিফলার জল ।

বরুণাচলৌহ । প্রস্তুতবিধি ৯৬৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

তারকেশ্বর রস । মূত্রাঘাতে মূত্রাশয় ও জননেন্দ্রিয়ের দাহ, অল্পে

অল্পে সক্রমণীয় মূত্র নির্গমন বিশেষতঃ মূত্রমার্গ হইতে রক্তস্রাব বা রক্তবর্ণ মূত্র নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

ভারকেশ্বর রস । প্রস্তুতবিধি ৯৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

চিন্তামণি । মূত্রাঘাতে উদরাগ্নান, কোষ্ঠকাঠিন্য, মূত্রের বিবদ্ধতা, মূত্রাশয় ও জননেন্দ্রিয়ের জ্বালা যন্ত্রণা প্রভৃতি বিনাশের জন্য, বিশেষতঃ বায়ু ও পিত্তের ক্ষমতা উৎপাদন করিয়া শরীর শিথিলকরণের জন্য এই ঔষধ ব্যবস্থা করিবে । ইহার ২।১টি বটী প্রয়োগ করিলেই সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া যায় ।
অম্বপান—চাউলধোয়া জল বা ত্রিফলার জল ও যথু ।

চিন্তামণি । প্রস্তুতবিধি ৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

চতুর্মূৰ্খ । মূত্রাঘাতের যে যে অবস্থায় চিন্তামণি প্রয়োগ করা যায়, সেই সেই অবস্থায় চতুর্মূৰ্খ প্রয়োজ্য । অম্বপান—চাউলধোয়া জল বা ত্রিফলার জল ।

চতুর্মূৰ্খ । প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

যোগেন্দ্ররস । চিন্তামণি বা চতুর্মূৰ্খ প্রয়োগে ফল না হইলে কিম্বা রোগ সমূলে বিনাশের জন্য এই ঔষধ প্রয়োগ করা অতি প্রয়োজন । অম্বপান—চাউলধোয়া জল বা ত্রিফলার জল ।

যোগেন্দ্র রস । প্রস্তুতবিধি ৬০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

উশীরাদ্যতৈল । মূত্রাঘাতে বায়ুর ক্লেশতা বিনাশ করিয়া শরীর শিথিল করিতে ইহার অদ্বুত ক্ষমতা । সর্কাদ্বে ও উদরে মালিশ করা কর্তব্য । বাত-জনিত বেদনা ও পিত্তজন্ত বস্তি, জননেন্দ্রিয় ও গাত্রদ্বাৰে ইহা ব্যবস্থা করা উচিত । এই তৈল যেমন বায়ুপিত্ত নাশক, তেমনই মূত্রের বিবদ্ধতা বিনাশক অথচ বলপুষ্টিকারক ।

উশীরাভ্যন্তর । প্রস্তুতবিধি ১১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

ত্রিকটকাদ্য স্নাত । মূত্রাঘাতে উদরাগ্নান বা অগ্নিমান্দ্য না থাকিলে অথচ বায়ুজন্ত বস্তি ও জননেন্দ্রিয়ে বেদনা, কোষ্ঠকাঠিন্য, মূত্রের বিবদ্ধতা, মূত্রনির্গম-কালে যাতনা, ক্লেশতা, কুঙ্কি-বেদনা, পিত্তের প্রকোপ বশতঃ

মূত্রাশয়ে, জননেদ্রিয়ে বা গাত্রে দাহ, সরক্ত বহ্নিরক্তবর্ণ মূত্রনির্গমন, সরুধারায় মূত্র প্রবর্তন, প্রস্রাবের অগ্রে বা পশ্চাতে ভস্মমিশ্রিত জলের স্রাব হওয়া এবং বাতকুণ্ডলিকা প্রভৃতি সর্বপ্রকার মূত্রাঘাতের যে কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই দ্রব্য রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অন্নপান—উষ্ণ দুগ্ধ । ইহা শুষ্ক বর্জক এবং বল ও পুষ্টিকারক ।

ত্রিকণ্টকাদ্য দ্রব্য । প্রস্তুতবিধি ২৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

মূত্রাঘাতে—পথ্যাপথ্য ।

পথ্য । রোগের প্রথম অবস্থায় অন্নাহার বন্ধ করিয়া দুগ্ধসাপ্ত অথবা দুগ্ধসহ সাপ্ত ও কিস্মিস্ দ্বারা পায়স প্রস্তুত করিয়া আহার করিতে দিবে। দুগ্ধ ও ধৈর্য মণ্ড এই অবস্থায় অতি উপকারী। পাতলা দান্ত হইলে, দুগ্ধ ও বার্গি পথ্য দিবে। এতদ্ব্যতীত সুপক নানাবিধ ফল এই রোগে অত্যন্ত উপকারী। ডাবের জল, ষোল, কেতুর, পানিফল, ডালিম, বেদানা, আনারস, কমলালেবু, পাতি বা কাগজীলেবু, আম, আমলকী, আতা, পেপে, কিস্মিস্, আঙ্গুর, প্রভৃতি সুপথ্য। রোগ প্রশমিত এবং দান্ত ও প্রস্রাব যথারীতি হইলে, মাছের কোল সহযোগে অন্নপথ্য দিবে। রোগ সমূলে আরোগ্য হইলে, ডাইল ও তরকারী আহার করা কর্তব্য নহে, তবে পটোল, আলু, সাচি কুমড়া প্রভৃতি আহার করিতে দেওয়া যায়।

অপথ্য । বিরুদ্ধ দ্রব্য, পরিশ্রম, পথপর্যটন, রাত্রিকাপরণ, রুদ্ধ বা পিত্তবর্জক দ্রব্য, মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগ-ধারণ ও বমনকারক দ্রব্য-সেবন এই রোগে পরিত্যাজ্য ।

অশ্মরীরোগ-চিকিৎসা ।

অশ্মরীরোগের সাধারণ লক্ষণ । অশ্মরীরোগ উৎপন্ন হইলে, নাভি, সেবনী ও মূত্রাশয়ের উপরিভাগে বেদনা হয়। অশ্মরী দ্বারা মূত্রধার রুদ্ধ হইলে বিচ্ছিন্ন ধারায় প্রস্রাব নির্গত হয়, মূত্ররন্ধ্র হইতে অশ্মরী অপসারিত

হইলে বিনা কষ্টে গোমেদের জ্বায় কিঞ্চিৎ লোহিতবর্ণ স্বচ্ছ মূত্র নির্গত হইয়া থাকে । অশ্মরীর বর্ষণে মূত্রনালীতে ক্ষত হইলে রক্তমিশ্রিত ঘন মূত্র নিঃসরণ হয় এবং প্রস্রাবের সময় কুহনহেতু অতিশয় বেদনা হইয়া থাকে ।

বাতিক অশ্মরীর লক্ষণ । বাতিক অশ্মরীরোগে পীড়িত ব্যক্তি আর্দ্রনাদের সহিত দন্তে দন্ত বর্ষণ করে, কম্পিত হয় এবং নাভিদেশ ও লিঙ্গ হস্তদ্বারা পীড়ন করে । প্রস্রাবের বেগ দিলে বায়ুসহ মল নির্গত হয় এবং যুহ্মূর্ছঃ বিন্দু বিন্দু মূত্র নিঃসৃত হইয়া থাকে । বাতাস্মরী শ্রাববর্ণ, ক্লষ্ণ ও কণ্টকদ্বারা আবৃতবৎ দৃষ্ট হয় ।

পৈত্তিক অশ্মরীর লক্ষণ । পৈত্তিক অশ্মরীরোগে পিত্তের প্রবলতা-বশতঃ মূত্রাশয়ে একরূপ দাহ উপস্থিত হয়, যেন অগ্নিদ্বারা মূত্রাশয় দগ্ধ হইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং অশ্মরী ভেলার বীজের জ্বায় আকৃতিবিশিষ্ট ও রক্ত, পীত বা ক্লষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

শ্লেষ্মিক অশ্মরীর লক্ষণ । শ্লেষ্মিক অশ্মরীরোগে শ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ রোগীর মূত্রাশয় শীতল, ভারবিশিষ্ট হয় ও তাহাতে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা হইয়া থাকে । অশ্মরী, বৃহৎ, মসৃণ ও গুরুবর্ণ বা মধুর জ্বায় বর্ণবিশিষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

অশ্মরীর স্তম্বসাধ্য লক্ষণ । বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক এই ত্রিবিধ অশ্মরী প্রায়শঃ বাল্যকালেই জন্মে, পরিণত বয়স্কের কদাচিৎ হইয়া থাকে । বাল্যকালে বালকগণের মূত্রাশয় ক্ষুদ্র থাকে, একজন্ম সহজে অঙ্গদ্বারা অশ্মরী গ্রহণ ও আহরণ করা যায় ।

শুক্লাশ্মরীর সংপ্রাপ্তি । শুক্রের বেগ ধারণ করিলে, শুক্রাশ্মরী জন্মে, এই রোগ বয়স্ক ব্যক্তিদিগেরই হয়, বালকগণের হয় না, কারণ তাহাদের জীর্ণমনেচ্ছা না থাকাতে শুক্রের বেগ থাকে না এবং শুক্র অবরুদ্ধ হয় না । কাম বেগবশতঃ স্বস্থানচ্যুত শুক্র স্থলিত না হইয়া বায়ুদ্বারা শিশ্ন ও অণ্ডকোষদ্বয়ের মধ্যগত মূত্রাশয়ের মুখে ধৃত ও শোষিত হইলে, শুক্রাশ্মরী উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

শুক্লাশ্মরীর লক্ষণ । শুক্রাশ্মরীরোগে শ্লোগীর মূত্রাশয়ে বেদনা ও কষ্টের সহিত মূত্র নির্গত হয় এবং অণ্ডকোষদ্বয়ে শোথ জন্মে । শুক্রাশ্মরীরোগ

উৎপন্ন হইবামাত্রই শুক্র স্থলিত হইতে থাকে এবং শিশ্ন ও অণ্ডকোষের মধ্যভাগ পীড়ন করিলে (টিপিলে) অশ্মরী অভ্যন্তরে লীন হয় ।

শর্করা ও সিকতার লক্ষণ । শর্করা ও সিকতা, পৃথক্ রোগ নহে, অশ্মরীরোগের প্রকার ভেদ মাত্র । অশ্মরী বায়ুদ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া চিনির তায় আকার হইলে, তাহাকে শর্করা এবং বালুকা কণার মত হইলে, তাহাকে সিকতাস্মরী কহে । শর্করা ও সিকতারোগে বায়ুর অমূলোমতা থাকিলে, মূত্রের সহিত ঐ শর্করা ও সিকতা বহির্গত হয় ; কিন্তু বায়ু প্রতিলোমগামী হইলে, মূত্রনলী রুদ্ধ হয় এবং মূত্ররন্ধ্রের সহিত সংলগ্ন হইয়া নানা প্রকার উপদ্রব উৎপাদন করে । শর্করা অপেক্ষা সিকতার রেণু সমূহ হৃদয়তর ।

অশ্মরী, শর্করা ও সিকতার অসাধ্য লক্ষণ । অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগে রোগীর নাভিতে ও অণ্ডকোষদ্বয়ে শোথ এবং মূত্ররোধ হইলে, রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয় ।

অশ্মরীর উপদ্রব । অশ্মরীরোগে রোগীর দুর্বলতা, শরীরের অবসন্নতা, কৃশতা, হৃদয় ও কৃক্ষি বেদনা, অরুচি, পাণ্ডু, উষ্ণবাত নামক মূত্রাবাত, তৃষ্ণা, হ্রদ্রোগ, বমি, কম্প, অগ্নিমান্দ্য, মুচ্ছা এবং প্রস্রাবকালে রোগীর দুঃসহ বহন হয় ।

অশ্মরীরোগ-চিকিৎসা-বিধি ।

যেদ্রুপ গোপিতে পোরোচনার উৎপত্তি হয়, নানা কারণে প্রকুপিত বায়ু শুক্র সহ মূত্রাশয়স্থিত মূত্রে অথবা পিত্তসহ শ্লেষ্মাকে শুক্র করিলে, তদ্রূপ অশ্মরী অর্থাৎ পাথরী জন্মে । অশ্মরী চারি প্রকার, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক ও শুক্রজ । শুক্রজ অশ্মরী শুক্র হইতে উৎপন্ন হয় । সর্বপ্রকার অশ্মরী রোগেই ত্রিদোষের প্রভাব বর্তমান, কিন্তু তৎসম্বন্ধে চতুর্বিধ অশ্মরীর মধ্যে বাতাদি ত্রিবিধ অশ্মরীরোগে শ্লেষ্মার প্রবলতা থাকে । যথাসময়ে চিকিৎসা না করিলে অশ্মরীরোগ যথেষ্ট ত্রায় জীবন নষ্ট করে । অশ্মরীরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বে মূত্রাশয়ের স্ফীততা, মূত্রাশয়ের নিকটবর্তী চতুষ্পাঞ্চে অভ্যন্ত বেদনা, প্রস্রাবে ছাগলের মূত্রের ত্রায় গন্ধ, মূত্রকৃষ্ণ, অর এবং অরুচি জন্মে ।

মূত্রকৃচ্ছ ও মূত্রাঘাতের সহিত অশ্মরীর বিভিন্নতা এই—মূত্রকৃচ্ছ ও মূত্রাঘাত সহসা উৎপন্ন হয় এবং চিকিৎসা করিলে, অল্পকালের মধ্যেই প্রশমিত হয়, কিন্তু অশ্মরী ক্রমশঃ বা দীর্ঘকালে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ অল্প অল্প করিয়া বাড়ে, সুতরাং সহসা মূত্র-নালী ও মূত্র অবরুদ্ধ হয় না ।

সাধারণতঃ মূত্রকৃচ্ছ অপেক্ষা মূত্রাঘাত এবং মূত্রাঘাত হইতে অশ্মরীরোগ কঠিন । মূত্রকৃচ্ছ ও মূত্রাঘাত পুরাতন হইলেও ঔষধ প্রয়োগ করা যায় এবং আরোগ্য হয়, কিন্তু অশ্মরীর পুরাতন অবস্থায় অঙ্গ-প্রয়োগ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই । অশ্মরী এবং শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছ এইজন্ত অগ্নাণ্ড মূত্রকৃচ্ছ অপেক্ষা অত্যন্ত কঠিন, কারণ অশ্মরী বা শর্করা দ্বারা মূত্রমার্গ অবরুদ্ধ হইলে, যে মূত্র-কৃচ্ছ উৎপন্ন হয়, তাহাতে যাবৎ অশ্মরী বা শর্করা স্থানচ্যুত হইয়া নির্গত না হয়, তাবৎ মূত্র সরলরূপে নির্গত হয় না ।

অশ্মরী রোগের পূর্বরূপ প্রকাশ পাইলে, অগ্নাণ্ড কাথ, অবলেহ ও বটিকা প্রভৃতি প্রয়োগের সঙ্গে জ্বরচিকিৎসোক্ত স্বল্প পঞ্চমূলকাথ, দশমূলকাথ, দ্বাদ-শাঙ্গ কাথ, চতুর্দশাঙ্গ কাথ বা অষ্টাদশাঙ্গ কাথ সেবন করাইবে, অনন্তর ঐ কাথ সেবনে জ্বর হ্রাস পাইলে বায়ু ও পিত্তনাশক তৈল দ্রুতাদি প্রয়োগ করিবে, কারণ তৈল দ্রুতাদি দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ বা বিগুণ বায়ু ও কুপিত পিত্ত প্রকৃতিস্থ না হইলে রোগ প্রশমনের বা রোগের মূলোচ্ছেদ অসম্ভব ।

বাতিক অশ্মরীরোগে গোক্ষুরযোগ, শুষ্ঠাদি কাথ, এলাদি কাথ বা বরুণাদি কাথ, বৃহৎ বরুণাদি কাথ এবং বরুণাণ্ডচূর্ণ ব্যবস্থা করিবে । বায়ু ও পিত্তের সমতার জন্তু চিস্তামণি বা যোগেন্দ্র রস এবং উশীরাদি তৈল বা বীর-তরাণ্ড তৈল এবং পাষাণভেদাদ্য চূর্ণ ও পাষাণভেদাদ্য দ্রুত ব্যবস্থা করা যায় । তৈল সর্ক্সাঙ্গে বিশেষতঃ উদরে মাখাইয়া রোগীকে স্থান করাইবে । তৈল-মর্দন ও দ্রুত সেবন দ্বারা এই রোগে মহোপকার দর্শে । উক্ত তৈল দ্বারা জননেন্দ্রিয়ে পিচ্কারী প্রয়োগ করিলেও অসীম উপকার হয় ।

পৈত্তিক অশ্মরীরোগে বৃহৎ বরুণাদি কাথ, তৃণপঞ্চমূল ক্ষীর, কুশাবলেহ, বরুণাণ্ড দ্রুত বা কুশাণ্ড দ্রুত এবং চিস্তামণি, যোগেন্দ্র রস প্রভৃতি ঔষধ সেব-নের ও উশীরাদি তৈল রোগীর স্নর্ক্সাঙ্গে ও উদরে মর্দনের ব্যবস্থা করিবে । উক্ত তৈল দ্বারা পিচ্কারী প্রয়োগ করা যায় ।

শ্লেষ্মিক অশ্মরীরোগে গোকুরযোগ, শুষ্ঠাাদি কাথ, বরুণাদি কাথ বা বৃহৎ বরুণাদি কাথ অথবা এলাদি কাথ, বরুণাঙ্গ চূর্ণ, পাষণভেদাদ্য চূর্ণ ও পাষণ-ভেদাদ্য ঘৃত এবং বীরতরাদ্য তৈল বা ত্রণরোগোক্ত সৈন্ধবাঙ্গ তৈল প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে । উক্ত তৈল দ্বারা পিচ্কারী প্রয়োগ করা যায় । এই রোগে শোথরোগোক্ত পুনর্ণবাষ্টক কাথ, পুনর্ণবাদি চূর্ণ, পুনর্ণবাদি তৈল, শুষ্ঠী ঘৃত ও পুনর্ণবাদি ঘৃত প্রয়োগ করা যায় ।

শুক্রাশ্মরীরোগের চিকিৎসা শ্লেষ্মিক অশ্মরীরোগের তায় করিবে । এই রোগে গোকুরযোগ, শুষ্ঠাাদি কাথ, বরুণাদি কাথ, এলাদি কাথ বা বৃহৎ বরুণাদি কাথ, পাষণভেদাদ্য চূর্ণ ও পাষণভেদাদ্য ঘৃত এবং বীরতরাদ্য তৈল বা ত্রণরোগোক্ত সৈন্ধবাদ্য তৈল প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে । এই রোগে শোথ-রোগোক্ত পুনর্ণবাষ্টক কাথ, পুনর্ণবাদি চূর্ণ, শুষ্ঠীঘৃত, পুনর্ণবাদি ঘৃত ও পুন-র্ণবাদি তৈল প্রয়োগ করা যায় ।

শর্করা ও সিকতার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তিলাদ্য কাথ, পাষণভেদাদ্য-চূর্ণ, বরুণাঙ্গ চূর্ণ, পুনর্ণবা কক্ক, বরুণাদি বা বৃহৎ বরুণাদি প্রভৃতি কাথ, উশী-রাদ্য, বীরতরাদ্য বা কুশাদ্য তৈল, কুশাবলেহ, বরুণাদ্যলৌহ, বরুণাঙ্গ ঘৃত (যতান্তরে) এবং চিস্তামণি বা যোগেন্দ্র রস প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে ।

অশ্মরী, শর্করা ও সিকতার অরিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, শোথ রোগোক্ত পুনর্ণবাষ্টক কাথ, পুনর্ণবাদি চূর্ণ, পুনর্ণবাদি তৈল, শুষ্ঠী ঘৃত ও পুনর্ণবাঘৃত ব্যবস্থা করিবে ।

অশ্মরীরোগে মূত্রনালীতে ক্ষত ও তজ্জন্ত রক্ত নির্গত হইলে, পৈত্তিক অশ্মরীরোগোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত ।

অশ্মরীরোগে-ঔষধ ।

শুষ্ঠাাদি কাথ । বাতিক, শ্লেষ্মিক ও শুক্রাশ্মরীরোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে ।

শুষ্ঠাাদি কাথ । প্রস্ততবিধি ৯৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

এলাদি কাথ । বাতিক, শ্লেষ্মিক না শুক্রাশ্মরীরোগের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে, এই ঔষধে শিলাজতু প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

এলাদি কাথ । এলাচি, শিশুলা, বটমণ্ড, পাথরকুচি, রেংকা, গোক্ষুর, বাসকছাল ও ভেরেণ্ডার মূলের ছাল ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

বরুণাদি কাথ । বাতিক, শ্লেষ্মিক ও শুক্রাশ্মরীরোগের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

বরুণাদি কাথ । প্রস্তুতবিধি ৯৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বৃহৎ বরুণাদি কাথ । বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক ও শুক্রাশ্মরীরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং জননেদ্রিয় হইতে রক্ত নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । প্রক্ষেপ-যবক্ষার ৩ রতি ।*

বৃহৎ বরুণাদি কাথ । প্রস্তুতবিধি ৯৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

গোক্ষুর যোগ । বাতিক, শ্লেষ্মিক ও শুক্রাশ্মরীরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই যোগ সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবনে অশ্মরী নিপতিত হয় ।

গোক্ষুর যোগ । গোক্ষুর, কুলেথাড়া, ভেরেণ্ডার মূল, ব্যাকুড় ও কণ্টকারী ; এই পাঁচটা দ্রব্য সমভাগে মিলিত অর্দ্ধতোলা, দুক্ষে পেষণ করিয়া সেবন করিতে দিবে ।

কুশাবলেহ । বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, শুক্রাশ্মরী এবং শর্করা ও সিকতার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথবা প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগে মূত্রমার্গদ্বারা রক্ত নির্গত হইলে, এই ঔষধ অমৃতের দ্বারা উপকারী । অনুপান—ত্রিফলার জল ।

কুশাবলেহ । প্রস্তুতবিধি ৯২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

তৃণপঞ্চমূল ক্ষীর । পৈত্তিক অশ্মরীরোগে বা মূত্রমার্গদ্বারা রক্ত নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

তৃণপঞ্চমূলক্ষীর । প্রস্তুতবিধি ২৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

তিলাদ্য কাথ । শর্করা ও সিকতার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই কাথ সেবন করিতে দিবে ; ইহা সেবনে শর্করা ও সিকতা মূত্রমার্গ দ্বারা বহির্গত হইয়া যায় ।

তিলাদ্য কাথ । তিল, আপাং, কদলমূল, গলাশছাল, -থব ও বেলগুঠ ; ইহারা সমভাগে মিলিত ২ তোলা, ছল ৩২ তোলা, শেব ৮ তোলা ।

পাষণভেদাদ্যচূর্ণ । বাতিক, শ্লেষ্মিক ও শুক্রজ অশ্মরী কিম্বা শর্করা ও সিকতারোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবনে অশ্মরী ভেদ হইয়া মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া থাকে ।
অম্বুপান—উষ্ণজল ।

পাষণভেদাচ্চ চূর্ণ । পাথরকুচি, বাসকছাল, গোক্ষুর, আকনাদি, হরীতকী, গুঠ, পিপ্পল, মরিচ, শঠা, দস্তীবীজ, কেলেকড়া, বনযমানী, শালিগুশাক, কাফুড়বীজ, শশাবীজ, কৃষ্ণজীরা, হিং, অন্নবেতস (থৈকল); বৃহতী, কণ্টকারী, ধনে ও বচ ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে । মাত্রা চারি আনা ।

বরুণাদ্যচূর্ণ । বাতিক, শ্লেষ্মিক, শুক্রজ এবং শর্করা ও সিকতা অশ্মরীর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবনে অতি শীঘ্র অশ্মরী ভেদ হইয়া পতিত হয় । এতদ্ব্যতীত মূত্রাশয়গত রোগ অর্থাৎ মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাঘাত, বিশেষতঃ শর্করা, সিকতা ও অশ্মরী-জনিত মূত্রকৃচ্ছ ইহা অতি উপকারী । বাতবস্তি, বস্তিকুণ্ডল ও মূত্রাণ্ণীনা-রোগে ইহা অসাধারণ ফলপ্রদ ।
অম্বুপান—উষ্ণজল ।

বরুণাচ্চ চূর্ণ । বরুণছাল চূর্ণ ১ ভাগ, ববকার রন্ধভাগ ও পুরাতন ইক্ষুগুড় সিকি ভাগ, রথ সল একত্র মর্দন করিবে । মাত্রা চারি আনা ।

চিন্তামণি । অশ্মরীরোগে বায়ুর প্রকোপবশতঃ বস্তিদের অর্থাৎ মূত্রাশয় স্ফীত ও পিত্তের প্রকোপ বশতঃ মূত্রাশয়ে অত্যন্ত দাহ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । শর্করা ও সিতকার প্রথম অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু অরিষ্ট লক্ষণ অর্থাৎ অণ্ডকোষ বা নাভিতে শোথ দৃষ্ট হইলে অথবা শ্লেষ্মিক ও শুক্রজ অশ্মরীরোগে প্রযোজ্য নহে ।
অম্বুপান—ত্রিকলার জল ।

চিন্তামণি । প্রস্তুতবিধি ৬৬ পৃষ্ঠাঃ দ্রষ্টব্য ।

যোগেন্দ্ররস । অশ্মরীরোগে বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ বশতঃ নানা-

বিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। যে যে অবস্থায় চিন্তামণি প্রযোজ্য, সেই সেই অবস্থায় সেই অনুপানে ইহা প্রয়োগ করা যায়।

যোগেন্দ্র রস। প্রস্তুতবিধি ৬০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বরুণাদ্যলৌহ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক ও শুক্রজ অশ্মরীরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ রোগীর তৎসঙ্গে অন্ন জ্বর থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা মূত্রকৃচ্ছ ও মূত্রাবাতরোগে এবং মেহরোগে মূত্রকৃচ্ছের লক্ষণ কিস্বা বস্তি ও জননেন্দ্রিয়ের প্রদাহ প্রকাশ পাইলে, ব্যবস্থা করা যায়। অনুপান—চাউল ধোয়া জল বা গ্রিফলার জল।

বরুণাদ্য লৌহ। প্রস্তুতবিধি ৯১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উশীরাদ্য তৈল। বাতিক ও পৈত্তিক অশ্মরীরোগের যে কোন অবস্থায় এবং শর্করা ও সিকতার প্রথম অবস্থায় এই তৈল রোগীর সর্সঙ্গে ও বিশেষতঃ উদরে মর্দন করিতে দিবে।

উশীরাদ্য তৈল। প্রস্তুতবিধি ৯৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শিলোদ্ভেদাদি তৈল। শ্লেষ্মিক ও শুক্রজ অশ্মরীরোগে এবং শর্করা ও সিকতার অরিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল উদরে মর্দনের ব্যবস্থা করিবে। তৈল মর্দন করিয়া উষ্ণ গোমূত্রপূর্ণ বোতল দ্বারা উদরে সেক দিবে।

শিলোদ্ভেদাদি তৈল। তিল তৈল /৪ সের। মুছাপাক করিবে। পুনর্ববার রস /৮ সের ও শতমূলীর রস /৮ সের। কন্ধদ্রব্য—পাথরকুচি, ভেরেণ্ডার মূল ও শালপাণী সমভাগে মিলিত এক সের। পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

বীরতরাদ্য তৈল। বাতিক ও পৈত্তিক অশ্মরীরোগের সর্সবস্থায় এবং শ্লেষ্মিক ও শুক্রজ অশ্মরীর পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ শোথ ও জ্বর না থাকিলে, এই তৈল উদরে ও সর্সঙ্গে মালিশ করিতে দিবে।

বীরতরাদ্য তৈল। তিল তৈল /৪ সের। যথাবিধি মুছাপাক করিবে। কাষ্যদ্রব্য—শরমূল, গণিয়ারী, কাশমূল, পরগাহা, কুণ্ঠমূল, ইক্ষুমূল, শতমূলী, পাথরকুচি, গোক্ষুর, গোণাছাল, আকন্দমূল, ছড়ছড়ে, উল্লুং, নালকিটী, পীতকিটী, বক্রগহাল, গুলফ, মলমূল ও গজপিপূল, ইহার সমভাগে মিলিত ১২৯০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কন্ধদ্রব্য—সৈন্ধব, ময়নাফল, কুড়, গুল্ফা, অন্নবেতস, বচ, বালা, বটমধু, বামনহাটী, দেবদারু, শুঠ, কটকল, কুড়, মেদ, চই, রক্তচিটা, শর্ষা, বিড়ঙ্গ, আতৈব, তেউড়ী, রেণুকা, নীলমূল, শাল-

পাণী, বেলগুঁঠ, জীরা, পিপুল, দস্তী ও রান্না ; ইহারা সমভাগে মিলিত এক সের। দুই আট সের। যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে ।

কুশাদ্য তৈল । বাতিক ও পৈত্তিক অশ্মরীরোগে এবং শর্করা ও সিকতার প্রথম অবস্থায় বিশেষতঃ মূত্রমার্গ দ্বারা রক্ত নির্গত হইলে, এই তৈল রোগীর সর্বাঙ্গে ও উদরে মর্দন করিতে দিবে । ঐ সকল রোগে এবং গ্লেয়িক ও শুক্রাশ্মরীরোগে বায়ুর অমূলোমনার্ঘ ইহা দ্বারা জননেন্দ্রিয়ে উত্তর-বস্তি ও মলদ্বারে বস্তি প্রয়োগ করা যায় । ইহা মূত্রকৃচ্ছ এবং মূত্রাঘাতেও প্রয়োগ করা যায় । সর্বপ্রকার অশ্মরীরোগে এই তৈল উষ্ণ দুগ্ধসহ পান করিতে দেওয়া যায় ।

কুশাদ্য তৈল । প্রস্তুতবিধি ৪৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বরুণ তৈল । বাতিক ও পৈত্তিক অশ্মরীরোগের সর্বাবস্থায় এবং গ্লেয়িক ও শুক্রাশ্মরীরোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল রোগীর উদরে ও সর্বাঙ্গে মর্দনের ব্যবস্থা করিবে । শর্করা এবং সিকতার প্রথম অবস্থায় ও মূত্রকৃচ্ছ এবং মূত্রাঘাতে ইহা অতি উপকারী ।

বরুণতৈল । তিল তৈল ৪ সের। মুছা পাক করিবে । কাথ্যদ্রব্য—বরুণছাল ৪ সের ও গোক্ষুর ৪ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে ।

তৃণপঞ্চমূল ঘৃত । বাতিক ও পৈত্তিক অশ্মরীরোগের সর্বাবস্থায় এবং গ্লেয়িক ও শুক্রাশ্মরীর পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ শোথ না থাকিলে, বিশেষতঃ অশ্মরীরোগে মূত্রনলীতে ক্ষত ও তজ্জন্ম মূত্রমার্গ দ্বারা রক্ত নির্গত হইলে, এই ঘৃত সেবন করাইবে । শর্করা ও সিকতার প্রথম অবস্থায় এবং মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাঘাতেও ইহা অতি উপকারী । অল্পপান—উষ্ণ দুগ্ধ ।

তৃণপঞ্চমূল ঘৃত । গব্য ঘৃত ৪ সের। যথাবিধি মুছা পাক করিবে । কাথ্যদ্রব্য—কৃশ, কাশ, শর, উলু ও কৃষ্ণ ইক্ষু, ইহাদের মূল সমভাগে মিশ্রিত ৬০ সের এবং গোক্ষুর ৬০ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । কঙ্কদ্রব্য—গোক্ষুর এক সের । যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা অধিক তোলা হইতে ১ তোলা ।

বরুণাদ্যঘৃত । বাতিক ও পৈত্তিক অশ্মরীর সর্বাবস্থায় এবং গ্লেয়িক ও শুক্রাশ্মরীর পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ শোথ ও জ্বর না থাকিলে, এই ঘৃত

রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শর্করা ও সিকতারোগের প্রথম অবস্থায় এই ঘৃত অতি উপকারী। মূত্রকৃচ্ছ এবং মূত্রাঘাতেও ইহা প্রয়োগ করা যায়।
অমুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

বরুণাদ্য ঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথাবিধি মুচ্ছা পাক করিবে। কাথ্য-
দ্রব্য—বরুণ-ছাল ১২।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কঙ্কদ্রব্য—বরুণছাল, কদলী-
মূল, বেল-ছাল, কৃষ্ণ, কাশ, শর, উলু ও কৃষ্ণ ইক্ষুর মূল, গুলঞ্চ, পাখরকুটি, শশাবীজ,
শাশেরমূল, তিলডাটার ক্ষার, পলাশছালের ক্ষার ও যুইমূল, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা।
যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ৯০ তোলা হইতে ১ তোলা।

বরুণাদ্যঘৃত (মতান্তরে)। গ্লেয়িক ও শুক্রজ অশ্মরীরোগে এবং
শর্করা ও সিকতার পুরাতন অবস্থায় এই ঘৃত অতি উপকারী। ইহা সেবন
করিলে গ্লেয়িক অশ্মরীরোগে মূত্রাশয়ের ভার, শীতলতা ও বেদনা প্রভৃতি
এবং শুক্রাশ্মরীরোগে মূত্রাশয়ের বেদনা, অণ্ডকোষের ফুলা হ্রাস পায় ও
অশ্মরী নিপতিত হইয়া থাকে। শর্করা ও সিকতারোগে জ্বর বা অগ্নিমান্দ্য
না থাকিলে, এই ঘৃত প্রয়োগ করা যায়। অমুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

বরুণাদ্য ঘৃত (মতান্তরে)। ছাগঘৃত /৪ সের। যথাবিধি মুচ্ছা পাক করিবে। কাথ্য-
দ্রব্য—বরুণ-ছাল; হোগলা মূল; শজিনা, জয়ন্তী, নাটাকরঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, ইক্ষু মূল, গণিয়ারী,
বেল-ছাল, তেলাকুচার মূল, বকবৃক্ষেরছাল, রক্তচিটা, নীলবিণ্টী, পীতবিণ্টী, হুড়ুডে, রক্ত-
শজিনা, মেঘশৃঙ্গী, শতমূলী, উলুগুড়, বৃহতী ও কণ্টকারী ; সমভাগে মিলিত ১২।০ সের, জল
৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কঙ্কদ্রব্য—শোধিত গুণ্ডুলু, এলাচি, রেণুকা, কুড়, মুখা, মরিচ,
রক্তচিটা, দেবদারু, ক্ষারমুক্তিকা, সৈন্ধব, হিং, ষাটুকাশীশ, পুষ্পকাশীশ, গুণ্ডুলু, শিলাজতু
ও তুতিয়া ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া
লইবে। মাত্রা—অর্দ্ধতোলা হইতে ১ তোলা।

পুনর্গবা কঙ্ক। গ্লেয়িক ও শুক্রাশ্মরীরোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে।
ইহাতে শোধ ও অশ্মরী উভয়ই বিনষ্ট হয়। অমুপান—দুগ্ধ।

পুনর্গবা কঙ্ক। খেতপুনর্গবা, লৌহ, হরিদ্রা, গোমুত্র, প্রিয়ঙ্গু, এবাল ও উলুগুড়ের পুষ্প,
প্রত্যেকে সমভাগ, দুগ্ধদ্বারা পেষণ। মাত্রা চারি আনা।

অশ্মরীরোগে-দুর্বলতা, অবসন্নতা, কম্প ও ক্রশতা-চিকিৎসা।

ছাগলাদ্য ঘৃত। অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগে রোগীর প্রবল জ্বর

বা অগ্নিমান্দ্য না থাকিলে অথচ বায়ুর কক্ষতা বশতঃ অত্যধিক দুর্বলতা, অবসন্নতা, কম্প, জীর্ণজ্বর ও কৃশতা লক্ষিত হইলে, এই দ্রুত রোগীকে সেবন করিতে দিবে । বাতপিত্ত প্রধান রোগীর পক্ষে ইহা অতি প্রশস্ত ।
অন্নপান—উষ্ণ দুগ্ধ ।

ছাগলাদ্য দ্রুত । প্রস্তুতবিধি ৬১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বৃহৎ ছাগলাদ্য দ্রুত । অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগে প্রবল জ্বর বা অগ্নিমান্দ্য না থাকিলে অথচ বায়ুর কক্ষতা বশতঃ রোগীর অত্যধিক দুর্বলতা, অবসন্নতা, কৃশতা, জীর্ণজ্বর, কোষ্ঠবদ্ধতা ও কম্প প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই দ্রুত রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

বৃহৎ ছাগলাদ্য দ্রুত । প্রস্তুতবিধি ৬১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

অশ্মরীরোগে-মূচ্ছা-চিকিৎসা ।

মহেন্দ্রসূর্য রস । অশ্মরীরোগে পাথরীদ্বারা মূদ্রনলী অবরুদ্ধ হইলে, মূত্র নির্গম-কালে অত্যধিক যন্ত্রণা বশতঃ রোগী মূচ্ছাভিত্ত হইয়, ঐ অবস্থায় এই ঔষধ রোগীর নাসিকাভ্যন্তরে প্রয়োগ করিবে ।

মহেন্দ্রসূর্য রস । প্রস্তুতবিধি ৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

চতুর্মুখ রস । শর্করা ও সিকতারোগে শর্করা ও সিকতা বহির্গত না হইলে কিম্বা অশ্মরীরোগে রোগী মূচ্ছাভিত্ত হইলে, নস্যপ্রয়োগ দ্বারা মূচ্ছা-ভঙ্গ করিয়া এই ঔষধ রোগীকে প্রয়োগ করিবে । বায়ুদ্বারা রোগীর শরীর কক্ষ হইলে এবং তজ্জন্ম দুর্বলতা, মূচ্ছা, উদরাগ্নান, কম্প, অবসন্নতা, জীর্ণজ্বর ও কৃশতা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, ইহা প্রয়োগে অসাধারণ উপকার হয় । পরন্তু মেহ-দোষ থাকিলে, তাহাও ইহাতে দূরীভূত হইয়া থাকে । বিশেষতঃ ইহা দ্বারা বায়ুর অহুলোমতা হয় বলিয়া কোষ্ঠশুদ্ধি হয় । ঐ সকল রোগে কৃষ্ণিশূল, বমি ও তৃষ্ণা প্রভৃতি উপসর্গও এই ঔষধের প্রভাবে বিনষ্ট হইয়া থাকে । এই অবস্থায় চিন্তামণি, চিন্তামণিচতুর্মুখ বা যোগেন্দ্ররস প্রয়োগে সমধিক উপকার দর্শে ।
অন্নপান—ত্রিকলার জল বা চাউলধোয়া জল ।

চতুর্মুখ রস । প্রস্তুতবিধি ৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

অশ্মরীরোগে—মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত-চিকিৎসা ।

তৃণপঞ্চমূল-ক্ষীর । অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগে রোগীর মূত্রনলী অবরুদ্ধ হইলে, দ্রবন্ত মূত্রকৃচ্ছ্র ও উষ্ণঘাত নামক মূত্রাঘাত উপস্থিত হয়, ঐ অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে ।

তৃণপঞ্চমূল-ক্ষীর । প্রস্তুতবিধি ২৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

কুশাবলেহ । অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগে সুদারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র বা মূত্রাঘাত উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

কুশাবলেহ । প্রস্তুতবিধি ৯২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বরুণাদ্যলৌহ । অশ্মরীরোগে মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । অস্থপান—ত্রিফলার জল ।

বরুণাদ্য লৌহ । প্রস্তুতবিধি ৯৬৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

অশ্মরীরোগে—হৃদ্রোগ-চিকিৎসা ।

অর্জুনাদি ক্ষীর । অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগে হৃদ্রোগ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা প্রয়োগে বক্ষঃস্থলের জ্বালা, তৃষ্ণা, গাত্রদাহ, হৃদয়ের ঘ্রানি ও মূর্ছা প্রভৃতি বিদূরিত হয় ।

অর্জুনাদি ক্ষীর । প্রস্তুতবিধি ৭৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

চিন্তামণি । অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগে হৃদ্রোগ প্রকাশ পাইলে এবং তজ্জন্ম হৃদয়ে অসহ বেদনা, ভারবোধ, অগ্নিমান্দ্য ও ফুস্ফুসে উৎকর্ষ বেদনা হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা দ্বারা রোগীর মূর্ছা, কৃষ্ণিশূল, অবসাদ প্রভৃতি উপসর্গ দূরীভূত এবং বল ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয় । রোগীর প্রমেহ দোষ থাকিলে, ইহা দ্বারা তাহাও বিনষ্ট হয় । ঐ সকলরোগে মূত্রাঘাত বা মূত্রকৃচ্ছ্রতা থাকিলে, এই ঔষধে উপকার দর্শে । ইহা বায়ুর অম্ললোমক বলিয়া কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ও বায়ুজনিত ক্লমতানাশক । অস্থপান—ত্রিফলার জল ।

চিন্তামণি । প্রস্তুতবিধি ৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

অশ্মরীরোগে—অরুচি-চিকিৎসা ।

আমলাদ্য যোগ । অশ্মরী, শর্করা বা সিকতারোগে রোগীর অরুচি হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

আমলাদ্য যোগ । প্রস্তুতবিধি ৫০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

অশ্মরীরোগে—বমন-চিকিৎসা ।

চন্দনাদি যোগ । অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগে রোগীর বমন হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহাতে কণ্ঠজ্বালা, মুর্ছা, পিপাসা প্রভৃতি উপসর্গও প্রশমিত হয় । অহুপান—চাউলধোয়া জল ও মধু ।

চন্দনাদি যোগ । প্রস্তুতবিধি ৪৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

অশ্মরীরোগে—তৃষ্ণা-চিকিৎসা ।

তৃণপঞ্চমূল পানীয় । অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগে পিত্তাধিক্য-বশতঃ রোগীর অত্যধিক পিপাসা হইলে, এই পানীয় অল্প অল্প করিয়া পান করিতে দিবে । ইহাতে প্রমেহ, দাহ, মুর্ছা এবং অশ্মরী প্রভৃতিও উপশমিত হয় ।

তৃণপঞ্চমূল পানীয় । প্রস্তুতবিধি ৪৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

কাশ্মর্যাদি পানীয় । অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগে পিত্তাধিক্য-বশতঃ প্রবল তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে অল্প অল্প পরিমাণে পান করিতে দিবে । ইহা প্রয়োগে দাহ, ঘর্ম্ম, বমন, কোষ্ঠবদ্ধতা, বাত বা পিত্তপ্রিত্ত জীর্ণজ্বর, মেহ ও অশ্মরী প্রভৃতি বিনষ্ট হয় ।

কাশ্মর্যাদি পানীয় । প্রস্তুতবিধি ৪৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

অশ্মরীরোগে—পাণ্ডু-চিকিৎসা ।

অষ্টাদশাঙ্গ লৌহ । অশ্মরীরোগে পাণ্ডুর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ তৎসঙ্গে রোগীর অগ্নিমান্দ্য বা পাতলা দান্ত হইলে, এই ঔষধ

সেবন করিতে দিবে । প্রমোহ দোষ বিজ্ঞমান থাকিলে, তাহাও ইহাতে বিনষ্ট হয় ।

অষ্টাদশাঙ্গ লোহ । প্রস্তুতবিধি ৯৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

অশ্মরীরোগে—পথ্যাপথ্য ।

অশ্মরীরোগে, কুলথকলায়, যুগ, মসুর বা ছোলার ডাইলের পাতলা যুগ, পটোল, ডুমুর, চালকুমড়া ও কুমড়ার ডাটা প্রভৃতির তরকারী, মাগুর, কই, খলিসা, ছোট রুই প্রভৃতির খোল, অণ্ডজপ্রাণীর মাংসের যুগ, পুনর্নবা শাক, শালপাণীশাক, আদা ও পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন এবং প্রবল জ্বর বিজ্ঞমান থাকিলে দুধ বালি, দুগ্ধ ও ঐষর মণ্ড পথ্য দিবে । কিস্মিস, বেদানা, আঙ্গুর, সুমিষ্ট কমলালেবু ও আনারস এবং তরল দ্রব্য সুপথ্য । স্নান* সহ্যমত, দ্রবদুগ্ধ জলে বা ঠাণ্ডা জলে করিতে দিবে । এই রোগে মূত্র বা শুক্রের বেগধারণ, অন্নরসবিশিষ্ট দ্রব্য, ক্রুদ্ধ বা বায়ুবদ্ধক দ্রব্য, কঠিন দ্রব্য, গুরুপাক-দ্রব্য, সংযোগবিরুদ্ধ অন্ন ও পানীয় পরিত্যজ্য ।

ত্রণ-শোথ-চিকিৎসা ।

(ইনফ্রামেশন ও য্যাব্‌সেস্ ।)

ত্রণ-শোথের সাধারণ লক্ষণ । ত্রণ উৎপন্ন হইবার পূর্বে শরীরের কোন স্থান প্রদাহিত হইয়া ফুলিয়া উঠে ।

বাতিক ত্রণ-শোথের লক্ষণ । যে ত্রণ-শোথ পাতলা চর্ম্মবিশিষ্ট, রক্তবর্ণ বা রক্তবর্ণ, যে শোথে কখনও বেদনা থাকে, কখনও বা থাকে না এবং টিপিলে যে শোথ ঢালু হয় ও হস্ত প্রদান করিলে কর্কশ (ধস্‌ধসে) বোধ হয়, তাহাকে বাতিক শোথ কহে ।

পৈত্তিক ত্রণ-শোথের লক্ষণ । যে ত্রণ-শোথ অতি কোমল অর্থাৎ যে শোথে হস্ত প্রদান করিলে, নরম বোধ হয়, যাহা দেখিতে পীত বা রক্তবর্ণ দেখায় এবং উষ্ণ, বেদনা ও দাহযুক্ত হয়, শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে ও পাকিয়া উঠে, তাহাকে পৈত্তিক ত্রণ-শোথ কহে ।

শ্লেষ্মিক ত্রণ-শোথের লক্ষণ । যে ত্রণ-শোথ শুক্রবর্ণ বা স্নিগ্ধ (চক্ চকে), পাণ্ডুবর্ণ, কঠিন, শীতল, টিপিলে ঢালু হয় না, পরন্তু কণ্ডুযুক্ত এবং বিলম্বে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও পাকে, তাহাকে শ্লেষ্মিক ত্রণ-শোথ কহে ।

সান্নিপাতিক ত্রণ শোথের লক্ষণ । যে ত্রণ-শোথে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক এই ত্রিবিধ ত্রণ-শোথের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকে সান্নিপাতিক ত্রণ-শোথ কহে ।

রক্তজ ত্রণ-শোথের লক্ষণ । রক্তজ ত্রণ-শোথ রক্তবর্ণ ও পৈত্তিক ত্রণ-শোথের লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া থাকে ।

আগন্তুক ত্রণ-শোথের লক্ষণ । অন্ন শব্দাদি দ্বারা কোনস্থান ক্ষত, ছিন্ন, ভিন্ন বা আহত হইলে, যে শোথ জন্মে, তাহাকে অভিঘাতজ শোথ কহে । ভল্লাতকের রস কিম্বা শুকশিখীর ফল শরীরের কোন স্থানে লাগিলে, সেই স্থান লাল হইয়া অনতিবিলম্বে ফুলিয়া উঠে । এই সকল আগন্তুক-শোথ গমনশীল, উষ্ণ ও রক্তবর্ণ এবং পৈত্তিক শোথের লক্ষণবিশিষ্ট । বিষধর-প্রাণী শরীরে বিচরণ করিলে অথবা তাহাদের মল, মূত্র, শুক্র ও লালা কোন অঙ্গে লাগিলে অথবা নির্বিষ প্রাণীর নখ ও দস্তাদি দ্বারা কোন স্থান আহত হইলে বা তাহাদের মল, মূত্র এবং শুক্রগিপ্ত বস্ত্র পরিধান করিলে অথবা বিষবৃক্ষাগত বায়ুর সংস্পর্শহেতু কিম্বা বিষাক্ত চূর্ণ গাত্রে লাগিলে, যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিষজ শোথ বলা যায় । এই শোথ কোমল, গমনশীল, অধোগামী, শীঘ্র সমুৎপন্ন এবং দাহ ও বেদনাবিশিষ্ট । অভিঘাতজ ও বিষজ উভয় প্রকার শোথই আগন্তুক ত্রণ-শোথ-মধ্যে পরিগণিত ।

ত্রণ শোথের বিশেষ লক্ষণ । বাতিক ত্রণ-শোথ অনিয়মিত সময়ে পাকে, শ্লেষ্মিক ত্রণ-শোথ বিলম্বে পাকে এবং পৈত্তিক রক্তজ ও আগন্তুক ত্রণ-শোথ শীঘ্র পাকে ।

অপক ত্রণ-শোথের লক্ষণ । অপক ত্রণ শোথ দৈব উষ্ণ, অল্প শোথ ও অল্প বেদনাবিশিষ্ট, কঠিন এবং চতুর্দিকস্থ চর্ম্মের জ্বালা স্বাভাবিক বর্ণযুক্ত ।

পচ্যমান ত্রণ-শোথের লক্ষণ । ত্রণ শোথ পাকিবার সময়ে অগ্নি-

দ্বারা দন্ধবৎ, ক্ষারদ্বারা পচ্যমানবৎ, পিপীলিকা কর্তৃক দংশনের জ্বায় বা ছেদ-
নের জ্বায়, অগ্নিদ্বারা বিদারণবৎ, দণ্ডদ্বারা তাড়নবৎ ও হস্তদ্বারা পীড়নবৎ
বেদনা হয় এবং উহার মধ্যে স্থচীদ্বারা বিদ্ধবৎ বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে ।
এতদ্ব্যতীত উহার অভ্যন্তরে অত্যন্ত জ্বালা, চোষ (পার্শ্বস্থিত অগ্নিদ্বারা তাপ-
প্রদানের জ্বায় বোধ), অঙ্গুলিদ্বারা পীড়নবৎ বেদনা, ত্রণ-শোথের চর্ম্মের
বিবর্ণতা, শোথের চর্ম্ম সঙ্কুচিত না হওয়া, বস্তির জ্বায় ফুলিয়া উঠা, রোগী
রুচিক কর্তৃক দষ্ট ব্যক্তির জ্বায় শয়নে বা উপবেশনে কোন অবস্থায়ই শান্তি-
লাভ করিতে পারে না, পরস্তু জ্বর, পিপাসা এবং অরুচি প্রভৃতি উপসর্গ দ্বারা
আক্রান্ত হইয়া থাকে ।

পক ত্রণ-শোথের লক্ষণ । ত্রণ-শোথ থাকিলে বেদনার ও দ্বাহ প্রভৃ-
তির উপশম, শোথ অল্প রক্তবর্ণ হয়, কিন্তু পচ্যমান শোথের অপেক্ষা বেশী
উন্নত হয় না । উহার উপরিস্থ চর্ম্ম শিথিলতাবাপন্ন হয়, সুতরাং অঙ্গুলিদ্বারা
টিপিলে অবনত হয় বা ঠোল খায়, পুনঃ পুনঃ স্থচীবিদ্ধবৎ বেদনা বোধ হয় ও
চুলকায়, জ্বরাদি উপসর্গ সমূহ প্রশমিত হয়, অঙ্গুলিদ্বারা টিপিলে জলপূর্ণ থলি-
য়ার জল যেগন অথত্র গমন করে, তদ্রূপ পুষ অথত্র গমন করে এবং রোগীর
আহারের ইচ্ছা হয় । ত্রণ-শোথ পাকিবার কালে ত্রিদোষের অধুবল্ক হয়,
কারণ বায়ুর প্রকোপ ব্যতীত বেদনা হইতে পারে না, পিত্তের প্রকোপ
ব্যতীত পাকিতে পারে না এবং শ্লেষ্মার প্রকোপ ব্যতীত পুষোৎপত্তি হইতে
পারে না ।

গভীরপাকী ত্রণ-শোথের লক্ষণ । গ্নৈয়িক ত্রণ-শোথ গভীরপাকী
অর্থাৎ অভ্যন্তরভাগ পাকে, কিন্তু বহির্ভাগে পাকের লক্ষণ প্রকাশ পায় না,
এই অবস্থায় শোথ শীতল, তাহার উপরিস্থ চর্ম্মের বর্ণ স্বাভাবিক, অল্প বেদনা-
বিশিষ্ট, পাষণের জ্বায় কঠিন ও স্পর্শ করিলে বেদনা বোধ হয় ।

ত্রণ-শোথ-চিকিৎসা-বিধি ।

যে কোন কারণে সর্কাজ বা শরীরের স্থানবিশেষ ফুলিয়া উঠিলে, তাহাকে
শোথ কহে, শোথ সাধারণতঃ নয় প্রকার এবং তাহারা যে সকল কারণে
উৎপন্ন হয়, তাহা শোথ রোগেই উক্ত হইয়াছে । যে সমস্ত শোথ হইতে

পরিণামে ত্রণ বা ক্ষত অর্থাৎ ঘা হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহাদের চিকিৎসাবিধিও শোথরোগে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু যে সমস্ত শোথ শরীরের স্থান-বিশেষে সীমাবদ্ধরূপে প্রকাশ পায় ও তাহা হইতে পরিণামে ত্রণ উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার চিকিৎসা শোথরোগে বর্ণিত হয় নাই । সংস্কৃতে বাহাকে ত্রণ কহে, বাঙ্গালায় তাহাকেই সচরাচর ঘা বা ক্ষত বলা যায় । অনেকে ত্রণ-শোথকেই ত্রণ বলিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে । শোথ বা ফুলা, ত্রণ উৎপত্তির পূর্বরূপ মাত্র, শোথ বিদীর্ণ হইলে তাহা হইতে যখন ক্ষত বা ঘা প্রকাশ পায়, তখনই উহা ত্রণ অর্থাৎ ঘা নামে অভিহিত হয় । শোথ-রোগের উৎপত্তির যে সকল নিদান বা কারণ ইতঃপূর্বে উক্ত হইয়াছে, ত্রণ-শোথের উৎপত্তির কারণও তাহাই । নানা কারণে বায়ু, রক্ত, পিত্ত, শ্লেষ্মা স্বয়ং পরস্পর মিলিত হইয়া কোন স্থানে ত্বক্ ও মাংসভেদী যে স্থূলগ্রন্থি বা গাঁটের আয় উৎপাদন করে, তাহাকে ত্রণ-শোথ বলা যায় । ছোটবড়ভেদে ত্রণ-শোথের চলিত নাম ক্ষেটক বা ফোড়া । ত্রণ-শোথ সাধারণতঃ ছয় প্রকার । বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক, রক্তজ ও আগন্তুক ।

সাধারণতঃ যে সকল শোথ পাকিয়া ত্রণ বা ঘা-রূপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা, তাহারাই ত্রণ-শোথ মধ্যে গণ্য, যেমন—নানাপ্রকার ছোট বড় ফোড়া, ত্রণ অর্থাৎ বাগী, বিদ্রুধি ও শুন-শোথ প্রভৃতি । 'ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি ত্বক্ ও মাংস আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, আর কতকগুলি রক্ত-বিকৃতি বশতঃ অস্থি, যেদ প্রভৃতি গভীর ষাভু আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় । ত্বক্ ও মাংসাশ্রয়ী সাধারণ-শোথের লক্ষণই এস্থলে বর্ণিত হইল, গভীর ষাভুশ্রয়ী অর্থাৎ বিদ্রুধি প্রভৃতির চিকিৎসা পৃথক্ বর্ণিত হইবে ।

ত্রণ-শোথ উৎপন্ন হইবামাত্র বসাইয়া দেওয়া উচিত, কিন্তু রক্তদোষ-জনিত অর্থাৎ ফিরঙ্গ প্রভৃতি রোগ হইতে যে ত্রণ-শোথ জন্মে, তাহা বসাইবার চেষ্টা না করিয়া পাকাইবে, যেহেতু বহির্গমনোন্মুখ দুষ্ট রক্ত বহির্গত হইতে না পারিলে, মহান্ অনর্থ সংঘটিত হয় । ত্রণ-শোথ বসাইবার ক্ষণ যে সকল ক্রিয়া করিতে হয়, তাহাকে বিস্মাপন কহে । বিস্মাপন শব্দে শোথ বিলয়নকর প্রলেপ ও পরিষেক প্রভৃতি বুঝায়, কিন্তু ইদানীং আয়ুর্বেদ-মতে কেবল এক-মাত্র প্রলেপই প্রয়োগ হইয়া থাকে । ত্রণ-শোথ যেমন নানাপ্রকার, তাহার

ঔষধও তেমনি নানাপ্রকার। একই প্রকার ঔষধ প্রয়োগে সর্বপ্রকার ত্রণ-শোথ আরোগ্য হয় না। বাতাদিক ত্রণ-শোথে স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণগুণযুক্ত ঔষধ, পিত্তাদিক ত্রণ শোথে পিত্ত প্রশমক অথচ শীতল ঔষধ এবং শ্লেষ্মাদিক ত্রণ-শোথে রুক্ষ ও শোষক ঔষধ প্রশস্ত। অনেকস্থলে এইরূপ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার ন্যূনাধিক্য বিচার পূর্বক ঔষধ নির্বাচন হয় না, সুতরাং চিকিৎসায়ও সফলতা লাভ করা যায় না; বরং সময় সময় বিপরীত ফল দর্শে। ধূতুরার মূল ও আদা বাটিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে, শ্লেষ্মিক ত্রণ-শোথ বসিয়া যায়, কিন্তু পৈত্তিক ত্রণ-শোথে ঐ প্রলেপ দিলে জ্বালা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, সুতরাং অগ্রে রোগের লক্ষণ দৃষ্টে ত্রণ-শোথ বাতজ, পিত্তজ কি শ্লেষ্মজ, তাহা স্থির করিয়া ঔষধ নির্বাচন করা কর্তব্য। ইতঃপূর্বে ফিরঙ্গরোগে সাধারণতঃ ত্রণের প্রতীকারার্থে যে প্রলেপাদি উক্ত হইয়াছে, ত্রণ-শোথের লক্ষণদ্বারা বাতাদিভেদে রোগ নির্ণয় করিয়া তাহাতেও সেই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এইরূপ ত্রণরোগেও এই সকল ঔষধ ব্যবহার্য। প্রলেপ প্রয়োগ করিতে হইলে, কয়েকটি নিয়ম প্রতিপালন করা আবশ্যক। রাত্রিকালে প্রলেপ প্রয়োগ করিবে না। রাত্রিতে প্রয়োগ করিলে, প্রলেপের শৈত্যদ্বারা ত্রণ-শোথের তাপ অবরুদ্ধ হয় ও তজ্জন্ত রোগ বৃদ্ধি পায়। বাসি প্রলেপ, অনেক ক্ষণের প্রস্তুত প্রলেপ বা রসহীন শুষ্ক প্রলেপ অথবা একবার যে প্রলেপ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা কিম্বা এক প্রলেপের উপর পুনরবার প্রলেপ প্রয়োগ করিবে না। কারণ গাঢ়ত্ব ও শুষ্কতা প্রযুক্ত ঐ প্রলেপ বীৰ্যাহীন হওয়াতে জ্বালা ও বেদনা বর্দ্ধিত হয়। প্রলেপ শুষ্ক হইয়া আসিলে, ঈষৎ উষ্ণ জলে ঝাড়া ভিজাইয়া তদ্বারা আন্তে আন্তে প্রলেপ ভিজাইয়া তুলিয়া ফেলিবে এবং পুনরবার টাটকা প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া লাগাইবে। প্রলেপ অধিক শুষ্ক হইলে, তুলিবার সময়ে রোগীর অত্যন্ত কষ্ট হয়, সুতরাং শুকাইয়া আসিলেই অর্থাৎ একটু নরম থাকিতে তুলিয়া ফেলা কর্তব্য। লোমযুক্ত স্থানে ফোড়া হইলে, অগ্রে খুরের দ্বারা লোম কামাইয়া ফেলা কর্তব্য, কারণ লোমের উপর প্রলেপ দিলে এবং উহা শুকাইয়া গেলে তুলিতে যেমন অনেক সময় নষ্ট হয়, তেমনি রোগীর যন্ত্রণার সীমা থাকে না। প্রলেপের দ্রব্যগুলি সমভাগে মিলিত করিবে এবং উত্তমরূপে পরিষ্কার শিলে পরিষ্কার নোড়া দ্বারা বাটিয়া লইবে।

অরণ্য রাধা উচিত, শিল নোড়া অপরিষ্কার থাকিলে, হিতে বিপরীত হইতে পারে। প্রলেপ প্রতিলোম ভাবে অর্থাৎ নিম্নদিক হইতে আরম্ভ করিয়া উপরের দিকে লাগাইবে। লোমের গতি প্রায়শঃ নিম্নগামিনী, তজ্জন্ম লোমকূপসকলও নিম্নমুখী; সূত্রাং নিম্ন হইতে উপরে প্রলেপ লাগাইলে, অতি সহজেই লোমকূপদ্বারা রসবহা শিরার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রিয়া করিতে সক্ষম হয়। প্রলেপ অন্ততঃ এক অঙ্গুলি পুরু হওয়া উচিত। ব্রণ-শোথের বেস্থান উচ্চ, সেই স্থান হইতেই পুষ্যরক্ত নির্গত হইবার সম্ভাবনা, অতএব সেই স্থানটুকু খালি রাখিয়া অত্যাশ্রয় শোথস্থান ব্যাপিয়া প্রলেপ দেওয়া উচিত।

পাকাইবার ও ফাটাইবার জন্য যে সকল প্রলেপ দেওয়া যায়, তাহা স্নাত্ত মিশ্রিত করিবেনা বা শুষ্ক হইলেও তুলিয়া ফেলিবে না; কারণ স্নাত্ত মিশ্রিত করিলে, প্রলেপ স্নিগ্ধ থাকে, সূত্রাং উহা বেশী শুষ্ক হইতে পারে না, বেশী শুষ্ক হইতে পারে না বলিয়া ফোড়াকে পীড়ন করিয়া বিদীর্ণ করিতে পারে না।

অল্পবয়স্ক শিশু ও বালকবালিকাদিগের ফোড়া বসাইবার জন্য চূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে, কিম্বা যুরগীর ডিম্বের লাল ও মধু মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে অথবা তোক্তমারি বা ইসবগুলের পুল্টিস্ প্রয়োগ করিবে। তোক্তমারি ও ইসবগুল শিশু ও বালকবালিকাদিগের বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ফোড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ফোড়া বসাইবার জন্য বাতিক ব্রণ-শোথে মাতুলুল লেপ, শাখোটক লেপ, পুনর্নবা লেপ, পঞ্চবঙ্গলেপ বা ধূতুরাদি লেপ প্রয়োগ করিবে। পৈত্তিক, রক্তজ ও আগন্তজ ব্রণ-শোথে চন্দনাদিলেপ, দূর্ঝাদিলেপ, পঞ্চবঙ্গলেপ ও পঞ্চক্ষীরলেপ, প্রশস্ত।

শৈথিল্য ব্রণ-শোথে ধূতুরাদিলেপ, পুনর্নবাদিলেপ, কটুফলাদিলেপ, সুরসাদিলেপ বা পঞ্চবঙ্গলেপ প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক ব্রণ-শোথে পঞ্চবঙ্গলেপ প্রয়োগ করিবে। বাতিক, শৈথিল্য বা সান্নিপাতিক ব্রণ-শোথে অত্যধিক বেদনা বা যন্ত্রণা থাকিলে, অগ্রে প্রলেপ দিয়া লোহার হাতা আঙুলে গরম করিয়া তদুপরি আঙুলে আঙুল চাপিয়া ধরিবে। যাবৎ

যন্ত্রণার লাঘব না হয়, তাৎক্ষণিক এইরূপ করিবে। ইহাতে যন্ত্রণার আশু লাঘব হয়, কিন্তু পৈত্তিক, রক্তজ বা আগন্তুক ত্রণ-শোথে সেক প্রদান করিবে না। বাতিক ও শ্লেষ্মিক ত্রণ-শোথের প্রলেপের দ্রব্য হকার কটুজল অথবা আদার রস কিম্বা গোমূত্রদ্বারা বাটিয়া লইলে, অধিক ফলপ্রদ হয়। সান্নিপাতিক ত্রণ-শোথে বায়ু ও শ্লেষ্মার লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও ঐ প্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করিবে। পৈত্তিক ত্রণ-শোথে অত্যন্ত দাহ এবং বাতজ শোথে অত্যন্ত বেদনা প্রকাশ পাইলে, কিম্বা সান্নিপাতিক ত্রণ শোথে দাহ ও বেদনা থাকিলে, তিললেপ লাগাইবে, ইহাতে ত্রণ-গোথের অসহ্য জ্বালা ও বেদনা সহ্যই প্রশমিত হয়। মরিচযোগ বা অহির্কণযোগ সর্বপ্রকার ত্রণ-শোথে ব্যবস্থা করা যায় এবং পাকিবার উপক্রমে প্রয়োগ করিলেও ফোড়া বসিয়া যায়। ত্রণ-শোথ ও তাহার বেদনা নিবারণার্থ জয়ন্তাদি স্বেদ অতি উপকারী।

আগন্তুক ত্রণ-শোথ নানাপ্রকার, সুতরাং তাহার চিকিৎসাও নানাপ্রকার। শরীরের স্থান বিশেষে আঘাত লাগিয়া, শোথ উৎপন্ন হইলে, হলুদ চূর্ণ ও নিমপাতা একত্র করিয়া আদার রসে বা হকার কটুজলে বাটিয়া শোথের উপর পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে; ইহা দ্বারা ফুলা, বেদনা ও জ্বালার সহ্য উপশম হয়। এইরূপ আদা, পান ও পেরুজ একত্র ছেচিয়া লাগাইলেও ফুলা ও বেদনা হ্রাস হয়। প্রবল শোথে আদা, পান ও রসুন একত্র ছেচিয়া বাক্সিয়া রাখিলে, অতি শীঘ্র ফুলা ও বেদনার উপশম হয়, কিন্তু কোমল অঙ্গে রসুনের পরিমাণ অল্প দেওয়া উচিত, বেশী হইলে, ফোকা পড়িবার সম্ভাবনা। এই সকল মুষ্টিযোগের আশ্চর্য্য শক্তি দেখিলে বিশ্ববিশুদ্ধ হইতে হয়।

শরীরের কোনস্থানে অল্পশত্রু কিম্বা শল্য ও কণ্টকাদি বিদ্ধ হইয়া, শোথ উৎপন্ন হইলে, ফুলা ও বেদনা নিবারণার্থ উক্ত প্রলেপ ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু অধিক রক্তস্রাব হইলে, সর্বাঙ্গে রক্তস্রাব বন্ধ করিয়া পশ্চাৎ প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। শীতলজলে বা বরফজলে পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া আহত স্থান বাক্সিয়া রাখিলে শীঘ্র রক্ত বন্ধ হয় কিম্বা কচিদূর্কীষাস পরিষ্কার শিলে - ছেচিয়া আহত স্থানে লাগাইয়া বাক্সিয়া রাখিলেও উদ্দেশ্যসিদ্ধ হয়। অনন্তর

রক্তশ্রাব রোধ হইলে, ঐ প্রলেপের কোন একটি প্রয়োগ করিবে। শুদ্ধাতক অর্থাৎ ভেলার রস কোন অঙ্গে লাগিলে, শোথরোগোক্ত শালদলচূর্ণ বা তদভাবে নারিকেল তৈল ও কপূর একত্র মিশ্রিত করিয়া সেই স্থানে মালিশ করিবে। শূক্শিঙ্গীর ফল বা শূঁয়াপোকা কোন অঙ্গে লাগিলে এবং তাহার স্তম্ভ মুখ কাঁটা বা ছল বিদ্ধ হইলে, অগ্রে একটি ডুমুর পাতা আস্তে আস্তে সেই স্থানে বুলাইয়া কাঁটা বা ছল তুলিয়া ফেলিবে, পরে নারিকেল তৈল ও কপূর মিশ্রিত করিয়া মালিশ করিবে। উপেক্ষা করিলে অথবা কাঁটা কিস্বা ছল না তুলিলে, শোথ পাকিতে পারে। বিষধর প্রাণী শরীরে বিচরণ করিলে অথবা তাহাদের মল, মূত্র, শুক্র ও লালা কোন অঙ্গে লাগিলে, সেইস্থান চুল্কাইতে চুল্কাইতে অচিরে লালবর্ণ হইয়া কুলিয়া উঠে ও বেদনায়ুক্ত হয়। এইরূপ দুর্ঘাতি (এড়াবিষ) জনিত শোথ কখনও উপেক্ষা করা কণ্ডব্য নহে, উপেক্ষা করিলে, পরিণামে মহান্ অনর্থ সংঘটিত হইতে পারে, এমন কি রোগীর অমনোবোগিতা, অচিকিৎসা বা কুচিকিৎসার ফলে হস্ত পদাদি অঙ্গ অঙ্গদ্বারা ছেদন করিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিতে হইয়াছে; এরূপও দেখা গিয়াছে। শিরীষের মূল, ছাল, পাতা, পুষ্প ও বীজ ইহার মধ্যে যে কোন একটি গোমূত্রদ্বারা বাটিয়া পুনঃপুনঃ প্রলেপ দিবে। এই প্রলেপের গুণে অনেকের হস্তপদাদি অঙ্গ রক্ষা পাইয়াছে, ছেদন করিতে হয় নাই। বিষাক্ত দ্রব্যের চূর্ণ গাত্রে লাগিয়া শোথ উৎপন্ন হইলেও এই প্রলেপ প্রয়োগ করা যায়। ভীমকুল, বোলতা, মধুমক্ষিকা (মোমাছি) বা অঙ্ককোন মক্ষিকা দংশন করিলে, সর্বাগ্রে তাহার ছাল চর্ম্মের সহিত সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবে এবং সংলগ্ন হইয়া থাকিলে, তাহা তুলিয়া ফেলিবে। একটি ফাঁপা চাবি (বাস্কের) লইয়া তদ্বারা আস্তে আস্তে দষ্টস্থান চাপিবে, এইরূপ চাপ দিলে ছাল বহির্গত হইবে। অনন্তর সত্ত্ব্যক্ত উষ্ণ গোবর লাগাইবে অথবা উৎকৃষ্ট মধু আস্তে আস্তে মালিশ করিবে। জলসহ লবণ মিশ্রিত করিয়া আস্তে আস্তে মালিশ করিলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। নিশাদল ও চূণ মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে কিস্বা কাঁটান'টের মূল চাউলধোয়া জলদ্বারা বাটিয়া লাগাইলেও দাহ, শোথ ও বিষ নষ্ট হয়। শ্বেতকরবীর মূল বা শিরীষ বৃক্ষের মূলের ছাল বাটিয়া লাগাইলে, সর্প-

দংশনজনিত শোথ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এসম্বন্ধে বিধি চিকিৎসায় বিস্তারিত বর্ণিত হইবে।

ত্রণ-শোথ বসাইবার ক্ষত যে সকল প্রলেপ উক্ত হইল, যদি উপযুক্ত পরি দুই তিন দিন প্রয়োগ করিলেও, শোথ বসিয়া না যায়, তবে রোগীর রক্তদোষ আছে কিনা এবং দান্ত পরিষ্কার হয় কিনা, এই সকল বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করা কর্তব্য, কারণ অনেক স্থলে ২।১ টি কাথ প্রয়োগের পরে দান্ত পরিষ্কার ও রক্তশুদ্ধি হওয়াতে শোথ বসিয়া যাইতে ও আনুষঙ্গিক অর বিনষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে। এই অবস্থায় সাধারণতঃ কোষ্ঠ শোধক অথচ রক্তশুদ্ধিকারক কাথ প্রয়োগ করিলেই চলে। শীত পিত্ত-রোগোক্ত অমৃতাদি কাথে কটকীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া কিম্বা উপদংশ ও ফিরঙ্গ রোগোক্ত পটোলাদি কাথ প্রয়োগ করিবে। বাতরক্ত চিকিৎসোক্ত নবকার্ষিক কাথ প্রয়োগ করিলেও চলে। ইহার যে কোন একটি কাথ পান করিতে দিবে এবং তৎসঙ্গে তিসি বা মসিনার পুন্টিস্ পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করিবে। আয়ুর্বেদে উপনাহ শ্বেদের উল্লেখ আছে, বাঙ্গালায় তাহাকে পুন্টিস্ বলা যাইতে পারে। উপনাহ শ্বেদে অপক-ত্রণ-শোথ বসে এবং পাকোন্মথ ত্রণ-শোথ পাকে; স্মৃতরাং ত্রণ-শোথের সূচনা হইতে যে পর্য্যন্ত উহা না পাকে, তাবৎ উপনাহ শ্বেদ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পূর্বোক্ত প্রলেপের ঔষধ সকল ছেচিয়া নরম কলার পাতায় বা ভেরেণ্ডার পাতায় রাখিয়া বস্ত্রখণ্ড দ্বারা পুটুলী বান্ধিয়া আঙুণে অন্ন অল্প বা সহ্যমত গরম করিয়া সেক দেওয়া যায়। এইরূপ বাতাদি দোষ-ভেদে ত্রণ-শোথ বসাইবার যে সকল প্রলেপ উক্ত হইয়াছে, সেই সকল দ্রব কুটিত করিয়া উপনাহ শ্বেদে প্রয়োগ করা যায়; কিন্তু সর্বাপেক্ষা তিসির পুন্টিস্ই অনায়াসলভ্য ও সহজ। তিসির পুন্টিস্ প্রয়োগ কালে বাতাদি-দোষের প্রতি দৃষ্টি না রাখিলেও চলে, ইহা সর্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ। ত্রণ-শোথের সূচনা হইতে তাবৎ না পাকে, তাবৎ প্রয়োগ করা যায়, প্রসিদ্ধ ডাক্তারেরা এই মতের সমর্থন করেন, এই সকল কারণে তিসির পুন্টিস্ই আজকাল অধিকাংশ স্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরাও শত শত স্থলে প্রয়োগ করিয়া ইহার সুফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তিসির পুন্টিস্ যে কোন অবস্থায় লাগাইবামাত্র রোগী আরাম বোধ করে, প্রদাহ ও শোথ কমিয়া

যায়; তবে এ সম্বন্ধে অবগুই মতভেদ আছে। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক-গণের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস স্নিগ্ধ বা তৈলাক্ত দ্রব্যের (তিসি ও তিল প্রভৃতির) পুন্টিস্ বা প্রলেপ অপক ত্রণ-শোধে দিলে, উহা পাকিয়া উঠে; বলা বাহুল্য আমরা এই মতের পক্ষপাতী নহি। আয়ুর্বেদে অপক ত্রণ-শোধ বসাইবার জন্ত শোধের উপর বাতপিত্তাদি দোষ নাশক ঔষধ-পাচিত কাথ, তৈল ও ঘৃত সিঞ্চনের ব্যবস্থা আছে, স্মরণ্য সে হিসাবে প্রায়শঃ নাশক মহা-দশমূল তৈল সিঞ্চে প্রৈয়িক ত্রণ-শোধ, বাতনাশক বিষ্ণুতৈলাদি সিঞ্চে বাতিক ত্রণশোধ ও পিত্তনাশক গুড়ুচ্যাди তৈল সিঞ্চে পৈত্তিক ত্রণ-শোধ বসিয়া যায়। পক্ষান্তরে অত্যধিক বেদনা ও দাহযুক্ত ত্রণ-শোধে তিল বা তিসি অল্প ভ্রাজিয়া দ্বন্ধে স্নিগ্ধ করিয়া প্রলেপ দেওয়াতে কিছুক্ষণের মধ্যেই বেদনা ও জ্বালার উপশম হইতেও দেখা গিয়াছে; এই সকল কারণে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে তিল ও তিসি প্রভৃতি দ্রব্যের ফোড়া বসাইবার ও পাকাইবার উভয় গুণই আছে। পুন্টিস্ প্রয়োগে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়, যেটি বসিবার বসে ও যেটি পাকিবার পাকে, স্মরণ্য সম্বন্ধেই যন্ত্রণার লাঘব হয়, কিন্তু তাখাপি প্রলেপের শক্তিও নিতান্ত অল্প নহে, তবে একটু বিবেচনার সহিত ব্যবস্থা করিতে হয়। পাকোন্মুখ ত্রণ-শোধে বসাইবার ঔষধ কদাপি ব্যবস্থা করা সমীচীন নহে, প্রলেপের উপকারিতা সম্বন্ধে আয়ুর্বেদে উক্ত হইয়াছে, বেক্রপ প্রজ্জলিত গৃহে জল সেচন করিলে, অগ্নির বেগ সম্বন্ধেই প্রশমিত হয়, তদ্রূপ প্রলেপ প্রয়োগ দ্বারা অচিরে দাহ, বেদনা প্রভৃতি যন্ত্রণা দায়ক উপসর্গ সমূহ প্রশমিত হইয়া থাকে। কাথ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি ত্রণ-শোধের উপর সেচন করিলে, ঐরূপ ফল পাওয়া যায়; আবার উপনাহ-স্বেদ সম্বন্ধেও শাস্ত্রকারগণের ঐ প্রকার মত। তাঁহারা আরও বলেন উপনাহ-স্বেদ প্রয়োগে আম অর্থাৎ অপক ত্রণ-শোধ বিলয় প্রাপ্ত হয় ও পাকোন্মুখ-ত্রণ-শোধ সম্বন্ধেই পাকিয়া উঠে। সর্বপ্রকার ত্রণ-শোধে পুন্টিস্ ব্যবহার্য। আগন্তুক অর্থাৎ অভিঘাতজ ও বিষজ শোধে কণ্টকাদি বিন্ধ হইয়া রহিলে পুন্টিসে শীঘ্র পাকে ও পাকিলে কণ্টকাদি অক্লেশে বহির্গত হইয়া যায়। তিসি বা মসিনার পুন্টিস্ যে প্রণালীতে 'প্রস্তুত' করিতে হয়, তিলের পুন্টিস্ সেই নিয়মে প্রস্তুত করিবে। উপদংশ ও ফিরঙ্গরোগে পুন্টিসের গুণ ও তাহার

প্রস্তুতপ্রণালী দ্রষ্টব্য । বসাইবার, পাকাইবার ও ফাটাইবার এই ত্রিবিধ গুণ তিল বা তিসির আছে । কারণ ইহার উভয়েই পিচ্ছিল পদার্থ । এইরূপ অগ্নাত পিচ্ছিল দ্রব্যও ঐ ত্রিবিধ গুণ অল্পাধিক বিদ্যমান । যেমন,—মাষকলাই, শিমূলছাল, লোধ, বেড়েলার পাতা, পুইপাতা, জবাফুল, তেলাকুচার পাতা প্রভৃতি । ইহাদের কোন একটি বাটিয়া একটু ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে ত্রণ-শোধ বসিয়া যায়, আবার উহার কোন একটি দ্রব্য বাটিয়া একটু তৈতুল মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে ত্রণ-শোধ অতি শীঘ্র পাকিয়া উঠে । পাকিয়া উঠিলে উহাদের সহিত ঘৃত বা তৈতুল মিশ্রিত করিবে না । তখন উহাদের কোন একটি দ্রব্য জল দ্বারা বাটিয়া পুরু করিয়া প্রলেপ দিবে এবং শুষ্ক হইলেও শীঘ্র প্রলেপ তুলিবে না ; কারণ পিচ্ছিল দ্রব্য শুষ্ক হইলেই পীড়ন করে (চামড়া টানিয়া ধরে), সুতরাং ত্রণ-শোধ বিদীর্ণ হয় । অনেক স্থলে এইরূপ প্রলেপ দ্বারাই ত্রণ-শোধ ফাটিয়া বা ফুটিয়া যায় ।

ছোট ছোট ত্রণ-শোধ (ফোড়া), মুখমণ্ডলের বা তদ্রূপ অগ্নাত সূকোমল অঙ্গের ফোড়া এবং বালক বালিকা বা শিশুদিগের ফোড়ার হুচনা হইলেই ইসবগুল বা তোকমারীর পুল্টিস্ (এই উভয় দ্রব্যই বেণে দোকানে পাওয়া যায়) লাগাইবে । এই উভয়প্রকার পুল্টিস্ই ঐ সকল ত্রণ-শোধে মহোপকারী এবং ফোড়া বসাইতে, পাকাইতে ও ফাটাইতে সক্ষম । শত সহস্র-স্থলে ইহাদের গুণ প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে । পুল্টিস্ প্রস্তুতের নিয়ম এই—ফোড়ার আয়তন অনুযায়ী বস্ত্রখণ্ড কাটিয়া লইবে এবং তৎপরি তোকমারী সাজাইয়া রাখিবে ও আস্তে আস্তে তাহার উপর জল ছিটাইয়া দিবে । বেশী-জোরে জল ছিটাইবে না, ছিটাইলে বীজগুলি স্থানভ্রষ্ট হইয়া যাইবে । অনন্তর জল লাগিয়া বীজগুলি ফুলিয়া উঠিলে, একখানি লোহার হাতায় রাখিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া লাগাইবে । অগ্নাত পিচ্ছিল দ্রব্যের ত্রায় ইহাও শুকাইয়া গেলে তুলিতে রোগী একটু যত্না বোধ করে, তজ্জগৎ একটু ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লইবে । পাকাইবার সময়ে একটু তৈতুল মিশ্রিত করিয়া লইবে । কিন্তু ফাটাইবার সময় ঘৃত বা তৈতুল মিশ্রিত করিবে না । এই নিয়মে তুলসী-বীজের পুল্টিস্ প্রস্তুত করিয়া লাগান যায় । ফল একই প্রকার ।

রক্তদোষ জনিত ত্রণ-শোধ বা দুষ্টত্রণ-শোধ কিম্বা অচিকিৎসায় বা কুচিকিৎসা-

সায় যে সকল ত্রণ-শোধ না বসে কিম্বা পাকাইবার জন্ত যে সকল ঔষধ উক্ত হইল, যদি তাহাতেও না পাকে, তাহা হইলে পাকাইবার জন্ত নিয়ের প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যবের ছাতু জলে গুলিয়া লোহার হাতায় করিয়া আঁগুণে গরম করিবে, অনন্তর শীতল হইয়া না যায়, এইরূপ ক্ষিপ্ৰহস্তে উহার সহিত কিঞ্চিৎ সর্ষপতৈল মিশ্রিত করিয়া বাতিক ও শ্লৈষ্মিক ত্রণ-শোধের (ফোড়ার) উপর লাগাইবে। এইরূপ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পৈত্তিক ও রক্তজ ত্রণ-শোধে লাগাইবে, সান্নিপাতিক ত্রণ-শোধে ঘৃত ও তৈল উভয়-মিশ্রিত করিয়া লাগাইবে কিম্বা যবের ছাতু, তিল ও তিসি সমভাগে লইয়া জলে বাটিয়া প্রলেপ দিবে। প্রলেপের পরিবর্তে পুল্টিস্ দিলেও কার্য্যসিদ্ধি হয়। গমের ভূমি ও মসিনা একত্র কিম্বা পৃথক্ বাটিয়া প্রলেপ বা পুল্টিস্ দিলেও চলে।

পিচ্ছিল দ্রব্যের প্রলেপ বা পুল্টিস্ দ্বারা ত্রণ-শোধ স্বয়ং ফাটিয়া যায়, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু কোমল অঙ্গের ত্রণ-শোধই প্রলেপ বা পুল্টিস্ দ্বারা বিদীর্ণ হইতে পারে। চামড়া পুরু হইলে, কেবলমাত্র প্রলেপ বা পুল্টিস্ দ্বারা ফোড়া বিদীর্ণ হয় না; সুতরাং তখন ত্রণ-শোধের যে স্থান উচ্চ দৃষ্ট হইবে, সেই স্থান হইতে পুষ রক্তাদি নির্গত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা বুঝিয়া ত্রণ-শোধের চতুর্দিকে পিচ্ছিল দ্রব্যের প্রলেপ দিয়া সেই উচ্চস্থানে একটি সিকি বা আধুলি পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া বিদীর্ণ হওয়ার জন্ত বিদারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। পায়রার বা শকুনির টাটকা অর্থাৎ উষ্ণ বিষ্ঠা, গোকুর দাঁত-ঘসা, হরিণের শিং-ঘসা, চিতামূল বাটা, দস্তীমূল বাটা, সাজিমাটা ও সাবান ইহাদের যে কোন একটি দ্রব্য লাগাইলেও ফোড়া বিদীর্ণ হয়। কিন্তু যেস্থলে এই সকল ঔষধ প্রয়োগেও বিদীর্ণ হয় না, সেস্থলে অন্ত্ৰচিকিৎসার প্রয়োজন, অথবা পুষরক্তাদি বহির্গত হইতে বিলম্ব হইলে, নালী-খা (নাড়ী-ত্রণ) হইতে পারে। এক্ষণে বক্তব্য এই—যেস্থানে ত্রণ শোধ হইয়াছে, সেই স্থানের চামড়া পাতলা কিম্বা পুরু এবং কেবল প্রলেপ বা পুল্টিস্ দ্বারা ফোড়া বিদীর্ণ হইবে কিনা অথবা নুখে স্বতন্ত্র বিদারক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে, কিম্বা অন্ত্ৰ চিকিৎসার প্রয়োজন; চিকিৎসকের সর্বাগ্রে এই সকল বিবেচনা করা উচিত। অথবা একবার প্রলেপ, একবার বিদারক ঔষধ প্রয়োগ বা

তাহাতে কৃতকার্য না হইলে অল্পপ্রয়োগ, এইরূপে পুনঃপুনঃ চিকিৎসার পরিবর্তন করিলে, রোগীর যন্ত্রণার সীমা থাকে না ।

বাগী, ফোড়া প্রভৃতি যে কোন প্রকার ত্রণ-শোথই হউক না কেন, পাকিয়া উঠিলেই তন্মধ্যস্থ ছুঁই পু্যরক্ত বাহির করিয়া দেওয়া উচিত, না দিলে বায়ুদ্বারা বুদ্ধিপ্রাপ্ত অগ্নি যেমন তৃণকাষ্ঠাদি রচিত গৃহ দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ ঐ ছুঁই পু্যরক্ত ক্রমশঃ মাংস, শিরা ও হাড়সমূহ ধ্বংস করিতে থাকে, পরন্তু ছুঁইরক্ত সর্বাপেক্ষে সঞ্চরণ করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকার রক্ত-বিকৃতি-জনিত রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে । পু্যরক্ত বাহির করিবার উপায় নানাপ্রকার । যে উপায়ে পু্যরক্ত বাহির করা যায়, আয়ুর্মেদে তাহাকে পাতন কহে । ত্রণ-শোথ পাকিয়া উঠিলেই অল্পদ্বারা কাটিয়া, শব্দদ্বারা বিদ্ধ করিয়া কিম্বা ঔষধ দ্বারা ফাটাইয়া পু্যরক্ত বাহির করা যায় । এক্ষণে প্রশ্ন এই—ঐ তিনটির মধ্যে কোন উপায় প্রশস্ত ? ইহার উত্তরে এক কথায় বলা যাইতে পারে, অল্পপ্রয়োগই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ অল্প প্রয়োগে মূর্ছ-মধ্যেই পু্যরক্ত বহির্গত ও রোগীর যন্ত্রণার লাঘব হয় । শব্দদ্বারা বিদ্ধ করিলে ত্রণের মুখ তাদৃশ বৃহৎ হয় না, সূত্ররাং সূক্ষ্ম-মুখ দ্বারা যথোচিত পু্যরক্ত নির্গত হইতে পারে না, রোগীর যন্ত্রণার কতক লাঘব হইলেও একেবারে শেষ হয় না, পরন্তু নালী হওয়ার আশঙ্কা থাকে । বিদারক ঔষধ দ্বারা ফাটাইয়া পু্যনিঃসারণ করিতে যাইলেও ঐরূপ অবস্থা প্রায়শঃ ঘটিয়া থাকে, সূত্ররাং অল্পপ্রয়োগই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত, তবে—সুকুমার বালক, সুকুমারী বালিকা, কোমলাঙ্গী যুবতী, বৃদ্ধ, ক্ষীণ ও ভয়ান্ত বা দুর্বল ব্যক্তির ত্রণ-শোথে অল্প-প্রয়োগ কর্তব্য নহে, উহাদিগের ত্রণ-শোথ বিদারক ঔষধ দ্বারা বিদীর্ণ করিবে । পক্ষ ত্রণ-শোথ অবিলম্বে বিদারণ না করিলে যেপ্রকার অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে, অপক ত্রণ শোথ বিদারণ করিলে, তদপেক্ষা সহজতর অনিষ্ট হইতে পারে, একথা স্মরণ রাখা উচিত, এমন কি অপক ত্রণ-শোথে অল্প-প্রয়োগ করিতে অকস্মাৎ রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে ।

যে কোন প্রকার ত্রণ-শোথের যে কোন অবস্থায় অমৃতাদি কাণ্ড ব্যবস্থা করা যায় । সর্বপ্রকার ত্রণ-শোথ ও তদামুশঙ্গিক জ্বরে ইহা মহৌষধ । ত্রণ-রোগে অমৃতাদি কাণ্ডের প্রয়োগ ও প্রস্তুত প্রণালী দ্রষ্টব্য ।

ত্রণ-শোথে-ঔষধ ।

মাতুলঙ্গাদি-লেপ । বাতজ ত্রণ-শোথের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তাহাতে টাটানি, শূলানি ও ছেচানি নানাপ্রকার বেদনা থাকিলে, এই প্রলেপ লাগাইবে । তিনবেলা অন্ততঃ তিনবার লাগান উচিত, কিন্তু রাত্রিকালে কিম্বা ফোড়ার মুখে প্রলেপ লাগাইবে না । ইহা প্রয়োগে ফোড়া বসিয়া যায় ।

মাতুলঙ্গাদি লেপ । ছোলঙ্গ গাছের মূলের ছাল, কেলেকড়ার মূল, দেবদারু, রাস্না এবং গণিয়ারী ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলদ্বারা উত্তমরূপে বাটিবে, অনন্তর কলার পাতায় রাখিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে ।

শাখোটক লেপ । বাতিক ত্রণ-শোথের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই লেপ তাহাতে প্রয়োগ করিবে । ইহা প্রয়োগে ফোড়া বসিয়া যায় ।

শাখোটকলেপ । শেওড়া বৃক্ষের মূলের ছাল কাঁজির দ্বারা বাটিয়া উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে ।

পুনর্ণবাদি লেপ । বাতিক ও শ্লেষ্মিক ত্রণ-শোথের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এবং তাহাতে বাতশ্লেষ্মিক নানাপ্রকার বেদনা থাকিলে, এই লেপ প্রয়োগ করিবে । ইহা প্রয়োগে অতি কঠিন ত্রণ-শোথও অতি শীঘ্র বসিয়া যায় ।

পুনর্ণবাদি লেপ । ঋতপুনর্ণবা, শঙ্কিনামূলের ছাল, দেবদারু, বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহত্তী, কণ্টকারী, গোক্ষুর ও শুঠ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে পেষণ পূর্বক কলার পাতায় রাখিয়া উষ্ণ করিয়া পুনঃ পুনঃ লেপ দিবে ।

পঞ্চবঙ্কল লেপ । বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক, রক্তজ বা আগন্তজ ত্রণ-শোথের যে কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ; এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে । ইহা সর্বপ্রকার ত্রণ-শোথের মহৌষধ । অতি প্রবৃদ্ধ-শোথ, এমন কি, ফিরঙ্গ জনিত দুষ্ট শোথ অর্থাৎ বাগীও ইহার প্রভাবে বসিয়া যায় । এই পাঁচটির মধ্যে কোন একটি বা দুইটির অভাব হইলে, যে কয়েকটি পাওয়া যায়, তদ্বারাই লেপ দিবে । পৈত্তিক, রক্তজ ও আগন্তজ ত্রণ-শোথে প্রলেপ দিতে হইলে, কিঞ্চিৎ স্নাত মিশ্রিত করিয়া লাগাইবে এবং

উষ্ণ করিবে না। অত্যাশ্র-শোথে উষ্ণ করিয়া লাগাইবে। বট, অশ্বথ, যজ্ঞদুম্বর, পাকুড় ও অন্নবেতস, এই পঞ্চদ্রব্যের ছালকে পঞ্চবক্সল কহে। ব্রণরোগে পঞ্চবক্সল প্রলেপ উক্ত হইয়াছে; কিন্তু সেখানে অন্নবেতসের পরিবর্তে ভ্রমবশতঃ বকুল-ছাল লিখিত হইয়াছে। অন্নবেতসকে কোন কোন প্রদেশের লোকে থৈকল, কেহবা বনচালিতা কহিয়া থাকে, উহার অভাবে কৃষ্ণবেতের মূলও প্রয়োগ করা যায়।

পঞ্চবক্সল লেপ । প্রস্তুতবিধি ৭২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চক্ষীর লেপ । পঞ্চবক্সল-লেপ যে যে ব্রণ শোথে যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, পঞ্চক্ষীর-লেপও সেই সেই ব্রণ-শোথে সেই সেই অবস্থায় প্রযোজ্য। পাঁচটি ক্ষীরের অভাব হইলে, যে কয়েকটি পাওয়া যাইবে, তাহাই কিম্বা একটি বা দুইটির ক্ষীর প্রয়োগ করিলেও চলে।

পঞ্চক্ষীর লেপ । বট, অশ্বথ, যজ্ঞদুম্বর, পাকুড় ও অন্নবেতস এই পাঁচটি বৃক্ষের ক্ষীর সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। গরম করিবার আবশ্যকতা নাই।

ধূস্তুরাদি লেপ । বাতিক বা শ্লেষ্মিক ব্রণ-শোথে এই লেপ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে অতিশীঘ্র ফুলা ও বেদনা কমে এবং ফোড়া বসিয়া যায়।

ধূস্তুরাদি লেপ । ধূস্তুরাপাতা ও আদা সমান ভাগে লইয়া ছকার কটুজলদ্বারা বাটবে এবং গরম করিয়া*পুনঃপুনঃ লাগাইবে। ইহার সহিত একভাগ শজিনার ছাল মিশ্রিত করিলে আরও ফলপ্রদ হয়। বাতিক ব্রণ-শোথে প্রলেপ দিতে হইলে, কিঞ্চিৎ ঘৃত বা তৎপরিবর্তে একভাগ তিল কিম্বা তিসি (মসিনা) মিশ্রিত করিলে বহোপকার দর্শে। কেবল শজিনার ছাল ছকার জলদ্বারা বাটিয়া গরম করিয়া লাগাইলেও অসীম উপকার হয়।

চন্দনাদি লেপ । পৈত্তিক, রক্তজ ও আগন্তজ ব্রণ-শোথে এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। ইহারারা দাহ ও বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ বিনষ্ট হয় এবং শোথ বসিয়া যায়।

চন্দনাদি লেপ । প্রস্তুতবিধি ৭২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দূর্বাদি লেপ । পৈত্তিক, রক্তজ ও আগন্তজ ব্রণ-শোথে অত্যধিক জ্বালা ও বেদনা থাকিলে, এই লেপ প্রয়োগ করিবে।

দূর্বাদি লেপ । কটি দূর্বাবাস, যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন সমভাগে লইয়া দুগ্ধসহ বাটিয়া প্রলেপ দিবে । কেবল দূর্বাবাস ও রক্তচন্দন বাটিয়া প্রলেপ দিলেও অসাধারণ উপকার হয় । আবশ্যকমত কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে ।

কটফলাদি লেপ । শৈথিল্যিক ব্রণ-শোথে এই লেপ প্রয়োগ করিলে, শীঘ্র শোথ বসিয়া যায় । চিকিৎসক শিরোমণি গঙ্গাপ্রসাদ সেন শৈথিল্যিক-শোথে প্রায়শঃ এই যোগটি প্রয়োগ করিতেন । বাতিক শোথে প্রয়োগ করিতে হইলে, ইহার সহিত একভাগ তিল মিশ্রিত করিয়া লইবে ।

কটফলাদি লেপ । কটফল, কুড়, কৃষ্ণজারা ও গুঁঠ সমভাগে লইয়া ছকার কটুজলে বাটিয়া গরম করিয়া লাগাইবে ।

সুরসাদি লেপ । শৈথিল্যিক ব্রণ-শোথ কঠিন, পাণ্ডুবর্ণ, চক্চকে, শীতল ও কণ্ডুযুক্ত হইলে, অথবা সান্নিপাতিক ব্রণ-শোথে ঐসকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই লেপ শোথস্থানে লাগাইবে । ইহাতে শোথ কোমল হয় ও শীঘ্র বসিয়া যায় । ছকার জল বা গোমূত্রের দ্বারা বাটিয়া গরম করিয়া লাগাইবে ।

সুরসাদিলেপ । প্রস্তুতবিধি ৭২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

তিললেপ । পৈত্তিক ব্রণ শোথে অত্যন্ত দাহ ও বাতজ ব্রণ-শোথে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে, এই লেপ পুনঃ পুনঃ লাগাইবে । ইহা ব্রণ-শোথের জ্বালা ও বেদনা নিবারণের মহৌষধ । সান্নিপাতিক শোথের বেদনা এবং জ্বালাও ইহা দ্বারা শীঘ্র প্রশমিত হয় ।

তিললেপ । তিল খোলায় অন্ন ভাজিয়া অন্ন দুগ্ধে ফেলিবে, অনন্তর ঐ দুগ্ধদ্বারা সেই তিল বাটিয়া লাগাইবে ।

মরিচাদি লেপ । বাতিক, পৈত্তিক, শৈথিল্যিক ও সান্নিপাতিক ব্রণ-শোথে এই লেপ প্রয়োগ করিবে ।

মরিচাদিলেপ । গোলমরিচ ও মুসকর সমভাগে লইয়া আদা ও ধূতুরাপাতার রসে বাটিয়া লইবে । অথবা কেবল মুসকর আদা বা ধূতুরাপাতার রসে বাটিয়া কিম্বা গোলমরিচ ঘসিয়া লাগাইবে, ইহাতে ব্রণ শোথ বসিয়া যায় ।

অহিফেণ লেপ । রক্তজ ও আগন্তুক ব্যতীত সর্বপ্রকার ব্রণ-শোথ পাকিবার উপক্রমেও এই প্রলেপে বসিয়া যায় ।

অহিংস লেপ । আদা বা ধূতুরা পাতার রসে আকিং গুলিয়া প্রলেপ দিবে ।

জয়ন্ত্যাদি স্বেদ । ত্রণ-শোথে অধিক বেদনা ও ফুলা থাকিলে, এই স্বেদ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিবে ।

জয়ন্ত্যাদি স্বেদ । জয়ন্তীপাতা, শলিনার ছাল, নিশিন্দাপাতা ও ধূতুরাপাতা একত্র ছেচিয়া কলার বা ভেরেণ্ডার নরম পাতায় রাখিয়া বস্ত্রগুদ্বারা পুটলী করিয়া আঙুণে গরম করিবে ।

ত্রণ-শোথরোগে—পথ্যাপথ্য ।

পথ্য—জ্বর থাকিলে, বালি বা যবমণ্ড, দুগ্ধসহ পথ্য দিবে । যবের ছাতু, যবতণ্ডুল দ্বারা বা ময়দার দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য, আটার রুটি অথবা লুচি, মাংসযুষ, ষৈর মণ্ড, দ্রুত, অড়হর ও যুগের দাইল, চিনি, মিক্সী, বেগুন, কাকুড়, পটোল, হিঞ্চাশাক, নালিতাপাতা বা পাটশাক, করলা অথবা বেতের-ডগা বা নিমপাতার শুক্ল, কচিমুলা, সুসুনিশাক, শালিঞ্চশাক, নটেশাক, বেতোশাক, কাঁঠাল, মোচা, খোড়, কাচকলা, ঠ'টেকলা, কিস্মিস্ এবং মবুররস ও তিল্লরসবিশিষ্ট দ্রব্য এই সকল দ্রব্য ত্রণ-শোথ, ত্রণ, নাড়ীত্রণ (নালী-বা) ও সদ্যোত্রণ রোগে সুপথ্য ।

অপথ্য ।—নূতন তণ্ডলের অন্ন, তিলের প্রস্তুত দ্রব্য, মটর, মাষকলাই, কুর্শী কলাই, গুড়, শীতলজল, শাক, বিদাহি বা পিত্তবর্ধক দ্রব্য, বিষ্টম্ভি-দ্রব্য, গুরুদ্রব্য, কটু দ্রব্য, অম্লদ্রব্য, শীতলদ্রব্য, লবণরসযুক্ত দ্রব্য ; ত্রণ-শোথ (ফোড়া) রোগে এই সকল অপথ্য স্মরণে তক্ষণ করা কর্তব্য নহে ।

ত্রণরোগ-চিকিৎসা ।

(য্যাব্‌সেস্) ।

বাতিক ত্রণের লক্ষণ । বাতিক ত্রণ শ্রামবর্ণ, কখনও অধিক বেদনাযুক্ত কখনও বা অল্পবেদনাযুক্ত হয় এবং ত্রণের মধ্যে দপ্‌ দপ্‌ করে ।

পৈত্তিক ত্রণের লক্ষণ । পৈত্তিক ত্রণে রোগীর দাহ, মোহ, তৃষ্ণা ও ঘর্ম্ম হয় এবং ত্রণ বিদীর্ণ হইয়া দুর্গন্ধযুক্ত পুথ রক্ত নির্গত হইয়া থাকে ।

শ্লেষ্মিক ব্রণের লক্ষণ । শ্লেষ্মিক ব্রণে ব্রণ পিচ্ছিল, ভারবিশিষ্ট, স্তিমিত (ভিজা ভিজা), স্নিগ্ধ (চক্চকে, তৈল বা ঘৃত মাখাইলে যেরূপ দেখা যায়), পাণ্ডুবর্ণ, অল্প বেদনা ও অল্প র়েদবিশিষ্ট হয়, পরন্তু ব্রণের সমস্তাংশ এককালে পাকে না, ক্রমশঃ বা দীর্ঘকালে পাকিয়া থাকে ।

রক্তজনিত ব্রণের লক্ষণ । রক্তজনিত ব্রণে ব্রণ রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং তাহা হইতে পুষ বহির্গত না হইয়া তৎপরিবর্তে রক্ত নির্গত হইয়া থাকে ।

সান্নিপাতিক ব্রণের লক্ষণ । সান্নিপাতিক ব্রণে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক এই দোষত্রয়ের লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পায় ।

ব্রণের স্নখ-সাধ্য লক্ষণ । তরুণ বয়স্ক ব্যক্তির মর্ষস্থান ব্যতীত অন্য স্থানে ত্বক্ ও মাংস আশ্রয় করিয়া ব্রণ উৎপন্ন হইলে এবং তাহা দীর্ঘকাল-জাত না হইলে ও উপদ্রব (জ্বর তৃষ্ণাদি) বিহীন হইলে, স্নখসাধ্য অর্থাৎ সহজে আরোগ্য হয় ।

ব্রণের কৃচ্ছ্র সাধ্য লক্ষণ । যে ব্রণ মর্ষস্থানে কিম্বা ত্বক্ ও মাংসাদি-ব্যতীত গভীর ধাতু আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় অথচ যাহাতে মারাত্মক উপসর্গ বিদ্যমান থাকে না কিম্বা দুই একটি বলবান্ উপসর্গ থাকিলেও, যে ব্রণ মর্ষ-স্থানোৎপন্ন বা গভীর ধাতুশ্রয়ী নহে, তাহা কৃচ্ছ্রসাধ্য অর্থাৎ কষ্টে প্রশ-মিত হয় ।

ব্রণের অসাধ্য লক্ষণ । বলবান্ বা মারাত্মক উপসর্গবিশিষ্ট অথচ গভীর ধাতুশ্রয়ী ব্রণরোগ দুর্বল ব্যক্তির হইলে তাহা অসাধ্য ।

দুষ্ট ব্রণের লক্ষণ । দুষিত ব্রণ অতি দুর্গন্ধযুক্ত, শুদ্ধব্রণের বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট, দীর্ঘকাল স্থায়ী অর্থাৎ শীঘ্র আরোগ্য হয় না, পরন্তু ব্রণ হইতে সর্ষদা পুষ্যুক্ত, দুষিত রক্তস্রাব হয় ও ব্রণের মধ্যে গর্ত হইয়া থাকে ।

শুদ্ধ ব্রণের লক্ষণ । শুদ্ধ ব্রণ জিহবার তল-দেশের তায় বর্ণযুক্ত, কোমল, চক্ চকে ও অল্প বেদনাবিশিষ্ট হয় এবং ঐ ব্রণ হইতে দুষিত বা দুর্গন্ধ পুষ রক্তাদি স্রাব হয় না, স্রাবের পদ্ধিমাণ হ্রাস হয় এবং ঐ ব্রণের মধ্যে গর্ত দৃষ্ট হয় না ।

শুকাবস্থাপন্ন ত্রণের লক্ষণ । ত্রণ শুষ্ক হইয়া আসিলে, তাহার অভ্যন্তরভাগ পাণ্ডু বা ধূস্রবর্ণ অথচ ক্রৈদ অর্থাৎ পৃথরজ্ঞাদিশূন্য দৃষ্ট হয়, ক্রমশঃ চতুর্দিক পুরিয়া উঠে, কোনস্থানে ফাট বা গর্ত থাকে না, পরন্তু ত্রণে স্বাভাৱিক গায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

শুষ্ক ত্রণের লক্ষণ । ত্রণ শুষ্ক হইলে সমতল অর্থাৎ উচ্চতা নিম্নতা-রহিত, কোমল অথচ বেদনা ও শ্রাব রহিত এবং পার্শ্ববর্তী চর্ম্মের সমতুল্য বর্ণযুক্ত হয় ।

ত্রণের অপর কৃচ্ছ্রসাধ্য লক্ষণ । কুষ্ঠ, যক্ষ্মা ও মধুমহরোগাক্রান্ত-ব্যক্তির কিম্বা দূবী বিষাক্রান্ত (এড়াবিষ দ্বারা পীড়িত) রোগীর ত্রণ জন্মিলে, তাহা কৃচ্ছ্রসাধ্য অর্থাৎ কষ্টে আরোগ্য হয়, ত্রণের উপরে ত্রণ উৎপন্ন হইলে, তাহাও কৃচ্ছ্রসাধ্য ।

ত্রণের সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ । আগন্তুক ত্রণ বা সন্তোত্রণ হইতে বস্মা, মেদ, মজ্জা কিম্বা মস্তিষ্কের দি বহির্গত হইলেও ঐ ত্রণ সাধ্য, কিন্তু দোষোৎপন্ন ত্রণ হইতে ঐ সকল শ্রাব হইলে, তাহা অসাধ্য ।

ত্রণরোগীর অরিষ্ট অর্থাৎ মৃত্যু-লক্ষণ । যে ব্যক্তির ত্রণ হইতে মদ্য, অগুরু, ঘৃত, চন্দন বা জাতী, পদ্ম, চাঁপা অথবা পারিজাত পুষ্পের গায় গন্ধ নির্গত হয়, তাহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিবে ।

ত্রণের অপর অসাধ্য লক্ষণ । দেহের মর্ম্মস্থানে ত্রণ জন্মিলে তাহাতে অভ্যন্ত বেদনা থাকিলে ও সেই ত্রণ হইতে অত্যধিক পৃথরজ্ঞ শ্রাব হইলে এবং তৎসঙ্গে রোগীর বলক্ষয়, মাংসক্ষয় (শীর্ণতা,), শ্বাস, কাস, অরুচি প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, সেই ত্রণ রোগীকে পরিত্যাগ করিবে । এতদ্ব্যতীত যে ত্রণ-রোগীর দেহের অভ্যন্তরে দাহ অথচ বহির্ভাগে শীতলতা কিম্বা অভ্যন্তরে শীতলতা ও বাহিরে দাহ প্রকাশ পায়, পরন্তু নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগেও উপকার হয় না, তাহার জীবনের আশা থাকে না ।

ত্রণরোগ-চিকিৎসা-বিধি ।

শরীরের স্থান-বিশেষ সীমাবদ্ধরূপে ফুলিয়া উঠিলে এবং তাহা হইতে পরিণামে ত্রণ জন্মিবার সম্ভাবনা লক্ষিত হইলে, তাহাকে ত্রণ-শোধ বল

যায়। ইংরাজিতে ত্রণ-শোধের প্রথম অবস্থাকে ইনফ্রামেশন্‌ এবং পরবর্তী অবস্থাকে গ্যাব্‌সেস্‌ কহে। প্রদাহ অর্থাৎ জ্বালা যন্ত্রণার সহিত কোন স্থান ফুলিয়া উঠিলে, তাহাই ইনফ্রামেশন্‌ নামে অভিহিত, আর উক্ত প্রদাহিত স্থানে পূ্য-সঞ্চয়ের প্রারম্ভ হইতে ক্ষত প্রকাশ ও তাহা শুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত গ্যাব্‌সেস্‌ বলা যায়। ত্রণ-শোধ যাবৎ আমাবস্থা (অপকাবস্থা) অতিক্রম করিয়া পকাবস্থা প্রাপ্ত ও বিদীর্ণ না হয়, তাবৎ উহা ত্রণ-শোধ নামে অভিহিত ; কিন্তু পাকিলে, যে কোন উপায়ে অর্থাৎ অন্ত্রদ্বারা কাটিয়া, শস্ত্রদ্বারা বিদ্ধিয়া কিম্বা বিদারক ঔষধদ্বারা ফাটাইয়া পূ্যরক্ত বাহির করিয়া দিতে হয়, পূ্যরক্তাদি বাহির করিবার জন্ত যে ক্ষত অর্থাৎ বা প্রকাশ পায়, তাহাকে ত্রণ কহে। সংস্কৃতে যাহাকে ত্রণ কহে, চলিত কথায় তাহাকেই ক্ষত বা ঘা কহে। ত্রণ-শোধে যে পর্য্যন্ত ক্ষত প্রকাশ না পায়, তাবৎ ত্রণ-শোধের চিকিৎসা করিবে, কিন্তু ক্ষত প্রকাশ পাইলে, ত্রণ-রোগের চিকিৎসা করিতে হয়। ত্রণ সাধারণতঃ দুই প্রকার, শারীর ত্রণ ও আগন্তুক ত্রণ। শারীর-ত্রণ দোষোৎপন্ন অর্থাৎ শরীরস্থ বায়ু, পিত্ত ও কফ দূষিত হইয়া ঐ ত্রণ উৎপাদন করে, যেমন কিরঙ্গজনিত বাগী ও প্রমেহ পিড়কা অর্থাৎ বিদ্রম্বি প্রভৃতি। আর অন্ত্রে কোন অঙ্গ কাটিলে, কোন অঙ্গে অন্ত্র বিদ্ধ হইলে, আঙুণে কোন অঙ্গ দগ্ধ হইলে অথবা কোন অঙ্গে কোন কঠিন দ্রব্যের ঘর্ষণ বা আঘাত লাগিলে, ত্র্ণ (চর্ন্‌) ও মাংসের অপচয় বশতঃ যে ক্ষত বা প্া উৎপন্ন হয়, তাহাকে আগন্তুক ত্রণ কহে। আগন্তুক অর্থাৎ অকস্মাৎ উৎপন্ন হয়, একজ্ঞ উহার নাম আগন্তুক ত্রণ। আগন্তুক ত্রণের অপর নাম সন্‌দ্যো ত্রণ। আগন্তুক বা সন্‌দ্যোত্রণে যাবৎ পূ্যোৎপত্তি না হয়, তাবৎ সন্‌দ্যোত্রণের চিকিৎসা করিবে, পূ্যোৎপত্তি হইলেই ত্রণরোগের চিকিৎসা-পদ্ধতি অবলম্বন করিবে।

ত্রণ-শোধ যেমন নানাপ্রকার, ত্রণও তজ্জন নানাপ্রকার। বাহ্য দৃষ্টিতে দেখিলে ত্রণ সহজ বা অনায়াস-সাধ্যরোগ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিলে অত্যন্ত কঠিন বলিয়া বোধ হইবে, বিশেষতঃ রক্তদোষ বা প্রমেহজনিত ত্রণ অর্থাৎ পীড়কা কষ্টসাধ্য, তন্মধ্যে আবার মধুমেহজনিত ত্রণ অর্থাৎ কার্কস্কল প্রভৃতি অতি কষ্টসাধ্য ব্যাধি, এমন কি বিদ্রম্বিকে অসাধ্য বলিলেও অত্যাঞ্জন হয় না। বিদ্রম্বি-চিকিৎসা অতঃপর স্বতন্ত্র বর্ণিত হইবে।

পক-ত্রণ-শোথ অস্ত্রদ্বারা কাটিয়া দিলে কিম্বা ঔষধের প্রভাবে বিদীর্ণ হইলে, ত্রণ-মধ্যস্থ পুষ্ণরক্ত সমস্ত নির্গত হয় না, কতক ভিতরে থাকিয়া যায়, একারণ ত্রণের চতুর্দিক চাপিয়া টিপিয়া বা ঔষধের সাহায্যে পুষ্ণরক্তাদি বাহির করিয়া দিতে হয়। এইরূপ চাপিয়া টিপিয়া অথবা ঔষধ প্রয়োগ করিয়া পুষ্ণরক্তাদি বাহির করাকে সংক্লেতে অবপীড়ন কহে। পক শোথ বিদীর্ণ-হইবা মাত্রই চাপিয়া টিপিয়া পুষ্ণরক্তাদি বাহির করিয়া দিবে, অনন্তর অসময়ে ত্রণের মুখ অর্থাৎ পুষ্ণরক্ত নিঃসরণের পথ বন্ধ হইয়া না যায়, তজ্জন্ত তিল ও কচি নিমপাতা সমভাগে লইয়া দুগ্ধদ্বারা বাটিয়া এক বা দুই-অঙ্গুলি চওড়া ও প্রয়োজনমত লম্বা পরিষ্কার মিহি কাপড়ের ফালিতে মাখাইয়া উহা কাচ্লা নামক ঘাসের ডাঁটারদ্বারা আন্তে আন্তে ঘায়ের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে, ফলতঃ একরূপ আকারের বস্ত্রবও লইবে, যেন তদ্বারা পুষ্ণরক্তাদি নিঃসৃত হইবার ক্ষমতা স্থানটা খালি হইয়াছে, তাহা পূর্ণ হইতে পারে। ক্ষত-মুখ সৰু হইলে, তাহাতে একরূপ কাপড়ের ফালি প্রবেশ করান যায় না, এমতাবস্থায় তিল ও কচি নিমপাতা সমভাগে লইয়া বাটিয়া এক টুকরা কাপড়ে মাখাইয়া রোদ্রে একটু শুষ্ক করিয়া তদ্বারা বস্তি অর্থাৎ পলিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাই ঘা-মুখে প্রবিষ্ট করাইয়া রাখিবে, একরূপভাবে প্রবিষ্ট করাইবে যেন ঐ পলিতার এক বা দুই অঙ্গুলি আন্দাজ ঘা-মুখের বাহিরে থাকে এবং পরদিন ঐ পলিতা দরিয়া টানিলে বহির্গত হইয়া আইসে। অনন্তর পৈঁজা তুলায় রত মাখাইয়া ঘা-মুখে বিছাইয়া এবং ঘা-মুখের চতুর্দিকে অবপীড়ন প্রলেপ লাগাইয়া তদুপরি নরম কলার পাতা অথবা পান রাখিয়া কাপড়ের পটী জড়াইয়া উত্তমরূপে বান্ধিয়া রাখিবে। অবপীড়ন প্রলেপ নানাপ্রকার; গন্ধবিরজা, তিসি, তোকমারি, বেড়েলার পাতা ও শিমূল বৃক্ষের ছাল প্রভৃতি পিচ্ছিলদ্রব্য মাত্রই অবপীড়ন গুণবিশিষ্ট, ইহার কোন একটি-দ্রব্য উত্তমরূপে বাটিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলেই চলে, কিন্তু মাষকলাই, যব-চূর্ণ ও ময়দার অবপীড়ন সর্বাঙ্গেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উপকারী। ঐ তিনটি দ্রব্য সমান ওজন লইবে। প্রথমতঃ মাষকলাই ওজন করিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিবে, পরে উহার সহিত যব-চূর্ণ ও ময়দা মিশ্রিত করিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিবে। এই প্রলেপ শুষ্ক হইলেও ক্ষতি নাই, উপকারই হয়, কারণ প্রলেপ

শুষ্ক হইবার সঙ্গে সঙ্গে ত্রণ অত্যধিক পীড়িত হয় ও ত্রণ-মধ্যস্থ পুষ্পরক্তাদি অক্লেশে বাহির হইয়া আইসে। অবপীড়ন প্রলেপের উপরে কেহ কেহ পান বা কলার নরম পাতা বিছাইয়া তদুপরি তিসির পুলটিস্ বসাইয়া বান্ধিয়া রাখেন এবং পুলটিস্ ঠাণ্ডা হইলে, পুনর্বার ঐ বন্ধন খুলিয়া নূতন পুলটিস্ লাগাইয়া বান্ধিয়া রাখেন, এই প্রণালীতে অধিক ফল পাওয়া যায়, তবে দুষ্টত্রণ ব্যতীত এতাদৃশ পরিশ্রম করিবার আবশ্যকতা নাই। ক্ষত ক্ষুদ্র হইলে, যা মুখে পলিতা বসাইয়া তাহার চতুর্দিকে তুলসীপাতা ও লবণ একত্র বাটিয়া তদ্বারা অবপীড়ন প্রলেপ দিবে। প্রথমতঃ ঘা-মুখ ঘৃত-মাখান পৈজা তুলাদ্বারা একপভাবে আবৃত করিয়া লইবে, যেন লবণ সংযুক্ত তুলসী পাতার রস ঘা মুখে না লাগে।

ক্ষতস্থান কদাপি খোলা রাখিবে না। খোলা রাখিলে, হাওয়া লাগিয়া ঘায়ের উপরিভাগ পাতলা পরদা দ্বারা আচ্ছাদিত হয়, কিন্তু ক্ষত কখনও শুষ্ক হয় না, পরন্তু ঐ পর্দার নিম্নে অতি শীঘ্র অধিক পরিমাণে পচলা সঞ্চিত হইতে থাকে এবং তদ্বারা ক্ষত ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, এমন কি ঐ অবস্থায় নালী হওয়ারও বিশেষ সম্ভাবনা।

ক্ষত-স্থান উল্লিখিত উপায়ে যে দিন বান্ধিয়া রাখিবে, তৎপরদিন আবার বন্ধন খুলিয়া প্রথমতঃ ঈষৎ উষ্ণজলদ্বারা ভিজাইয়া আস্তে আস্তে পৈজা তুলা ও ত্রণ মধ্যস্থ পলিতা বা কাপড়ের ফালি খুলিবে, পরে নিমপাতা-সিদ্ধ জল বা নিমপাতা ও পলতাসিদ্ধজলদ্বারা ক্ষত-স্থান ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া পুনর্বার পূর্বদিনের নিয়মানুযায়ী বান্ধিয়া রাখিবে।

তিল ও নিমপাতার গুণে পচলা দূরীভূত হইয়া ক্ষত পূর্ণ হয়। উহা যেমন ত্রণ-শোধক, তেমনি ত্রণপূরক ও রোপক। দুইবার জন্ম জল প্রস্তুতের নিয়ম—এই—নিমপাতা ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ১৬ তোলা অথবা নিমপাতা ১ তোলা, পটোলপাতা ১ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ১৬ তোলা। যে পর্যন্ত ক্ষত একেবারে শুষ্ক না হয়, তাবৎ এই নিয়মে কার্য্য করিবে। ক্ষত-চিকিৎসার ইহাই সাধারণ নিয়ম; এই নিয়মে চিকিৎসা করিলে অধিকাংশ ক্ষত পরিস্কৃত ও পরিপূর্ণ হইয়া শুকাইয়া যায়, কিন্তু দুষ্ট ত্রণ উক্ত নিয়মে ঔষধ প্রয়োগ দ্বারাও শুষ্ক হয় না, ঐ অবস্থায় দুষ্টত্রণকে শুষ্ক করিয়া লইতে

হয়। দুইত্রণের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, নিমপাতা সিদ্ধ জল বা পলতা ও নিমপাতাসিদ্ধ জলের পরিবর্তে হরীতক্যাди কাথদ্বারা দুইক্ষত ধৌত করিবে। এই কাথ ত্রণ-শোধন-কার্যে যে কত উপকারী, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যাহারা ডাক্তারী ঔষধের প্রশংসায় দিগ্দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করেন, তাঁহারা অল্পগ্রহপূর্বক এই কাথটি প্রয়োগ করিলে, ইহার আশ্চর্যাণ্ডে নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইবেন। ধৌত করিবার সময়ে প্রয়োজন মত ত্রণের অভ্যন্তর পরিষ্কার করিবার জন্য ছোট বড় পিচ্কারী ব্যবহার করা যায়। দুইত্রণ দিবসে অন্ততঃ দুইবার ধৌত করা উচিত। কাথজল উত্তমরূপে ছাকিয়া শুদ্ধারা পিচ্কারী পূর্ণ করিয়া আন্তে আন্তে বা আবশ্যিকমত একটু জোরে অভ্যন্তরভাগ ধৌত করিবে। ধুইয়া একখণ্ড মিহি পরিষ্কার কাপড়দ্বারা ত্রণ-মধ্যস্থ জল মুছিয়া তৎপর তিলাষ্টকলেপ, নিম্বপত্রাদি লেপ, কিম্বা হরিদ্রাশুলেপ ইহার যে কোন একটি প্রলেপ ক্ষত-স্থানে লাগাইয়া পূর্বোক্ত প্রণালীমত বান্ধিয়া রাখিবে। ঘায়ে বেশী গচ্চা বা পচা মাংসাদি না থাকিলে, একমাত্র শারিবা লেপ প্রয়োগ করিলেও চলে। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণ তিল ও যষ্টিমধু কিম্বা নিমপাতা ও তিল অথবা নিমপাতা, তিল, যষ্টিমধু একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে কিম্বা একমাত্র ছাতিমগাছের ক্ষীর (কস বা আঠা) ক্ষতস্থানে লাগাইলে, দুইক্ষত অতি শীঘ্র বিশুদ্ধ হয়। ক্ষত সম্যক্ বিশুদ্ধ হইলে, ঘায়ের উপরের পচ্চা উঠিয়া যায়, মধ্যস্থ গর্ভ পূরিয়া উঠে, বেদনা কমে, রস, রক্ত ও পুষের দুর্গন্ধ থাকে না অথচ স্রাবের পরিমাণ হ্রাস পায়, তখন রোপণ অর্থাৎ ষা শুকাইবার ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। ক্ষত শুষ্ক হওয়ার জন্য নিম্বমূল প্রসিদ্ধ ঔষধ। একমাত্র নিম্বমূল প্রয়োগে অধিকাংশ ক্ষত আরোগ্য হয়। কচি নিমপাতা ও তিল একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে কিম্বা নিমপাতা, যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রার ছাল একত্র বাটিয়া মৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে ক্ষত শুষ্ক হয়। নরাস্থিলেপ ক্ষত শুষ্ক করণে অসাধারণ ঔষধ, কিন্তু অস্থি পুরাতন হওয়া চাই, নূতন লইবে না। ফিরঙ্গজনিত ক্ষত বা অতি পুরাতন দুই ক্ষতও উহা প্রয়োগে আরোগ্য হয়। এই প্রকার আরও একটি আশ্চর্য্য ঔষধ আছে,—পঞ্চবঙ্কল লেপ, ইহা প্রয়োগে যতি কষ্টসাধ্য ক্ষত আরোগ্য হয়। এই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ক্ষতস্থান দখিতে যখন জিহ্বার তল-দেশের দ্বায় বর্ণবিশিষ্ট দৃষ্ট হইবে ও তাহাতে

ক্ষুদ্র দানায়ুক্ত মাংসাস্তুর উদগত হইবে, এবং ক্ষত পূর্ণ হইয়া পার্শ্ববর্তীস্থানের প্রায় সমতুল্য হইবে অথচ ঘায়ে জ্বালাযন্ত্রণা ও শ্রাব থাকিবে না, তখন বুঝিতে হইবে যে, ক্ষত আরোগ্য হইতে আর বিলম্ব নাই। এই অবস্থায় কেবলমাত্র শতধৌতঘৃত তুলায় মাখাইয়া ঐ তুলা লাগাইয়া রাখিলেই চলে।

ঘায়ের মধ্যে গর্ভ হওয়া ছুষ্ঠব্রণের আর একটি লক্ষণ। গর্ভ হইলে একদিক উচ্চ হয়,—যে স্থান উচ্চ হয়, সে স্থানকে সমতল করিয়া লইতে হয়, নচেৎ ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক হয় না। ঐ সকল ব্রণ-শোধক ঔষধে প্রায়শঃ এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, কিন্তু যদি বিলম্ব হয়, তবে একখণ্ড কাঁচা তুতিয়া জলে ডুবাইয়া চিমটা দ্বারা ধরিয়া আস্তে আস্তে ঘায়ের উচ্চ স্থানের উপর বুলাইয়া আনিবে, দুই একবার বুলাইয়া আনিলেই ঐ স্থান একটু সাদা হইবে, তখন উহাতে ব্রণ-শোধক লেপ প্রয়োগ করিবে। বেশী বুলাইলে জ্বালা করিতে পারে। ইহাতে উচ্চস্থান বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় সমতল হয়। ডাক্তারখানায় এই নিয়মে চিকিৎসা করা হয়। ক্ষত ধৌত না করিলে উহাতে কাঁট বা পোকা জন্মে, এই অবস্থায় অগ্রে ঐ পোকা বিনষ্ট করিয়া পশ্চাৎ ব্রণ-শোধক প্রলেপ লাগাইবে। পোকা বিনষ্ট করিবার জন্ত নিমপাতা, নিশিন্দাপাতা ও ডহর করঞ্জার পাতা সমভাগে একত্র বাটিয়া কিম্বা তদভাবে কেবলমাত্র রসুন বাটিয়া ক্ষতমধ্যে প্রলেপ দিবে।

সূক্ষ্মমুখ-ব্রণ ।

এক প্রকার ব্রণ বা ক্ষত আছে, তাহার মুখ সূক্ষ্ম অর্থাৎ সরু, অথচ ভিতরের আয়তন বৃহৎ, এইরূপ ব্রণ হইতে পুষ্করজ্ঞাৎখোচিতরূপে নির্গত হইতে পারে না, সুতরাং ভিতরে আবদ্ধ রহিয়া প্রথমতঃ স্বীয় বাস্তু ধ্বংস করে, পশ্চাৎ পার্শ্ববর্তী শিরা, স্নায়ু ও মাংস বিনষ্ট করিয়া বিষম অনিষ্ট সংঘটন করে। এই অবস্থায় ঐ ব্রণে ঔষধ প্রয়োগ করা যায় না, ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইলে, ব্রণের মুখ বড় করিয়া লইতে হয়। নিমপাতা বাটিয়া বা মুখে লাগাইয়া বান্ধিয়া রাখিলে, ষা-মুখ বড় হয়। আপাঙ্গের পাতা ও সৈন্ধবলবণ একত্র বাটিয়া ষা-মুখের চতুর্দিকে প্রলেপ দিলে, উক্ত প্রলেপের স্থান ফাটিয়া পুষ্করজ্ঞাৎ নিঃসৃত হইতে থাকে। ভিতরের পুষ্করজ্ঞাৎ নিঃসরণের আর একটি আশ্চর্য্য ঔষধ বরিশালের অন্তর্গত চাঁদসীর বিখ্যাত চিকিৎসক স্বর্গীয় পদ্মডাক্তারপ্রয়োগ

করিতেন, বলা বাহুল্য, এখনও উহা বহুপ্রচলিত । এই ঔষধটি হৃদ-মুখ-
ত্রণ ও নালী-ঘায়ে প্রয়োগ করিলে, ভিতরের দূষিত পুষ্করাদি আকর্ষণ করিয়া
বাহির করে, হৃদ-মুখত্রণে অগ্রে এই ঔষধটি প্রয়োগ করিয়া পশ্চাৎ নিমপাতা-
বাটা ঘা-মুখে দিলে, ঘা-মুখ বড় হয় । ইহা বহুপরীক্ষিত এবং বিখ্যাত ঔষধ ।
ঔষধ প্রয়োগের নিয়ম এই—হিফে বা হেলেক্স নামক প্রসিদ্ধ তিক্তরসবিশিষ্ট
জলজ শাকের শিকড় জলে ধুইয়া কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া ছায়ায় শুকাইয়া
লইবে, কিন্তু ছেচিবে না, ছেচিলে, রস বাহির হইয়া যাইবে । পরে ফোড়ার
আয়তন অপেক্ষা কিছু বড় চারি খানি কলার নরম পাতা উপযুগপরি সাজাইয়া
হৃদমুখ লোহার শলাকা দ্বারা উহা বহু ছিদ্রযুক্ত করিবে । এইরূপে ছিদ্রবিশিষ্ট
দুইখানি পাতা উপযুগপরি সাজাইয়া তদুপরি ঐ কুচিগুলি রাখিয়া ফোড়ার
উপরে বসাইবে এবং অল্প ছিদ্রযুক্ত কলার পাতা দুইখানি তাহার উপরে
রাখিয়া ঢাকা দিয়া কাপড়ের পটী দিয়া জড়াইয়া বান্ধিয়া রাখিবে । এরূপভাবে
বান্ধিবে যেন বান্ধন না নড়ে অথবা ঢিলা হইয়া সরিয়া না যায় । এইরূপে
দুই দিন দুই রাত্রি অতীত হইয়া যাইলে বান্ধন খুলিলেই দেখা যাইবে,
ভিতরের পুষ্কর সমস্ত বহির্গত হইয়া পটী ভিজিয়া গিয়াছে, তখন নিমপাতা-
সিদ্ধ জল দ্বারা ক্ষত ধুইয়া নিমপাতাবাটা ঘা মুখে লাগাইয়া পুনর্বার বান্ধিয়া
রাখিবে, এইরূপভাবে দুই তিন দিন ঔষধ লাগাইলে, দেখা যাইবে যে ঘা-মুখ
বেশ বড় এবং ঘা লালবর্ণ হইয়াছে, তখন ঘা-শুকাইবার জন্য নিম্নস্থত প্রয়োগ
করিলেই চলে ।

ঘা-মুখ বড় করিবার আরও একটি ভাল ঔষধ আছে । বিগুন্ধ সীজের
কীর এক তোলা ও এক আনা ভূতিয়া ভস্ম উত্তমরূপে পেষণ করিয়া একখানি
রটিং কাগজে মাখাইয়া রোদ্রে শুকাইয়া লইবে । ঐ কাগজ কাঁচি দ্বারা
একটা দুয়ানির পরিমাণ কাটিয়া ক্ষতমুখে লাগাইবে । ভূতিয়ার পরিমাণ
বেশী হইলে, জ্বালা করে । কেহ কেহ কাগজখানিকে লাল করিবার নিমিত্ত
ঐ সঙ্গে একটু মেজেন্টার রং মিশ্রিত করিয়া থাকেন ।

পুরাতন দুর্ভিক্ষত ।

একপ্রকার পুরাতন দূষিত ঘা আছে, ত্রণ-শোধক ঔষধাদি প্রয়োগেও
তাহার বিশেষ উপকার হয় না, উপরে সর্বদা ময়লা বা পচলা সঞ্চিত থাকে,

ভিতরে সর্বদা শুড়্ শুড়্ করে, যেন পোকা জন্মিয়াছে বলিয়া বোধ হয় । বেশী বেদনা বা জ্বালাময়তা থাকে না, একরূপ ঘায়ের একটি আশ্চর্য্য ঔষধ নিম্নে লিখিত হইল । ঘায়ের আয়তন অপেক্ষা কিছু ছোট একখানি ছাগলের মাংস ঘায়ের উপর একরূপভাবে বসাইবে, যেন ক্ষতস্থান বেশ চাপা পড়ে এবং যেন ঘায়ের কোন অংশ খালি না থাকে । এইরূপে বসাইয়া তরুণের কলার নরম পাতা বা ক্ষত ছোট হইলে, পান রাখিয়া কাপড়ের পট্টা জড়াইয়া বান্ধিয়া রাখিবে, একদিন এক রাত্রি এইরূপে বন্ধন রাখিবে, পরে খুলিয়া যদি দেখা যায়, যা বেশ পরিষ্কার হইয়া শুদ্ধ ত্রণের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, তবে নিম্নপাতাসিদ্ধ জলে ধুইয়া রোপক অর্থাৎ যা শুকাইবার ঔষধ লাগাইবে । আর যদি ভাল পরিষ্কার হয় নাই বলিয়া বোধ হয়, তবে পুনর্বার আর একখণ্ড টাটকা মাংস লাগাইয়া একরূপ বান্ধিয়া একদিন একরাত্রি রাখিবে । প্রায়শঃ দুই তিনবারের বেশী মাংস লাগাইতে হয় না ।

নাড়ীত্রণ বা নালী ঘা । (সাইনাস্)

অপক ত্রণ-শোধ বা পক ত্রণ-শোধ উপেক্ষা করিলে, দূষিত পুণ্ড্র ও রক্তাদি বহির্গত হইতে না পারিয়া নিকটবর্তী ত্বক্ মাংসাদি বিদীর্ণ করিয়া অস্তঃস্থিদ্ৰ-যুক্ত লতার জ্বায় যে ক্ষত প্রকাশ করে, তাহাকে সংস্কৃতে নাড়ীত্রণ ও চলিত-কথায় নালী ঘা বা শোষ কহে । ইংরাজীতে ইহাকে সাইনাস্ কহে । ত্রণশোধ প্রকাশ পাইবামাত্র, তাহাকে বসাইবার অথবা পাকাইবার চেষ্টা না করিলে, তদ্ব্যবস্থায় দূষিত রক্ত, মাংসাদি ভেদ করিয়া নালী উৎপাদন করে । আবার ছেদন করিয়াই হউক বা অন্য যে উপায়েই হউক, পক ত্রণ-শোধের মধ্যস্থ্যপুণ্ড্র বাহির করিয়া না দিলেও, চর্ম্ম মাংসাদি ভেদ করিয়া নালী উৎপাদন করে । অপর সম্ভোত্রণ বা আগন্তুক ত্রণ হইতেও ঐ উভয় কারণে নালী হইতে পারে । আবার কোন অঙ্গের কোন স্থানে কণ্টক বা শল্যাদি প্রবিষ্ট হইলে যদি তাহা সময়ে বাহির করা না যায়, কিম্বা কিয়দংশ ভিতরে রহিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা হইতেও নালী হইতে পারে । নালী প্রকাশ পাইলে, ভগ্নদ্রব রোগোক্ত স্নানাদি বর্জিত প্রয়োগ করিবে এবং প্রত্যহ একবার করিয়া নিম্নপাতাসিদ্ধ জলে ক্ষত-স্থান ধোত করিবে, এইরূপ প্রত্যহ ব্রীতিমত্ত ধোত

ও বর্তি প্রয়োগ করিলে ক্ষত পরিষ্কার ও নালীর আকার বড় হইয়া আসিবে, এই ঔষধ প্রয়োগেই অনেক নালী বা আরোগ্য হয়, কিন্তু যদি উহাতেও আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে, হৃৎকম্প প্রণালী অনুসারে হিষ্কার শিকড় অথবা ব্লটিং কাগজ লাগাইবে, কিম্বা ক্ষতান্তক মলম বা ক্ষতকুলান্তক-মলম প্রয়োগ করিবে, এই মলম দুইটি পূর্ববঙ্গের বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি-অঞ্চলে সমধিক ব্যবহৃত হয় এবং উহাতে অসাধারণ উপকার পাওয়া যায় ।

সদ্যোত্রণ বা আগন্তুজ ত্রণ ।

কোন অঙ্গ আঙুণে পুড়িলে বা অঙ্গে কাটিলে অথবা কোন অঙ্গে শস্ত বিচ্ছিলে, যে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহাকে সদ্যোত্রণ বা আগন্তুজ ত্রণ কহে ।

হাতে, পায়ে বা অঙ্গুলিতে অগ্নির উত্তাপ লাগিলে, তৎক্ষণাৎ ঐ স্থানে একটু মধু ঢালিয়া দিলে কিম্বা তদভাবে হিং জলে ঘসিয়া নারিকেল বা তিল-তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে, তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবৃত্তি হয় ও ক্ষোদ্র পড়ে না, কিন্তু বেশী পুড়িলে ও চামড়া উন্টাইয়া ক্ষত প্রকাশ পাইলে, হিং প্রয়োগ নিষেধ । এতদ্ব্যতীত উত্তাপ লাগিবামাত্রই সেই স্থানে পুনর্বার আঙুণের উত্তাপ সহমত লাগাইবে, অবশ্য পুনর্বার আঙুণের তাপ লাগাইলে একটু বেশী জ্বালা করিবেই, কিন্তু তাহা সহ করিয়া থাকিতে পারিলে উত্তাপ দিতে দিতে জ্বালা কমিয়া আইসে, ইহাকেই বলে বিধে-বিষ-ক্ষয় । অধিক স্থান দগ্ন হইলে, এইরূপ উত্তাপ লাগাইতে অত্যন্ত কষ্ট হয় ।

কোন অঙ্গ পুড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ চূর্ণেণ স্বচ্ছ জল ও নারিকেল তৈল বা তিল তৈল একসঙ্গে ফেনাইয়া মাখনের মত হইলে, সেই স্থানে লাগাইবে । অনন্তর জীরকাদি তৈল বা কিঞ্চুলুক তৈল হৃৎকম্প পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ডে ভিজাইয়া লাগাইবে ও তদুপরি কলার নরম পাতা রাখিয়া উত্তমরূপে বান্ধিয়া রাখিবে । প্রত্যহ একবার করিয়া বন্ধন খুলিবে ও নিমপাতা সিদ্ধজল দ্বারা ধৌত করিয়া উক্ত তৈল-সিক্ত বস্ত্রখণ্ড লাগাইয়া পুনর্বার বান্ধিয়া রাখিবে । জীরকাদি তৈল প্রয়োগে যে ক্ষত শুষ্ক না হয়, তাহা কিঞ্চুলুক তৈল প্রয়োগে শীঘ্র শুষ্ক হয় । কিঞ্চুলুক তৈলটি অগ্নিদগ্ন ঘায়ে উৎকৃষ্ট ঔষধ । এতদ্ব্যতীত শতধৌত ঘৃত ও নিমপাতা বাটা লাগাইলেও ক্ষত শুষ্ক হয় । শতধৌত ঘৃত প্রস্তুতের নিয়ম-

এই—পুরাতন হইলেই ভাল হয়, কিন্তু পুরাতন অভাবে নূতন ঘৃত হইলেও চলে। ঐ ঘৃত আবশ্যকমত গ্রহণ করিয়া একটি জল-পূর্ণ বাটীর মধ্যে হাত ডুবাইয়া অঙ্গুলিদ্বারা ঘৃত ছানিবে, ছানিতে ছানিতে কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া ভাসিবে, সেই ভাসমান বিচ্ছিন্ন অংশ একত্র করিয়া ঐ জলে ফেলিয়া নূতন জল লইয়া তাহার মধ্যে আবার ঐ প্রণালীমত ছানিবে, এইরূপ একশত বার করিলে তাহাকে শতধৌত ঘৃত কহে। এই ঘৃত নানাপ্রকার দূষিত বা বিস্তৃক্ত ও শুষ্ক করিবার জন্য প্রয়োগ করা যায়। অগ্নিদগ্ধ স্থান অতি বস্ত্রে রক্ষা করা উচিত। বাহাতে ফোঁদা পড়িতে ও ঘা হইতে না পারে, তৎপ্রতি মনঃসংযোগ করিবে, কারণ অগ্নিদগ্ধ ক্ষত হইতে খেতকুষ্ঠ উৎপন্ন হইতে পারে।

অন্ত্রে কোন অঙ্গের কোন অংশ কাটিলে, কর্ত্তিত বা কাটা অংশ প্রায়ই দুই তিন বা তদধিক ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে, এ অবস্থায় প্রথমতঃ বিভক্ত-অংশগুলি যথাস্থানে অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় যে স্থানে যেরূপ ভাবে ছিল, তদ্রূপ স্থাপন করিয়া হস্তদ্বারা চাপিয়া ধরিবে এবং প্রচুর পরিমাণে শীতল জল সেচন করিবে। কিছুকাল এইরূপ জল সেচন করিলে, প্রায়ই রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, শীতল জলের পরিবর্তে বরফ জল সেচন করিলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। রক্ত বন্ধ করিবার সাধারণ নিয়ম কথিত হইল, কিন্তু শীতল জল বা বরফ জল-দ্বারা অধিকাংশ স্থলেই রক্ত বন্ধ হইলেও সর্বত্রই বন্ধ হয় না। স্থূল ধমনী কাটিয়া গেলে শীতল জল বা বরফ জলে কার্য্যসিদ্ধি অর্থাৎ রক্ত বন্ধ হয় না, ঐ অবস্থায় অবিলম্বে কচি দুর্লভাধাস ছেঁচিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবে, যদি তাহাতেও রক্তরোধ না হয়, তাহা হইলে আপাঙ্গের পাতা বা বিশল্যকরণী (আয়াপান) ইহার যে কোন একটি দ্রব্যের পাতার রস সেচন করিবে, তাহাতেও রক্ত বন্ধ না হইলে, অবিলম্বে উপযুক্ত চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

রক্ত বন্ধ হইলে, ক্ষত স্থানে কপূরচূর্ণ ছড়াইয়া আকান্দীপাতা বা বিস্তাড়কের পাতা ক্ষতস্থে লাগাইয়া কাপড়ের পটীদ্বারা উপত্যরূপে বান্ধিয়া রাখিবে। আকান্দীপাতা ও লতার রক্তরোধের ক্ষমতাও যেমন আছে, মাংস জুড়িবার শক্তিও তদ্রূপ আছে, উক্ত উভয়প্রকার পাতার অভাবে পান বা নরম কলার পাতা ক্ষতস্থানে লাগাইয়া পটী বান্ধিবে। কপূর ছড়াইলে ক্ষতস্থানে

বেদনা হয় না বা ক্ষতস্থান পাকৈ না। এইরূপে যে দিন বান্ধিয়া রাখা হইবে, তাহার দুইদিন পরে অর্থাৎ তৃতীয় দিনে উক্ত বান্ধন খুলিবে এবং নিমপাতা-সিদ্ধজল দ্বারা ক্ষত ধৌত করিয়া নিষ-স্রুত মাখন কাপড়ের ফালি দ্বারা ক্ষত-স্থান আচ্ছাদিত করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। দুই চারি দিন যদি ঐরূপ ঔষধ-প্রয়োগে শুদ্ধ ত্রণের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে, বুঝিতে হইবে, ঐ নিষস্রুত প্রয়োগেই যা শুদ্ধ হইবে, কিন্তু যদি ঘায়ের পচলা বা ময়লা না কমে, তাহা হইলে ত্রণশোধক নিষপত্রাদিলেপ প্রয়োগ করিয়া ত্রণ শুদ্ধ করিয়া নিষস্রুত প্রয়োগ করিবে। আগন্তুক বা স্ফোত্রণে পূর্ষোৎপত্তি হইলেই শারীর ত্রণোক্ত বিধান অনুযায়ী তাহার চিকিৎসা করিবে। অঙ্গ শব্দ বা কণ্টকাদি বিদ্ধ হইলে যে ক্ষত হয়, তাহার রক্তবদ্ধ করিবার জন্য উক্ত প্রণালী অবলম্বন করিবে। অবশ্য অঙ্গে বিদ্ধ কণ্টক বা শব্দাদি ক্ষিপ্ৰহস্তে বাহির করিয়া পৃষ্ঠাৎ রক্ত বদ্ধ করিবে, পরে ক্ষতস্থানে পূর্নচূর্ণ ছড়াইয়া উক্ত প্রণালীমত বান্ধিয়া রাখিবে। কোন অঙ্গে কণ্টকাদি বিদ্ধ হইলে, সেই স্থানে একটু সরিষার তৈল লাগাইয়া রাখিবে, যদি তাহাতে না পাকে, তাহা হইলে ত্রণ পাকাইবার ঔষধ প্রয়োগ করিয়া পাকাইবে, পাকিলে কণ্টকাদি আপনা হইতেই বহির্গত হইয়া যায়।

কোন কঠিন দ্রব্যের যথা লাগিয়া কোন অঙ্গে ক্ষত হইলে, অঙ্গে শীতল-জলে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া তদুপরি লাগাইবে এবং জল শুষ্ক হইলে, পুনঃপুনঃ শীতল জল সেনচন করিবে, এইরূপে রক্তশ্রাব ও বেদনার নিবৃত্তি হইলে, রক্ত-চন্দন ঘষা কিম্বা পুরাতনস্রুত কলার পাতায় বা পানে মাখাইয়া তদ্বারা ক্ষত বান্ধিয়া রাখিবে।

শূকরদংশনক। এইরোগে শরীরের স্বক্ স্থানে স্থানে পাকিয়া ক্ষত হয় এবং তদুপরি কণু উদ্গত হয়, দেখিতে ঐ ক্ষতের প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং তাহাতে বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে, এই রোগকে বরাহদংশন বা শূকরদংশন কহে। চলিত কথায় উহাকে বরাহদাড় কহে। এই রোগে রোগীর জ্বর হয়। ইহা বিসর্পের স্তায় গমনশীল।

চিকিৎসা। রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র হলুদ ও ভীমরাজের মূল বাটিয়া

প্রলেপ দিবে। ইহাতে রোগ সঞ্চরণের গতিরোধ হয় এবং পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিলে রোগও প্রশমিত হয়। ইহাতে অমৃতাদি কাথ প্রয়োগ করিবে।

বৃষণকচ্ছু। যথারীতি ঘন ও গাত্র মার্জনা না করিলে, অণ্ডকোষে ময়লা সঞ্চিত হয় ও ক্রমশঃ সেই ময়লা হইতে কণ্ডু অর্থাৎ চুলকনা উৎপন্ন হয়, পরে উহা চুলকাইতে চুলকাইতে ক্ষত প্রকাশ পায় ও তাহা হইতে রস নির্গত হইতে থাকে। এই রোগকে বৃষণকচ্ছু কহে। ইহা কফ ও রক্ত-দোষে উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা। চাউল মুগরার তৈল দ্বারা রসাজন ঘসিয়া পুনঃপুনঃ লাগাইবে।

অহিপূতন। বালক বালিকাদিগকে ঘন না করাইলে বা তাহাদের মলদ্বার, মূত্রদ্বার ও যোনিদ্বার ধুইয়া মুছিয়া না দিলে, ঐ সকল স্থানে ময়লা সঞ্চিত হইয়া একপ্রকার কণ্ডু উদ্ভূত হয় ও তাহা চুলকাইতে চুলকাইতে পাকিয়া উঠে ও ক্ষত প্রকাশ পায় এবং রস রক্ত ও পুষ্টি নির্গত হইতে থাকে। অনন্তর ক্রমশঃ সমস্ত ক্ষতগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া ঘোরদর্শন বৃহৎ একটী ক্ষততে পরিণত হয়; শিশুদিগের ইহা স্নতি কঠিন রোগ। এই রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র চিকিৎসকের প্রয়োজন, উপেক্ষা করিলে মহান্ অনর্থ সঙ্গটিত হয়।

চিকিৎসা। রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র রসাজন চাউলমুগরার তৈলে ঘসিয়া পুনঃ পুনঃ লাগাইবে ও যথারীতি ক্ষতস্থান বান্ধিয়া রাখিবে। ক্ষতস্থান খয়ের ও নিমপাতার কাথ দ্বারা দিবসের মধ্যে তিনবার ধোত করিবে।

অরুণ্ষিকা। ইহা একপ্রকার ক্ষতরোগ, মস্তকের উপরিভাগে জন্মে। প্রথমতঃ মস্তকের উপরে স্থানে স্থানে কতকগুলি ক্ষোটক উদ্ভূত হয়, তন্মধ্যে কতকগুলি পাকে ও ক্ষততে পরিণত হয়, কতকগুলি পাকিতে আরম্ভ করে ও ক্ষত স্থানের আয়তন বর্দ্ধিত করে, আবার কতকগুলি নূতন উদ্ভূত হয়, এইরূপে ক্রমশঃ বহুমুখ ও অত্যধিক ক্লেদযুক্ত ক্ষত সমস্ত মস্তক পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ইহা হইতে অধিক ক্লেদ নির্গত হয়।

চিকিৎসা। অরুণ্ষিকার ক্ষত প্রকাশ পাইবামাত্র খয়ের ও কচি নিমপাতার কাথ দ্বারা ক্ষত-স্থান ধুইয়া আঙুলে আঙুলে একখানি কাপড় বুলাইয়া মুছিয়া ফেলিবে, অনন্তর কুড়কাঠ (বেশে দোকানে পাওয়া যায়) খণ্ড খণ্ড

করিয়া কাটিয়া লোহার হাতায় করিয়া ভষ্ম করিবে। সাবধান, যেন পুড়িয়া মাদা না হয়। যখন ধূম রহিত হইবে অথচ কাল থাকিবে, তখন নামাইয়া চূর্ণ করিবে, এই চূর্ণ তিলতৈলের সহিত মর্দন করিয়া লাগাইলে অতি সত্ত্বর রোগ প্রশমিত হয়। দিবসের মধ্যে তিন চারিবার ধুইবে ও ঔষধ লাগাইবে। এই রোগে বসন্ত রোগোক্ত ঋদ্রাষ্টক কাথ বা নিম্বাদি কাথ পানের ব্যবস্থা করিবে।

শর্করার্কুদ । প্রকুপিত বায়ু ও কফ মাংস, শিরা, স্নায়ু ও মেদ দূষিত করিয়া ত্বকের উপর এক প্রকার গ্রন্থি উৎপাদন করে। ঐ গ্রন্থি পাকে ও বিদীর্ণ হয় এবং বিদীর্ণ হইলে তাহা হইতে ঘৃত, মধু ও বসার তায় অথচ অধিক পরিমাণে শ্রাব হয় এবং অত্যধিক শ্রাব হেতু ধাতুক্ষয় বশতঃ বায়ু অত্যধিক রুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অভ্যন্তরস্থ মাংসকে শোষণ পূর্বক শর্করার তায় কঠিন গ্রন্থি উৎপাদন করিয়া তন্মধ্যস্থ শিরা সমূহ দ্বারা পচা অথচ দুর্গন্ধবিশিষ্ট নানা বর্ণের ক্লেদ নিঃসারিত করে, কখনওবা উহা হইতে অকস্মাৎ রক্তশ্রাব হয়।

চিকিৎসা । রোগের প্রথমাবস্থায় অর্কুদরোগোক্ত বিকলতা-প্রলেপ বা শল্মাদিচূর্ণ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বসিয়া যায়। পাকিলে দস্তাদিলেপ প্রয়োগ করিয়া ফাটাইবে। ক্ষত হইলে নিমপাতাসিদ্ধ জল দ্বারা ক্ষত ধৌত করিবে ও ব্রণরোগের তায় চিকিৎসা করিবে। সেবনের জন্য অর্কুদরোগোক্ত কাঞ্চনার গুগ্‌গুলু ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

ব্রণরোগে—ঔষধ ।

হরীতক্যাди কাথ । বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ-ব্রণে ঔষধ প্রয়োগপক্ষেও ক্ষত শুদ্ধ না হইলে এবং দুষ্টব্রণের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথজল ছাকিয়া ক্ষত ধৌত করিবে। দিবসে অন্ততঃ দুইবার ধৌত করা প্রয়োজন।

হরীতকাদি কাথ । হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ধরৈর, দারুহরিজা, বটহাল, যজ্ঞডুমুর-হাল, অখণ্ড-হাল, কদম্ব-হাল, পাকুড়-হাল, অন্নবেতস-হাল, করবীফুলের গাছের ছাল, আকল-মুলের ছাল, ফুড়িছাল, নিমপাতা ও কুলপাতা ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ছাকিয়া লইবে।

তিলাকটক-লেপ । বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ-
কৃত নিম্বয়ত প্রয়োগে আরোগ্য না হইলে অথচ ঐ সকল ত্রণে দুষ্টত্রণের লক্ষণ
অর্থ্যাৎ ত্রণের উপরে নানাবর্ণের ময়লা সঞ্চিত হইলে, হরীতক্যাди কাণধারা
ক্ষত ধৌত করিয়া এই লেপ ঘায়ের উপরে লাগাইবে । ইহা প্রয়োগে ত্রণের
বেদনা ক্লেদ, শ্রাব, জ্বালা, রক্তশ্রাব, টাটানি, শূলানি, দপ্ দপ্ করা প্রভৃতি
উপসর্গ দূরীভূত হইয়া ত্রণ বিশুদ্ধ হয় এবং কিছু দিন প্রয়োগে শুষ্ক হইয়া
থাকে । ইহাতে লবণ আছে, সূত্ররাং লাগাইবামাত্র একটু ধরে অর্থাৎ জ্বালা
করে, কিন্তু একটু সহিয়া থাকিলেই দুইচারি মিনিট পরে বেদনা প্রশমিত হয় ।

ভিলাষ্টক-লেপ । কৃষ্ণভিলের শাস, সৈন্ধব লবণ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, বৃহৎ,
যষ্টিমধু ও নিম্বপাতা : এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগ, জল বা দুধে মর্দন করিবে । বাটিয়া
ঘষাচন্দনের হায়ে করিবে । অগ্রে অগ্ন্যাগ্ন দ্রব্য বাটিয়া পশ্চাৎ ঘৃত মিশাইবে ।

নিম্বপত্রাদি লেপ । বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক ও
রক্তজ-ত্রণে দাহ, বেদনা ও দুর্গন্ধযুক্ত শ্রাব থাকিলে, অথচ দুষ্টত্রণের লক্ষণ
প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ ত্রণে লাগাইবে । ইহাতে ত্রণ শুষ্ক ও শুষ্ক হইয়া
থাকে । ইহাতেও লবণ আছে, তজ্জন্ম লাগাইবামাত্র একটু জ্বালা করে,
কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই শীতল হয় ।

নিম্বপত্রাদি লেপ । কচি নিম্বপাতা, কৃষ্ণভিল, দন্তীমূলের ছাল, তেউড়ীমূলের ছাল,
সৈন্ধবলবণ ও বপু, প্রত্যেকে সমভাগ, দুধে মর্দন । অগ্ন্যাগ্ন দ্রব্য অগ্রে ঘষাচন্দনের হায়ে
বাটিয়া পশ্চাৎ মধু মিশ্রিত করিবে ।

শারিবা লেপ । বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ
ত্রণে বেশী ক্লেদ বা শ্রাব না থাকিলে, অথচ ক্ষত শুষ্ক হইতে বিলম্ব হইলে,
এই ঔষধ বাটিয়া ঘায়ে লাগাইবে । ইহা ত্রণ-শোধক ও রোপক ।

শারিবা লেপ । অনন্তমূল দুধবারা বাটিয়া প্রলেপ দিবে ।

হরিত্রাদ্য লেপ । দুষ্ট ত্রণের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তাহাতে
দাহ, বেদনা, ময়লা বা পচলা ও রক্তশ্রাব থাকিলে হরিতক্যাদি কাণধারা ক্ষত
ধৌত করিয়া এই প্রলেপ ঘায়ে লাগাইবে । ইহা প্রয়োগে জ্বালা করে না ।

হরিত্রাদ্য লেপ । হরিত্রা, দারুহরিদ্রা, নিম্বপাতা, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, যষ্টিমধু, কৃষ্ণভিল
ও পলতা প্রত্যেকে সমভাগ । দুধে পেষণ ।

কুষ্ঠাদি লেপ । বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ-
ত্রণ নিষ্পত্ত প্রয়োগে আরোগ্য না হইলে এবং ঐ সকল ত্রণের উপরে পচলা
সঞ্চিত থাকিলে, বিশেষতঃ তলদেশ অসমতল বা উচ্চ নীচ দৃষ্ট হইলে, হরী-
তক্যাদি কাথ দ্বারা ক্ষতস্থান ধোত করিয়া এই লেপ লাগাইবে । যে পর্য্যন্ত
ঘায়ের অবস্থা পরিবর্তন হইয়া শুদ্ধ ত্রণের লক্ষণ প্রকাশ না পায়, তাবৎ প্রত্যহ
দুই বেলা দুই বার করিয়া ধোত করিবে ও প্রলেপ লাগাইবে ।

কুষ্ঠাদি লেপ । প্রস্তুতবিধি ৮২৭ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য ।

ক্ষতকুলান্তক মলম । নিষ্পত্ত প্রয়োগে যে ক্ষত আরোগ্য না হয়,
এই মলমে সেই ক্ষত আরোগ্য হয় । ইহা নালী ঘায়েরও মহৌষধ । যে
নালী ঘায়ের মুখ নিতান্ত স্থল বা সরু নহে, অন্যায়সে ঔষধ প্রবিষ্ট হয়, সেই
সকল নালীবা এই মলমে শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে । স্থল মুখ ত্রণে অগ্রে
হিকার শিকড় প্রয়োগ করিয়া ঘা-মুখ বড় হইলে, ইহা প্রয়োগ করিবে ।
ফিরঙ্গজন্মিত বাগীতে কিস্বা অগ্রে ফোড়া হইয়া পশ্চাৎ তন্মধ্যে নালী হইলে,
ইহা প্রয়োগে রোগ আরোগ্য হয় ।

ক্ষতকুলান্তক মলম । নারিকেল তৈল ২০ তোলা, মনসানীজের পাতার রস ১০ তোলা,
আপাঙ্গের পাতার রস ১০ তোলা, নিমপাতার রস ১০ তোলা, গাঁজা চূর্ণ অর্দ্ধতোলা, মূষা-
শাখ চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা, বিশুদ্ধ গন্ধকচূর্ণ অর্দ্ধ তোলা ও তুতিয়াভস্ম চারি আনা । সমস্ত একত্র
করিয়া জাল দিবে । জল রহিত হইলে, তৈল নামাইবে । দুই চারি কোঁটা তৈল আণ্ডে
ফেলিয়া দিবে এবং চটুপটু শব্দ না হইলে, নামাইবে । মনসানীজের পাতা নির্ধূম অঙ্গারান্নিতে
উত্তপ্ত করিয়া নিম্জড়াইয়া রস লইবে ।

ক্ষতান্তক মলম । ইহা নালী ঘায়ের মহৌষধ । নালী ঘারে এই মলম
যদি কোনপ্রকারে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে, ক্ষত আরোগ্য-
সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না । যে কোন প্রকার নালী ঘায়ে ইহা
প্রয়োগ করা যায় । নালী ঘায়ের মুখ স্থল হইলে, মূষাদি বস্তি প্রয়োগ করিয়া
মুখ বড় করিয়া লইবে, অথবা হিকার শিকড় ছেচিয়া লাগাইবে, কিস্বা
নিমপাতা বাটা লাগাইয়া মুখ বড় করিয়া এই ঔষধ লাগাইবে ।

ক্ষতান্তক মলম । কোমল শাঁস হইয়াছে, এরূপ একটি ডাব নারিকেলের মুখ কাটিয়া
মুখটিখানা পুথক করিয়া রাখিবে ও জল ফেলিয়া দিবে । পরে ঐ ডাবের উপরের কতকংশ

চাছিয়া ডাবটি বেশ হাল্কা করিবে। অনন্তর ঐ ডাবের মধ্যে যখন ১০ তোলা, আপাঙ্গের পাতার রস ২৥০ তোলা, খোসা ছাড়ান ও বাটা পেরোজ ২৥০ তোলা ও গাঁজা চূর্ণ, চারি আনা, এই সকল দ্রব্য রাখিয়া মুখটিখানি পূর্বে যেমন ছিল, ঠিক তদ্রূপ করিয়া লইবে, তৎপরে স্তম্ভাধারা ব্যক্তিরা কাপড় জড়াইয়া মাটির লেপ দিয়া রোজে শুষ্ক করিবে এবং ঘূটের আগুনে পাক করিবে। পাক করিতে করিতে যখন শেঁ শেঁ শব্দ রহিত হইবে, তখন অর্থাৎ জল রহিত হইলেই নারিকেল উঠাইবে। পাক ঠিক হইয়াছে কি না, বুঝিতে না পারিলে, মুখটিখানা উঠাইয়া দেখিবে, যদি জল থাকে, তাহা হইলে পুনর্বার মুখটি ঢাকা দিয়া জাল দিবে। একটু ঔষধ আগুনে ফেলিয়া দিলে যদি শব্দ না হয়, তাহা হইলে, পাক ঠিক হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। ঘূটিয়ার অভাবে কাঠের আগুনে জাল দিবে।

স্নুহাদি বর্ত্তি। যে কোন প্রকার ত্রণে (ষায়ে) নালী অর্থাৎ শোথ হইলে, এই বর্ত্তি প্রয়োগ করা যায়, অনেক নালী এই বর্ত্তি প্রয়োগেই আরোগ্য হয়, আবার যে নালী আরোগ্য না হয়, তাহারও আয়তন ও মুখ বড় হয়, স্তম্ভাধারা অথবা ঔষধ অক্লেশে প্রয়োগ করা যায়।

স্নুহাদিবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৮২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নরাস্থি-লেপ। অত্যাশু ঔষধে ক্ষত শুষ্ক না হইলে, এই ঔষধ ক্ষতস্থানে লাগাইলে, অতি শীঘ্র ক্ষত শুষ্ক হয়।

নরাস্থিলেপ। মনুষ্যের কপালের পুরাতন অস্থি, ত্রিফলার কাথ বা জলধারা শিলায় ঘষিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবে।

পঞ্চবকুল-লেপ। দুর্গন্ধ পুষ্পরক্ত আবযুক্ত যে সকল দুষ্ট ক্ষত অত্যাশু ঔষধে আরোগ্য হয় না, এই লেপ প্রয়োগে তাহা অবিলম্বে আরোগ্য হয়। ইহা প্রয়োগে ত্রণ শুষ্ক হইয়া শুষ্ক হয়।

পঞ্চবকুললেপ। প্রস্তুতবিধি ৭২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অমৃতাদি ক্কাথ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক, রক্তজ এবং আগন্তুক ত্রণরোগীর ত্রণে বেদনা, ত্রণ হইতে রুদ পুথাদি নিঃসরণ, অন্নরস ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ত্রণ-শোথ এবং নানাবিধ ত্রণরোগে ইহার ত্রায় শক্তিশালী ঔষধ আর নাই বলিলেই হয়। দূষী বিষ জনিত ক্কাথ অত্যাশু ত্রণ-শোথ, দুষ্ট ত্রণ, বীষর্প, বিদ্রুধি, সর্পবিধ ক্ষোভক ও নালী বা প্রভৃতি যে প্রকারই হউক না কেন, ইহা

নির্নিগারে প্রয়োগ করা যায় । তৎসংস্থষ্ট জরেও ইহা মহৌষধ । বসন্ত ও হাম প্রভৃতি রোগেও ইহা সমধিক উপকারী । ইহা সর্বদা ব্যবহার্য্য, স্মরণ্য বহু-পরীক্ষিত । ত্রণশোথের প্রারম্ভে ইহা প্রয়োগ করিলে, ত্রণ পাকিবার ও তাহা হইতে ক্ষতপ্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা থাকে না । ঐ সকল অবস্থায় কোষ্ঠ-কাঠি থাকিলে, তেউড়ীচূর্ণ অথবা ক্যাষ্টর অয়েল মিশাইয়া দিবে ।

অমৃতাদি কাথ । প্রস্তুতবিধি ৮২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

পটোলাদিকাথ । অমৃতাদি কাথের স্থায় ইহাও সর্বপ্রকার ত্রণরোগে প্রয়োগ করা যায় ।

পটোলাদি কাথ । পলতা, গুলঞ্চ, বাসকছাল, মুখা, ছুরালভা, চিরতা, কটকী, ক্ষেৎ-গাণ্ডা, নিমছাল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা ; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

সপ্তবিংশতিক গুগ্গুলু । বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক, রক্তজ ও স্ফোত্রণ-রোগীর ত্রণে বেদনা, ত্রণ হইতে দুর্গন্ধ ক্লেদ বা পুণ্যাদি-নির্গমন এবং তৎসঙ্গে অল্পজ্বর ও কাস, বিশেষতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । অমুপান—গরম দুগ্ধ ।

সপ্তবিংশতিক গুগ্গুলু । প্রস্তুতবিধি ৮২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

নবকার্ষিক গুগ্গুলু । বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক, রক্তজ ও স্ফোত্রণে রোগীর ত্রণ হইতে ক্লেদ নির্গমন, ত্রণে অত্যন্ত বেদনা, গাত্রবেদনা, অল্প জ্বর ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । অমুপান—গরমজল বা গব্যদুগ্ধ ।

নবকার্ষিক গুগ্গুলু । প্রস্তুতবিধি ৮৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

ত্রণগজাক্ষুশ রস । বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ-ত্রণে পুণ্যোৎপত্তি হইলে ও তজ্জন্ম রোগীর জ্বর, গাত্রবেদনা, কাস, মাথাধরা ও আলস্য প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে বৈকালে সেবন করিতে দিবে । অমুপান—মধু ।

ত্রণগজাক্ষুশ রস । প্রস্তুতবিধি ৮৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

পঞ্চতিক্তমৃত গুগ্গুলু । বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক প্রভৃতি যে কোন প্রকার ক্ষত পুরাতন হইলে এবং অগ্নাশ্র ঔষধে তাহা আরোগ্য না হইলে,

বিশেষতঃ ফিরঙ্গ ও বিদ্রবি বা অত্যাশ্রু দুইক্ষতরোগে রোগীর রক্ত পরিষ্কারের জন্য এই ঘৃত প্রয়োগ করিবে। ত্রণের পুরাতন অবস্থায় রোগীর জীর্ণজ্বর থাকিলে, তাহাও ইহাতে বিনষ্ট হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ইহাতে কোষ্ঠকাঠিন্য দূরীভূত হইয়া থাকে। অহুপান—পঞ্চদ্বয়।

পঞ্চতিক্তঘৃত গুণ-গুণ। প্রস্তুতবিধি ১০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাতিক্তক ঘৃত। বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ ত্রণ এবং সন্তোত্রণ পুরাতন হইলে ও তজ্জন্ত রোগীর রক্তদুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে কিম্বা ক্ষত আরোগ্য না হইলে, এই ঘৃত প্রয়োগ করিবে। ইহা রক্ত শোধক ও ত্রণ-শোধক, পরস্তু বাত বা পিত্তাধিক্য শরীরে অতি উপকারী। পুরাতন-বাতপিত্তাধিক্য জীর্ণজ্বর ও তজ্জন্ত চক্ষু হাত পা জ্বালা এবং অনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, তাহাও ইহা প্রয়োগে বিনষ্ট হয়।

মহাতিক্তক ঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৪১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিঘ্যনন্দন তৈল। ত্রণ বা ক্ষতরোগের পুরাতন অবস্থায় ত্রণ হইতে অধিক রক্ত নির্গত অথচ ত্রণের ক্ষত গভীর হইলে, এই তৈল ক্ষতস্থানে লাগাইবে। ইহা দুইক্ষতশোধক, পুরক ও রোপক।

বিঘ্যনন্দন তৈল। প্রস্তুতবিধি ২০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সোমরাজী তৈল। বাতিক, পৈত্তিক বা সন্তঃ-যে প্রকার ক্ষতই হউক না কেন, পুরাতন হইলে এবং তাহাতে নালী হইলে, কিম্বা ক্ষত শুষ্ক না হইলে বা শুষ্ক হইতে বিলম্ব হইলে, এই তৈল ক্ষতস্থানে লাগাইবে। ইহা ত্রণশোধক, পুরক ও রোপক।

সোমরাজী তৈল। প্রস্তুতবিধি ২০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ সোমরাজী তৈল। ক্ষতরোগের পুরাতন অবস্থায় ক্ষত শুষ্ক হইতে বিলম্ব হইলে বা নালী হইলে, এই তৈল ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিবে। তৈলে তুলা বা নেকড়া ভিজাইয়া লাগাইবে।

বৃহৎ সোমরাজী তৈল। প্রস্তুতবিধি ২০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জীরকাদি তৈল। আগুণে কোন অন্ন পুড়িলে ও তজ্জন্ত ক্ষত (বা) হইলে, এই তৈলে নেকড়া বা তুলা ভিজাইয়া ক্ষত-স্থানে লাগাইবে।

জীরকাদি তৈল । তিলতৈল ১০ সের । কাথাজব্য—কুটীত জীরা এক পোয়া, আল /৪ সের, শৈব /১ সের । বথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে ।

কিঞ্চুলুক তৈল । ইহা অগ্নি-দগ্ধ ক্ষতরোগের মহৌষধ । অত্যাশ্রু ওষধে যা শুষ্ক না হইলে, এই তৈল প্রয়োগ করিলে, অবিলম্বে ক্ষত শুষ্ক হয় ।

কিঞ্চুলুকতৈল । জীবিত কৈচুয়া (কেচো) এক পোয়া ও তিলতৈল এক সের । প্রথমতঃ তৈল কটাহে চড়াইয়া আল দিবে ও নিক্ষেপ হইলে, কৈচো নিক্ষেপ করিবে । অনন্তর কৈচোগুলি ভাজা ভাজা হইলে ও চটপট শব্দ থাকিলে নাখাইয়া ছাকিয়া লইবে ।

ত্রণরোগে—পথ্যাপথ্য ।

পথ্য । যবমণ্ড, যবের ছাতু বা যবতুলস্বারা প্রস্তুত অত্যাশ্রু খাদ্য, যমদাছারা প্রস্তুতখাদ্য, মাংসমূষ, ঐশ্বরমণ্ড, ঘৃত, অড়হর ও মুগের দাইল, চিনি, মিশ্রী, বেগুন, কাকুড়, পটোল, করলা বা নিমপাতার শুভ্র, রুটী, লুচি, বেতের ডগা, কচিমূলা, সুসুনিশাক, শালিঞ্চ শাক, হিঞ্চাশাক, নালিতাপাতা বা পাটশাক, ন'টে শাক, বেতোশাক, কাঁঠাল, মোচা, ধোড়, কাঁচা কলা, ঠ'টে কলা, দাড়িম, কিসমিস এবং তিক্তরসবিশিষ্ট দ্রব্য ; এই সকল দ্রব্য ত্রণ শোথ, ত্রণ, নাড়ীত্রণ (নালী-বা) ও সদ্যোত্রণ-রোগে সুপথ্য । মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ করিলে, ত্রণ শীঘ্র শুষ্ক হয় না, সুতরাং ভক্ষণ না করিয়া পারিলেই ভাল ।

অপথ্য ।—নুতন তণ্ডুলের অন্ন, তিলের প্রস্তুত দ্রব্য, মটর, মাষকলায়, কুলখকলাই, গুড়, শীতলজল, শাক, বিদাহি বা পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য, বিষ্টস্তি দ্রব্য, গুরুদ্রব্য, কটুদ্রব্য, অন্নদ্রব্য, শীতল দ্রব্য, মধুর এবং লবণরসসংযুক্ত দ্রব্য, ত্রণ-শোথ বা ফোড়ারোগে এই সকল দ্রব্য অপথ্য, সুতরাং ভক্ষণ করা কর্তব্য নহে । সর্বপ্রকার ত্রণরোগে এই সকল পথ্য প্রযোজ্য ও অপথ্য পরিত্যাগ্য ।

বিদ্রুধি-চিকিৎসা ।

(কার্বঙ্কল)

বাতিক বিদ্রুধির লক্ষণ । বাতিক বিদ্রুধি কৃষ্ণবর্ণ বা রক্তবর্ণ, অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট অথচ ক্ষুদ্র বা বৃহৎ নানা আকারের হয় এবং উহার কোন অংশ পাকে, কোন অংশ পাকে না ।

পৈত্তিক বিদ্রধির লক্ষণ । পৈত্তিক বিদ্রধি পাকা ডুগ্বরের দ্বারা অথবা গ্রামবর্ণ হয়, শীত্রে বাড়ে ও পাকে, পরন্তু রোগীর জ্বর ও বিদ্রধিতে দাহ (জ্বালা) হইয়া থাকে ।

শ্লেষ্মিক বিদ্রধির লক্ষণ । শ্লেষ্মিক বিদ্রধি সরার মত বড়, পাণ্ডুবর্ণ, চক্চকে, অল্প বেদনায়ুক্ত ও স্পর্শ করিলে শীতল বোধ হয় এবং উহা অল্পে অল্পে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও বহুবিলম্বে পাকিয়া থাকে ।

সান্নিপাতিক বিদ্রধির লক্ষণ । সান্নিপাতিক বিদ্রধি কৃষ্ণ, পীত ও শ্বেত প্রভৃতি নানা বর্ণযুক্ত, নানা প্রকার বেদনা, দাহ ও কণ্ডু বিশিষ্ট হয় এবং নানাবর্ণের পুষ্প্রাব হইয়া থাকে, পরন্তু ঐ বিদ্রধি অতি দীর্ঘাকার ও উন্নত হয়, উহার কোন অংশ পাকে এবং কোন অংশ পাকে না। উহা অতি ভয়ঙ্কর ।

আগন্তুক বা ক্ষতজনিত বিদ্রধির লক্ষণ । কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, অথবা পাষাণাদি কঠিন দ্রব্যের আঘাত লাগিয়া শরীরের কোনস্থান ফুলিয়া উঠিলে কিম্বা ঐ সকল কারণে কোনস্থানে আঘাত লাগিয়া রক্তস্রাব হইলে সেই অবস্থায় রোগী যদি কুপথ্য সেবন করে, তাহা হইলে, তাহার আঘাত বা রক্তস্রাবজ্ঞ যে উদ্ভা তাহা কুপিত বায়ুদ্বারা বিস্তৃত হইয়া রক্তের সহিত পিত্তস্রাব করে ও তজ্জন্ম রোগীর জ্বর, তৃষ্ণা, দাহ এবং পৈত্তিক বিদ্রধির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত শোথ বা ক্ষতকে আগন্তুক বা ক্ষতজ-বিদ্রধি কহে ।

রক্তজনিত বিদ্রধির লক্ষণ । এই বিদ্রধি গ্রামবর্ণ কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ ফোটক (ফুস্কুড়ি) দ্বারা আবৃত, অত্যন্ত দাহযুক্ত, বেদনাবিশিষ্ট এবং পৈত্তিক-বিদ্রধির লক্ষণাবিহীন হইয়া থাকে, পরন্তু এই রোগে রোগীর জ্বর হয় ।

অন্তর্বিদ্রধি ও স্থান-বিশেষে তাহার বিশেষ ২ লক্ষণ । কুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফ পৃথক্ বা একত্রে হইয়া শরীরের অভ্যন্তরে অর্থাৎ মলদ্বারে, মূত্রাশয়ের মুখে, নাভিতে, কুক্ষিদেহে (কোখে), কুচ্কিতে, অগ্রমাংসে, প্রীহাতে, যকৃতে, হৃদয়ে ও ক্লোমনামক পিপাসার স্থানে বহুদূর অর্থাৎ উইটিপির দ্বারা

বহু ছিদ্রযুক্ত ও উন্নত এবং গুণাবৎ কঠিন বিদ্রুধি উৎপাদন করে। ইহাদের সাধারণ লক্ষণ বাহ্য বিদ্রুধির ঞায়, কিন্তু স্থান-বিশেষে আবার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায়, যথা—মল-দ্বারে হইলে অধোবায়ুর নিরোধ, বস্তি-মুখে হইলে মূত্রকৃচ্ছ ও মূত্রের অল্পতা, নাভিতে হইলে হিকা, কুক্ষিদেশে হইলে বেদনার সহিত উদরের শুকতা, কুচ্কিতে হইলে কটিতে ও পৃষ্ঠে অতিশয় বেদনা, অগ্রমাংসে হইলে পার্শ্বদ্বয়ের সঙ্কোচ, প্লীহাতে হইলে নিঃশ্বাসের অবরোধ, হৃদয়ে হইলে সর্কশরীরে অত্যন্ত বেদনা ও কাস, যকৃততে হইলে শ্বাস ও হিকা এবং ক্রোম নামক পিপাসায়ন্তে হইলে রোগীর অত্যন্ত তৃষ্ণা হইয়া থাকে।

বিদ্রুধির পক ও অপক লক্ষণ । বিদ্রুধির পক, অপক ও বিদ্রুপাকের লক্ষণের ঞায় ।

অন্তবিদ্রুধি হইতে পৃথিব্যাবের পথ । নাভির উর্দ্ধে বুক (অগ্র-মাস বা বুকপাত) ও প্লীহা প্রভৃতি স্থান জাত বিদ্রুধির পৃথ উর্দ্ধদিক দিয়া (মুখ দিয়া), নাভির নিম্নদেশ অর্থাৎ মূত্রাশয় ও কুচ্কি প্রভৃতি স্থানজাত বিদ্রুধির পৃথ নিম্নদিক দিয়া (মলদ্বার দিয়া) এবং নাভিজাত বিদ্রুধির পৃথ মুখ ও মলদ্বার উভয়দিক দিয়া বহির্গত হয় ।

বাহ্য বিদ্রুধির সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ । বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, ক্ষতজ ও রক্তজ বিদ্রুধি সাধ্য এবং সান্নিপাতিক বিদ্রুধি অসাধ্য ।

অন্তবিদ্রুধির সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ । নাভি, মূত্রাশয় ও কুচ্কিতে-জাত বিদ্রুধির পৃথ মল-দ্বার দিয়া নির্গত হইলে, রোগী রক্ষা পায়, কিন্তু মুখ দিয়া নির্গত হইলে, মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। প্লীহা ও ক্রোম (পিপাসার স্থান) প্রভৃতি স্থান-জাত বিদ্রুধি বাহ্যদেশ (বাহিরের দিক দিয়া) বিদীর্ণ হইলে, রোগী কচিং রক্ষা পায়, কিন্তু হৃদয়, নাভি ও মূত্রাশয়জাত বিদ্রুধি বাহিরের দিক দিয়াই হউক বা ভিতরের দিক দিয়াই হউক বিদীর্ণ হইলে, রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে ।

বিদ্রুধির অপক অসাধ্য লক্ষণ । বিদ্রুধি-রোগীর উদরাগ্নান, মূত্র-রোধ, বমি, হিকা, তৃষ্ণা, বেদনা, ও শ্বাস প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, জীবনের আশা থাকে না ।

বিদ্রুধি-চিকিৎসা-বিধি ।

বিদ্রুধিও ত্রণ-শোথ-মধ্যে পরিগণিত । বিদ্রুধির শোথ হইতেও 'পরিণামে ত্রণ উৎপন্ন হয় এবং ত্রণ-শোথ হইতেও পরিণামে ত্রণ বা ক্ষত উৎপন্ন হয়, তবে পার্থক্য এই—সাধারণতঃ কুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফ চর্ম্ম ও মাংসের অভ্যন্তরে থাকিয়া রক্তের বিকৃতি জন্মাইয়া ত্রণ শোথ উৎপাদন করে এবং কুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফ অস্থি, অস্থি আবরক পর্দা এবং মেদ প্রভৃতি গভীর ধাতুর অভ্যন্তরে থাকিয়া ত্বক্, মাংস ও রক্তের বিকৃতি ও অপচয় ঘটাইয়া বিদ্রুধি উৎপাদন করে । বিদ্রুধি মধুমেহ বা বহুমূত্র হইতে উৎপন্ন দশবিধ পিড়কার অন্তর্ভুক্ত । বিদ্রুধি সাধারণতঃ দুই প্রকার, বাহ্য বিদ্রুধি ও অন্তর্বিদ্রুধি । শরীরের বাহিরে হইলে, তাহাকে বাহ্যবিদ্রুধি এবং অভ্যন্তরে প্রাণী, যক্ষ্ম, আমাশয়, পকাশয় ও বন্তি প্রভৃতি স্থানে হইলে, তাহাকে অন্তর্বিদ্রুধি কহে । এই উভয় প্রকার বিদ্রুধি আবার বাতপিত্তাদি দোষ-ভেদে ছয়প্রকার, বাতিক, পৈত্তিক, স্নায়িক, সান্নিপাতিক, ক্ষতজ ও রক্তজ । প্রমেহ রোগ-হইতে যে পিড়কা জন্মে, তাহা দশপ্রকার, তন্মধ্যে নয়প্রকার পিড়কার লক্ষণ ইতঃপূর্বে প্রমেহ-পিড়কা রোগে বর্ণিত হইয়াছে, অল্প প্রকার পিড়কা বিদ্রুধির লক্ষণযুক্ত তাহাও উক্ত হইয়াছে, সুতরাং মধুমেহ হইতে সর্বপ্রকার বিদ্রুধি উৎপন্ন হইতে পারে । বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে ইহাকে 'ফোটক, কোন-স্থানে ছার, কোন স্থানে বা পাথুরে ছার কহে । ইহা পৃষ্ঠে হইলে, পৃষ্ঠত্রণ ও ঘাড়ে হইলে ঘাড়মাগুরা নামে অভিহিত হয় । ইহাকে, কেহ কেহ কার্কঙ্কল নামে অভিহিত করেন, কিন্তু ইহাই প্রকৃত কার্কঙ্কল কিনা, নিশ্চিত বলা সুকঠিন, কারণ বিদ্রুধি ও কার্কঙ্কলের লক্ষণ এক নহে, বরং অন্তর্বিদ্রুধি, বন্ধ্যীক ও বিস্ফোটকের সহিত কার্কঙ্কলের অনেক সামঞ্জস্য আছে । এতদ্ব্যতীত দাঁতের গোড়ায়, কর্ণভ্যন্তরে ও গলদেশে বিদ্রুধি জন্মে এবং উহার যথাক্রমে দন্ত-বিদ্রুধি, কর্ণবিদ্রুধি ও গলবিদ্রুধি নামে অভিহিত হয় । বিদ্রুধি অতি কঠিন ব্যাধি, শরীরের অভ্যন্তরস্থ অস্থি, অস্থি-আবরক পর্দা ও মেদ-প্রভৃতি গভীর ধাতুসমূহকে আশ্রয় করিয়া উহা উৎপন্ন হয় । বিদ্রুধির মূল অতি গভীর, অস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় । বিদ্রুধি ও বিস্ফোটকের মধ্যে লক্ষণের অনেক

সামঞ্জস্য বর্তমান, সম্ভবতঃ এইজন্ত ডাক্তারেরা বলেন, মধুমেহ বা বহুমূত্র হইতে ঐ উভয়প্রকার স্ফোটকই উৎপন্ন হইতে পারে। বিস্ফোটককে ইংরাজিতে বয়েল কহে। বিদ্রুধিও গভীর মূলবিশিষ্ট, বিস্ফোটকও তাহাই, বিদ্রুধিও যে কারণে হয়, বিস্ফোটকও সেই কারণে হয়। কিন্তু এইপ্রকার সামঞ্জস্য স্বেও সান্নিপাতিক বিদ্রুধি ও সান্নিপাতিক বিস্ফোটকের আকারগত পার্থক্য বিদ্যমান, সান্নিপাতিক বিদ্রুধির অগ্রভাগ সরু, কিন্তু সান্নিপাতিক বিস্ফোটকের অগ্রভাগ সরু নহে, চেপ্টা ও মধ্যানিয়। এইজন্ত বিস্ফোটকই কার্ষক বলিয়া বোধ হয়।

বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক ও রক্তজ বিদ্রুধি কঠিন হইলেও অসাধ্য নহে, সময়ে বা রোগারস্তে সূচিকিৎসা করিলে আরোগ্য হইতে পারে, অবশ্য মর্শ্ব-স্থানে উৎপন্ন বা বহু উপসর্গযুক্ত হইলে, নিতান্ত সহজে আরোগ্য হয় না, কিন্তু সান্নিপাতিক, আগন্তুক ও মধুমেহ হইতে বিদ্রুধির লক্ষণযুক্ত যে স্ফোটক উৎপন্ন হয়, তাহা মারাত্মক। বিদ্রুধি স্বভাবতই অতি কঠিন, তার উপর যদি মর্শ্ব-স্থানে উৎপন্ন বা উপসর্গবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে একবারে অসাধ্য হইয়া পড়ে, তখন রোগীর আর জীবনের আশা থাকে না।

বাতিক বিদ্রুধি দেখিতে রক্ত বা রক্তবর্ণ ও অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত। বাতিক বিদ্রুধি ছোট ও হয়, বড় ও হয়, বিদ্রুধির মধ্যে টন্ টন্, ঝন্ ঝন্ বা দপ্ দপ্ করে, এইরূপ টন্ টনানি বেদনা অল্প কোন বিদ্রুধিতে হয় না, পরন্তু ইহাতে রোগীর জ্বরও হয় না। পৈত্তিকবিদ্রুধি দেখিতে লালবর্ণ ও দৃষ্ট হয় বা কদাচিৎ-শ্যামবর্ণও দৃষ্ট হয়, লালবর্ণ ঘেঙুলি হয়, তাহার পাকা ডুম্বরের ন্যায় বর্ণযুক্ত হয় এবং অতি শীঘ্র বাড়িয়া উঠে, রোগীর জ্বর হয়, এবং বিদ্রুধির মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা করে। শ্লেষ্মিক বিদ্রুধি দেখিতে বাতিক ও পৈত্তিক বিদ্রুধি অপেক্ষা বড়, পাণ্ডুবর্ণ এবং উহা অল্প বেদনায়ুক্ত ও খুব আন্তে আন্তে বাড়ে ও অনেক বিলম্বে পাকে; উহাতে রোগীর জ্বর হয় না এবং বাতিক বিদ্রুধির ন্যায় বেদনা বা পৈত্তিক বিদ্রুধির ন্যায় জ্বালা করে না। সান্নিপাতিক বিদ্রুধি অতি রূহৎ। আগন্তুক বা ক্ষতজনিত বিদ্রুধি হইতে রক্তের সহিত পিত্তস্রাব হয় এবং বিদ্রুধির মধ্যে জ্বালা করে ও রোগীর জ্বর হয়। রক্তজ বিদ্রুধি শ্যামবর্ণ, জ্বালা ও বেদনায়ুক্ত হয়, উহাতে রোগীর জ্বর হয় এবং বিদ্রুধির চতুর্দিকে 'রক্তবর্ণ ছোট ছোট স্ফোটক' বা ফুস্ফুড়ি উদ্গত হইয়া থাকে।

বাতপিত্তাদি-ভেদে বিদ্রুগির বিশেষ লক্ষণ এই—বাতিক বিদ্রুগিতে টন টনানি, শূলানি বেদনা হয়, জ্বালা থাকে না, রোগীর জ্বরও হয় না। পৈত্তিক-বিদ্রুগি অতি শীঘ্র ব্যাড়ে, অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত হয় ও রোগীর জ্বর হয়। শৈশ্নিক বিদ্রুগিতে অল্প বেদনা থাকে, দেখিতে বাতিক ও পৈত্তিক বিদ্রুগি অপেক্ষা বড়, জ্বালা থাকে না এবং রোগীর জ্বরও হয় না। সান্নিপাতিক বিদ্রুগি উক্ত তিন প্রকার অপেক্ষা বড়, দেখিতে অতিশয় লম্বা ও উচ্চ, কিন্তু বাতাদি ত্রিদোষোৎপন্ন বলিয়া উহাতে তিন দোষেরই প্রকোপ বর্তমান থাকে। আগ-স্কন্ধ বিদ্রুগি হইতে রক্তস্রাব হয়, অত্যাশ্র লক্ষণ পিত্তজ বিদ্রুগির জায়। রক্তজ বিদ্রুগির বিশেষ লক্ষণ এই—বিদ্রুগির উপর কৃষ্ণবর্ণ ফুসুড়ি জন্মে, কিন্তু অত্যাশ্র লক্ষণ পৈত্তিক বিদ্রুগির জায় অর্থাৎ রোগীর জ্বর ও বিদ্রুগি জ্বালাযুক্ত হয়; কিন্তু আগস্কন্ধ বিদ্রুগির জায় এই বিদ্রুগি হইতে স্রাব হয়।

ত্রণ-শোধের জায় বিদ্রুগি উৎপন্নমাত্রই বসাইয়া দেওয়া উচিত, উপযুক্তপরি ৫।৭ দিন ঔষধ প্রয়োগেও যদি না বসে, তাহা হইলে, অবিলম্বে পাকিবার ঔষধ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু এক শ্রেণীর বিদ্রুগি আছে, তাহারা বাতিক বা শৈশ্নিক লক্ষণযুক্ত, দেখিতে উইয়ের চিপির জায় বহু ছিদ্রযুক্ত, উহাকে অন্ত-বিদ্রুগি কহে। উহা সহজে পাকে না, ঐ বিদ্রুগি পাকাইতে পারিলে রোগীর আর ভয় থাকে না। এতদ্ব্যতীত ছিদ্রবিশিষ্ট নহে, অথচ বাতিক, শৈশ্নিক বা সান্নিপাতিক লক্ষণযুক্ত বিদ্রুগিও আছে, তাহারাও সহজে পাকে না। স্রুতরাং বিদ্রুগি না বসিলে ভয়ের কারণ বটে।

বিদ্রুগি নানাপ্রকার হইলেও সাধারণতঃ দুই প্রকার প্রণালী অবলম্বন করিলেই চিকিৎসা চলে। বাতিক ও শৈশ্নিক বিদ্রুগিতে এক প্রকার এবং পৈত্তিক, আগস্কন্ধ (ক্ষতজ) ও রক্তজ বিদ্রুগিতে অন্য প্রকার। এই প্রণালী সহজ, এই নিয়মে চিকিৎসা করিতে হইলে, বিদ্রুগিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লইতে হয়। এক শ্রেণীর বিদ্রুগি আয়তনে ছোট ও হয়, বড়ও হয়; কিন্তু শোধ টিপিলে কঠিন বোধ হয় ও অল্পে অল্পে ফুলা বাড়ে, তন্মধ্যে নানা-প্রকার বেদনা অসহ্য হয়, কখনও বেদনা কমে ও বাড়ে, অথচ রোগীর জ্বর হয় না বা বিদ্রুগি জ্বালাও করে না, ইহা বাতিক ও শৈশ্নিক বিদ্রুগির লক্ষণ। অন্য এক শ্রেণীর বিদ্রুগি উৎপন্ন হওয়া মাত্রই রোগীর জ্বর হয়, ফুলা অতি সহর

বাড়ে, বিদ্রুধি দেখিতে কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ এবং বিদ্রুধিতে অত্যন্ত দাহ বিজ্ঞমান থাকে, ইহা পৈত্তিক, ক্ষতজ ও রক্তজ বিদ্রুধির লক্ষণ । সান্নিপাতিক বিদ্রুধিতে রোগীর জ্বর ও বিদ্রুধিতে দাহ বা জ্বালা না থাকিলে, বাতিক বা শ্লেষ্মিক বিদ্রুধির ঔষধ এবং রোগীর জ্বর ও বিদ্রুধিতে অত্যন্ত জ্বালা থাকিলে পৈত্তিক বিদ্রুধির ঔষধ প্রয়োগ করিবে ।

সান্নিপাতিক বিদ্রুধিতে বাতিক ও শ্লেষ্মিক বিদ্রুধির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এবং বাতিক ও শ্লেষ্মিক বিদ্রুধিতে শোভাজন লেপ ও শোভাজন বেদ, ষাওয়ার জ্ঞা প্রাতে পুনর্বাদি কাথ, বৈকালে কঙ্কালী যোগ, সান্নিপাতিক বিদ্রুধিতে পৈত্তিক বিদ্রুধির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং পৈত্তিক, রক্তজ ও আগন্তুক বিদ্রুধিতে পঞ্চবক্স লেপ কিম্বা তদভাবে চন্দনাদি-লেপ বা অনন্তাদি-লেপ এবং ষাওয়ার জ্ঞা সকালে পুনর্বাদি কাথ ও বৈকালে কঙ্কালী-যোগ প্রয়োগ করিবে । শজিনার ছাল সর্বপ্রকার বিদ্রুধির মহৌষধ । কেবলমাত্র শজিনার ছালের কাথে শজিনার ছাল-চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিলে কিম্বা শজিনার ছালের রস পান করিতে দিলে সর্বপ্রকার বিদ্রুধি প্রশমিত হইতে পারে । সর্বপ্রকার বিদ্রুধিতে কোষ্ঠপরিষ্কার রাখা কণ্ডব্য । পুনর্বাদি কাথ উষ্ণ থাকিতে থাকিতে তাহাতে ক্যাষ্টর অয়েল অথবা তেউড়ী-চূর্ণ মিশাইয়া পান করাইবে । দুই তিন দিন অন্তর বিরচনের ব্যবস্থা করা কণ্ডব্য । রোগ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত এই নিয়মে ঔষধ প্রয়োগ করিবে । যে বিদ্রুধি ঐ সকল ঔষধ প্রয়োগেও বসে না অথবা মসিনার পুন্টিস্ প্রয়োগেও পাকে না, সেই বিদ্রুধিকে অবিলম্বে পাকাইবার চেষ্টা করিবে । বলালতা বা বলা-ডুমুরনামক প্রসিদ্ধলতার মূল, ছাল ও পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিদ্রুধি পাকে । দুই তিন দিন প্রলেপ দিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় । পাকিলে আর ভয়ের কারণ থাকে না, তখন পক্কব্রণ-শোধের জায় বিদারণ ও পুষ-নিঃসারণ করিয়া ব্রণ-শোধক ও ব্রণ-রোপক ঔষধ প্রয়োগ করিলেই ক্ষত আরোগ্য হয় ।

বিদ্রুধিরোগে—ঔষধ ।

শোভাজন-লেপ । বিদ্রুধি-ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক, অত্যন্ত কঠিন কিম্বা অল্প বা অধিক বেদনায়ুক্ত হইলে অথচ রোগীর জ্বর বা বিদ্রুধিতে দাহ

না থাকিলে, এই প্রলেপ তিনবেলা তিনবার প্রয়োগ করিবে । সান্নিপাতিক-বিদ্রধিতে দাহ না থাকিলে অথচ অধিক ফুলা ও বেদনা থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করা যায় ।

শোভাঞ্জন লেপ । শজিনা গাছের মূলের ছাল ছকার কটুজলে বাটিয়া পান বা কলার নরম পাতায় রাখিয়া আঙুণে গরম করিয়া লেপ দিবে ও কাপড়ের পটীদ্বারা বান্ধিয়া রাখিবে । শোথ অতি বৃহৎ ও বেদনায়ুক্ত হইলে, ইহার সহিত এক ভাগ আদা, এক ভাগ গুড়ুরাপাতা ও কিঞ্চিৎ সৈন্ধব মিশ্রিত করিবে ।

শোভাঞ্জন-স্বেদ । বিদ্রধি ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক, তাহাতে অত্যধিক বেদনা থাকিলে অথচ জ্বালা না থাকিলে, এই স্বেদ পুনঃ পুনঃ লাগাইবে । এই স্বেদ দিয়া শোভাঞ্জন-লেপ লাগাইয়া রাখিয়া রাখিবে । বিদ্রধিতে জ্বালা থাকিলে, কখনও স্বেদ দিবে না ।

শোভাঞ্জন স্বেদ । শজিনা গাছের মূলের ছাল ছেচিয়া কলার নরম পাতায় রাখিয়া এক টুকরা কাপড় জড়াইয়া পোটলী করিবে এবং নিম্ন কয়লার আঙুণে গরম করিয়া পুনঃ পুনঃ সেক দিবে ।

অনন্তাদি-লেপ । বিদ্রধি ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হউক, শীঘ্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, ও তাহাতে অত্যন্ত জ্বালা যন্ত্রণা থাকিলে, এই প্রলেপ লাগাইবে । সান্নিপাতিক বিদ্রধিতে অত্যন্ত দাহ থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করা যায় । পঞ্চবকুল বা চন্দনাদি লেপের পরিবর্তে ইহা লাগাইবে । পৈতিক, ক্ষতজ ও রক্তজ-বিদ্রধিতে ইহা প্রয়োগ করা যায় ।

অনন্তাদি-লেপ । অনন্তমূল, ইক্ষুচিনি, যষ্টিমধু ও ধৈ সমভাগ, দুগ্ধে মর্দন করিয়া তিনবেলা তিনবার প্রলেপ দিবে । গরম করিবে না ।

পঞ্চবকুল-লেপ । বিদ্রধি ক্ষুদ্র হউক অথবা বৃহৎ হউক, বিদ্রধিতে অত্যন্ত জ্বালা থাকিলে, দুগ্ধে বাটিয়া, এই লেপ শীতলাবস্থায় লাগাইবে । দাহ-সংযুক্ত বিদ্রধিতে ইহার ত্রায় ঔষধ অতি বিরল ।

পঞ্চবকুল লেপ । প্রস্তুতবিধি ৭০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

চন্দনাদি-লেপ । বিদ্রধি ক্ষুদ্র হউক, বা বৃহৎ হউক, তাহাতে অত্যন্ত

দাহ বা জ্বালা থাকিলে অর্থাৎ পৈত্তিক, রক্তজ ও ক্তজ বিদ্রুধিতে পঞ্চবঙ্গল-
লেপের দ্বাৰা এই লেপ প্রয়োগ করিবে ।

চন্দনাদি লেপ । প্রস্তুতবিধি ১২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

কঙ্কলী-যোগ । বাহ বা অন্তর্বিদ্রুধির যে কোন অবস্থায় এই যোগ
রোগীকে বৈকালে সেবন করিতে দিবে । খাওয়ার ঔষধের-মধ্যে বিদ্রুধি-
রোগে এরূপ মহোপকারী ঔষধ আর নাই । রোগ আরোগ্য হওয়া পর্যন্ত
প্রত্যহ প্রয়োজ্য । অস্থপান—শজিনা বৃক্ষের ছালের রস ২ তোলা ও মধু ।

কঙ্কলী-যোগ । বিস্তৃত পায়দ ১ তোলা ও বিস্তৃত গন্ধক ২ তোলা একত্র কঙ্কলী
করিবে । মাত্রা ২ হইতে ৪ রতি ।

পুনর্গবাদি কাথ । বাহ বা আভ্যন্তরিক যে কোন বিদ্রুধি উৎপন্ন-
হইবামাত্র, এই কাথ রোগীকে প্রত্যহ সকালে সেবন করিতে দিবে । যাবৎ
রোগ আরোগ্য না হয়, তাবৎ প্রত্যহ প্রাতে প্রয়োজ্য ।

পুনর্গবাদি কাথ । পুনর্গবা, দেবদারু, শুঠ, বেলহাল, শোণাছাল, গাভারীছাল, পারুল-
ছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ইহারা সমভাগে মিলিত
২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । কোষ্ঠ-কাঠিগ্ধ থাকিলে, ইহার সহিত ক্যাষ্টর
অয়েল বা তেউড়ীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে । দান্ত পরিকার থাকিলে, শজিনাছালের
চূর্ণ এক্ষেপ দিবে ।

অমৃতাদিকাথ । বাহ ও অন্তর্বিদ্রুধির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, পুন-
র্গবাদি কাথের পরিবর্তে এই কাথ প্রয়োগ করা যায় । ইহা প্রয়োগে আনুষ-
ঙ্গিক জ্বরও বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

অমৃতাদিকাথ । প্রস্তুতবিধি ৮২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বিদ্রুধিরোগে—পথ্যাপথ্য ।

পথ্য—পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন, যুতপক তরকারী ও যুতপক মসুর,
মুগ বা বুটের দাইল, যবের মণ্ড, মাংস-সমুষ্, কাঁচাকলা, পটোল, বেগুন, উচ্ছে,
করলা, নিমপাতা, বেতের ডগা, স্নগুদীশাক, নোটেশাক, বেতোশাক, কাঁঠাল,
মোচা, লবণের মধ্যে সৈন্ধব, মিষ্টদ্রব্যের মধ্যে ইক্ষুচিনি বা মিশ্রী এবং অন্যান্য

তিক্ত ও কষায়রসবিশিষ্ট দ্রব্য এই রোগে সূপশ্য । জ্বর থাকিলে তৈরমণ্ড, কিসমিস্ প্রভৃতি পথ্য দিবে ও যথোচিত লজ্জন দিবে । মিষ্টদ্রব্য ও দুগ্ধ অল্প পরিমাণে দিবে ।

অপথ্য—নূতন তণ্ডুলের অন্ন, দধি, গুড়, অন্নদ্রব্য, ভাজাঘব, গুরুমাংস, পিষ্টক, জলজ-প্রাণীর মাংস, গুরুপাকদ্রব্য, শ্লেষ্ম-বর্ধক বা পিত্ত-বর্ধক দ্রব্য ও দিবানিদ্রা বিদ্রমিরোগে অপথ্য, সূত্রাং পরিত্যজ্য । এই রোগে মৈথুন নিষিদ্ধ ।

বিসর্প-চিকিৎসা ।

(ইরিসিপিলাস্ ।)

বাতিক বিসর্পের লক্ষণ । বাতিক বিসর্পে শোথ এবং বাতিক জ্বরের জ্বাশ শরীরের নানাস্থানে বেদনা উপস্থিত হয়, পরন্তু বিসর্পের শোথ স্পন্দিত এবং স্থিতিবিদ্ধবৎ বেদনা বা ভঙ্গবৎ বেদনামুক্ত ও রোগীর শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে ।

পৈতিক বিসর্পের লক্ষণ । পৈতিক বিসর্পের শোথ লোহিতবর্ণ হয়, ঐ শোথ এক স্থান হইতে অগ্রসর সঞ্চরণ করে বা সরিয়া যায় এবং রোগীর পৈতিক জ্বর উপস্থিত হইয়া থাকে ।

শ্লেষ্মিক বিসর্পের লক্ষণ । শ্লেষ্মিক বিসর্পের শোথ দিগ্ধ (চক্চকে) ও কণ্ডুযুক্ত হয় এবং রোগীর শ্লেষ্মিক জ্বরের জ্বাশ শরীরে বেদনা হইয়া থাকে ।

সান্নিপাতিক বিসর্পের লক্ষণ । সান্নিপাতিক বিসর্পে বাতিক, পৈতিক ও শ্লেষ্মিক এই তিন দোষের লক্ষণ প্রকাশিত হয় ।

বাতপৈতিক বা অগ্নি বিসর্পের লক্ষণ । অগ্নি বিসর্পে রোগীর প্রবল জ্বর, বমি, মূর্ছা, অতীসার, পিপাসা, ভ্রম, সন্ধিস্থানে বিদীর্ণবৎ বেদনা, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি ও শ্বাস উপস্থিত হয় এবং সর্বাঙ্গ জলন্ত অঙ্গারদ্বারা আবৃত-বৎ বোধ হয় । পরন্তু বিসর্প যে যে স্থান দিয়া সঞ্চরণ করে বা চলিয়া যায়, সেই সেই স্থান নির্কাপিত অঙ্গারবৎ কৃষ্ণবর্ণ অথবা নীলবর্ণ বা রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং অগ্নিদগ্ধ স্ফোটকের জ্বাশ স্ফোটকদ্বারা আবৃত হইয়া বিসর্প দ্রুত-

গতিতে অত্যাধিক গমন করে। এই রোগ এত দ্রুতগামী যে সহজেই মর্ষ-স্থান (হৃদয়াদি) পর্য্যন্ত আক্রমণ করে, মর্ষ-স্থান আক্রমণ করিলে, তত্রত্য বায়ু অত্যন্ত প্রকুপিত হইয়া রোগীর অঙ্গ-বেদনা, জ্ঞান-লোপ, নিদ্রা-নাশ, শ্বাস ও হিকা প্রভৃতি উৎপাদন করে, রোগী যন্ত্রণায় অধীর হইয়া একবার ভূমিতে শয়ন, একবার উপবেশন করে, কিছুতেই সুস্থ হইতে পারে না, তখন যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া মূর্ছিত ও মৃত্যু-মুখে পতিত হয় ।

গ্রন্থি-বিসর্পের লক্ষণ । কফদ্বারা বায়ুর গতি অবরুদ্ধ হইলে, বায়ু প্রকুপিত হইয়া শ্লেষ্মাকে কিম্বা হৃদ, শিরা, স্নায়ু ও মাংসগত দূষিত রক্তকে বহুভাগে বিভক্ত করিয়া গোলাকার, কঠিন, রক্তবর্ণ ও অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত গ্রন্থি-মালা উৎপাদন করে । এই রোগে প্রবল জ্বর, শ্বাস, কাস, অতীসার, মুখশোথ, হিকা, বমি, ভ্রম, মূর্ছা, বিবর্ণতা, প্রলাপ, অঙ্গ-ভঙ্গ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, ইহাকে বাতশৈথিল্যিক বিসর্প বা গ্রন্থি-মালা কহে ।

পিভৈশৈথিল্যিক বা কদমক বিসর্পের লক্ষণ । এই বিসর্প প্রায়শঃ আমাশয়ে উৎপন্ন হইয়া শরীরের একদেশ অর্থাৎ বহির্দেশ বা অন্তর্দেশে গমন করে । এই বিসর্পে শোথের চতুর্দিক ক্ষুদ্র পিড়িকা দ্বারা আবৃত হয় এবং শোথ পাত, লোহিত, পাণ্ডু ও রক্তবর্ণ, স্নিগ্ধ, মলিন, গুরুত্ববিশিষ্ট ও গম্ভীরপাকী হয় অর্থাৎ বিলম্বে পাকিয়া উঠে । পাকিলে মাংস সকল রুদ্ধযুক্ত হয় ও খসিয়া পড়ে, এইজন্ত শিরা ও স্নায়ু সকল স্পষ্ট দেখা যায়, পরন্তু উহা হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হইতে থাকে । এই বিসর্প কদমকের ন্যায় অত্যন্ত রুদ্ধযুক্ত হয় বলিয়া ইহাকে কদমক বিসর্প কহে । এইরোগে রোগীর জ্বর, জড়তা, নিদ্রা, তন্দ্রা, মস্তক-বেদনা, অবসাদ, আক্ষেপ, প্রলাপ, অরুচি, ভ্রম, মূর্ছা, অগ্নিমান্দ্য, অস্থিতে বিদীর্ণবৎ বেদনা, পিপাসা ও অপক মল-ত্যাগ হয় । আমাশয় কফ ও পিত্তের স্থান বলিয়া এই বিসর্প প্রায়শঃ আমাশয়েই উৎপন্ন হয় ।

ক্ষতজ বিসর্পের লক্ষণ । অস্ত্র শস্ত্রাদির আঘাতে কোন স্থান আহত হইলে, সেই স্থানে ক্ষত উৎপন্ন হয়, পরন্তু ঐ ক্ষত কোন কারণে দূষিত হইলে, বায়ু প্রকুপিত হইয়া রক্ত ও পিত্তকে দূষিত করিয়া কুলুপি কলাইরমত ক্ষোচক-যুক্ত শোথ উৎপাদন করে, ইহাকে ক্ষতজবিসর্প কহে । ঐ বিসর্পে অত্যন্ত দাহ ও বেদনা জন্মে, রোগীর জ্বর হয় এবং রক্ত শ্রামবর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

বিসর্পের উপসর্গ । জ্বর, অতীসার, বমন এবং চর্ম ও মাংস বিদীর্ণ-
হওয়া, ক্লান্তি, অরুচি এই কয়েকটি বিসর্পের উপসর্গ ।

বিসর্পের সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ । বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক-
বিসর্প চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য হয়, কিন্তু সান্নিপাতিক, দ্বন্দ্বজ তিন প্রকার ও
ক্ষতজ বিসর্প অসাধ্য । পৈত্তিক বিসর্পে শরীর অগ্ননের দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ হইলে,
তাহাও অসাধ্য ; বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক বিসর্প মর্দনস্থানে উৎপন্ন হইলে,
তাহা কষ্টসাধ্য ।

বিসর্প-চিকিৎসা-বিধি ।

লবণ, অন্ন, কটু ও উষ্ণ-বীৰ্য্য দ্রব্যাদি সেবন প্রভৃতি নানা কারণে প্রকুপিত
বায়ু, পিত্ত ও কফ রক্ত, লসীকা, ত্বক্ ও মাংসকে দূষিত করিয়া বিসর্পরোগ
উৎপাদন করে । এই রোগ শরীরের এক স্থান হইতে অল্প স্থানে সঞ্চরণ
করে অর্থাৎ গমন করে বলিয়া ইহাকে বিসর্প কহে । যেমন ব্রণপরিণামী
শোথকে ব্রণশোথ কহে, তদ্রূপ ব্রণপরিণামী বিসর্পকে, বিসর্প-ব্রণ বলা যায় ।
যে সকল বিসর্প হইতে পরিণামে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহার স্তবরাং ব্রণ-শোথ-
মধ্যে গণনীয় । ডাক্তারেরা বলেন, ইহা সংক্রামক, এক শরীর হইতে অল্প-
শরীরে সংক্রমণ করে । বিসর্পরোগ উৎপত্তির পূর্বে পদ্রিপাক-যন্ত্রের দুর্ব্ব-
লতা, স্থান-বিশেষের মাংস-পেশীতে বেদনা, শিরঃপীড়া, গল-নলীতে বেদনা
ও ক্ষত, শরীরের অবসাদ, অস্থিরতা এবং শীত বা কাম্প পূর্ব্বক জ্বরগমন ; এই
সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং প্রবল আক্রমণে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব
হইয়া থাকে । প্রায়শঃ দ্বিতীয় দিন হইতে ষষ্ঠ বা সপ্তম দিবসের মধ্যে
রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফ শরীরের
যে স্থানে সঞ্চিত হয়, প্রথমতঃ সেই স্থান উষ্ণ ও লালবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে,
অনন্তর দোষের ন্যূনাধিক্য অনুসারে ত্বকের উপরে বা অভ্যন্তরে অথবা ত্বকের
বাহ্য ও অভ্যন্তর উভয় প্রদেশে ঐ শোথ বিচরণ করে । বিসর্পের গতি দুই
প্রকার । যথা—যে স্থানে দোষ সঞ্চিত হয়, সেই স্থান উষ্ণ বোধ হয়, চুলকায়,
স্পর্শ করিলে জ্বালা করে, অনন্তর অবিলম্বে দ্রুতগতিতে এক স্থান হইতে অল্প-
স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, কত ক্ষণের মধ্যে 'কতদূর বিস্তৃত হইবে, তাহা

লক্ষণদ্বারা নিরূপিত করা যায় না এবং কোন চিকিৎসকই স্থির করিয়া বলিতে পারেন না। কোন কোন বিসর্প দেহিতে দেহিতে নিমেষ মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং তাহার গতি-রোধের চেষ্টা না করিলে অবিলম্বে সর্কাসব্যাপী ও মারাত্মক হইয়া উঠে। ইহা প্রথমপ্রকারের গতিবিশিষ্ট; অপর এককালে সর্কাসে দোষ সঞ্চিত হইয়া একবারে সর্কাসে সঞ্চার করা।

বিসর্প সাত প্রকার; বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ, বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ এবং পিত্তশ্লেষ্মজ। ক্ষতজ বিসর্পে প্রায়শঃ পিত্তজ বিসর্পের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং কখনও বা অল্প দোষের লক্ষণও প্রকাশ পাইয়া থাকে; সুতরাং উহা স্বতন্ত্র ব্যাধি নহে, যে দোষের প্রাবল্য লক্ষিত হইবে, সেই দোষজ বিসর্পের দ্বারা উহার চিকিৎসা করিবে। উক্ত সাত প্রকার বিসর্পের মধ্যে মর্শ্ম-গ্রানে উৎপন্ন না হইলে, বাতিক, পৈতিক ও শ্লেষ্মিক বিসর্প আরোগ্য হয়; কিন্তু বাতপৈতিক, বাতশ্লেষ্মিক, পিত্তশ্লেষ্মিক, সন্নিপাতিক ও ক্ষতজ বিসর্প অসাধ্য। ইহাদের মধ্যে যেগুলি কেবলমাত্র হকের উপরে সঞ্চার করে, সেগুলি তাদৃশ মারাত্মক নহে, ইহাকে বহিঃবিসর্প কহে। যেগুলি কেবল মাত্র হৃৎ মাংসের অভ্যন্তরে সঞ্চার করে এবং ব্যাপিত স্থানে প্রদাহ, রোগীর জ্বর অথচ অকস্মাৎ শ্রম ও বলক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু বাহিরে বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায় না, সেগুলি কঠিন, তাহাকে অন্তঃবিসর্প কহে, আর যেগুলি ভিতর বাহির উভয় দেশ একবারে আক্রমণ করে, সেগুলি অতি কঠিন বা অসাধ্য, তাহাকে বহিঃস্বপ্নবিসর্প কহে।

এক প্রকার বিসর্প সচরাচর দৃষ্ট হয়, তাহা আঙণে পোড়া ফোঁস্কার মত কালরংয়ের ছোট ছোট হয়, তন্মধ্যে পুঁথ থাকে না, ফোঁস্কা ফাটিয়া গেলে কেবল একটু রস নির্গত হয়, তদুপরি প্রায়ই মামড়ি বা চামাটি পড়ে, চলিত কথায় ইহাকে পোড়ানারান্দী, পোড়ামলঙ্গী বা ক্ষুদেওড়া কহে। বাতিক বিসর্পের চিকিৎসাদ্বারা ইহা সহজে আরোগ্য হয়।

বিসর্প পিত্ত-বর্জক দ্রব্যাদি সেবনেও হয়, আবার ফিরঙ্গ প্রভৃতি রোগে রক্ত দূষিত হইলেও জন্মে। কোন কোন বিসর্পরোগে রোগীর জ্বর নাও হইতে পারে, হয়ত রোগী অগ্রে কিছুই বুঝিতে পারে না, রাত্রিতে অকস্মাৎ আঙ্গুলটি একটু ফুলিয়া উঠিল, তৎসঙ্গে ফুলাস্থান লালবর্ণ হইল ও ক্রমশঃ তাহার

আলায়ঙ্গণায় রোগী অভিভূত হইয়া পড়িল, ঐ অবস্থায় দেখা গিয়াছে যোগী এক গামলা বয়ফ-জলে পাঁচ মিনিট হাত ডুবাইয়া রাখিল, একটু সীতলবোধ হইল, কিন্তু পাঁচ মিনিট পরে, জল গরম হইয়া উঠিল, আবার আলায় পূর্ববৎ ছটফট করিতে লাগিল । চলিত কথায় ইহাকে আঙ্গুলহারা কহে । এই অবস্থা মারাত্মক না হইলেও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক, বিশেষতঃ উক্ত বিসর্প কিরূপ-জনিত হইলে, প্রলেপাদি প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয় না, তখন অঙ্গ-প্রয়োগ অবশ্যস্বাবী হইয়া উঠে, অঙ্গপ্রয়োগ করিলে দূষিত রক্ত বহির্গত হইয়া তৎক্ষণাৎ আলায় শান্তি হয়, কিন্তু প্রলেপদ্বারা বিশেষ উপকার হউক কি নাই হউক, প্রলেপ দিতে কালবিলম্ব করা কোন মতেই কর্তব্য নহে, করিলে বিসর্প অধিকাংশস্থানে বিস্তৃত হইতে পারে, অন্ততঃ বিসর্পের গতি-রোধের জন্মও প্রলেপ প্রয়োগ করা উচিত । এস্থলে বুঝিতে হইবে, দূষিত রক্ত বাহির করিয়া না দিলে, উপায় নাই । ব্যাধিত স্থানের কোন অংশ পচিতে আরম্ভ করিলেও অবিলম্বে অঙ্গপ্রয়োগ করিয়া পচা অংশ চাছিয়া ফেলিবে, নচেৎ কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একেবারে চিরজীবনের জন্ম অকর্মণ্য হইয়া যাইতে পারে । কুষ্ঠ ও বিসর্পের মধ্যে প্রভেদ এই—কুষ্ঠরোগে দোষ দূষ্য দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ক্রিয়া করে, কুষ্ঠে রক্ত ও পিত্ত প্রকুপিত হইলেও, রক্ত ও পিত্তের প্রাবল্য থাকে না, পরন্তু কুষ্ঠরোগ সাম্প্রতিক অর্থাৎ ত্রিদোষোৎপন্ন, কিন্তু বিসর্প রক্ত ও পিত্ত দূষিত না হইলে, উৎপন্ন হইতে পারে না; তন্নিম্ন সম্প্রাপ্তিগত পার্থক্যও আছে ।

রোগ প্রকাশ পাইবামাত্রই কালবিলম্ব না করিয়া প্রলেপ যোজনা করিবে । বতখানি স্থান ব্যাপিয়া রোগোৎপত্তির চিহ্ন দেখা যাইবে, তদপেক্ষা চতুর্দিকে এক অঙ্গুলি বড় বস্ত্রখণ্ড কাঁচি দ্বারা কাটিয়া তাহাতে প্রলেপ মাধাইয়া ব্যাধিত-স্থানে একরূপভাবে লাগাইবে যেন ব্যাধিত স্থান সম্যক আবৃত হইয়া অন্ততঃ এক অঙ্গুলি পরিমিত সূক্ষ্ণ স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় । রোগাক্রান্ত ত্বক্ ও সূক্ষ্ম-ত্বকের মধ্যে একটি স্পষ্ট সীমা রেখা বর্তমান থাকে, বর্ণ-পার্থক্যে তাহার প্রভেদ অক্লেশে স্থির করা যায়, সূত্ররূপে কতটা স্থান আক্রান্ত হইয়াছে, তাহা সহজে নির্ণয় করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করা যায় । এইরূপে প্রলেপ যোজনা করিলে, অন্তর্দিকে রোগ বিস্তৃত হইতে পারে না । প্রলেপ এক অঙ্গুলি পুরু করিয়া লাগাইবে, শুষ্ক হইলে পুনর্বার নূতন প্রলেপ যোজনা করিবে ।

প্রলেপ প্রয়োগ করিয়া খাওয়ার ঔষধে ব্যবস্থা করা উচিত । পোড়া-নারাকীটে, খাওয়ার ঔষধের আবশ্যকতা হয় না, একমাত্র কিছুলুক তৈল প্রয়োগ করিলেই চলে, নিতান্ত প্রয়োজন হইলে, বিরেচক দুই একটি পাচন প্রয়োগ করিলেই চলে, কিন্তু কঠিন হইলে, বমনবিরেচনদ্বারা দেহের উষ্ণ ও অধোভাগস্থ দোষ নিঃসারিত করিবে, এই প্রকার অন্তঃপরিমার্জনদ্বারা রোগের প্রবল আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না এবং রোগ মারাত্মক হইতে পারে না, পরন্তু সহরই প্রশমিত হইয়া থাকে । এই রোগে ব্যাধিত স্থানে জলোকা-প্রয়োগ অতি উপকারী, পূর্বে ঐরূপ প্রক্রিয়াদ্বারা রক্ত-মোক্ষণের প্রথা ছিল । এই প্রণালী অতি সুন্দর, ফিরঙ্গ-বিষজ্ঞানিত বিসর্পে এইরূপ রক্তমোক্ষণদ্বারা মহোপকার দর্শে ।

বমন বিরেচনাদি দ্বারা দোষ নিঃসারিত হইলে, খাওয়ার ঔষধ ব্যবস্থা করিবে । অনন্তর স্বয়ং বিদীর্ণ বা অঙ্গদ্বারা বিদারণ করা হইলে, ক্ষত প্রকাশ পায়, তখন বণ-রোগের আয় তাহার চিকিৎসা করিতে হয় । দুইজ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, অগ্রে তাহাকে শোধন করিয়া পশ্চাৎ ক্ষত শুষ্ক হইবার ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় । বমনের জন্ত পোলুতা ও নিমছালের কাথে মদনফল-চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে, ইহাতে বমন হইলে অনেক উপকার হয় । বিরেচনের জন্ত ত্রিফলার কাথে তেউড়ী চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করা-ইয়া দান্ত করাইবে । আমলকীর স্বরসে দ্বিত মিশ্রিত করিয়া পান করাইলে প্রত্যহ দান্ত পরিষ্কার হয় এবং রোগও প্রশমিত হয় । বাতিক, পৈত্তিক ও বাত পৈত্তিক বিসর্পে রাঙ্গাদি লেপ, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক বিসর্পে চন্দনাদি লেপ বা পঞ্চবঙ্গল-লেপ, শৈত্যিক বিসর্পে মুস্তকাদি লেপ অথবা ত্রিফলাদি লেপ প্রয়োগ করিবে । পৈত্তিক বিসর্পে গোটা মসুর বা মুগ বাটিয়া প্রলেপ দিলেও রোগ প্রশমিত হয় । বাতপৈত্তিক, বাতশৈত্যিক ও পিত্তশৈত্যিক বিসর্পে, কিম্বা সান্নিপাতিক ও ক্ষতজ বিসর্পে দশাঙ্গ লেপ অতি উপকারী । ইহা বিষ-দোষ-নাশক, স্মৃতরাং এড়াবিষ লাগিয়া বিসর্প হইলে, ইহা প্রয়োগে বিষ নষ্ট ও রোগ প্রশমিত হয় ।

সর্বপ্রকার বিসর্পে দেবনের জন্ত পটোলাদি কাথ, অমৃতাদি কাথ বা কীরাতাদি কাথ ব্যবস্থা করিবে । এই রোগের প্রথমাবস্থা হইতে কঙ্কালী-

যোগ করলা বা উচ্ছে পাতার রস সহ প্রয়োগ করা যায় । অরের বেগ প্রশ-
মিত হইলে, শরীরের রক্ত-শোধনের জন্য পঞ্চতিক্ত স্নাত গুগ্গুন্মু বা পদ্মক-
স্নাত ব্যবস্থা করিবে । ফিরঙ্গ জনিত বিসর্পে পঞ্চতিক্তস্নাতগুগ্গুন্মু পান
করাইয়া পশ্চাৎ ফিরঙ্গরোগোক্ত মশলার জল সেবন করিতে দিলে রোগ
সমূলে ধ্বংস হয় । বিসর্পরোগ সমূলে ধ্বংস না হইলে, পুনরাক্রমণ করে,
ইহা স্মরণ রাখা উচিত ।

বিসর্পরোগে-ঔষধ ।

বমনযোগ । রোগ প্রবল হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অগ্রে বিসর্প-
রোগীকে বমন করাইবে ।

বমনযোগ । পোলতা ২ তোলা ও নিমছাল ২ তোলা, জল ৬৪ তোলা, শেষ ১৬ তোলা ।
প্রক্ষেপ মদনকলচূর্ণ ১০ আনা বা অর্দ্ধতোলা । প্রথমতঃ চারি আনা চূর্ণ অর্দ্ধপোয়া জলে
গুলিয়া পান করাইবে, তাহাতে যদি ১৫২০ মিনিট বা আধ ঘণ্টার মধ্যেও বমন না হয়, তবে
আসৎ একবার প্রয়োগ করিবে ।

রাস্নাদি লেপ । বাতিক, পৈত্তিক কিম্বা বাতপৈত্তিক বিসর্পের লক্ষণ
প্রকাশ পাইলে বা পীড়িতস্থানে দাহ, সস্তাপ থাকিলে এবং প্রদাহিত স্থান
লাল বা কৃষ্ণবর্ণ হইলে, এই প্রলেপ বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া লাগাইবে । ক্রতজ বা
সান্নিপাতিক বিসর্পে ঐ সকল দোষের প্রকোপ থাকিলেও ইহা প্রয়োগ
করা যায় ।

রাস্নাদিলেপ । রাস্না, নীলগন্দিরমূল, দেবদারু, রক্তচন্দন, বষ্টিমধু ও বেড়েলা, প্রত্যেকে
সমভাগ, জলে মর্দন ।

চন্দনাদি লেপ । পৈত্তিক বিসর্পে পীড়িত স্থান রক্তবর্ণ ও অত্যধিক
দাহ বা সস্তাপযুক্ত হইলে, এই প্রলেপ বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া লাগাইবে । সন্নি-
পাতজ বা ক্রতজ বিসর্পে পিস্তের প্রকোপ থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যায় ।

চন্দনাদিলেপ । রক্তচন্দন, বষ্টিমধু, বেগারমূল ও পদ্মকাষ্ঠ, প্রত্যেকে সমভাগ, দুজে মর্দন ।

পঞ্চবন্ধুল লেপ । পৈত্তিক বিসর্পে চন্দনাদি লেপ প্রয়োগে উপকার
না হইলে, এই মহোপকারী লেপ লাগাইবে । ক্রতজ বা সান্নিপাতজ বিসর্পে
অত্যধিক প্রদাহ থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যায় ।

পঞ্চবন্ধলেপ । প্রস্ততবিধি-১৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

মুস্তকাদি লেপ । মৈথ্রিক বিসৰ্পের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই লেপ লাগাইবে ।

মুস্তকাদি লেপ । মুখা, বদিরকাঠ বা খয়ের, ছাতিমছাল, বাসকছাল, সোন্কালপাতা ও পেবদারু, প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দন ।

ত্রিফলাদি লেপ । মৈথ্রিক বিসৰ্পে মুস্তকাদি লেপ প্রয়োগে রোগ প্রশমিত না হইলে, এই লেপ প্রয়োগ করিবে । সন্নিপাতজ ও ক্ষতজ বিসৰ্পে স্নেহাৱ প্রকোপ থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করা যায় ।

ত্রিফলাদি লেপ । হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পদ্মকাঠ, বেণারমূল, বরাহক্রান্তা, ধরবীমূল, নলমূল ও অনন্তমূল; প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দন ।

দশাঙ্গ লেপ । বাতপৈত্তিক, বাতমৈথ্রিক বা পিত্তমৈথ্রিক বিসৰ্পে কিস্বা ক্ষতজ ও সান্নিপাতজ বিসৰ্পে এই লেপ প্রয়োগ করিবে । ইহা অতি উপকারী । এড়া-বিষ লাগিয়া বিসৰ্প হইলে, তাহাতেও এই লেপ প্রয়োগ করা যায় । ইহা বিষদোষ-নাশক ।

দশাঙ্গ লেপ । শিরীষছাল, যষ্টিমধু, ভগ্নপাদুকা, রক্তচন্দন, বড়এলাইচ, জটাংগাঙ্গী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড় ও বালা, প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দন ।

পটোলাদি কাথ । বিসৰ্প রোগের যে কোন অবস্থায় এই কাথ প্রয়োগ করা যায় । ইহা সৰ্ব্বপ্রকার বিসৰ্প-নাশক ।

পটোলাদি কাথ । প্রস্ততবিধি ১০০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

অমৃতাদি কাথ । বাতিক, পৈত্তিকাদি যে কোন বিসৰ্প হইলে এবং তৎসঙ্গে অন্ন, গাত্র-বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ ও বিসৰ্পপীড়িত স্থানে দাহ ও শোথ প্রকাশ পাইলে এবং তজ্জন্ম রোগী মরণায় অস্থির হইলে, এই কাথ পান করিতে দিবে । কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, কাথের সহিত ভেউড়ী-চূর্ণ চারি আঙ্ক বা অৰ্দ্ধতোলা প্রক্ষেপ দিবে ।

অমৃতাদি কাথ । প্রস্ততবিধি ৮২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

কিরাতাদি কাথ । * যে কোন প্রকার বিসৰ্পে যে কোন লক্ষণ প্রকাশ

পাইলে ও তৎসঙ্গে জ্বরাদি উপসর্গ থাকিলে 'এই কাথ প্রয়োগ করা যায়। রোগ যাবৎ আরোগ্য না হয়, তাবৎ প্রযোজ্য। কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে, তেউড়ী-চূর্ণ সহ ব্যবস্থা করিবে।

কিরাতাদিকাথ। চিরতা, গুলঞ্চ, পোলতা, বাসকহাল, নিমহাল, ক্ষেংপাণড়া, খয়ের ও মুখা সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

কঙ্কলীবোগ। বিসর্পরোগের যে কোন অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ বিরচন প্রয়োগ করিয়া এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ঔষধ প্রয়োগে জ্বর বিরাম হইলে স্নাতসংযুক্ত ব্যঞ্জন ও মাংস-মুগ প্রভৃতি পুষ্টিকর আহার প্রদান করিবে। অল্পপান—উচ্ছে বা করলা পাতার রস।

কঙ্কলী বোগ। প্রস্তুতবিধি ১০৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চতিক্ত স্নাত গুণ্ণুলু। বিসর্পরোগে রোগীর জ্বরের প্রবলবেগ হ্রাস পাইলে এবং অনাহার সহ্য হইলে, এই স্নাত রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা সেবনে রোগ সন্মূলে বিনষ্ট হয় এবং পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। অন্ন রাখা উচিত, বিসর্প সন্মূলে বিনষ্ট না হইলে, পুনরাক্রমণ করে। বাতিক, শ্লেষ্মিক, বাত-শ্লেষ্মিক, পৈত্তিক ও পিত্ত-শ্লেষ্মিক বিসর্পরোগে এবং সন্নিপাতজ বা ক্ষতজ বিসর্পরোগে বায়ু বা শ্লেষ্মার প্রকোপ থাকিলে, ইহা প্রযোজ্য। কিরলজ জনিত বিসর্পেও ইহা প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। অল্পপান—উষা দুগ্ধ।

পঞ্চতিক্ত স্নাত গুণ্ণুলু। প্রস্তুতবিধি ১০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পদ্মকস্মৃত। পৈত্তিক বিসর্পে এবং সন্নিপাতিক ও ক্ষতজ বিসর্পে পিত্তের প্রকোপ অধিক থাকিলে কিম্বা বিসর্প কোন প্রকার এড়াবিষ জনিত হইলে, এই স্নাত প্রয়োগ করিবে। নালী বা ও বিস্ফোটক প্রভৃতি রোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়। কিরলজনিত বিসর্পে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হয় না। অল্পপান—উষা দুগ্ধ।

পদ্মক স্নাত। পদ্মস্নাত ১/৪ সের। কঙ্কলী ১ পদ্মকর্ষ, বটীষধু, লোধ, নাপেখর, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, ছোটএলাইচ, হুড়, লাক্ষা (পালা), তেজপাতা, মোম, তুতেভষ্ম, বহুবীর

পুষ্করহাল, শিরীষহাল ও কয়েদবেল প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত একশের । জল ষোলসের ।
পাকশেষ নাশাটয়া ছাকিয়া লইবে ।

বিসপর্বরোগে—পথ্যাপথ্য ।

পথ্য—বিসর্পে বেশী জ্বর থাকিলে, রোগীকে লজ্জন বা সাণ্ড বালি প্রভৃতি লঘুপথ্য ব্যবস্থা করিবে । ঝৈরমণ্ড, যবমণ্ড, মুগ, মহুর, ছোলা ও অড়হর দাইলের ঘূষ এবং মাংসের ঘূষ প্রভৃতি জ্বরসঙ্গে ব্যবস্থা করা যায় । জ্বর বন্ধ হইলে, মুগ, মহুর, ছোলা বা অড়হর দাইল, পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন, জাঙ্গলপ্রাণীর মাংসের ঘূষ, যতদ্বারা সম্বলন করা দাইল ও ব্যঞ্জনাদি, মাখন, কিস্মিস্, ডালিম, বেদানা, করলা, বেতের অগ্রভাগ, পোলতা, পটোল, ডুমুর, কাঁচাকলা, বেগুন প্রভৃতি পথ্য দিবে । তিক্তরস বিশিষ্ট যে কোন দ্রব্য এই রোগে উপকারী । দুগ্ধ সহ্যমত দিবে । দান সহ্যমত ।

অপথ্য—শারীরিক পরিশ্রম, দিবা-নিদ্রা, মৈথুন, পূর্কদিগাগত বায়ু বা প্রবল বায়ু সেবন, শাক, সংযোগ-বিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন, দধি, অন্নদ্রব্য, ছানা, গুরুপাক অন্ন ও পানীয়, রসুন, কুলুধিকলায়, মাষকলায় ও তিল ভক্ষণ, জাঙ্গল-প্রাণীর মাংস ব্যতীত অল্প মাংস ভক্ষণ, পিত্তবর্জক দ্রব্য, লবণ, অন্ন ও কটুরসবিশিষ্ট দ্রব্য ভোজন, মদ্যপান, রাত্রি আগরণ ও রৌদ্র সেবন, এই সকল পরিত্যজ্য ।

স্নায়ুরোগ-চিকিৎসা ।

লক্ষণ । নানাকারণে প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফ জন্মা (পদমূল) বা বাহ্যুল আশ্রয় করিয়া শোথ উৎপাদন করে ও বিদীর্ণ করিয়া ক্ষত জন্মায় এবং দৌষ দেহস্থ উন্মার সহিত মিলিত হইয়া ক্ষত স্থানের মাংসকে শোষণ করিয়া হৃদয়ের ত্রায় করে, ইহাকে স্নায়ুরোগ কহে । মাংস শুষ্ক হইয়া স্নায়ু অর্থাৎ হৃদয় ত্রায় হয় বলিয়া ইহার নাম স্নায়ুরোগ । ইহা অতি কঠিন ব্যাধি । জন্মা বা বাহ্যুলে উৎপন্ন হয় । প্রথমতঃ রোগাক্রান্ত স্থান রক্তবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে, তখন সাধারণ ব্রণ-শোথ বদিয়াই মনে হয়, চিকিৎসকেরও সময় সময় রোগ-নির্ণয়ে মতিভ্রম ঘটে । ক্রমশঃ শোথ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং শোথের

অভ্যন্তর ভাগ কিয়দংশে ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকে । রোগ-বিরণে বিলম্ব-যটিলে যারাত্মক লক্ষণ প্রকাশ পায় বা রোগী মৃত্যু-মুখে পতিত হয় । শোথের পকাপক লক্ষণদ্বারা পাকিয়াছে কিনা স্থির করা দুষ্কর, কারণ, বাহ্য লক্ষণ দৃষ্টে শোথের বহির্ভাগ কঠিন এবং অপক বলিয়াই বোধ হয় । অন্ত্র প্রয়োগে বিলম্ব ঘটিলে, স্বয়ং বিদীর্ণ হইয়া যায়, তখন স্বচূর্ণ খোলসহযোগে ক্ষত-স্থানে প্রয়োগ করিলে কিম্বা অন্ত্রদ্বারা উহা ছেদন করিলে, শুষ্ক মাংসখণ্ড স্ততার ত্রায় বহির্গত হইতে থাকে, এবং শোথও প্রশমিত হয়, কিন্তু রোগের মূলোচ্ছেদ না হইলে, পুনর্বার স্থানান্তরে রোগ প্রকাশ পায় । এই রোগে অন্ত্র প্রয়োগ-কালে ভ্রমবশতঃ যদি বাহ বা জজ্বাস্থিত স্নায়ু ছিন্ন হয়, তাহা হইলে, বাহ সমুচিত ও রোগী ঋণ হইতে পারে ।

চিকিৎসা । স্নায়ু রোগ বৃত্তিতে পারিলেই শক্তিনার মূলের ছাল, শক্তিনারপাতা ও সৈন্ধবলবণ কাঁজির জলে (অভাবে ভাতের অন্নজলে) বাটরা প্রলেপ দিবে । সৈন্ধব প্রথম ২।১ বার বেশী পরিমাণে দিবে, পরে ক্রমশঃ পরিমাণ কমাইয়া দিবে, কারণ যে স্থানের মাংস শুষ্ক হইয়া স্বেদন হয়, সেই স্থানে বেশী বেদনা থাকে না, ক্রমশঃ ঔষধ প্রয়োগে শুষ্ক মাংসখণ্ড যতবেশী নির্গত হয়, তদনুযায়ী ক্ষত পরিষ্কৃত হয় ও বেদনা বৃদ্ধি পায় ; স্ততরাং লবণের পরিমাণ ঐ অবস্থায় কমাইতে হয় । পুনঃ পুনঃ ঐ প্রলেপ লাগাইবে । প্রত্যহ বৈকালে অখগন্ধাচূর্ণ ঘৃতসহযোগে মর্দন করিয়া দুগ্ধ অহুপানে সেবন করাইবে । অখগন্ধা, আতাইষ, মুখা, বামনহাটী, শুঠ, পিপুল ও বহেড়া চূর্ণ করিয়া ছুঙ্কের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে । এতদ্ব্যতীত রসসিন্দূর করলারমূল বা নিসিন্দাপাতার রসসহ দিবসে ২ । ৩ বার প্রয়োগ করিবে । অর না থাকিলে বা অল্প থাকিলে, অখগন্ধা ঘৃত বা বৃহৎ ছাগলাদি ঘৃত দুগ্ধসহ সেবনের ব্যবস্থা করিবে । ভেকের মাংস সিদ্ধ করিয়া তদ্বারা সেক দেওয়া যাইতে পারে ।

এই রোগে তুষ্টি-পুষ্টি বর্জক ঔষধ ও পথ্য প্রয়োগ করা কর্তব্য, কারণ ক্রমশঃ সেবনে বায়ু বর্জিত হইলে রোগও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । রোগীর শরীর স্বভাবতঃ শীর্ণ বা বাতাসিক হইলে মাংস ঘূষ পথ্য দিবে । তিক্তদ্রব্য, দুগ্ধ ও ঘৃত এই রোগে অতি উপকারী ।

বিস্ফোটক-চিকিৎসা।

বাতিক বিস্ফোটকের লক্ষণ। বাতিক বিস্ফোটে রোগীর অর, মস্তকে বেদনা, পিপাসা ও সর্বাঙ্গে বিশেষতঃ সন্ধিস্থানে বেদনা হয় এবং স্ফোটক কৃষ্ণবর্ণ ও অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হইয়া থাকে।

পৈত্তিক বিস্ফোটকের লক্ষণ। পৈত্তিক বিস্ফোটে রোগীর অর ও তৃষ্ণা হয় এবং স্ফোটক পীত বা লোহিত বর্ণ ও অত্যন্ত দাহযুক্ত হয়, পরন্তু উহা গীষ পাকে ও উহা হইতে স্রাব নির্গত হয়।

শ্লেষ্মিকবিস্ফোটকের লক্ষণ। শ্লেষ্মিক বিস্ফোটে রোগীর বমি, অরুচি ও শরীরের জড়তা হয় এবং স্ফোটক পাণ্ডুবর্ণ, কঠিন, কণ্ডুযুক্ত ও বেদনা-বিহীন হয়, পরন্তু উহা বিলম্বে পাকে।

দ্বন্দ্বজ বিস্ফোটকের লক্ষণ। বাতপৈত্তিক বিস্ফোটে অত্যন্ত বেদনা হয়। বাত শ্লেষ্মিক বিস্ফোটে অত্যন্ত বেদনা ও কণ্ডু জন্মে এবং স্ফোটক আর্দ্র-ভাবাপন্ন হয় ও শরীরের গুরুতা হইয়া থাকে। পিত্তশ্লেষ্মিক বিস্ফোটে কণ্ডু ও জালা হয় এবং রোগীর অর ও বমি হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক বিস্ফোটকের লক্ষণ। সান্নিপাতিক বিস্ফোটকের মধ্য-স্থান নিম্ন ও পার্শ্বদেশ উন্নত এবং স্ফোটক কঠিন, ক্ষুদ্রাকার, দাহযুক্ত, রক্তবর্ণ ও রোগীর পিপাসা, বমন, মোহ, মূৰ্ছা, শরীর বেদনা, অর, প্রলাপ, কম্প ও তজ্জা হইয়া থাকে। এই বিস্ফোট অসাধ্য, কেহ কেহ ইহাকেই কার্কশল কহেন।

রক্তজ বিস্ফোটকের লক্ষণ। রক্তজ বিস্ফোট দেখিতে গুজার স্থায় রক্তবর্ণ, ইহা পৈত্তিক লক্ষণান্বিত। শত সহস্র ঔষধ প্রয়োগেও ইহা আরোগ্য হয় না।

বিস্ফোটের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ। এক দোষজ বিস্ফোট সাধ্য, বিদোষজ বিস্ফোট কষ্টসাধ্য এবং সান্নিপাতজ বিস্ফোট নানাপ্রকার উপদ্রব-সংযুক্ত হইলে অসাধ্য হয়।

বিস্ফোটক-চিকিৎসা-বিধি।

কটুরস ও অন্নরসবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, উষ্ণবীৰ্য্য, পিত্তবর্জক, ক্লক্লগ-

বিশিষ্ট ও কারদ্রব্য বা অপকদ্রব্য ভোজন, আহার পরিপাক না হইতে পুন-
র্বার ভোজন, রোজ সেবন ও ঋতুবিপর্যয় (এক ঋতুতে অল্প ঋতুর আবির্ভাব) ;
এই সকল কারণে বিশেষতঃ ফিরঙ্গ প্রভৃতি রোগে রক্ত দূষিত হইলে কিম্বা
মধুমেহ বা বহুমূত্ররোগ থাকিলে, বাতাদি দোষ প্রকৃপিত হইয়া রক্ত, মাংস
ও অস্থিকে দূষিত করিয়া ভয়ঙ্কর ফোটক উৎপাদন করে । রক্ত ও পিত্ত
অত্যন্ত দূষিত হইলে, এই রোগ উৎপন্ন হয় । বিস্ফোটক জ্বরপূর্বক রোগ,
বিস্ফোটক উৎপন্ন হইবার পূর্বে প্রায়শঃ জ্বর হইয়া থাকে, কিন্তু কচিং উৎপন্ন
হইবার পরে বা সঙ্গে সঙ্গে জ্বর হয় ।

কার্বকলের লক্ষণ । রোগাক্রান্ত স্থান প্রথমে শক্ত হয় ও ফুলিয়া
উঠে, ফুলা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও বিস্তৃত হইতে থাকে, শোথের আয়তন
অজ্ঞাধিক পরিমাণে গোলাকার, মুখ চ্যাপ্টা, কঠিন ও রক্তবর্ণ হয় ; দেখিতে
দেখিতে তাহার উপরে আশুণে পোড়া ফুস্কড়ির তায় ফোকা পড়ে, ঐ ফুস্কড়ি
কাটিয়া গেলে, কতকগুলি ছিদ্র বাহির হইয়া পড়ে এবং ঐ সকল ছিদ্রের মধ্য
দিয়া পচা মাংস দেখা যায়, তাহার পর ক্রমশঃ ছিদ্রগুলি বৃদ্ধিযায় ও পচা-
মাংস বহির্গত হইতে থাকে, সমস্তাংশ বাহির হইলে, নিম্নে একটি অক্ষুরবিশিষ্ট
কত দৃষ্ট হয়, এইরূপ দূষিত ফোটককে বিস্ফোটক কহে । ফোটকের
সহিত ইহার প্রভেদ এই—ইহার মুখ চ্যাপ্টা কিন্তু ফোটকের মুখ সরু ।
ইহা হইতে ক্রমশঃ মারাত্মক উপসর্গ সকল প্রকাশ পায় ও রোগী অবিলম্বে
মৃত্যুমুখে পতিত হয় । ইহা দ্রোলোক অপেক্ষা পুরুষদিগেরই অধিক হয়
এবং মধ্য বয়সের পরই প্রায়শঃ ইহার আক্রমণ দেখা যায় । মধুমেহ বা
বহুমূত্র হইতে এই রোগ উৎপন্ন হইলে এবং মুখমণ্ডলে, মস্তকে, পৃষ্ঠদেশে বা
মর্ম্মস্থানে হইলে, সমধিক বিপজ্জনক হইয়া থাকে । ইহা দেহের নানাস্থানে
হয়, কচিং সর্বদেহে উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

বিজ্রধি ও বিস্ফোটক এই উভয়ের মধ্যে কোন্টি প্রকৃত কার্ককল,
তাহার নির্দেশ করা দুঃস্থ । কেহ বলেন, বিজ্রধিই কার্ককল, আবার
কেহ বলেন বিস্ফোটকই কার্ককল । ডাক্তারী মতে কার্ককল যদি
মধুমেহ বা বহুমূত্র হইতে উৎপন্ন হয়, এইরূপ ধরিয়া লওয়া যায়, তবে
বিজ্রধিকেই আয়ুর্বেদ-মতে কার্ককল বলা উচিত, কারণ বিজ্রধি ঐ রোগ

হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। 'পক্ষান্তরে ডাক্তারদের মধ্যেও অনেকে বলেন, ঐ রোগ হইতে বিস্ফোটকও উৎপন্ন হয়, বিস্ফোটকও উৎপন্ন হয়। আবার কেহ কেহ বিস্ফোটকও কেহ 'কেহ বিস্ফোটককে কার্ভক্সল কহেন, নানাধনের নানা মত। কার্ভক্সলের লক্ষণ ১০৫৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল।

বিস্ফোটক প্রকাশ পাইবামাত্র জ্বরের গতি বুঝিয়া নবজ্বরের জ্বায় লক্ষণ বা লঘু পথের ব্যবস্থা করিবে। বমন বিরচন অনেক রোগেই মহোপকারী, বমন-বিরচন দ্বারা উর্দ্ধ ও অধোগত সার্কাস্টিক দোষের লাঘব হয়, সুতরাং রোগের প্রবল আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। বমনের জন্ত পোল্টা ও নিমছালের কাথে মদনফলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। অত্যন্ত দুর্বল শরীরে বমনের পরিবর্তে বিরচন ব্যবস্থা করিবে। বিরচনের জন্ত ত্রিফলার কাথের সহিত তেউড়ী-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া কিম্বা আমলকীর স্বরসের সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে; ইহাতে জ্বরও বিনষ্ট হয় এবং দুই একবার দাণ্ডও হইয়া থাকে। অত্যন্ত কাথের সহিত তেউড়ীমূলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলেও ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক বিস্ফোটে রান্নাদিলেপ কিম্বা শিরীষলেপ; পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক ও রক্তজ বিস্ফোটে চন্দ্রনাড়ী লেপ, পঞ্চবঙ্গল লেপ বা উৎপলাদি লেপ; গ্লেটিক বিস্ফোটে মুস্তকাদিলেপ বা ত্রিফলাদি লেপ প্রয়োগ করিবে। বাতপৈত্তিক, বাতগ্লেটিক ও পিত্তগ্লেটিক বিস্ফোটে কিম্বা সান্নিপাতিক বিস্ফোটে দশাঙ্গ-লেপ অতি উপকারী। এই লেপ বিষ নাশক, সুতরাং বিস্ফোটক এড়াবিষ বা অজ্ব কোন বিষ জনিত হইলেও, এই প্রলেপে বিনষ্ট হইয়া থাকে। বাতিক, গ্লেটিক ও বাতগ্লেটিক-বিস্ফোটে শিরীষ-ছাল, যজ্ঞডুমুর ছাল ও জামছাল সমভাগে পেষণ করিয়া তদ্বারা প্রলেপ প্রয়োগ করা যায়।

বমন বিরচনের পর শুদ্ধদেহে সেবনের জন্ত সিন্দূরযোগ বৈকালে প্রয়োগ করিবে, সর্বপ্রকার বিস্ফোটক ইহাতে বিনষ্ট হয়। বাতিক বিস্ফোটে দশমূলাদি, পৈত্তিক বিস্ফোটে দ্রাক্ষাদি ও গ্লেটিক বিস্ফোটে কিরাতাদি কাথ প্রয়োগ করিবে। বাতপিত্তাদি ভেদে দোষ নির্ণীত না হইলে, বাসাদিকাথ বা পটো-লাদিকাথ অথবা অমৃতাদিকাথ ইহাদের কোন একটি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এই সকল কাথ রোগের মূলীভূত কারণ-নাশক, রক্তপরিষ্কারক ও

অরনাশক এবং দেহ-শোধক ও বিস্ফোটকনাশক ৷ কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে, ঐ সকল কাথের সহিত কটকী-চূর্ণ বা তেউড়ী-চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে । দোষের তাদৃশ প্রবলতা না থাকিলে, কেবল গুলঞ্চ ও নিম্বছালের কাথে কিম্বা ইঞ্জয়ব ও খয়েরের কাথে (খদিরকাষ্ঠ অভাবে) কটকী বা তেউড়ী-চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিলেও উদ্দেশ্যসিদ্ধ হয় ।

যদি বিস্ফোটক না বসে, তাহা হইলে পাকাইবার চেষ্টা করিবে । পুষোৎপত্তি হইলে, সহজেই আরোগ্য হয় । বলাড়ুমুরের গাছের ছাল, পাতা ও মূল বাটিয়া স্ফোটকের উপর লাগাইয়া তদুপরি কলার পাতা বা পান রাখিয়া বান্ধিয়া রাখিবে । কদমপাতা ছেচিয়া ফোড়ার উপর বিছাইয়া বান্ধিয়া রাখিলেও পাকে । থাকিলে পক ব্রণ-শোথের ত্রায় তাহার চিকিৎসা করিবে । অনন্তর ব্রণ বা ক্ষত প্রকাশ পাইলে, ব্রণ-গজাঙ্কুরস ও ব্রণারিগুগ্গলু এই দুইপদ দুই বেলা বা একপদ একবেলা প্রয়োগ করিবে । অর হাস পাইলে পঞ্চতিক্ত দ্ব্যতগ্গলু বা বিসর্পরোগোক্ত পদ্মাকম্বত ব্যবস্থা করিবে ।

বিস্ফোটকে-ঔষধ ।

রাস্নাদি-লেপ । বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক বিস্ফোটের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ বিস্ফোটক কৃষ্ণবর্ণ, রক্তবর্ণ বা শ্রামবর্ণ হইলে এবং তাহাতে অভ্যন্ত দাহ, স্থচীবিদ্ধবৎ বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই লেপ প্রয়োগ করিবে । ইহাতে অচিরে জ্বালা যন্ত্রণার নিবৃত্তি হইয়া শোথ বসিয়া যায় ।

রাস্নাদি লেপ । প্রস্তুতবিধি ১০৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

শিরীষাদি-লেপ । বাতিক বিস্ফোটে স্ফোটক কৃষ্ণ বা শ্রামবর্ণ ও কৃষ্ণ দৃষ্ট হইলে এবং তাহাতে স্থচীবিদ্ধবৎ বেদনা বা খন্টনানি, টাটানি, শূলানি, দপ্-দপ্-করা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই লেপ প্রয়োগ করিবে । ইহা দ্বারা অচিরে বাতজ্ব শোথ বসিয়া যায় । স্ফোটক কোন প্রকার বিষ লাগিয়া হইলেও, ইহাতে শোথ বসে ।

শিরীষাদি লেপ । শিরীষছাল, বেণারমূল, নাপেশ্বর ও কেলেকড়া বা কালিয়ালতা প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দন ও আণ্ডণে গরম করিয়া প্রলেপ দিবে ।

চন্দনাদি-লেপ। পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক ও রক্তজ বিস্ফোটে স্ফোটক, রক্ত, শ্রাম বা কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হইলে এবং তাহাতে অত্যন্ত দাহ ও অত্যধিক উত্তাপ থাকিলে, এই প্রলেপ প্রয়োগ করিলে, মহোপকার দর্শে। ইহা প্রয়োগে অচিরে ঐ সকল শোথ বসিয়া যায়। সান্নিপাতিক বিস্ফোটে পিত্তের অত্যধিক প্রকোপবশতঃ এসকল উপসর্গ উপস্থিত হইলেও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

চন্দনাদি লেপ। প্রস্তুতবিধি ৭২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চবকুল-লেপ। পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, রক্তজ ও সান্নিপাতজ-বিস্ফোটে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ নানা উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ স্ফোটক রক্তবর্ণ ও অত্যধিক প্রদাহযুক্ত হইলে, এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা অচিরে শোথ বিলীন হয়।

পঞ্চবকুল লেপ। প্রস্তুতবিধি ৭২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উৎপলাদি-লেপ। পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, রক্তজ ও সান্নিপাতজ-বিস্ফোটে অত্যধিক জ্বালা ও সস্তাপ থাকিলে এবং স্ফোটক রক্তবর্ণ ও উষ্ণবোধ হইলে, এই প্রলেপ লাগাইবে।

উৎপলাদি লেপ। নীলগন্ধিরমূল, রক্তচন্দন, লোধ, বেণারমূল, অনন্তমূল ও শ্যামালতা, প্রত্যেকে সমভাগ, দ্বন্দ্বৈ পেষণ করিয়া লাগাইবে।

মুস্তকাদি-লেপ। শ্লেষ্মিক বিস্ফোটে স্ফোটক পাণ্ডুবর্ণ, বৃহৎ, কঠিন, ও অল্প বেদনায়ুক্ত হইলে, এই লেপ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে শোথ বসিয়া যায়।

মুস্তকাদি লেপ। প্রস্তুতবিধি ১০৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিফলাদি-লেপ। শ্লেষ্মিক বিস্ফোটে স্ফোটক পাণ্ডুবর্ণ, বৃহৎ, কঠিন ও অল্প বেদনায়ুক্ত হইলে, এই লেপ লাগাইবে। ইহা প্রয়োগে অচিরে শোথ বসিয়া যায়।

ত্রিফলাদি লেপ। প্রস্তুতবিধি ১০৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দশাঙ্গ-লেপ। বাতপৈত্তিক, বাতশ্লেষ্মিক, পিত্তশ্লেষ্মিক ও সান্নিপাতিক বিস্ফোটে অত্যন্ত দ্বাহ, টাটানি, শুলানি, টন্টনানি বা হটাবিদ্ধবৎ-

বেদনা থাকিলে এবং ঐ সকল স্ফোটক কৃষ্ণবর্ণ, শ্যামবর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ বা কৃষ্ণ দৃষ্ট হইলে, এই প্রলেপ লাগাইবে।

দশাঙ্গলেপ । প্রস্তুতবিধি ১০৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

সিন্দূর যোগ । যে কোন প্রকার বিস্ফোটের যে কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ বৈকালে সেবন করিতে দিবে । অল্পপান—উষ্ণেপাতা বা করলাপাতার রস ও মধু । ইহাতে দান্ত পরিস্কার হয় । বিসর্প রোগোক্ত কজ্জলীযোগ প্রয়োগেও সমধিক উপকার হয় ।

সিন্দূর যোগ । রসসিন্দূরের গুলকের রস, নিমছালের রস ও খয়ের জলে ভিজাইয়া সেই জল ও ইন্দ্রবের কাথদ্বারা ক্রমাগত সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া রসসিন্দূরের সমপরিমাণ কপূর, এলাইচ, দারুচিনি ও তেজপাতা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ মিশ্রিত করিবে । মাত্রা—এক আনা ।

দশমূলাদিকাথ । ব্যতিক বিস্ফোট কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বা শ্যামবর্ণ হইলে এবং তৎসঙ্গে রোগীর জ্বর, সন্ধিহানে বেদনা, তৃষ্ণা প্রভৃতি নানা উপসর্গ থাকিলে এই কাথ রোগীকে প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে । কোষ্ঠ-কাঠিগ্র থাকিলে, কটকী বা তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে ।

দশমূলাদি কাথ । বেলছাল, শোণাছাল, গাভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালগাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, পোঙ্গুর, রাস্তা, দারুহরিদ্রা, বেণারমূল, হরালভা, গুলঞ্চ, ধনে ও যুথ প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । ছাকিয়া পান করিতে দিবে ।

দ্রাক্ষাদি কাথ । পৈত্তিক বিস্ফোটক রক্তবর্ণ ও স্পর্শে উষ্ণবোধ হইলে এবং তাহাতে অত্যন্ত দাহ, রোগীর প্রবল জ্বর ও গাত্র-দাহ প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই কাথ প্রত্যহ সকালে পান করিতে দিবে । কোষ্ঠ-কাঠিগ্র থাকিলে, কটকী বা তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে ।

দ্রাক্ষাদি কাথ । কিসুম্বি, গাভারীছাল, পিণ্ডেজুর, পলতা, নিমছাল, বাসকছাল, কটকী, ধৈ ও হরালভা প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

কিরাতাদি কাথ । শ্লেষ্মিক বিস্ফোটক পাণ্ডুবর্ণ, বৃহৎ, কঠিন ও অল্প-

বেদনায়ুক্ত হইলে এবং তৎসঙ্গে রোগীর জ্বর, গা-ব্যথা, অকুচি ও গাত্র-শুকতা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই কাথ তাহাকে প্রত্যহ প্রাতে পান করিতে দিবে। কোষ্ঠ কাঠিও থাকিলে কটকী বা তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে।

কিরাতাদি কাথ। চিরতা, বচ, বাসকছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ইন্দ্রযব, হুড়চী, নিমছাল ও পলতা, এত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বাসাদি কাথ। বিস্ফোটের যে কোন অবস্থায় যে কোন উপসর্গ থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করা যায়।

বাসাদি কাথ। বাসকছাল, মুখা, যষ্টিমধু, নিমছাল, চিরতা, পোলতা, কেওপাপড়া, বেণারমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও ইন্দ্রযব, এত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পটোলাদি কাথ। যে কোন প্রকার বিস্ফোট প্রকাশ পাইলে ও তাহাতে যে কোন উপসর্গ থাকিলে, এই কাথ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে রোগীর আনুষঙ্গিক জ্বর, দাহ, কম্প ও অজ্ঞাত সর্ব-প্রকার উপসর্গ বিনষ্ট হয়। কোষ্ঠ কাঠিও কটকী বা তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। ব্রণরোগোক্ত পটোলাদিকাথ প্রয়োগ করিলেও চলে।

পটোলাদিকাথ। পলতা, নিমছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, গুলঞ্চ, মুখা, রক্ত-চন্দন, স্ফটিকমুখী, কটকী, আকনাদি, হরিদ্রা ও হরালতা, এত্যেকে সমভাগে মিলিত ২তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

অমৃতাদি কাথ। বিস্ফোটকের যে কোন অবস্থায় যে কোন উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ প্রয়োগ করা যায়।

অমৃতাদি কাথ। প্রস্তুতবিধি ৮২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ব্রণ-গজাকুশ রস। বিস্ফোটক পাকিয়া ক্ষত প্রকাশ পাইলে এবং তাহা হইতে নানাপ্রকার স্রাব হইলে অথচ জ্বালা যন্ত্রণা থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অমুপান—উচ্ছেপিতা বা করলাপাতার রস।

ব্রণগজাকুশ রস। প্রস্তুতবিধি ৮২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রণারিগুগ্‌গুলু । বিস্ফোটকে ক্ষত উৎপন্ন হইলে এবং তাহা হইতে নানা প্রকার স্রাব হইলে অথচ জ্বালা যন্ত্রণা থাকিলে কিম্বা ক্ষত শুষ্ক হইতে বিলম্ব হইলে, ক্ষত শুষ্ক ও রক্তভুক্তির জন্য ইহা প্রয়োগ করিবে । অমুপান—গরম দুধ ।

ত্রণারি গুগ্‌গুলু । পিপূল ১ তোলা, হরীতকীচূর্ণ ১ তোলা, আমলকীচূর্ণ ১ তোলা, বহেড়াচূর্ণ ১ তোলা, রসসিন্দূর ১ তোলা ও বিশুদ্ধ গুগ্‌গুলু ৫ তোলা । প্রথমতঃ গুগ্‌গুলু মৃতসংযুক্ত করিয়া তৎসহ ক্রমশঃ সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিবে ।

পঞ্চতিক্তদূত গুগ্‌গুলু । বিস্ফোটকের ক্ষত শুষ্ক হইতে বিলম্ব হইলে, ক্ষত ও রক্তশোধনের জন্য বা রোগ সমূলে ধ্বংস করিবার জন্ত, এই দূত প্রয়োগ করা বাইতে পারে । অমুপান—গরম দুধ ।

পঞ্চতিক্তদূত গুগ্‌গুলু । প্রস্তুতবিধি ৭০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বিস্ফোটকে—পথ্যাপথ্য ।

পথ্য—অরসদেহ নবজরের শ্রায় লজ্জন বা লঘুপথ্য অর্থাৎ সাণ্ড, ধৈর্যমণ্ড বা যবমণ্ড প্রভৃতি খাইতে দিবে । অর বন্ধ হইলে, পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, স্নাত সন্তলিত মুগ, মসুর ও ছোলার দাইল, ঘূতে সন্তলন করা পটোল, পলতা, উচ্ছে, করলা, বিস্বে, বেগুণ, ডুমুর, কাঁচকলা, খোড় ও মোচা প্রভৃতির তরকারী প্রভৃতি পথ্য দিবে । মিষ্ট দ্রব্য এই রোগে বত-কম ব্যবহার করা যায়, ততই ভাল ।

অপথ্য । অন্ন, কটু ও লবণরসবিশিষ্ট দ্রব্য, পিত্ত-বর্ধক দ্রব্য, কৃষ্ণদ্রব্য, জলজ মাংস, শাক, দধি, ইক্ষুচিনি ব্যতীত অন্য মিষ্টদ্রব্য ও গুরুপাকদ্রব্য বিস্ফোটে অহিতকর । এই রোগে মৈথুন, ক্রোধ, পরিশ্রম ও রৌদ্র-সেবন আরোগ্য-লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত এই সকল পরিত্যাজ্য ।

স্ফোটক-চিকিৎসা ।

স্ফোটক আকৃতিভেদে নানা প্রকার । বিজ্রধি, বিসর্প ও বিস্ফোট প্রভৃতি বৃহৎ স্ফোটক, তাহাদের চিকিৎসা ইতঃপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে কতকগুলি

ক্ষুদ্র ২ স্ফোটকের চিকিৎসা বর্ণিত হইতেছে । যেমন বিদ্রুপি প্রভৃতি ত্রণ পরি-
ণামী ব্যাধি, তজ্জন অমুশয়ী এবং কক্ষা প্রভৃতি কতকগুলি স্ফোটক আছে।
তাহারা ক্ষুদ্র হইলেও ত্রণপরিণামী, স্মৃতরাং যাবৎ ক্ষত প্রকাশ না পায়, তাবৎ
ত্রণ-শোধ-মধ্যে গণ্য, কিন্তু ক্ষত প্রকাশ পাইলে, ত্রণ বলা যায় ।

অমুশয়ার লক্ষণ । পায়ের উপরে অল্প শোধযুক্ত, নিকটবর্তী হকের
সমানবর্ণবিশিষ্ট এবং অন্তঃপাক ও গভীরমূলযুক্ত রোগ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে
অমুশয়ী কহে । এইরোগে হকের নিম্নে স্ফোটক জন্মে ও পাকে, স্মৃতরাং
হকে রোগের প্রভাব অল্পই প্রকাশ পায়, হক অল্প ফুলিয়া উঠে, কিন্তু স্ফোট-
কের মূল মাংস পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ।

অমুশয়ীর চিকিৎসা । শোধ প্রকাশ পাইবামাত্র যবচূর্ণ, ময়দা ও
কাঁচা গোটা যুগ সমভাগে পেষণ করিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিবে । যদি এই
প্রলেপে শোধ না বসে, তবে অবিলম্বে পঞ্চবকুল লেপ প্রয়োগ করিবে । শজি-
নার ছাল বাটিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলেও শোধ বসিয়া যায় । শজিনার ছাল
ছেচিয়া কলার নরম পাতার জড়াইয়া পোটলী করিবে এবং আঙুণে গরম
করিয়া স্বেদ দিবে, ইহাতে বেদনা ও ফুলার আশু শান্তি হয় । সেবনের জন্ত
রসসিন্দূর বা কজ্জলী-যোগ শজিনার ছালের রসসহ প্রয়োগ করিবে । পাকিলে
অল্পপ্রয়োগ করিয়া বা ঔষধদ্বারা কাটাইয়া ক্ষত শুষ্ক হওয়ার ঔষধ দিবে ।
এতদ্ব্যতীত ডেউয়ো বা ডেহরা গাছের ক্ষীর বা যজ্জড়মূরের ক্ষীর দ্বারা প্রলেপ
দিলেও শোধ বসিয়া যায় ।

কক্ষানামক স্ফোটকের লক্ষণ । হস্তে, কক্ষ-দেশে (কাঁধে) ও কক্ষে
(বগলে) দাহ ও তীব্র বেদনায়ুক্ত কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক উৎপন্ন হইলে, তাহাকে
কক্ষা বলা যায় । ঐ সকল স্থানে অগ্নাশ্রু স্ফোটকও উৎপন্ন হইতে পারে,
কিন্তু সেই সকল ফোড়া অপেক্ষা ইহাতে দাহ এবং বেদনা বেশী থাকে, পরন্তু
ইহা দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ ।

কক্ষার চিকিৎসা । শোধ প্রকাশ পাইবামাত্র বসাইয়া দিবে । যজ্জ-
ড়মূরের আঠা বা তেউড়ীর আঠা লাগাইলে, অচিরে ঐ শোধ বসিয়া যায় ।
উহাতে না বসিলে ত্রণ-শোধরোগোক্ত পঞ্চবকুল লেপ প্রয়োগ করিলে

নিঃসন্দেহ শোধ বসিয়া যাইবে । অসময়ে প্রাণেপ দিলে হয়ত নাও বসিতে পারে, সুতরাং যদি পাকে, শোধ ফাটাইয়া ফুটাইয়া বা বিদীর্ণ করিয়া তাহা হইতে পুষ্টি নিঃসারিত করিয়া ত্রণের আয় চিকিৎসা করিবে ।

পাষণগর্দভ । হস্থ-সন্ধিতে কঠিন, অল্প বেদনাবিশিষ্ট ও মৃদু (তেল তেলে) শোধ জন্মিলে, তাহাকে পাষণ-গর্দভ কহে ।

চিকিৎসা । ইহার সঙ্গে জ্বর থাকিলে এবং যথাসময়ে চিকিৎসা না করিলে রোগ মারাত্মক হইতে পারে । জ্বরের জ্ঞানবজ্রের জয়াবটী শক্তিনার ছালের রস সহ প্রয়োগ করিবে অথবা বিস্ফোটকরোগোক্ত অমৃতাদিকাথ বা পটোলাদিকাথ সেবন করিতে দিবে । শক্তিনার ছাল, ধূতুরার মূল ও আদা সমভাগে হুঁকার কটু জলে বাটিয়া আঙুণে গরম করিয়া প্রলেপ দিবে । ইহাতে না বসিলে, ত্রণ-শোধোক্ত পঞ্চবকল প্রলেপ দিবে ।

জালগর্দভ । ইহা শরীরের নানাস্থানে উৎপন্ন হইতে পারে । যেস্থানে উৎপন্ন হয়, সেস্থানের শোধ অতি পাতলা চর্মে আচ্ছাদিত থাকে, ঐ শোধ অল্প পাকে এবং শোধে অত্যন্ত দাহ বিদ্যমান থাকে ও তাহার যন্ত্রণায় রোগী অস্থির হয় । পরন্তু রোগীর জ্বর হয় । এরোগ কদাচ উপেক্ষা করিবে না, কারণ ইহা বিসর্পের আয় এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে, সুতরাং রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র প্রতীকার করিবে । যথাসময়ে চিকিৎসা না করিলে, বিসর্পের আয় প্রসর্পিত হইয়া মহান্ অনর্থ সংঘটিত করে, এমন কি জীবন নষ্টও করিতে পারে । ইহার অপর নাম অগ্নিবাত ।

জালগর্দভ চিকিৎসা । শোধ প্রকাশ পাইবামাত্র প্রলেপের ঔষধ প্রয়োগ করিবে । পঞ্চবকল-লেপ এক টুকুরা কাপড়ে মাখাইয়া অবিলম্বে শোধ আচ্ছাদিত করিয়া প্রলেপ দিবে । কাপড়ের টুকুরা কাঁচিঘারা কাটিয়া লইবে, এরূপ পরিমাণে কাটিবে, যেন শোধস্থানের চতুর্দিকে এক আঙ্গুল পরিমাণ কাপড় বেশী থাকে এবং শোধ-স্থান আচ্ছাদিত হইয়া নীরোগ বা সুস্থ স্থানের এক আঙ্গুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, শোধ স্থান খালি থাকিলে, ঐ শোধ অত্র সঞ্চার করিতে পারে, সুতরাং 'প্রলেপটি' বিশেষ বিবেচনাপূর্বক ঘোষণা করিবে । এইরূপে গোটা মুগ বা মৃদু বাটিয়া প্রলেপ দিলেও

শোথ বসিয়া যায় । শোথ বিদীর্ণ হইয়া কত প্রকাশ পাইলে, ত্রণশোথের
 তায় তাহার চিকিৎসা করিবে ।

বল্মীক । গ্রীবায়, ঋদ্ধে, বগলে, হস্তে, পদে, সন্ধিস্থানে কিম্বা গলায়
 এক প্রকার স্ফোটক জন্মে, ইহা দেখিতে বল্মীকবৎ অর্থাৎ উইয়ের চিপির
 তায় উন্নতাগ্র ও বহুছিদ্র বা মুখবিশিষ্ট । ইহাতে হৃদীবিক্রবৎ বেদনা থাকে
 (ছুঁচ-কুটাইলে যেন্দ্রপ বেদনা হয়) এবং ঐ বহুমুখ বা ছিদ্রদ্বারা পচা মাংসখণ্ড
 স্ততার আকারে বহির্গত হয় । পরন্তু বিসর্পের তায় ইহাও সঞ্জনশীল অর্থাৎ
 এক স্থান হইতে অত্র গমনশীল । ইহা কদাচ উপেক্ষণীয় নহে, সময়ে
 চিকিৎসা না করিলে বা সূচিকিৎসার অভাবে মারাত্মক হইতে পারে, বিশেষতঃ
 মর্মস্থানে উৎপন্ন হইলে জীবন নাশের সম্ভাবনা । প্রথমতঃ শোথ প্রকাশ পায়,
 পরে অল্প অল্প পাকে ও উপরের চর্ম উঠিয়া গিয়া কত প্রকাশ পায়, তখন
 উইয়ের চিপির তায় উচ্চ ও বহুছিদ্র সকল প্রকাশ পায়, ডাক্তারীমতে বাহ্যকে
 কার্শ্বকল কহে, তাহার সহিত ইহার লক্ষণের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে ।

বল্মীক-চিকিৎসা । শোথ প্রকাশ পাইবামাত্র পক্ষবহল-লেপ প্রয়োগ
 করিবে । বিসর্পের তায় ইহাতে প্রলেপ লাগাটবে, যেন অত্র সঞ্জন করিতে
 না পারে । ময়ূর বা মৃগ বাটির চতুর্দিকে প্রলেপ দিলে সঞ্জন করিতে
 পারে না । যদি না বসে অথচ বহু ছিদ্র প্রকাশ পায়, তাহা হইলে বলা-
 ডুম্বরের পাতা ও শিকড় ছেচিয়া শোথের উপরে স্থাপন করিয়া তৎপরি কলার
 পাতা বিছাইয়া বান্ধিয়া রাখিবে, ইহাতে শীঘ্র পাকে, পাকিলে আর ভয়ের
 কারণ থাকে না, তখন পুণ্য রক্তাদি আব হইতে পাকে । যদি উহাতেও না-
 পাকে, তাহা হইলে অস্ত্রদ্বারা উহার মূলোচ্ছেদ করা প্রয়োজন । পাকিলে
 পক্ষ ত্রণ-শোথের তায় চিকিৎসা করিবে । আত্মমদিক অর থাকিলে, নবজরের
 জয়াবটী ও বিদ্রবি রোগোক্ত কঙ্কণীযোগ প্রয়োগ করিবে । জরের প্রকোপ
 প্রবল হইলে, অবগুহ লঙ্ঘন বা লণুপথ্য ব্যবস্থা করিবে ।

অগ্নিরোহিণী । কক্ষ-দেশে (বগলে) একপ্রকার দুঃসহ যন্ত্রণাদায়ক
 ও মৃত্যুপ্রদ স্ফোটক জন্মে, উহা দেখিতে অলঙ্ঘ অগ্নির তায় । উহাতে অল্প ও
 অন্তর্দাহ জন্মায় এবং মাংস পথ্যস্ত বিদীর্ণ করে । এই রোগ ত্রিদোষোৎপন্ন,

কিন্তু তাহা হইলেও ইহাতে প্রায়শঃ পিত্তাধিক লক্ষণ অর্থাৎ দাহ প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায় ; পরন্তু পিত্তাধিক ত্রণের ত্রায় অগ্নিবর্ণাভা এবং কচিং বা কিকিং কৃষ্ণ বা গ্লামবর্ণের আভা প্রকাশ পায় । প্রথমতঃ কোনস্থানে একটি রক্তবর্ণ কণ্ড প্রকাশ পায় ও তাহা চুলকায়, পরে দেষিতে দেষিতে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তবে ঐরূপে বর্দ্ধিত হইলেও খুব বড় হয় না বা অন্ততঃ সঞ্চরণ করে না । প্রায়শঃ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বর্দ্ধিত হইবার বেগ হ্রাস পায় এবং জ্বর ও প্রবল গাত্র-দাহ ও ক্ষেটিকে দাহ প্রকাশ পায় । রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র প্রতী-কারের চেষ্টা না করিলে প্রায়শঃ জীবন নষ্ট করে ; সুতরাং উহা কদাপি উপেক্ষণীয় নহে ।

অগ্নিরোহিণী-চিকিৎসা । রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র পঞ্চবকল-লেপ প্রয়োগ করিবে, এই মহোষধে অবিলম্বে শোধ বসিয়া যায় । পলতা ও নিম-ছালের কাথে তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে, বিরচনদ্বারা দান্ত হইলে, জ্বরের সম্ভাপ হ্রাস হইয়া আইসে ও দাহ প্রশমিত হয়, পরন্তু জীবনের আশঙ্কা থাকে না ; সুতরাং আন্তে আন্তে চিকিৎসা করিবার অবসর পাওয়া যায় । ক্ষেটিক যাবৎ না বসে, তাবৎ ঐ লেপ পুনঃ পুনঃ লাগাইবে । বির-চনের পর অমৃতাদিকাথ সেবন করিতে দিবে । ক্ষেটিকে অত্যধিক দাহ থাকিলে পৈত্তিক বিসর্পরোগোক্ত বিধান অমৃতায়ী চিকিৎসা করিবে এবং না বসিলে পাকাইয়া ফাটাইয়া ফুটাইয়া বা বিদীর্ণ করিয়া পুষ্কল নিঃসারিত করিয়া ক্ষতরোপণের ঔষধ প্রয়োগ করিবে । ষথাসময়ে চিকিৎসা না করিলে, এ রোগে মৃত্যু অনিবার্য্য । প্রায়শঃ ৭ । ১০ বা ১৫ দিনের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু হয় ।

বিদারিকা । কঙ্কদেশে (বগলে) ও বক্ষণ সন্ধিতে অর্থাৎ কুচকিতে ভূমিকুয়াণ্ডের ত্রায় গোলাকার ছোট বড় শোথ জন্মিলে, তাহাকে বিদারিকা কহে । ইহাতেও রোগীর আত্মবঙ্গিক জ্বর, দাহ ও তৃষ্ণা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায় । ইহাও ত্রিদোষোৎপন্ন, কিন্তু শোথ ক্ষুদ্র হইলে বা দোষের প্রবল প্রকোপ না থাকিলে, উপসর্গগুলিও অনতি প্রবলভাবে উপস্থিত হয় এবং শোথ বৃহৎ হইলে বা দোষের প্রবল প্রকোপ থাকিলে, ত্রিদোষের নানা প্রকার প্রকোপ লক্ষণ প্রকাশ পায়, সুতরাং দাহ, পিপাসা, তন্দ্রা, মুচ্ছা, জড়তা,

অলসতা, মুখ-লিপ্ততা প্রভৃতি নানা উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও এই রোগ মারাত্মক নহে, কষ্টদায়ক মাত্র ।

বিদারিকা-চিকিৎসা । শোথ প্রকাশ পাইলে, শজিনাছাল, ধূতুরামূল, দেবদারু ও আদা সমভাগে তকার কটু জলে বাটিয়া কলার নরম পাতায় রাখিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে, ইহাতে যদি না বসে, পক্ষবকল-লেপ প্রয়োগ করিবে । অমৃতাদিকার্ষ সেবন করাইলে অরও বিনষ্ট হয় এবং তৎসঙ্গে ফোটকও বসিয়া যায় । না বসিলে পাকিবার ওষধ প্রয়োগ করিবে এবং পাকিলে পকত্ব-শোধের ছায় চিকিৎসা করিবে ।

পিড়কা-চিকিৎসা ।

পিড়কাশব্দে সাধারণতঃ দুগ্ধাণ্ড অপেক্ষা অল্পায়তনবিশিষ্ট ফোটক বুঝাই-লেও আয়ুর্বেদমতে অত্যন্ত প্রমেহ-পিড়কা অর্থাৎ সরার ছায় আকৃতিসূক্ত বৃহৎ বিদ্রুপি পর্য্যন্তও পিড়কা শ্রেণীভুক্ত । আবার হাম, জলবসন্ত, বসন্ত এবং কিরঙ্গজনিত ইরাপস্নও পিড়কাশ্রেণীভুক্ত । সূত্রাং আয়ুর্বেদমতে ফোটক ও পিড়কা উভয়ই একার্থবোধক ;—ফোটক বলিলে যাহা বুঝায়, পিড়কা বলিলেও তাহাই বুঝায়, কিন্তু এই গ্রন্থে প্রচলিত অর্থের অনুসরণ করিয়া তদনুযায়ী ফোটক ও পিড়কা স্বতন্ত্র লিপিবদ্ধ করা হইল ।

অজগল্লী । চাক্‌চাক্যুক্ত এবং নিকটবর্তী চামড়ার ছায় বর্ণ ও যুগের ছায় আকৃতিবিশিষ্ট অথচ প্রথিত পিড়কা জন্মিলে, তাহাকে অজগল্লী কহে । ইহা বেদনারহিত এবং শ্লেষ্মা ও বাত এই দ্বিদোষের প্রকোপে উৎপন্ন । কিন্তু ইহাতে বায়ু অপেক্ষা শ্লেষ্মার প্রকোপ বেশী থাকে, এই জন্ত বেদনা থাকে না । এই রোগ বাল্যকালে অর্থাৎ শিশুদিগকেই আক্রমণ করে । শিশুরোগে অজগল্লীর লক্ষণ দ্রষ্টব্য ।

চিকিৎসা । পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিলে অজগল্লিকা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । অল্প চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না । যবক্ষার, স্যাচিক্ষার ও ঝিহুক-ভগ্ন সমানভাগে জলে মর্দন করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে । অজগল্লিকায় বেদনা থাকে না ; সূত্রাং কাটা বা সূচীদ্বারা উপযুক্তপরি বিদ্ধ করিলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে । বিদ্ধ করিলে সহজে পাকে ও আরোগ্য হয় ।

এতদ্ব্যতীত মনঃশিলা, দেবদারু ও কুড় সমানভাগে জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলেও পাকে ।

যবপ্রথ্যা । যবের ত্রায় আকৃতি বিশিষ্ট, অতি কঠিন অথচ গ্রন্থিত পিড়কা জন্মিলে, তাহাকে যবপ্রথ্যা কহে । এই পিড়কার মূলদেশ মাংস-পর্যন্ত বিস্তৃত হয় । ইহার লক্ষণ ও চিকিৎসা অঙ্গগলিকার ত্রায় । প্রথমতঃ যবকার, সাচিষ্কার ও বিম্বক-ভগ্নদ্বারা প্রলেপ দিয়া কয় করিবার চেষ্টা করিবে, পরে অঙ্গগলিকার ত্রায় চিকিৎসা করিবে ।

অস্ত্রালজা । কঠিন, অবক্র, গোলাকার এবং উন্নত পিড়কা জন্মিলে, তাহাকে অস্ত্রালজী কহে । ইহা অন্ন পাকে ও অন্ন পুষ সংযুক্ত হইয়া থাকে । মনঃশিলা, দেবদারু ও কুড় সমানভাগে বাটিয়া প্রলেপ দিলে সত্ত্বর পাকে ও আরোগ্য হয় ।

বিরূতা । পিত্ত প্রকৃপিত হইয়া পক্ষ ডুমুর ফলের তার লালবর্ণবিশিষ্ট, গোলাকার ও অত্যধিক দাহযুক্ত পিড়কা উৎপাদন করিলে, তাহাকে বিরূতা কহে । এই পিড়কা অতি শীঘ্র পাকে এবং পাকিলে পিড়কার মুখ বিস্তৃত হইয়া পড়ে । মুখ বিস্তৃত হয় বলিয়া ইহাকে বিরূতা কহে ।

চিকিৎসা । বিরূতা পিড়কা অতি শীঘ্র পাকে, সূত্ররাং বসাইবার চেষ্টা করা রূপা । ইহা যন্ত্রণাদায়ক বটে, কিন্তু যারায়িত্ব নহে । পাকোন্মুখ না হইলে, অবশ্যই পক্ষবদ্ধন বা পক্ষক্ষীরিরকের ক্ষীরদ্বারা প্রলেপ দিয়া বসাইয়া দিবে । পাকোন্মুখ হইলে পাকিবার জন্ত তোকমারী বা ত্রিসির পুলটিস্ এবং অত্যন্ত দাহ থাকিলে বিসর্পরোগোক্ত চন্দনাদি লেপ দিবে । পাকিলে পক্ষ-ত্রণ-শোথের ত্রায় চিকিৎসা করিবে ।

ইন্দ্রবিদ্ধা । যেরূপ পক্ষকোণের মধ্যে বীজসকল অবস্থান করে, তদ্রূপ খাত ও পিণ্ডের প্রকোপে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা দ্বারা আবৃত হইয়া পিড়কা জন্মিলে, তাহাকে ইন্দ্রবিদ্ধা কহে । ইহার চিকিৎসা বিরূতা পিড়কার ত্রায় করিবে । ইহাতে পক্ষক্ষীরের লেপ অতি উপকারী । অথথ, পাকুড়, বেতস ও যজ্ঞডুমুর এই পাঁচটিকে পক্ষক্ষীরিরক কহে । ইহাদের ছালের লেপ দেওয়া যায় বা ক্ষীরের লেপও দেওয়া যায়, আবার পাঁচটি সংগ্রহ করিতে না

পারিলে ২।৩ টি বৃক্ষের ছাল বা ক্ষীর দ্বারা লেপ দিলেও চলে। পাকোন্মুখ হইলে, পাকিবার ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

গর্দভিকা। বায়ু ও পিত্তের প্রকোপবশতঃ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা দ্বারা আবৃত, রক্তবর্ণ, গোলাকার অথচ বেদনাবিশিষ্ট পিড়কা উদ্গত হইলে, তাহাকে গর্দভিকা কহে। ইহার চিকিৎসা বিবৃতার গ্রায়। প্রথমে বসাইবার চেষ্টা করিবে, না বসিলে কিম্বা পাকোন্মুখ হইলে, পাকিবার ঔষধ লাগাইবে।

ইরিবেল্লিকা। বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষের প্রকোপে মস্তকে-
তীর বেদনাবিশিষ্ট পিড়কা জন্মিলে তাহাকে ইরিবেল্লিকা কহে। এই রোগে রোগীর প্রবল জ্বর হয়। বিবৃতার গ্রায় ইহার চিকিৎসা করিবে। পিড়কায় প্রলেপ দিবে এবং অমৃতাদি কাথ সেবনের ব্যবস্থা করিবে। যে কোন পীড়কা বা ফোটক সংযুক্ত জ্বরে এই কাথ অতি উপকারী।

গন্ধমালা। কক্ষা নাম্নী ফোটকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও বেদনাবিশিষ্ট কয়েকটি পিড়কা চর্মের উপরে মালার গ্রায় একবারে উদ্গত হইলে, তাহাকে গন্ধমালা বা গন্ধনাম্নী পিড়কা কহে। ইহা পিত্তের প্রকোপবশতঃ উৎপন্ন হয়। বিবৃতার গ্রায় ইহার চিকিৎসা করিবে।

কচ্ছপিকা। বায়ু ও কফের প্রকোপ বশতঃ কক্ষপের গ্রায় আকৃতি-
বিশিষ্ট অথচ অতি কঠিন পাঁচ ছয়টি পিড়কা পরস্পর সম্মিলিতভাবে উদ্গত হইলে, তাহাকে কচ্ছপিকা কহে।

চিকিৎসা। পিড়কা প্রকাশ পাইবামাত্র ধূতুরা পাতা, আদা ও শাজিনা ছাল সমভাগে বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে; তাহাতে না বসিলে, পঞ্চ-
বন্ধল লেপ অথবা দেবদারু, মনঃশিলা ও কুড় সমভাগে বাটিয়া লেপ দিবে। পাকিবার ঔষধ লাগাইয়া পাকাইবে, এবং পাকিলে, পকত্রণ-শোধনের গ্রায় চিকিৎসা করিবে।

পনসিকা। কর্ণরন্ধ্রে একপ্রকার নিশ্চল ও তীব্র বেদনায়ুক্ত পিড়কা জন্মে, তাহাকে পনসিকা কহে। ইহার অভ্যন্তরভাগ পাকে।

চিকিৎসা। পনসিকা বসে না, সুতরাং বসাইবার চেষ্টা করা যথা।

মনঃশিলা, কুড়, হরিদ্রা, হরিতাল ও দেবদারু সমভাগে জলে বাটিয়া প্রলেপ দিবে ; ইহাতে পাকে । পাকিলে পক ত্রণ-শোথের জায় চিকিৎসা করিবে ।

ত্বকরোগ-চিকিৎসা ।

কুনথ ও চিল্প । বায়ু ও পিত্ত নথের অগ্রভাগস্থ মাংস দূষিত করিয়া দাহ ও পাকবিশিষ্ট যে রোগ জন্মায়, তাহাকে কুনথ কহে । এই রোগে হস্ত ও পদের অঙ্গুলির নখাগ্রভাগের মাংস প্রথমতঃ একটু ফুলিয়া উঠে, উহাতে বেদনা ও জ্বালা হয় এবং উহা স্পর্শ করিলে কর্কশ বোধ হয় । কাহারও কাহারও ঐরূপ অবস্থাই দীর্ঘকাল যাবৎ বর্তমান থাকে, এই অবস্থাকে কুনথ কহে । আবার ঐ অবস্থার পরিবর্তন হইয়া যখন নখাগ্রভাগ পাকে ও তাহাতে ক্ষত উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে রস নির্গত হইতে থাকে, তখন চিল্প বলা যায় ।

চিকিৎসা । কুনথ রোগে নিমপাতা ও খয়ের বাটিয়া প্রলেপ দিবে ও অঙ্গুলি বান্ধিয়া রাখিবে । যাবৎ রোগ আরোগ্য না হয়, তাবৎ ঐরূপ ঔষধ লাগান ও বান্ধিয়া রাখা উচিত । চিল্পরোগে সরিষার তৈল ১ তোলা, চূর্ণ ১০ আনা, ধূনা ১০ আনা ও তুঁতে ভষ্ম ৩ রতি একত্র লোহার হাতায় বা ঝিনুকে রাখিয়া আগুনের জ্বালে ফুটাইয়া পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিবে । ক্ষত আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত বান্ধিয়া রাখা উচিত ।

কদর । কাকর বা কণ্টকাদি দ্বারা পদতল ক্ষত বা আহত হইলে, কুলের আঠির জায় আকৃতিবিশিষ্ট গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাকে কদর কহে । কেহ কেহ উহাকে কুল-আঠি কহে । ইহাকে অন্নদ্বারা ছেদন করিয়া ক্ষত-স্থানে ত্রণরোগোক্ত নিষ্প্রয়ত লাগাইবে ।

পাদদারী । যাহারা অধিক ভ্রমণ করে, তাহাদের পদদ্বয়স্থিত বায়ু প্রকুপিত হইয়া পদদ্বয়কে বিদীর্ণ করে । এই রোগের চলিত নাম পা'ফাটা । পাদদারীরোগে পদ অত্যন্ত রুদ্ধ হয় । কুষ্ঠরোগোক্ত বিপাদিকারোগেও পদ-তল ফাটে ; কিন্তু তাহাতে কুষ্ঠরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় বলিয়া তাহা কুষ্ঠ-রোগের মধ্যে পরিগণিত ।

চিকিৎসা । এই রোগে ধূনাচূর্ণ, ঘোম ও তৈল একত্র আগুনে ফুটাইয়া পুনঃ পুনঃ লাগাইবে ।

অলসক (পাঁকুই)। হৃষ্ট কর্দম সংস্পর্শে এই রোগ জন্মে। এই-
রোগে পায়ের অঙ্গুলিঘরের মধ্যস্থল ক্লিন্ন এবং কণ্ডু (চুলকণা), দাহ ও বেদনা-
বিশিষ্ট হয়, পরন্তু ঐ কণ্ডু পাকে ও তাহা হইতে রসনির্গত হয়।

চিকিৎসা। জাতীপত্র বা মালতীফুলের পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে
রোগ সারে। সরিষার তৈল, চূণ ও তুঁতেভস্ম একত্র আশুণে দুটাইয়া
লাগাইলে রোগ সারে। ক্ষতস্থানে ঔষধ লাগাইয়া বান্ধিয়া রাখিবে।

যুবান-পিড়কা। যুগ্মে শিমূল কাঁটার ঝায় উন্নতগ্র স্কৃষ্ণড়ি জন্মিলে,
তাহাকে যুবান পিড়কা কহে। ইহা যৌবনকালে উদ্গত হয়, চলিত কথায়
ইহাকে বয়োস্ফোট, বয়স্ফোড়া বা বয়ত্রণ কহে। ইহা কক্ষ, বায়ু ও রক্ত-
দোষে জন্মে। উক্ত উন্নতগ্রস্থান দুইটি অঙ্গুলিদ্বারা টিপিলে উহার মধ্য
হইতে একটি শাস নির্গত হয়। উহা কখনও একটু পাকে এবং কিঞ্চিৎ
বেদনাবিশিষ্ট হয়। তখন দুই অঙ্গুলিদ্বারা টিপিয়া শাস বাহির করিয়া দিলে,
বেদনা কমে। শিমুলের কাঁটা হৃদ্রসহযোগে ষষিয়া লাগাইলে, ঐ রোগের
শান্তি হয়।

জতুমণি। হৃকের উপর মন্থন, কিঞ্চিৎ উন্নত, বেদনারহিত ও কৃষ্ণবর্ণ
যে মণ্ডল উৎপন্ন হয়, তাহাকে জতুমণি কহে। ইহা জন্মের সহিত উৎপন্ন
হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, ইহা পুরুষের দক্ষিণদিকে ও স্ত্রীলোকের
বামদিকে উৎপন্ন হইলে, শুভ ফল প্রদান করে। প্রচলিত কথায় কোন
কোন অঞ্চলে ইহাকে জড়ুল এবং কোন কোন অঞ্চলে জড় বা জটু কহে।
ইহা আরোগ্য হয় না, পরন্তু আরোগ্য না হইলেও কোন ক্ষতি নাই।

মাষক। হৃকের উপর মাষকলাইয়ের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ,
কিঞ্চিৎ উন্নত, বেদনারহিত ও অচল ক্ষুদ্র মাংসাত্মক উদ্গত হইলে, তাহাকে
মাষক কহে। প্রচলিত কথায় ইহাকে আঁচিল বলা যায়।

তিলকালক। হৃকের উপর তিলপরিমিত স্থানে বেদনারহিত, অল্পমত
অথচ কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নের উৎপত্তি হইলে, তাহাকে তিলকালক কহে। প্রচলিত
কথায় ইহাকে তিল কহে।

চিকিৎসা। জতুমণি, মাষক ও তিলের চিকিৎসা করিতে হইলে,

এক টুকরা কাপড়দ্বারা বাতির জ্বায় পাকাইয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিবে এবং ঐ জ্বলন্ত বাতি বা পলিতা পুনঃ পুনঃ রোগ-স্থানে লাগাইবে । অনন্তর দক্ষ হইলে মাখন বা তিলতৈল লাগাইবে । এইরূপ পুনঃ পুনঃ দক্ষ করিলে রোগ সারে ।

ব্যঙ্গ ও নীলিকা । ক্রোধ ও পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে বায়ু প্রকুপিত অথচ পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া মুখে গ্রামবর্ণ ও অহুয়ত মণ্ডল উৎপাদন করিলে, তাহাকে মুখ-ব্যঙ্গ কহে । চলিত কথায় ইহাকে মেচেতা কহে । উক্ত মণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইলে, তাহাকে নীলিকা কহে । ব্যঙ্গ ও নীলিকায় প্রভেদ এই—ব্যঙ্গ দেখিতে গ্রামবর্ণ ও নীলিকা কৃষ্ণবর্ণ ।

চিকিৎসা । নিমপাতা বাটা ও চন্দনঘসা মিশ্রিত করিয়া মালিশ করিবে বা মজিষ্ঠা দুগ্ধসহযোগে বাটিয়া মালিশ করিবে কিম্বা মস্তুরের দাইল দুগ্ধসহ বাটিয়া অথবা দুগ্ধসহ জায়ফল ঘসিয়া মালিশ করিবে ।

পরিবর্তিকা । পুন্স অতিশয় মর্দন বা পীড়ন (টেপাটিপি) করিলে কিম্বা তদনুরূপ আঘাতপ্রাপ্ত হইলে, সর্বশরীরগামী ব্যানবায়ু প্রকুপিত হইয়া পুন্সের বৃক্ আশ্রয় করে, তজ্জন্ম ঐ বৃক্ ক্ষীত হইয়া লিঙ্গের অধোভাগে গ্রন্থির জ্বায় লব্ধিত হয় অর্থাৎ বুলিয়া পড়ে । ইহাকে পরিবর্তিকা কহে । এই রোগ বায়ুজনিত হইলে, ঐ লব্ধিত চর্ম্মে বেদনা অসহ্য হইয়া, কিন্তু শ্লেষ্ম-জনিত হইলে, ঐ লব্ধিত চর্ম্ম কঠিন ও কণ্ডূযুক্ত (চুলকণাবিশিষ্ট) হয় । বাতজ পরিবর্তিকা পাকিতেও পারে । বিষাক্ত মেহরোগে এই রোগ প্রকাশ পায়, তাহার চিকিৎসা ঐ রোগে কথিত হইয়াছে । ইহাকে চলিত কথায় মুদো বলা বাইতে পারে ।

চিকিৎসা । রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র দশমূল তৈল দ্বারা এক টুকরা কাপড় ভিজাইয়া তদ্বারা পুন্স বান্ধিয়া রাখিবে । নেকড়ার পোটলা আঙণে গরম করিয়া কিম্বা গরম জলে নেকড়া ভিজাইয়া তদ্বারা আঙণে আঙণে ব্যাধিত স্থানে স্বেদ দিবে, কিন্তু বিষাক্তমেহে পুন্সে অত্যন্ত প্রদাহ বর্তমান থাকে, সুতরাং ঐ অবস্থায় এইরূপ স্বেদ কদাপি প্রয়োগ করিবে না । শীতল জলের অথবা বায়ু পিত্তনাশক তৈল ভিজান নেকড়ার পটী ঐ অবস্থায় প্রয়োজ্য ।

এইরূপে ক্রমশঃ বেদনা ও ফুঁলা কমিয়া যায় এবং চর্ম্ম পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

অবপাটিকা । অনাৰ্জিকা বালিকার ক্ষুদ্র যোনিতে রমণের চেষ্টা করিলে কিম্বা হস্ত দ্বারা পুমঙ্গ মর্দন বা পীড়ন করিলে অথবা পুমঙ্গ তদনুরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইলে, পুমঙ্গের অগ্রভাগের বেঠনচর্ম্ম উন্টাইয়া গিয়া বিদীর্ণ হয়, এবং পুনর্বার পুমঙ্গ বৃদ্ধিত হয় না, এই রোগকে অবপাটিকা কহে ।

চিকিৎসা । পরিবর্তিকার ভায় এই রোগের চিকিৎসা করিবে । কৃত উৎপন্ন হইলে, রক্তচন্দন-যশা ঘৃতসহযোগে লাগাইবে বা গভীর কৃত হইলে নিম্নস্থত প্রয়োগ করিবে ।

নিরুদ্ধপ্রকাশ । অবপাটিকা যে সকল কারণে উৎপন্ন হয়, নিরুদ্ধ-প্রকাশও সেই সকল কারণে উৎপন্ন হয় । অবপাটিকা রোগে যদি বেঠনচর্ম্ম লিঙ্গের অগ্রভাগকে আচ্ছাদিত করে বা ঢাকিয়া ফেলে, তাহাকে নিরুদ্ধপ্রকাশ কহে । পুমঙ্গের এইরূপ বৃদ্ধিত অবস্থার চিকিৎসনাম নুদো । এই রোগে বেঠনচর্ম্ম একরূপ স্থিত হয় ও একরূপভাবে লিপাগ্রভাগকে আবৃত করিয়া ফেলে যে তজ্জন্ত রোগীর প্রস্রাব-পথ পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যায় ও তজ্জন্ত প্রস্রাব নির্গত হইতে পারে না বা অতি কষ্টে নির্গত হয়, পরন্তু মূত্র-নিঃসরণকালে, বেদনা ও বাতনায় রোগী অস্থির হয় । এই অবস্থা অতি শোচনীয় । গনোরিয়া বা বিবাক্ত-মেহে এইরূপ অবস্থা হয় ।

চিকিৎসা । গনোরিয়া রোগে গনোরিয়া জনিত নিরুদ্ধ প্রকাশের চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে । অত্যাশ্র কারণে নিরুদ্ধপ্রকাশ রোগ উৎপন্ন হইলে ও প্রস্রাববন্ধ হইলে, প্রস্রাব সরলরূপে নির্গত হওয়ার জন্ত ত্রিকলার-জল বা দধির মাত ছাকিয়া তদ্বারা পিচ্কারী দিবে এবং বাতনাশক মধ্যম-নারায়ণ প্রভৃতি তৈলে নেকড়া ভিজাইয়া তদ্বারা লিঙ্গনাল বেঠন করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে । পাকিবার আশঙ্কা ও দাহ থাকিলে, অবিলম্বে ব্রণ-শোথোক্ত চন্দনাদিক্রাথ সেচন বা চন্দনাদিলেপ প্রয়োগ করিবে ও পুনর্নবাষ্টক কাথ সেবন করিতে দিবে ।

সন্নিরুদ্ধ গুদ । মলের বেগ-ধারণ বশতঃ অপানবায়ু প্রকুপিত হইয়া

মলদ্বারকে অবরুদ্ধ বা সঙ্কুচিত করিলে, তাহাকে সন্নিরুদ্ধগুদ কহে । ইহা অতি কঠিন ব্যাধি, ঔষধ প্রয়োগে রোগ প্রশমিত না হইলে, অন্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা মল-নির্গমনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে হয়, নচেৎ মল রুদ্ধ হইয়া রোগী মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে পারে ।

চিকিৎসা । এই রোগে বাতনাশক মধ্যমনারায়ণ প্রভৃতি তৈল মলদ্বারে সেচন করিবে । ঐ তৈলের পিচ্কারী প্রয়োগ করিলেও প্রকৃতি অপানবায়ু প্রশমিত হয় এবং সঙ্কুচিত মলদ্বার পুনর্বার বিস্তৃত হয় ।

গুদভ্রংশ । অতিশয় কুহন ও অধিক মলভেদনশতঃ ক্রমশঃ ও দুর্বল-বৃত্তি ও হৃদনাড়ী স্থান হইতে বাহির হইয়া পড়িলে, তাহাকে গুদভ্রংশ কহে । চিহ্নিত কথায় ইহাকে হালিশ বা গোঁগোল বাহির হওয়া কহে ।

চিকিৎসা । সহসা হালিশ বহির্গত হইয়া পড়িলে ভীত হইবে না, অনেক ভীত হইয়া টেপাটিপি করে ও তজ্জন্ত উহা ক্ষত বিক্ষত হয় । হস্তের অঙ্গুলিতে ঘৃত বাণেশ্বর দ্বারা তাহাকে আন্তে আন্তে ঠেলিয়া অন্তর্নিবিষ্ট করিবে । অতীসার বা প্রবাহিকা (আমাশয়) রোগের প্রবৃত্তিবস্থায় একবার হালিশ অন্তর্নিবিষ্ট করিলেও পুনর্বার বাহির হইতে পারে, কারণ অতীসার ও আমাশয়ে গ্রহণীনাড়ীর সঙ্কোচন শক্তি হ্রাস পায়, সুতরাং নাড়ী শিথিল হইয়া পড়ে । ঐ অবস্থায় হালিশ অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া কাপড়ের কোপীন দ্বারা মলদ্বার চাপিয়া বান্ধিয়া রাখিবে । কিন্তু একপক্ষে চাপিয়া বান্ধিবে, যেন বেশী চাপ লাগিয়া রক্তের চলাচল বন্ধ না হয় । গরুর চর্কি দ্বারা লিপ্ত করিয়া আন্তে আন্তে ঠেলিয়া দিলে, অতি শীঘ্র হালিশ অন্তর্নিবিষ্ট হয় । প্রয়োজন হইলে ইন্দুরের মাংস সিদ্ধ করিয়া মলদ্বারে বেদ দেওয়া যায় এবং কচি পদ্মপাতা চিনি সহ বাটিয়া সেবন করান যায় । শূকরের চর্কির ও গরুর চর্কি সঙ্কোচন শক্তি অতি প্রবল ।

ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) । লোমকূপস্থিত পিত্ত বায়ুর সহিত মিলিত ও প্রকৃতি হইলে, মস্তকের কেশ উঠিয়া যায়, পরন্তু দুইরক্ত ও কফ রোমকূপ (লোমেরছিদ্র) সকলকে অবরুদ্ধ করে বলিয়া পুনর্বার কেশ উদ্গত হইতে পারে না । এই রোগের সংস্কৃত নাম ইন্দ্রলুপ্ত বা কুহা,—চলিতনাম টাক । এই রোগ সকলেরই স্বপরিচিত ।

চিকিৎসা । রোগ প্রকাশ পাইলে, ডুমুরপাতা দ্বারা ব্যাধিত-স্থান (টাক) বুসিয়া কুঁচের প্রলেপ দিবে। কুঁচ ছাঙ্গে বাটিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিতে হয়। রসাজন বাটিয়া তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে অথবা হাতীর দাঁত ভষ্ম করিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলে পুনর্বার কেশোলম্ব হয়। গোম্বুর, তিলপুশ, মধু ও ঘৃত বাটিয়া লেপ দিবে। কেশ উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করিলে, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, খুচীখুচী, তিল, গব্যদুগ্ধ, গব্যহৃৎ ও ভীমরাজ একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। ইহাতে কেশ গাঢ়, দৃঢ়মূল, আয়ত ও কুঞ্চিত হয়। যষ্টিমধু প্রভৃতি দ্রব্যগুলি অগ্রে ছাঙ্গে বাটিয়া পশ্চাৎ গাহার সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিবে।

দারুণক । বায়ু ও কফের প্রকোপে কেশভূমি কৃষ্ণ, কর্কশ ও কণ্ডু-বৃদ্ধ হইলে, তাহাকে দারুণক কহে। ইহা সকলেরই পরিচিত রোগ, চলিত কথায় ইহাকে ঝুঁকী, রুণী বা খুঁকী কহে। ইদানীং ধাতু-দৌর্বল্য ও রক্তহ্রাস হইতে প্রায়শঃ এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চিকিৎসা । নারিকেল তৈল এক পোয়া, ভীমরাজের রস এক পোয়া ও কুঁচফল-চূর্ণ এক ছটাক একত্র জাল দিবে এবং জল শুকাইয়া গেলে নামাইবে। এই তৈল মস্তকে মর্দন করিলে রোগ সারে।

পলিত । ক্রোধ, শোক ও শ্রমজনিত শরীরোত্তাপ ও পিত্ত কেশভূমিকে আশ্রয় করিয়া অকালে কেশ পাকায়, ইহাকে পলিত বা চুলপাকা কহে। ঐ সকল কারণ ব্যতীত আরও অনেক কারণে চুল পাকিতে পারে; ধাতুদৌর্বল্য ও রক্তহ্রাস প্রভৃতি নানা কারণে শরীর নিম্নোক্ত হইয়া পড়িলে অকালে চুল পাকে। পরন্তু ঐ সকল কারণেই যেন ইদানীং অকালপলিতের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া বোধ হয়। রক্তহ্রাস ও ধাতুদৌর্বল্য হইতে কেশ পাকিলে, সুবাসিততৈল মর্দনে কোনই উপকার হয় না, তবে স্নগন্ধিতৈল, তিল-তৈল বা নারিকেলতৈলে প্রস্তুত হয় বলিয়া মস্তক একটু ঠাণ্ডা রাখে, এই পর্য্যন্ত। ধাতু-দৌর্বল্য-জনিত হইলে ধাতুপোষক বৃহৎ ছাগলাগ্ন ঘৃত বা অমৃতপ্রাশ ঘৃত ও বৃহৎ চিন্তামণি বা ত্রৈলোক্য-চিন্তামণি প্রভৃতি সেবন করাইবে ও তৎসঙ্গে ধাতু-পোষক বলাতৈল বা পুষ্করাজ-প্রসারিণী তৈল মস্তকে মর্দনের ব্যবস্থা

করিবে। রক্তদোষ থাকিলে, রক্তশোধনের জন্য মশলার জল প্রয়োগ করিবে। কথা এই—মূলরোগ নষ্ট না হইলে, কেবল সুগন্ধিতৈল মর্দনে কোনই উপকার হয় না। চুল পাকার কারণ অম্লসন্ধান করিলেই দেখা যায়, হয় রক্ত-দোষ আছে, নয় ধাতুদৌর্বল্য আছে।

পদ্মিনীকণ্টক। ঘকের উপর কণ্টকের স্থায় মাংসানুর উদ্ভাগত হইলে, তাহাকে পদ্মকাটা কহে। ইহা সঙ্গজন পরিচিত ব্যাধি। জলপয়ের ডাটা পোড়াইয়া জলসহযোগে প্রলেপ দিবে অথবা কচি নিমপাতা ও সোঁদালপাতা বাটিয়া লেপন করিবে।

চুলী (চুলী)। গায়ে অন্ন বা বহু আয়তনবিশিষ্ট শুষ্কবর্ণ বা কচিৎ গ্রামবর্ণ মণ্ডল উৎপন্ন হইলে, তাহাকে চুলী বা ছোঁদ কহে। ইহাতে বেদনা থাকে না, কিন্তু দুগ্ধ বর্জমান থাকে—চুলকাইতে চুলকাইতে কিছু কিছু মরামাংস উঠে।

চিকিৎসা। যেতচন্দন ঘসা, হরিতাল, সোহাগার ঝৈ ও নিমের কচি পাতা সমভাগে বাটিয়া প্রলেপ দিবে। যদি ইহাতে আরোগ্য না হয়, তবে বট, অখণ্ড, পাকুড়, অন্নবেতস ও বজ্রমূর; এই পঞ্চবৃক্ষের ক্ষীর বা আঠা লাগাইবে। পাঁচটি একসঙ্গে না পাইলে, ২। ৩ টি বাহা পাওয়া যায়, তাহাদের ক্ষীর লাগাইবে।

দদ্রু। কুষ্ঠরোগে দদ্রু উল্লেখ করা গিয়াছে, কারণ দর্দ্র ক্ষুদ্রকুষ্ঠ-মধ্যে পরিগণিত। দদ্রু সামান্য রোগ নহে, অনেক সময়ে নানাপ্রকার ঔষধেও আরোগ্য হয় না; পরন্তু যথাসময়ে চিকিৎসা না করাইলে ক্রমশঃ সর্ক্ষাঙ্গ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, এই প্রকার দদ্রু সহজসাধ্য নহে। রক্তদোষ হইতে ক্রমশঃ ইহা উৎপন্ন হয়। এই অবস্থায় পক্ষনিষেধ সেবনের ব্যবস্থা করা উচিত। মালিশের অল্প বিশুদ্ধ গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত গজ্জনতৈল প্রয়োগ করিলেই চলে। দ্রিঙ্গ প্রভৃতি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দদ্রু প্রকাশ পাইলে এবং উক্ত মালিশের ঔষধে রোগ না সারিলে চাউলমুগরার তৈল ও বিশুদ্ধ গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মালিশ করিবে।

ঘামাচি। ঘামাচি, কণ্ডু বা চুলকনা উৎপাদন প্রেষার কার্য্য, গাত্রে-চন্দন ঘসা লেপন ও বিশুদ্ধ গন্ধক সেবন করিলে, মহোপকার দর্শে।

পাঁচড়া। বিশুদ্ধ গন্ধকচূর্ণ সরিষার তৈলে মিশ্রিত করিয়া লাগাইবে।

মসূরিকা-চিকিৎসা ।

(বসন্ত, পানিবসন্ত ও হাম অর্থাৎ স্মলপক্স, চিকেনপক্স ও
মিজ্‌ল্‌স্‌ ।)

বাতিক মসূরিকার লক্ষণ । বাতিক বসন্তের পিড়কা বা গুটীসকল
গ্রাম বা রক্তবর্ণ, ক্লক (চাক্‌চিক্যবিহীন), তীব্র বেদনায়ুক্ত ও কঠিন এবং
বিলম্বে পাকে । এই রোগে রোগীর সন্ধি ও অস্থি-সমূহে ভগ্নবৎ বেদনা, কাস,
কম্প, অস্থিরতা, ক্লান্তি, তালু, ওষ্ঠ ও জিহ্বার শুষ্কতা, তৃষ্ণা ও অরুচি প্রভৃতি
বায়ুপ্রধান উপসর্গ প্রকাশ পায় ।

পৈতিক মসূরিকার লক্ষণ । পৈতিক বসন্তের পিড়কা বা গুটী-
সকল রক্ত বা পীতবর্ণ, অত্যন্ত দাহ ও তীব্রবেদনায়ুক্ত হয় এবং শীঘ্র পাকে ।
এইরোগে রোগীর পাতলা দাঁড়, পাত্রে দাহ, পিপাসা, মুখ-পাক, চক্ষু রক্তবর্ণ
এবং তীব্রজ্বর প্রভৃতি পিত্তপ্রধান উপসর্গ সকল প্রকাশ পায় ।

শৈথিলিক মসূরিকার লক্ষণ । শৈথিলিক বসন্তের গুটী সকল খেত বা
পাণ্ডুবর্ণ, ম্লক (চাক্‌চিক্যযুক্ত), অতি রুহৎ, চতুর্দিকে ঝামাচির আয় ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র দুলুড়ি দ্বারা পরিবৃত্ত ও অল্প বেদনায়ুক্ত হয় । ইহা অধিক বিলম্বে
পাকে । এই রোগে রোগীর মুখ বা নাক হইতে ককশ্রাব, শরীরের শুষ্কতা,
আদ্রতা (শরীর ভিজ্‌জা ভিজ্‌জা বোধ হওয়া), মস্তকে বেদনা, বমনেচ্ছা, অরুচি,
মিট্রা, তন্দ্রা ও আলস্য এই সকল শৈথিলিক উপসর্গ প্রকাশ পায় ।

রক্তজ মসূরিকার লক্ষণ । রক্তজ বসন্তের গুটী সকলের লক্ষণ ও
রোগের উপসর্গ পৈতিক বসন্তের আয় এবং জ্বর পৈতিক জ্বরের লক্ষণসদৃশ,
কিছুমান বিভিন্নতা নাই ।

সান্নিপাতিক মসূরিকার লক্ষণ । সান্নিপাতিক বসন্তের গুটীসকল
চিড়ার মত চেপ্টা ও বিস্তৃত এবং ঐ গুটীর মধ্যস্থান নিম্ন হইয়া থাকে ; পরন্তু
ঐ গুটীগুলি নীলবর্ণ ও অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত এবং অতি বিলম্বে বা দীর্ঘকালে
পাকে ও তাহা হইতে দুর্গন্ধ পূর্ণ নির্গত হইয়া থাকে । এইরোগে সান্নিপাত
জ্বরের আয় নানা উপদ্রবযুক্ত জ্বর হইয়া থাকে । সান্নিপাতিক জ্বরে যেমন
স্নেহ দাহ, স্নেহ শীত প্রকাশ পায়, তদ্রূপ সান্নিপাতিক রোগনাত্রেই বায়ু, পিত্ত

ও কফ এই দোষত্রয় প্রকুপিত হয় বলিয়া যখন বে দোষ প্রবল হয়, তখন সেই দোষের প্রকোপলক্ষণ প্রকাশ পায়। বসন্তরোগও সন্নিপাতজ হইলে, নানাবিধ উপসর্গ প্রকাশ পায়, আবার তৎসঙ্গে বসন্তের গুণীসকলও নানাবর্ণযুক্ত হইয়া থাকে, কখনও বা প্রবালের ঞায় লাল কখনও বা জামফলের ঞায় কালো, কখনও লৌহজালের ঞায় বর্ণযুক্ত এবং কখনও বা তমাল ফলের ঞায় বর্ণবিশিষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত বসন্তের অসাধ্য লক্ষণে যতগুলি উপসর্গ বর্ণিত হইবে, তাহার প্রায় সমস্ত উপসর্গই সন্নিপাতজ বসন্তে উপস্থিত হয়, সুতরাং সান্নিপাতিক বসন্ত অসাধ্য।

ত্বক্গতা বা চর্মজা মসূরিকার লক্ষণ। চন্দনামক এক প্রকার মহুরিকা আছে, তাহাতে রোগীর কণ্ঠরোধ, অরুচি, তন্দ্রা, প্রলাপ ও অস্থিরতা বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পায়। এই রোগ অতি কষ্টসাধ্য।

রোমান্ধীর লক্ষণ। শরীর রোমান্ধিত হইলে, লোমকূপ সকল ধেরূপ উন্নত হয়, সেই প্রকার উচ্চ ও রক্তবর্ণযুক্ত পিড়কা সর্বদা জন্মিলে, তাহাকে রোমান্ধী অর্থাৎ হাম কহে। কফ ও পিত্ত দূষিত হইলে, এই রোগ উৎপন্ন হয়। জ্বর, কাস, অরুচি এই রোগের প্রধান লক্ষণ বা উপসর্গ। তদ্ব্যতীত কফ ও পিত্ত দ্বিটির অচ্যাত্ত লক্ষণ অর্থাৎ দাহ, গা-ব্যথা প্রভৃতিও এই রোগে প্রকাশ পায়।

রসগত মসূরিকার লক্ষণ। রসগত বসন্তকে চাণিত কথায় পানি-বসন্ত বা জলবসন্ত কহে। এই রোগে জলধুধুদের ঞায় আকৃতি ও বর্ণবিশিষ্ট গুণী উৎপন্ন হয় এবং তাহা বিদীর্ণ হইলে, জলস্রাব হয়। গুটিকাগুলি রস বা জলপূর্ণ হয় বলিয়া, ইহাকে পানি বা জলবসন্ত কহে। ইহাতে দোষের প্রকোপ অতি অল্পই প্রকাশ পায়।

রক্তগত মসূরিকার লক্ষণ। রক্তগত বসন্তে গুণীসকল রক্তকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, সুতরাং গুণী সকল রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয় ও শীঘ্র পাকে, গুণীর চর্ম অতি স্থল বা পাতলা এবং বিদীর্ণ হইলে, তাহা হইতে রক্তস্রাব হয়। ইহা সুসাধ্য।

মাংসগত মসূরিকার লক্ষণ। মাংসগত বসন্তের গুণী সকল কঠিন ও

নিম্ন অর্ধাং চক্চকে হয়, বিলম্বে পাকে এবং গুটীর চর্ম স্থূল হয়। এই রোগে রোগীর গাত্র-বেদনা, কণ্ঠ, জ্বর ও তৃষ্ণা হয়। এই রোগ কষ্টসাধ্য।

মেদোগত মসূরিকার লক্ষণ। বসন্ত মেদ-ধাতুকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইলে, গুটীসকল গোলাকার, কোমল, অল্প উচ্চ, স্থূল ও বেদনা-বিশিষ্ট হয় এবং রোগীর প্রবল জ্বর, অস্থিরতা, মোহ ও গাত্র-সন্তাপ উপস্থিত হয়। ইহাও অসাধ্য, কেহ কেহ এই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করে।

অস্থি ও মজ্জাগত মসূরিকার লক্ষণ। বসন্ত অস্থি ও মজ্জা আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইলে, গুটীসকল ক্ষুদ্র, গাত্রসমবর্ণবিশিষ্ট, রক্ষ ও দেখিতে কিয়দংশে চিড়ার মত আকৃতিবিশিষ্ট হয়। পরন্তু এই রোগে রোগীর মোহ, অস্থিরতা ও মর্শ-স্থান সকল ছিন্নবৎ এবং অস্থিসকল ভ্রমর কর্তৃক বিদ্ধবৎ প্রতীয়মান হয়। ইহাতে রোগীর জীবন শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শুক্রগত মসূরিকার লক্ষণ। বসন্ত শুক্র ধাতুকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইলে, গুটীসকল নিম্ন (চাক্চিক্যশালী), অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত ও পৃথ-পূর্ণ পক পিড়িকার আয় খেতবর্ণ দৃষ্ট হয়। এই রোগে রোগীর শরীর আর্দ্র (ভিজা ভিজা), মোহ, গাত্র-দাহ, অস্থিরতা ও ক্ষিপ্ততা উপস্থিত হয় এবং রোগী অচিরে মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়া থাকে।

মসূরিকার স্নেহসাধ্য লক্ষণ। রসগত (পানিবসন্ত), রক্তগত পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক ও পিত্তশ্লেষ্মিক বসন্ত স্নেহ-সাধ্য।

মসূরিকার কষ্টসাধ্য লক্ষণ। বাতিক, বাতপৈত্তিক ও বাতশ্লেষ্মিক-বসন্ত কষ্টসাধ্য।

মসূরিকার অসাধ্য লক্ষণ। সান্নিপাতিক বসন্তে গুটীসকলের বর্ণ প্রবাল, তমাল-কল, জাম ও লৌহের আয় হইলে তাহা অসাধ্য। এতদ্ব্যতীত বসন্তরোগীর কাস, হিষ্কা, মোহ, প্রবল জ্বর, অত্যধিক প্রলাপ, অস্থিরতা, মুচ্ছা, তৃষ্ণা, গাত্র-দাহ, দেহ বা মস্তকবর্ণন, চক্ষু ও মূত্র নাক হইতে রক্ত-প্রাব, কণ্ঠে ঘর্ ঘর্ শব্দ ও বেদনার সহিত শ্বাস-ত্যাগ এই সকল উপসর্গ থাকিলে, রোগ অসাধ্য। সান্নিপাতিক বসন্তে প্রায়শঃ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বসন্তরোগের বিস্তৃত বিবরণ ।

সংস্কৃতে বাহাকে মসুরী বা মসুরিকারোগ কহে, চলিত কণ্ঠ্য তাহাকে বসন্তরোগ বলা যায় । বসন্ত এক প্রকার বিশিষ্ট বীজ জনিত দেশব্যাপী সংক্রামক ব্যাধি । কি প্রকারে ঐ বীজ সৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়া বসন্ত উৎপাদন করে এবং সেই বীজ আবার কি প্রকারেই বা একদেহ হইতে অন্তদেহে প্রবেশ করে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে ;—

বসন্তবীজের সৃষ্টি ও পুষ্টি । নানাকারণে বসন্তবীজের সৃষ্টি হয় । কটু ও অম্লরসবিশিষ্ট দ্রব্য, ক্ষার দ্রব্য ও বিরুদ্ধ ভোজন, আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্বার ভোজন, দূষিত শিম ও শাক ভক্ষণ, দূষিত জল পান ও দূষিত বায়ু-সেবন এই সকল কারণে দোষ প্রকুপিত ও দূষিত রক্তের সহিত মিলিত হইয়া শরীরে মসুরের (মসুর কলাইয়ের) আকৃতি ও পরিমাণবিশিষ্ট যে পিড়কা উৎপাদন করে, তাহাকে মসুরী বা বসন্ত কহে । বসন্তরোগোৎপত্তির যে সকল পান ভোজনাদি কারণ উক্ত হইল, ঐ সকল কারণের সহায়তায় প্রথমতঃ পিত্ত প্রকুপিত হয়, অনন্তর, ঐ দুষ্ট পিও রক্তের সহিত মিলিত হইয়া রক্তকে দূষিত করে, পরে সেই দুষ্ট রক্ত ও পিত্ত তকে উপস্থিত হইয়া গুটি উৎপাদন করে । এই সকল গুটির মধ্যে কোনটির আকার মসুরের ত্রায়, কোনটির আকার মৃগের ত্রায় এবং কোনটির আকার মাষকলায়ের ত্রায়, এইরূপে শরীরাত্ত্বত্বের বীজ সৃষ্ট ও পুষ্ট হইলেও গুটি উৎপাদন-কার্য্য সম্বন্ধ-সাপেক্ষ, এইজন্য রোগ কয়েকদিন পর্য্যন্ত গুণ্ডাবস্থায় থাকে এবং কোন শরীরে বীজাধান করিলেও অর্থাৎ টীকা দিলেও দুই এক দিনেই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় না । অনন্তর ক্রমশঃ রোগের পূর্ব লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন মাথা ধরে, মাথা ও শরীর ভার বোধ হয়, চক্ষু ছল ছল ও মুখ রসে টল টল করিতে থাকে, ক্ষুধা কমিয়া যায় বা একেবারেই থাকে-না, স্নাতরাং ধাইতে ইচ্ছা হয় না, কিছুই ভাল লাগে না, কিছুতেই শান্তি পাওয়া যায় না—সর্বদা অশান্তিবোধ হইতে থাকে, স্নানিত্রা হয় না, শরীর অত্যন্ত দুর্বলবোধ হয়, নানাপ্রকার বিভীষিকাপূর্ণ স্বপ্ন দর্শন হয়, শরীরের বর্ণ-বিপর্য্যয় ঘটে, চক্ষু, মুখ ও সর্বাঙ্গ জ্বলন্ত লোহিত বর্ণ দৃষ্ট হয়, রোগের

প্রবল আক্রমণের পূর্বে প্রায়শঃ ত্বক্ অত্যন্ত লাল ও ক্ষীত হয় এবং এই সকল উপসর্গের সঙ্গে সঙ্গে জ্বর ও জ্বরাক্রমণে কম্প প্রকাশ পাইয়া থাকে । জ্বর সর্বত্রই প্রবল হয় না, দোষ প্রকোপের ন্যূনাধিক্য অনুসারে জ্বরের বেগও অল্পাধিক হয় । এই রোগে শিশু ও বালকদিগের আক্ষেপ প্রকাশ পায়, কাহারও কাহারও গলায় বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে । বসন্তের এই সকল পূর্বলক্ষণ প্রায়শঃ দুই দিন পর্য্যন্ত বর্তমান থাকে ও তৃতীয় দিবসে গুটী বহির্গত হয়, কদাচিৎ এই নিয়মের ব্যতিক্রমও হইতে দেখা যায়; চতুর্থ, পঞ্চম ষষ্ঠ, সপ্তম বা অষ্টম দিবসেও গুটী বাহির হইয়া থাকে । বীজে বসন্তের তীব্র প্রভাব বর্তমান থাকিলে গুটীও সম্বর এবং অধিক সংখ্যক উদ্গত হয় । প্রথমে কপালে ও হস্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল দাগ দেখা দেয়, অনন্তর ক্রমশঃ সেগুলি দলে দলে উৎপন্ন হইয়া সমস্ত অঙ্গ আৱৃত করিয়া ফেলে । সচরাচর ঐ সকল গুটিকা সংখ্যা ১০০ হইতে ৩০০ শত, কিন্তু সময় সময় সহস্রপর্য্যন্ত হইতে দেখা যায় । মুখমণ্ডল, মস্তক এবং কণ্ঠদেশে গুটী অধিক সংখ্যায় উদ্গত হয় । এইপ্রকার বসন্তকে দোষজ বলা যাইতে পারে ।

গুটিকার সংখ্যা তিন শতেরও অধিক হইলে, রোগীর অবস্থা প্রায়ই সাংঘাতিক হইয়া উঠে, ঐ অবস্থায় জ্বরের বেগ প্রায়ই অত্যন্ত প্রবল হয়, সর্সদা বমনোদ্বেষ, গাভ বেদনা, প্রলাপ, মুচ্ছা ও অস্থিরতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়, এমন কি সময় সময় সংজ্ঞা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া থাকে ; কিন্তু অল্প সংখ্যক গুটী বহির্গত হইলে, জ্বর অথবা অন্ত্যন্ত উপসর্গের তাদৃশ প্রবলতা দৃষ্ট হয় না এবং রোগীও অনায়াসে মুক্তিলাভ করে । কোন কোন রোগীর মুখগহ্বরে বা কণ্ঠনলীতে গুটী উদ্গত হয় ও তজ্জন্ত সর্সদা শ্লেষ্মসংযুক্ত থুথু নির্গত হইতে থাকে, পরন্তু গলাধঃকরণেও অত্যন্ত কষ্টবোধ হয়, আহার গ্রহণে ও কথা কহিতে পর্য্যন্ত নিতান্ত অসমর্থ হইয়া পড়ে । নাক, মুখ ও চক্ষুতে ফুলা প্রকাশ পায়, চক্ষু অত্যন্ত কোমল বলিয়া অন্ধিপন্নব ক্ষীত হয় ও ঝুলিয়া পড়ে । শ্বাস-বহা নলীতে হইলে, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্টবোধ হয় এবং শ্বাস, কাস ও স্বর-ভঙ্গ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে । গুটী বহির্গত হইবার দুই এক দিন পরেই গুটীগুলির প্রায় অধিকাংশ পূর্ণাবয়ব-প্রাপ্ত ও অগ্রভাগ অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণভাবাপন্ন হইয়া উঠে ; তখন উহার উপরে

অস্থূল চালনা করিলে, সর্বপের মত ক্ষুদ্র একটি গুটার ঝায় অস্থূত হয় ; কিন্তু গুটী পাকিতে আরম্ভ করিলে, ঐ কঠিন মধ্যভাগ নিম্ন হইয়া পড়ে । তিন দিবসের পরই পুষ স্ফার হয় এবং পুষ স্ফার হইলেই ঐরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । প্রায়শঃ আট নয় দিনের মধ্যে গুটিকা পরিপক হয়, কদাচিত্ তদপেক্ষা বেশী সময়ও লাগে । পক হইলে, গুটীকা কখনও কখনও স্বয়ং বা আপনা আপনি বিদীর্ণ হয়, আবার কখনও বা গুটিকা কণ্টকাদির সাহায্যে বিচ্ছ করিয়া পুষাদি নিঃসারণ করিতে হয় । পুষাদি নিঃসরণের পর ত্রণ-স্থান মামড়ী দ্বারা আবৃত হয় এবং মামড়ী উঠিয়া গেলে ক্ষতস্থান লোহিত-বর্ণ ধারণ করে । গুটিকা বিদীর্ণ না হইয়া সময় সময় আপনা আপনি গুরু হইয়া যায় ।

বসন্তবীজের সংক্রমণ । উক্ত নানাকারেণে প্রথমে বসন্তবীজের সৃষ্টি ও গুপ্তি হয়, তৎপর ক্রমশঃ তাহা এক দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রমণ করে । সস্তের বীজ বসন্তরোগীয় গুটিকা ও শোণিত মধ্যে অবস্থিতি করে এবং তাহার সাত্ত সংস্পর্শ, নিঃশ্বাস গ্রহণ, তাহার শব্দ্যয় শ্রবণ, আসনে উপবেশন-কিন্তু রোগীর বাবদন্ত বস্ত্রাদি ব্যবহার, এই সকল কারণে বীজ এক দেহ হইতে অন্য দেহে প্রবেশ করে । এইরূপে বীজ ক্রমশঃ দেশব্যাপী হইয়া পড়ে । এই বসন্তকে আগন্তুক বসন্ত বলা যায় ।

রোগ-প্রবণতা । বাহাদের কখনও বসন্তরোগ উৎপন্ন হয় নাই, তাহাদের শরীর স্বভাবতঃ বসন্ত-রোগপ্রবণ, কিন্তু একবার ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া আরোগ্যলাভ করিলে, রোগপ্রবণতা বিনষ্ট হয় ও তাহাকে প্রায়শঃ দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হইতে দেখা যায়না, বা কদাচিত্ দৃষ্ট হইলেও দ্বিতীয় আক্রমণে জীবন নষ্ট হয় না ; একারণে রোগ প্রবণতা বিনষ্ট করিবার জন্য চীকা দেওয়ার প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে । একবার রোগাক্রান্ত হইয়া আরোগ-লাভ করিলে তো কথাই নাই, কিন্তু চীকা দ্বারাও রোগ-প্রবণতার আশঙ্কা অনেকাংশে দূরীভূত ও বসন্তের আক্রমণ ব্যর্থ হইতে পারে । চীকা দুই প্রকার, বাঙ্গালা ও ইংরাজী চীকা । বাঙ্গালা চীকা রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে যেরূপ সমর্থ, ইংরাজী চীকা তদ্রূপ নহে, তবে দুই তিন বৎসর অন্তর একবার

করিয়া টীকা লইলে এবং উপস্থাপিত অস্ত্রতঃ দুই তিনবার টীকা গ্রহণ করিলে
কিয়ৎ পরিমাণে উদ্বেগ-সিক্ত হইতে পারে ।

রোগের প্রকার ভেদ । বসন্ত রোগ পাঁচ প্রকার । বাতজ, পিত্তজ,
শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ ও রক্তজ । পূর্বরূপের পরই রোগের রূপ বা লক্ষণ প্রকাশ
পায়, তখন লক্ষণ দৃষ্টে বাতপিত্তাদি কোন দোষের প্রকোপে রোগটি উৎপন্ন
হইয়াছে এবং প্রকৃপিত বাতাদি দোষ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা
ও শুক্র এই সপ্তধাতুর কোন ধাতুকে আশ্রয় করিয়াছে কি না, তাহা স্থির
করিতে হয় । সপ্ত ধাতুর মধ্যে কোন একটীকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন
হইলে, তাহাদিগকে রসজ, রক্তজ, মাংসজ, মেদোগত, অস্থিজ, মজ্জাগত ও
শুক্রগত বসন্ত কহে । বসন্তরোগ দোষজই হউক বা ধাতুগতই হউক রোগোৎ-
পাদকদোষের প্রকোপ-লক্ষণ অবশ্যই প্রকাশ পায়, কিন্তু দোষ যদি রসাদি
ধাতুকে আশ্রয় করিয়া রোগ উৎপাদন করে, তাহা হইলে, অতিরিক্ত আরও
কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায় অর্থাৎ বায়ু প্রকৃপিত হইয়া রক্তধাতুকে আশ্রয়
করিয়া বসন্ত উৎপাদন করিলে, বাতিক বসন্তের লক্ষণও প্রকাশ পায়, অধি-
কন্ত রক্তজ বসন্তের লক্ষণও প্রকাশ পায় । এই প্রকার যে কোন দোষ যে-
কোন ধাতুকে আশ্রয় করিলে, দোষ ও ধাতু উভয়ের মিলিত লক্ষণ প্রকাশ
পাইয়া থাকে ।

বিশিষ্ট লক্ষণ । বাতিক বসন্তে গুটী পৃথক্ পৃথক্ বা এক সঙ্গে দুই
তিনটি নানা আকারে উদ্ভূত হয়, বায়ুর বৈশম্যহেতু আকার বা বর্ণ কিছুই
স্থিরতা থাকে না । গুটিকা স্পর্শ করিলে ক্ষয় কঠিন ও দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, অস্থি ও
সন্ধিস্থানে বাতজন্ত বেদনা ও বাতিক জরের অগ্নাজ লক্ষণ প্রকাশ পায় । পৈত্তিক-
বসন্তে গুটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়া উঠে, এক সঙ্গে ২০টি ঝড়াইয়া উঠে না, গুটীর
আকৃতি গোলাকার বা অণ্ডাকার, বর্ণ লাল বা ক্ষয় পীতভ, গুটীতে অত্যন্ত
জালা ও তীব্র বেদনা অনুভূত হয় এবং গুটী শীঘ্র পাকিয়া উঠে । এতদ্ব্যতীত
গাত্রদাহ, পিপাসা, অস্থিরতা ও মলভেদ প্রভৃতি নানা উপসর্গ দেখা দেয় ।
শ্লেষ্মিক বসন্তে গুটীগুলি খেতবর্ণ, বৃহৎ ও কোমল হয় । রক্তজ বসন্তের লক্ষণ
পৈত্তিক বসন্তের সমতুল্য । সন্নিপাতিক বসন্তের গুটীসকল নানাবর্ণের ও

নানা আকারে হইয়া থাকে এবং ঐ অবস্থায় মারাত্মক লক্ষণ ও নানা উপদ্রব প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ও ঔষধ প্রয়োগ সম্বন্ধে বক্তব্য । বসন্তরোগের চিকিৎসাসম্বন্ধে মত-ভেদ দৃষ্ট হয়, তজ্জন্ত উহার চিকিৎসা লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে কয়েকটি কথা বলা নিতান্ত আবশ্যিক । আয়ুর্বেদবিশারদগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, চিকিৎসাদ্বারা বসন্তরোগ প্রশমিত হয় না, সুতরাং ঐ রোগের চিকিৎসা নিষ্ফল । আবার কেহ কেহ বলেন, রোগের চিকিৎসা যথারীতি করা উচিত । এইরূপ ঔষধ প্রয়োগ সম্বন্ধেও মতবৈধ দৃষ্ট হয়,—কেহ কেহ বলেন, বসন্তরোগে ঔষধ প্রয়োগদ্বারা রোগের কিছুমাত্র প্রতীকার হয় না, আবার কেহ কেহ বলেন, ঔষধ প্রয়োগ অবশ্য কর্তব্য, ঔষধের ফল অবশ্যই ফলে এবং রোগেরও প্রতীকার হয় । এক্ষণে প্রশ্ন এই—কোন পক্ষের সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা উচিত ? আমরা অবশ্য চিকিৎসা ও ঔষধ-প্রয়োগেরই পক্ষপাতী, কারণ মানব কর্ম করিতেই জগতে প্রেরিত হইয়াছে, কর্মব্যতীত সে কখনও নিশ্চিন্ত বা উদাসীন থাকিতে পারে না । কোন কোন কার্যে মানবের কতটুকু শক্তি আছে, বিচারবুদ্ধি বা তৎদ্বারা তাহার সুখীমাংসা হওয়া সম্ভবপর নহে, কারণ একদিকে কার্যাবিশেষে মানবের অসাধারণ শক্তি প্রকাশ পায়, আবার অপরদিকে কার্যাবিশেষে তাহার শক্তি অতি তুচ্ছ নগণ্য বলিয়া মনে হয়,—ইলেকট্রিক ট্রামওয়ে, কলের গান ও বিনা তারে টেলিগ্রাফের কথা মনে হইলে, মানুষের অসাধ্য কোন কর্মই জগতে নাই, এমনই মনে হয় ; কিন্তু আবার যখন দেখা যায়, অতি তুচ্ছ একটা সাধারণ কার্য মানুষ করিতে পারে না ;—একগাছা পাকাচুল কালো করিতে সক্ষম হয় না, তখনই মনে হয়, সৃষ্টিকর্তা ভগবান্ অল্পগ্রহ করিয়া যে বিষয়ে যাহাকে যতটুকু শক্তি দান করিয়াছেন, তদতিরিক্ত কার্য করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই । আর একটা কথা এই—চিকিৎসক আয়ুঃ প্রদান করিতে সক্ষম নহেন, কিন্তু রোগ-প্রশমন করিতে সক্ষম ; সুতরাং মৃত্যুজাপক অরিষ্টলক্ষণ প্রকাশ, পাইলেও অন্ততঃ রোগীর রোগ-বিস্তার লাঘবের জন্তও ঔষধ প্রয়োগ কর্তব্য । এই সকল আলোচনা করিলে, স্পষ্টই বুঝা যায় যে কোন রোগই হউক এবং রোগীর যতদূর সঙ্গতাপন্ন অবস্থাই হউক, চিকিৎসার ফলাফল

ভগবানের প্রতি সমর্পণ করিয়া চিকিৎসা কার্যে প্রবৃত্ত হওয়াই একান্ত কর্তব্য ।
এরোগ সারেনা বা এরোগী বাঁচিবে না, এসকল কাণের কথা নহে ।

বসন্ত-চিকিৎসা-বিধি ।

বসন্তরোগে গুটী উদ্গত হইবার পূর্বে প্রায়শঃ জ্বর প্রকাশ পায়, কিন্তু কেবলমাত্র জ্বর বা পূর্ব লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই তদ্বারা রোগ নির্দ্ধারণ করা যায় না, অন্ততঃ গুটিকার সন্ধান না হইলে, বসন্তরোগ জন্মিবে, এরূপ কল্পনাও করা যায় না, তবে গ্রাম, নগর বা জনপদে বসন্তের প্রাদুর্ভাব থাকিলে যদি জ্বর হয়, তাহা হইলে, জ্বরেরও রোগ জন্মিতে পারে, আত্ম-মানিক এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে এবং তাহাই প্রকৃষ্ট পন্থা । কেহ কেহ বলেন,—সন্দেহস্থলে কোন ঔষধই প্রয়োগ করা উচিত নহে, বসন্তরোগ জন্মিবে কি অন্তরোগ জন্মিবে, তাহারই যখন নিশ্চয়তা নাই, তখন অগ্রেই বসন্তরোগের ঔষধ প্রয়োগ করিবার আবশ্যকতা কি ? আবার অনেকে বলেন, বসন্ত উঠিবে কি না, তাহা দুই চারি দিন না দেখিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে, কিন্তু রোগ নির্দ্ধারণ না হইলেও, এরূপ চিকিৎসাপদ্ধতি অবলম্বন করা যাইতে পারে, যাহাতে বসন্ত উঠিলেও উপকার হইবে এবং না-উঠিলেও কোন অপকার হইবে না, অধিকন্তু তদ্বারা রোগীর জ্বর আরোগ্যের সাহায্য হইবে । বসন্তরোগের কোন অবস্থায়ই তাঁর বিখ্যাত অথবা শোষণ-গুণবিশিষ্ট কোনও ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে । তবে রোগীর বিকার উপস্থিত হইলে, মৃগনাতি বা তৎসংযুক্ত ঔষধ অবশ্যই ব্যবস্থা করা যায় । অনেকে মনে করেন, মৃগনাতি বায়ুবর্ধক, এজ্ঞ বসন্তবিকারে ব্যবস্থা করা উচিত নহে, কিন্তু একথা সত্য নহে, মৃগনাতি বায়ু নাশক, একটু শোষণগুণবিশিষ্ট বা উষ্ণ বীৰ্য্য হইলেও বায়ু বা পিত্তবর্ধক নহে, বরং তিক্ত বলিয়া পিত্ত-নাশক এবং উষ্ণবীৰ্য্য বলিয়া শ্লেষ্ম-নাশক । ঐজ্ঞই বাত-শ্লেষ্মজনিত-বিকারে বা সন্নিপাত বিকারে, বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা তিন দোষেরই প্রকোপ-বৈখম্যকে বিদূরিত করিয়া শমতা উৎপাদন করে । মৃগনাতির গুণ এস্থলে উদ্ধৃত হইল,—কস্তুরী—কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট, ক্ষারযুক্ত, উষ্ণবীৰ্য্য, ওজুবর্ধক ও গুরুপাক । ইহা কফ, বায়ু, বিষদোষ, বমি, শীত, দুর্গন্ধ, শোণরোগ,

আক্ষেপ ও হিকা নিবারক, পরস্ব ঘর্মকারক, মূত্রকারক, কামোদীপক, বল-
কারক ও কিঞ্চিৎ মাদকগুণবিশিষ্ট ।

বসন্তের পূর্বরূপকে প্রথমাবস্থা, গুটিকা উদগত হইলে, দ্বিতীয় অবস্থা,
গুটিকার পচ্যমান অবস্থাকে তৃতীয় অবস্থা ও পক্যাবস্থাকে চতুর্থ অবস্থা বলা
যাইতে পারে ।

প্রথমাবস্থা । জ্বর বা সন্দির ভাব দেখা দিলেই স্বল্প লক্ষ্মীবিলাস বা
কফ-চিহ্নামণি প্রয়োগ করিবে অথবা জ্বর প্রবল এবং প্রলাপ প্রভৃতি উপসর্গ
 থাকিলে, কস্তুরীভূষণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে । এই সকল ঔষধ সাধারণ
 ঔষধের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও সর্বদা ব্যবহার্য্য, প্রায়শঃ প্রস্তুত থাকে, স্মৃতরাং সংগ্রহ
 করিতে কষ্ট হয় না । এতদ্ব্যতীত কেবল স্বর্ণসিন্দুর বা উৎকৃষ্ট রসসিন্দুর
 প্রয়োগ করিলেও চলে । অবস্থা-ভেদে এই সকল ঔষধের অল্পপান কল্পনা করিয়া
 লইবে । তুলসীপাতাররস বা পানের রস সাধারণ অল্পপান, তবে অত্যন্ত গা-
 ব্যাধা প্রভৃতি শ্লেষ্মার প্রকোপ-জনিত কোন উপসর্গ থাকিলে, আদা, বেলপাতা
 ও ওকড়ার রসের সহিত প্রয়োগ করা যায় । দিবারাত্রির মধ্যে তিন চারিবার
 প্রয়োগ করিতে হয় ; শ্লেষ্মার প্রবল প্রকোপ না থাকিলে অর্দ্ধমাাত্রায় দিলেও
 চলে । ঐসকল ঔষধের অন্তর্গত সিদ্ধিবীজ ও ধতুরাবীজ একরূপভাবে দুকে
 সিদ্ধ করা উচিত, যেন টিপিলে গলিয়া যায় । যাবৎ গুটিকার স্মৃচনা না হয়,
 তাবৎ এই নিয়মে ঔষধ সেবন করাইবে ও অবস্থা-ভেদে জল সাগু, খৈরমণ্ড,
 মুগ বা বুটের ঘুষ ও মিষ্টী প্রভৃতি লব্ধ পথ্য দিবে ।

দ্বিতীয়াবস্থা । বসন্তের গুটীর স্মৃচনা হইলে বা কপালে ও হাতে ক্ষুদ্র-
 ক্ষুদ্র লাল দাগ দেখা দিলে, অবিলম্বে ঔষধের পরিবর্তন করা উচিত । তখন
 ঐসকল ঔষধ বন্ধ করিয়া সর্বাগ্রে বমন ও তৎপরে বিরেচন প্রয়োগ করিবে ।
 বমন বিরেচনদ্বারা দেহ বিস্কদ্ধ হয়, স্মৃতরাং রোগের প্রবল আক্রমণের
 আশঙ্কা থাকে না, স্ফোটকের সংখ্যা হ্রাস পায়, যে গুটীগুলি উঠে, তাহাতে
 বেদনা ও পৃথ অল্প হয়, জ্বরবিকারে পরিণত হয় না বা হইলেও প্রায়শঃ
 মারাত্মক হয় না । বমনের জন্ত ১১৬ পৃষ্ঠায় লিখিত ৩নং বমনযোগ ব্যবস্থা
 করিবে কিম্বা নিমছাল ও পলুতার কাথে মদনফলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান
 করাইবে । বমনের জন্ত ময়নাফল অতি উৎকৃষ্ট, ইহা দ্বারা বমন করাইলে,

অজ্ঞাত বমনকারক দ্রব্যের জ্বার রোগীর দুর্বলতা, আমাশয়ের উত্তেজনা বা উগ্রতা প্রকাশ পায় না এবং মুখ বিরস বা বিষাদ হয় না। বমন-কার্যে মদন-ফলের জ্বার উপকারী ঔষধ নাই বলিলেও অভ্যুক্তি হয় না, তজ্জন্ত এই গ্রাহে বমনার্থ বমন-যোগের মধ্যে মদনফল সংযুক্ত করা হইয়াছে ; ইহার চূর্ণও প্রয়োগ করা যায় এবং উহা পেষণ করিয়াও প্রয়োগ করা যায় ; বমনের জন্ত যে কাথ প্রস্তুত করা যায়, তাহার প্রণালী স্বতন্ত্র, কিন্তু এক্ষণে তাহা অপ্রচলিত। সাধারণনিয়মে কাথ প্রস্তুত করিয়া তৎসহ এক্ষণে প্রয়োগ করা হয়। একজন্ত বিসর্পরোগে ঐ প্রণালীই অবলম্বিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কেহ কেহ হিষ্কাশাকের রস ও মধু কিম্বা করলা অথবা উচ্ছে ইহার কোন একটির পাতার রস ও হরিদ্রাচূর্ণ একত্র করিয়া প্রয়োগ করেন। হিষ্কাশ রসে কেবল বমন হয়, কিন্তু করলাপাতা বা উচ্ছেপাতার রসে বমন বিরেচন উভয়ই হয় এবং উহাতে রোগীর বিশেষ ক্লেশ বা আমাশয়ের তাদৃশ উত্তেজনা, দুর্বলতা প্রভৃতি প্রকাশ পায় না। হিষ্কাশ রসের মাত্রা ৮ তোলা, প্রক্ষেপ মধু ২ তোলা, করলা বা উচ্ছেপাতার রসের মাত্রা ৮ তোলা ও প্রক্ষেপ হরিদ্রা-চূর্ণ ১০ চারি আনা। রোগী নিতান্ত দুর্বল হইলে, বমন করাইবে না ; কেবল বিরেচন প্রয়োগ করিবে। যে দিন বমন করান হইবে, সেই দিন আর অন্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। বমনের পর ধৈর্যমণ্ড পথ্য দিবে। মণ্ডের সহিত বেদানা বা ডালিমের রস মিশ্রিত করা যায়। ২ তোলা কিস্মিস্ অর্ধসের দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া ও চটকাইয়া সেই দুগ্ধ ছাকিয়া ধৈর্য মণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবে। ঞ্জটিকা উদগত হইলেই, দুগ্ধমিশ্রিত পথ্য দেওয়া উচিত, দুগ্ধবিহীন পথ্য কদাচ দেওয়া উচিত নহে। অবস্থা-ভেদে ঘূতের সস্তলন-করা যুগ বা ছোলার ঘূষ একবেলা এবং দুগ্ধ ও কিস্মিসের কাথসহ ধৈর্যমণ্ড একবেলা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কণ্ঠনাশীতে বা মুখ-গহ্বরে ঞ্জটিকা উঠিলে, পথ্য গলাধঃ করিতে বা গিলিতে কষ্ট হয়, এক্রপ অবস্থায় একমাত্র দুগ্ধ ও ধৈর্য মণ্ডই উৎকৃষ্ট পথ্য। ঐ অবস্থায় রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া কলার নরম পাতা দ্বারা একটি চোদ্দ (চুদ্দা) প্রস্তুত করিয়া তাহা টাকরার উপরে রাখিয়া আস্তে আস্তে ঐ পথ্য ঢালিয়া দিবে। রোগীর অত্যধিক দাহ থাকিলে, যুগ ও আমলকীর ঘূষ কিম্বা মটরের ঘূষ অতি উপকারী। যুগ ও আমলকীর

যুষের বিধান এই—কাঁচা গোটা মুগ ১০ তোলা ও আমলকী ৪ তোলা একত্র করিয়া একরূপ পরিণ জলে সিদ্ধ করিবে যেন মুগ গলিয়া যায় । গলিয়া গেলে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে । এক বেলা ঐধর মণ্ড ও দুধ এবং একবেলা মুগের যুষ বা বুটের যুষ পথ্য দিবে । প্রত্যহ একবার পায়রা বা নূরগীর যুষও ব্যবস্থা করা উচিত ; মাংসের যুষ এই রোগে প্রয়োগ একান্ত কর্তব্য । যে দিন বমন করান হইবে, তাহার পরদিবস হইতে যথারীতি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে । এই সময়ে একবেলা সিন্দূরযোগ ও একবেলা কজ্জলীযোগ প্রয়োগ করিবে এবং তৎসঙ্গে বাতপিত্তাদি ভেদে প্রত্যহ একটি পাচন ব্যবস্থা করিবে । পাচন প্রয়োগ নিত্য প্রয়োজন । বসন্ত, হাম, বিস্ফোট, বিসর্প ও বিদ্রুপি প্রভৃতি রোগে কাথ সেবন যেক্রপ উপকারী, তদ্রূপ আর কিছুই নহে । বাতিক বসন্তে দশমুলাদি, পৈত্তিকে দ্রাক্ষাদি ও শৈথিল্যে কিরাতাদি কাথ ব্যবস্থা করা যায় । বাতপিত্তাদি-ভেদে রোগ নির্ণয় করিতে না পারিলে কিম্বা সর্বপ্রকার বসন্তে নিম্বাদি কাথ প্রয়োগ করা যায়, ইহার আর বসন্তের ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই বলিলেও চলে । ইহাতে জ্বর প্রভৃতিও প্রশমিত হয় এবং গুটিকাও ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আইসে, অধিকন্তু গুটিকা উঠিয়া আবার বসিয়া গেলে, অথবা উঠিতে বিলম্ব হইলে, তাহাও অবিলম্বে নিঃশেষে উদ্গত হয় । এতদ্ব্যতীত অমৃতাদি কাথ, পটোলাদি কাথ বা খদিরাষ্টক কাথ, সর্বপ্রকার বসন্তে প্রয়োগ করা যায় । প্রয়োজন মনে করিলে, দুই বেলা দুইটি কাথ সিন্দূরযোগের অল্পপানরূপে প্রয়োগ করা যায় ; এই সকল কাথ পান করিলে অপক বসন্ত বিশোধিত ও প্রশমিত হয় এবং পক বসন্ত শীঘ্র শুদ্ধ হয় । কিন্তু বসন্তের পচ্যমান অবস্থা লক্ষিত হইবামাত্রই ঐসকল ঔষধ, পথ্য ও পাচনের পরিবর্তন করিবে । বমনের দুই দিবস পরে বিরেচন দিবে । বিরেচন একদিন বা দুই দিন অন্তর অবস্থা-ভেদে দিবে । উদরে মল সঞ্চিত না থাকে, তজ্জন্ত মধ্যে মধ্যে বিরেচন প্রয়োগ একান্ত আবশ্যক ; বিরেচনের জন্ত ত্রিফলার কাথ ও তেউড়ীচূর্ণ যথোচিত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে, তৎপরিবর্তে ক্যাষ্টর অয়েল সেবন করান যায়, মাত্রা—২।০ তোলা ।

পচ্যমান বা তৃতীয় অবস্থা । গুটী পাকিবার উপক্রমে বায়ুর প্রকোপ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, সূত্ররাং ঐ অবস্থায় গুটী শীঘ্র পাকে না, হয় ত বসিয়া বা

শুকাইয়াও খাইতে পারে, এইরূপ অবস্থা হইলে রোগীর মৃত্যু অনিবার্য, সুতরাং ঐরূপ লক্ষণ লক্ষিত হইলেই অবিলম্বে বাহ্যনাশক অথচ পুষ্টিকর পথ্য ও ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। পচ্যমান অবস্থার শুভূচ্যাদি কাৰ্য্য প্রত্যাহ পান করাইবে। এই কাৰ্য্য পানে ওষ্ঠা নীষই পাকে অথচ রোগীর বায়ু বৃদ্ধিত হয় না। এতদ্ব্যতীত কুলঙ্কট চূর্ণ করিয়া ইক্ষুভেদের সাহিত্য চাটিয়া খাইতে দিলেও বসন্ত শীঘ্র থাকিয়া উঠে। এই সময় বসন্তজনিত অরৈ-বিকার উপস্থিত না হইলে, ইক্ষুকলাবটী প্রয়োগ করিবে, প্রত্যাহ সকালে গটোলাদি কাৰ্য্য ও বৈকালে ইক্ষুকলা-বটী প্রয়োগ কারণেই চলে। প্রত্যাহ মাংসের সুব, দুগ্ধ, স্তত্বারা সন্তলন করা দাইনের সুব, ঐষের বসন্ত বা অন্নমণ্ড পথ্য দেওয়া সর্বথা কর্তব্য।

বসন্তে বিকার। বসন্তে অরৈবিকার উপস্থিত হইলে, রোগীও অবস্থা প্রায়শঃ শোচনীয় হয়। সন্নিপাতজন্যবসন্তে বায়ু ও ক্ষেত্রার প্রবল প্রকোপ থাকিলে, বাতগৈরিক জ্বরের এবং ত্রিদোষের প্রবল প্রকোপ থাকিলে, সন্নিপাতিক বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন রোগী হৃৎ পর্য্যন্ত গলাধঃ করিতে পারেনা, কণে দাহ, কণে শীত প্রকাশ পায়, রোগী মুত্তমুঃ হইয়া বৃদ্ধিত হয়, অস্থি, সন্ধি ও বস্তকে বেদনা, চক্ষু হইতে কল নির্গমন, নেত্রদ্বয়ের বক্রিয়া ও ষোলাটে ভাব, তজ্জা, প্রলাপ, কাস, খাস, অরুচি, ভ্রম প্রভৃতি বিবিধ উপসর্গ অস্বাভিক পরিমাণে প্রকাশ পায়। এই অবস্থার অবিলম্বে কস্তুরীভূষণ (বতান্তরে) প্রয়োগ করিবে। বাবৎ বিকার প্রশমিত না হয়, তাবৎ উহা প্রয়োগ করা উচিত। বসন্ত-বিকারে এই ঔষধের জ্বার কলপ্রদ ঔষধ অতি বিরল। ইহা শত শত বুলে প্রয়োগ করিয়া সফল পাওয়া গিয়াছে। এই ঔষধের উপকরণ প্রায় সমস্তই বসন্তজনিত জ্বর ও বিকার নাশক, ইহা প্রয়োগে বায়ুর প্রকোপ সৰ্ব্বদিত হয়না অথচ শীঘ্রই বিকার হ্রাস পায়। কাস, খাস, অরুচি ও বসি হইলে, কিবা ঝলাব্যাধা, ঔষধ ও পথ্য গ্রহণে অক্ষমতা প্রভৃতি লক্ষিত হইলে, অষ্টাদাবলেহ গটিয়া খাইতে দিবে। শূল, উদরাগ্নান ও কন্ম উপস্থিত হইলে, স্ততসন্তলন করা ছাগ বা পাররার সুব অবশ্যই ব্যবস্থা করিবে। মাংসরসে লক্ষিত হইলে, অন্ন ডালিমের রস মিশ্রিত করিয়া দিবে। কর্তরোধ হইলে, ষাতিয়াদি কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া তদ্বারা কুলি করিতে দিবে, কাথ অনেক ক্ষণ

মুখে রাখিয়া নাড়া চাড়া করিয়া ফেলিয়া দিতে হয় । কোন্ শরীরে কত গুটী বাহির হইবে, তাহার স্থিরতা নাই, দোষ-প্রকোপের তারতম্যে গুটীর সংখ্যায়ও ভ্রাস বৃদ্ধি হয় । যে পরিমাণে দোষ প্রকুপিত হয়, গুটিকার সংখ্যাও তদ্রূপ হইয়া থাকে, স্তত্রাং সমস্ত গুটী বাহির হইল কি না, তাহা বুঝিবার কোনই উপায় নাই । তবে সাধারণ নিয়ম এই—যদি গুটী উঠিবার পর ২০ দিনের মধ্যেও সংখ্যাবৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে নিম্নাদি কাণ ব্যবস্থা করিবে । গুটী যথারীতি বাহির না হইলেও রোগীর জীবন-নাশের সম্ভাবনা, আবার অধিক সংখ্যক বহির্গত হইলেও, যন্ত্রণার সীমা থাকে না, উপসর্গ-সকল কঠোরভাবে আক্রমণ করে ; একপাবহ্যায় সংখ্যাধিক্য দৃষ্ট হইলে জয়ন্তী-পাতার চূর্ণ গুটিকার উপরে ছড়াইয়া দিবে, জয়ন্তী পাতার চূর্ণ পুরু কাপড়ে ছাকিয়া একটুকরা পাতলা কাপড়ে বান্ধিয়া পোটলার মত করিবে এবং ঐ পোটলাটি আস্তে আস্তে রোগীর সর্কাস্পে বুলাইবে, পরে সর্কাস্প পুরু কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে । কঠল দ্বারা চূর্ণ মার্জনা করিলেও চলে । অষ্টাঙ্গপুণ্ড্র ঐ সময়ে প্রয়োগ করিলেও বেশ সুকল পাওয়া যায় । গুটী উঠিতে বিলম্ব হইলে বা বহির্গত গুটী বসিয়া গেলে নিম্নাদি কাণ পান করিতে দিবে ও তৈলাকুচার পাতার রস এবং মাখন একত্র করিয়া সর্কাস্পে মাখাইবে । গুটীগুলি পুষ্ট হইলে ও দুই চারিটি পাকিতে আরম্ভ করিলে, পঞ্চতিল্ল দ্বত, নিমতৈল কিন্না তৎপরিবর্তে নিমপাতা দ্বতে ভাজিয়া তুলি দ্বারা পুনঃ পুনঃ লাগাইবে । সিন্দূরযোগ সাধারণতঃ সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু কঙ্কালীখোণ বায়ুর রুদ্ধতা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে প্রয়োগ করিবে না । গুটী অধিক সংখ্যায় প্রকাশ পাইলে, রোগীর শয়ন বা পার্শ্বপরিবর্তন করিতে কষ্ট হয়, স্তত্রাং তখন যুক্তিপূর্বক শয্যা রচনা করিয়া দিবে । পুরু তোষকের উপর পরিষ্কার চাদর বিছাইয়া তদুপরি রোগীকে শয়ন করাইবে, কিন্তু গুটী গলিয়া গেলে কলার নরম পাতায় মাখন মাখাইয়া তোষকের উপর স্থাপন করিয়া তদুপরি শয়ন করাইবে ।

পকাবস্থা বা চতুর্থ অবস্থা । গুটিকাগুলি সুপক হইলে, কখনও স্বয়ং বিদীর্ণ হয়, কখনও বা স্ফাণ্ড কণ্টকের সাহায্যে পুষ নিঃসারণ করিতে হয় । কণ্টকের সাহায্যে পুষ নিঃসারণ করা অতীব ক্লেশকর ব্যাপার, উহাতে

রোগীর বড়ই কষ্ট হয়, ঐ রূপ না করিলেও ক্ষতি নাই, কারণ, বসন্তের পুষ-
 গুটিকার উপরেই সঞ্চিত হইয়া শুষ্ক হয় ও স্বরং উঠিয়া যায়। গুটিকা পূব-
 পূর্ব হইলেই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবে, যেন ঐ বীজ বায়ুমণ্ডলের
 সহিত মিশিত হইয়া জনপদ ধ্বংস করিতে না পারে। নিম্নতল, পক্ষতিস্ত্র দ্রব্য
 বা নিমপাতা ভাজ্যদ্রব্য তুলিতে করিয়া গুটীর উপরে সর্ষদা লাগাইবে। গুটিকা
 উন্মত্ত হইলেই রোগীকে আরোগ্যলাভ পর্য্যন্ত বায়ু ও আলোক রহিত স্বতন্ত্র
 গৃহে স্বতন্ত্রভাবে রাখিবে ও ঘর বন্ধ রাখিবে; বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত খুলিবে
 না। বিকার তিরোহিত হইলেই গরম দুগ্ধসহ পক্ষতিস্ত্র দ্রব্য গুণ্ণপান
 করিতে দিবে, ঐ সময়ে সিন্দূরযোগ বা সন্মতোভদ্র রস, ইন্দুকলাবতী ও
 পটোলাদি কাথ প্রয়োগ একান্ত কর্তব্য। ঐ তিন পদ ঔষধ ও পক্ষতিস্ত্র দ্রব্য
 গুণ্ণপান প্রয়োগ করিলেই চলে, এতদতিরিক্ত ঔষধের প্রয়োজন হয় না।

উপসর্গ। এই রোগে বাতশ্লেষ্মজ বা সান্নিপাতজ বিকারের আশ্রয় নানা-
 বিধ মারাত্মক উপসর্গ প্রকাশ পায়, সুতরাং ঐ সকল উপসর্গকে প্রশমিত
 করাই চিকিৎসকের প্রধান কার্য্য। উপসর্গ প্রশমনের জন্ত ফলগ্রন্থ মুষ্টিযোগ
 প্রয়োগ করিবে। অত্যন্ত পিপাসা হইলে, ঘোরী ও যষ্টিমধু এক টুকরা কাপড়ে
 বান্ধিয়া জলে ভিজাইয়া ঐ পোটলী চুষিতে দিবে এবং ঐ দুই দ্রব্য জলে
 ভিজাইয়া সেই জল পান করিতে দিবে। অর্কচি প্রবল হইলে, আমরুলশাক
 দ্রব্যে সঁাতলাইয়া অল্প জল ও মৈদ্ববলণ মিশিত করিয়া একটু একটু লেহন
 করিতে দিবে। বৃকে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলে, নধু ও মৈদ্বব কিম্বা মৈদ্বব ও দ্রব্য
 একত্র মিশ্রিত করিয়া করাঙ্গুলিতে মাখাইয়া রোগীর নাসিকা পুনঃ পুনঃ মার্জনা
 করিবে, ইহাতে শ্লেষ্মা বহির্গত হইয়া যায়। শ্লেষ্মা শুষ্ক হইলে বাসক, যষ্টিমধু,
 কিস্মিস্ ও মরিচ প্রত্যেকে ১০ তোলা, ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা
 থাকিতে নামাইয়া সেই কাথ পান করাইবে। ইহাতে শ্লেষ্মা তরল হয়। ঐ
 অবস্থায় পানে একটু পুরাতন দ্রব্য মাখাইয়া গরম করিয়া পুনঃ পুনঃ বৃকে সেক
 দিবে। কিস্মা পান ও পৈয়াজ ছেচিয়া তাহার রস কাপড়ে ছাকিয়া ও গরম
 করিয়া বৃকে মালিশ করিবে। ঐ দুই দ্রব্যের স্বরস খাওয়াইলেও উপকার হয়।
 কাসের বেগ অত্যন্ত প্রবল হইলে এবং তজ্জন্ত উৎকাসি প্রকাশ পাইলে অ-
 গলনালী শুষ্ক শুষ্ক করিলে চক্ষ্মাগতরস বা তালীশাদিচূর্ণ ব্যবস্থা করিবে। চক্ষ্মতে

গুণী উপগত হইলে মধুকাদি প্রলেপ ও আশ্চ্যাতম প্রয়োগ করিবে, নচেৎ চক্ষু নষ্ট হইতে পারে। চক্ষুর বৃষ্টি অগ্ন হইলে, শাম্বকের জল বা কপূর-ভিজান জল চক্ষুর অভ্যন্তরে ফোঁটা ফোঁটা দিবে। সন্নিপাত অরের জ্বায় অত্যন্ত উপসর্গের চিকিৎসা করিবে, যুষ্টিযোগই প্রয়োজ্য, তবে তাহা বিযাক্ত বা তাঁত্র না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে। কোন কোন উপসর্গ প্রথমনের জ্বায় মকরদ্বজ প্রয়োগ করা যায়। অতীসারে মুখার রস, উদরাগ্নানে চাউল ধোয়া জল, হিকার মুড়ি বা ষে ভিজান জল, বমনে ষে ভিজান জল, গাত্র-দাহতে পটোলের রস, বেদানার রস বা ডালিমের রস, মুখ দিয়া রক্তস্রাব হইলে যষ্টিমধু ও কিস্মিসের কাথ এই সকল অম্লপান সহ মকরদ্বজ প্রয়োগ করিবে। বসন্ত-রোগের অন্তে কূপর, মণিবন্ধ ও স্বল্পদেশে শোধের আবির্ভাব হইতে পারে ; ঐ অবস্থায় যবচূর্ণ, গমচূর্ণ ও যুগ বা মাযকলাই চূর্ণ সমভাগে লইয়া জলে গুলিয়া শুদ্ধারা প্রলেপ দিবে ; ইহাতেই শোধ প্রায়শঃ বসিয়া যায় ; যদি না-বসে, ত্রণ-শোধ নাশক অত্যন্ত প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। গুটিকা পলিয়া গেলে, ভ্রামধ্যে পোকার সঞ্চার না হয়, তজ্জন্ত সরলকাষ্ঠ, ধূনা, দেবদারু, চন্দন, অগুরু অর্থাৎ আগরকাষ্ঠ ও গুগ্গুলু সমভাগে লইয়া একটি শরায় রাখিয়া রোগীর মস্তক ব্যতীত সর্বত্র আচ্ছাদিত করিয়া ঐ ধূম লাগাইবে। গুণী উঠিলেই প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ধূপ প্রয়োগ করিবে। গুণী হইতে অত্যধিক পুথ নিঃসরণ বশতঃ ক্ষতস্থান সর্ষদা ক্রেকগুক্ত থাকিলে, পঞ্চবকুলের হস্ত চূর্ণ তত্পরি পুনঃ পুনঃ ছড়াইয়া দিবে। বট, অথথ, যজ্ঞদুগুর, পাকুড় ও অন্ন-বেতসের ছাল এই পাঁচটিকে পঞ্চবকুল কহে। সমানভাগে চূর্ণ লইবে। ইহাতে ক্ষত পরিষ্কার ও শুদ্ধ হইয়া থাকে। পায়ে অধিক গুণী নির্গত ও তজ্জন্ত পায়ে দাহ উপস্থিত হইলে, চাউলের জল দ্বারা পা ধোত করিবে। চক্ষুতে প্রবলদাহ ও চক্ষু হইতে রক্তস্রাব হইলে, যষ্টিমধু পরিষ্কার শিলায় বাটিয়া একটুকরা কাপড়ে জড়াইয়া ফোঁটা ফোঁটা রস চক্ষুর অভ্যন্তরে দিবে।

আরোগ্যস্থান। রোগ আরোগ্য হইলে, কাঁচা হরিদ্রা ও কচি নিম-পাতা বাটিয়া রোগীকে মাখাইয়া নান করাইবে।

উঠতি ঝোল, বস্তুতি ঘোল। এই প্রবাদ বাক্য, দেশময় প্রচলিত। এই প্রবাদ বাক্যের অনুসরণ করিয়া অনেকে হাম, বসন্ত ও জল বসন্ত

উঠিলেই কলমীর 'কোল রোগীকে খাইতে দেন । কলমীর কোল উপযুক্ত ২১০ দিন খাইলে, হাম, পানিবসন্ত ও বসন্তের গুটী দলে দলে বহির্গত হয়, যুষ্টি-
 বোগটি উপকারী, কিন্তু প্রয়োগ করিলে, অনেক স্থলে জ্বরের বেগ বর্ধিত
 করে, পাতলা দান্ত করায় ; তবে রোগীর শরীর বায়ু পিত্তাদিক হইলে, ঐ
 সকল উপসর্গ উপস্থিত নাও হইতে পারে । ইহার পরিবর্তে নিম্বাদি কাথ ও
 ভাক্রামেথী ভিজান জল প্রযোজ্য । অনেকে পান্না বা পশুতি ভাতের জল
 জ্বরের প্রবলবেগসঙ্গেও পথ্য দিয়া থাকেন, এরূপ পথ্য সর্বথা অপকারী ; এমন
 কি পরিণামে উহাতে জীবন নষ্ট হইতে পারে । হাম, বসন্ত ও পানিবসন্ত
 বসিবার সময় অত্যন্ত দাহ ও পাতলা দান্ত হইলে বোল-মিশ্রিত অন্নমণ্ড বা যব-
 মণ্ড (বালি) দেওয়া যাইতে পারে ; অল্প বোল পান করিতে দিবে অথবা
 তৎসহ চিড়ারমণ্ড মিশ্রিত করিয়া পথ্য দিবে ।

বসন্তরোগে—ঔষধ ।

স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস । বসন্তরোগের পূর্বে জ্বর, গাত্র-বেদনা, মাথাভার,
 মাথাকামড়ানি, হাত-পা কামড়ানি, শরীরের অবসন্নতা, সর্দিতে নাকমুখ
 বন্ধ, চক্ষু ছল ছল করা, মুখে রসে টল টল করা, চক্ষু, মুখ ঈষৎ ফুলাফুলা
 প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, জ্বরের বেগ অল্পই হউক বা প্রবলই হউক এই
 ঔষধ প্রয়োগ করিবে ; কিন্তু গুটিকার হুচনা হইলে প্রযোজ্য নহে । তিন-
 বেলা তিনবার প্রযোজ্য । অনুপান—তুলসীপাতার রস বা পানের রস ও মধু ।

স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস । প্রস্ততবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

কফচিন্তামণি । স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়,
 ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রযোজ্য । অনুপান—তুলসীপাতার রস ও মধু ।

কফচিন্তামণি । বিগুহু হিঙ্গুল, ইন্দ্রযব, সোহাগার থৈ, মরিচ ও তুঙ্গে শোধিত সিদ্ধিবিজ
 প্রত্যেকে ১ তোলা এবং রসসিন্দূর ৩ তোলা, আদার রসে মর্দন । বটী ৩ রতি ।

কস্তুরী ভূষণ । স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস যে যে অবস্থায় প্রযোজ্য, সেই
 সেই অবস্থায় জ্বরের বেগ অত্যধিক প্রবল হইলে ও তজ্জন্ম তন্দ্রা, প্রলাপ,
 পার্শ্ববেদনা, প্রভৃতি বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ
 করিবে । অনুপান—রুদ্রাক্ষশা ও মধু ।

কস্তুরী ভূষণ । প্রস্ততবিধি ৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

কজ্জলীযোগ । বসন্তের গুণী উঠিলে, বমন-বিরেচনের পর রোগীকে প্রত্যহ সকালে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে গুণীর সংখ্যাধিক্য ও উপসর্গের প্রভাব হ্রাস হয়, স্নতরাং রোগের প্রবল আক্রমণের অল্পতা ঘটে। অন্নপান—পানের রস ও মধু ।

কজ্জলীযোগ । প্রস্তুতবিধি ১০৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

সিন্দূরযোগ । বসন্তের গুণী দেখা দিলে, এই ঔষধ প্রত্যহ বৈকালে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে গুণীর সংখ্যা হ্রাস হয় ও রোগের প্রবল আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না এবং অগ্নাত উপসর্গের প্রভাব কমিয়া আইসে ।

সিন্দূরযোগ । প্রস্তুতবিধি ১০৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

দশমূল কাথ । বাতিক বসন্তের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। গুটিকা পাকিতে আরম্ভ করিলেও ইহা প্রয়োগ করা যায়; কিন্তু ইহা অপেক্ষা গুড়চ্যাদি কাথই সমধিক উপকারী ।

দশমূল কাথ । প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

দ্রুগাদি কাথ । পৈত্তিক বসন্তের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করাইবে। গুটিকা পাকিতে আরম্ভ করিলে, এই কাথ সেবন বন্ধ করিবে ।

দ্রুগাদি কাথ । প্রস্তুতবিধি ১০৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

কিরাতাদি কাথ । শৈথিল্য বসন্তরোগে যাবৎ গুটিকা পাকিতে আরম্ভ না করে, তাবৎ এই কাথ প্রয়োজ্য ।

কিরাতাদি কাথ । প্রস্তুতবিধি ১০৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

কস্তুরীভূষণ (মতাস্তরে) । বসন্তরোগে রোগীর অরবিকার উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অন্নপান—রুদ্রাক্ষরস ও তালের বাগুড়ার রস ।

কস্তুরীভূষণ (মতাস্তরে) । প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

গুড়ুচ্যাদি কাথ । গুটী পাকিতে আরম্ভ করিলে, বায়ুর প্রকোপ-
বিনাশের জন্ত এই কাথ প্রয়োজ্য । ইহার অভাবে দশমূল কাথ প্রয়োগ
করা যায় ।

গুড়ুচ্যাদি কাথ । গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, কিসমিস্, ইক্ষুমূল ও দাড়িমের খোসা, প্রত্যেকে সম-
ভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেধ ৮ তোলা ।

অষ্টাঙ্গাবলেহ । বসন্ত, জলবসন্ত ও হাম প্রভৃতি রোগে অরবিকার
উপস্থিত হইলে এবং তৎসঙ্গে শ্বাস বা হিকা, ইহার কোন একটি উপসর্গ
অথবা উভয়ই এককালে প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ চাটিয়া খাইতে দিবে ।
এসঙ্গে, কাস, অরুচি, বমি বা কর্ণরোগ অথবা গলাব্যথা বা পথ্যগ্রহণে অক্ষমতা
অথবা ঢোক গিলিতে কষ্ট প্রভৃতি থাকিলে, তাহাও ইহাতে প্রশমিত হয় । এই
ঔষধে উপকার না হইলে, শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ ইহার পরিবর্তে প্রয়োগ করা যায় । উহা
অপেক্ষা শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ সমধিক উপকারী । ইহা গভিনী, প্রসূতি ও শিশু
কিন্থা বালকের পক্ষেও মহোপকারী । অন্নপান—উষ্ণজল ।

অষ্টাঙ্গাবলেহ । কটুফল, কুড়, কাকড়াশৃঙ্গী, দুগ্ধলতা, কুম্বলীরা, শুঠ, পিপুল ও যরিচ
প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, আদার রসে মর্দন ও শুদ্ধ করিয়া লইবে ।

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ । অষ্টাঙ্গাবলেহ যে যে অবস্থায় প্রযোজ্য, ইহাও সেই
সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায় । অন্নপান—উষ্ণজল ।

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

নিম্বাদি কাথ । বাতপিত্তাদিতেদে রোগ নির্ণয় করিতে না পারিলে,
এই কাথ প্রয়োগ করিবে । ইহা সর্বপ্রকার বসন্ত ও তজ্জনিত অরনাশক,
বিশেষতঃ ইহা প্রয়োগে বহির্গত গুটিকা অন্তর্লীন হইলে, তাহাও শীঘ্র উপশত
হয় । গুটিকা নিঃশেষে বাহির হয় নাই, যদি এরূপ বুঝা যায় অথবা গুটিকার
সংখ্যাল্পতা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, এই কাথ অবশ্য প্রয়োগ করিবে । কুষ্ঠ,
বিক্ষেপ্ত ও বিসর্পরোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায় । সকালে বা সন্ধ্যার সময়
প্রয়োজ্য । সিদ্ধরোগ বা কজ্জলীঘোণের অন্নপানরূপেও প্রয়োগ করা যায় ।

নিম্বাদি কাথ । নিম্বছাল, ক্ষেপাপড়া, আকনাগি, পলতা, কটকী, বাসকছাল, দুগ্ধলতা,

আমলকী, বেণারমূল, যেতচন্দন ও রক্তচন্দন প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল-
৩২ তোলা, শেব ৮ তোলা ।

অমৃতাদি কাথ । ইহা সর্বদা ব্যবহার্য্য অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ । বিস্ফোট,
বিসর্প, ব্রণ, বসন্ত, হাম, কণ্ঠ ও গীতপিত্ত প্রভৃতি রোগ এবং তন্দ্রানিত জ্বর-
প্রশমনের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয় । ইহা স্বতন্ত্ররূপে বা কঙ্কলীষোগে কিম্বা
সিন্দূরযোগের অহুপানরূপে প্রয়োগ করা যায় । ইহার পরিবর্তে সমগুণবিশিষ্ট
পটোলাদি কাথ বা খদিরাষ্টক কাথ প্রয়োগ করিলেও চলে ।

অমৃতাদি কাথ । প্রস্তুতবিধি ৮২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বাসাদি কাথ । বসন্ত ও হামের যে কোন অবস্থায় ইহা প্রয়োগ
করা যায় ।

বাসাদি কাথ । প্রস্তুতবিধি ১০৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

পটোলাদি কাথ । রোগীর দান্ত পরিষ্কারের জন্য অমৃতাদি বা খদি-
রাষ্টকের পরিবর্তে ইহা প্রয়োগ করিবে । ইহা কটুকী মিশ্রিত, স্তূতরাং
দান্ত খোলসা রাখে । অধিক কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকিলে কটুকীচূর্ণ বা তেউড়ীচূর্ণ
৥০ আনা মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে । ইহা বসন্তের সর্পাবস্থায়
প্রয়োগ করা যায় । বিস্ফোট রোগোক্ত পটোলাদি কাথ প্রয়োগ করিলেও
চলে । ইহা সিন্দূরযোগ বা কঙ্কলীষোগের অহুপানরূপেও প্রয়োগ করা যায় ।

পটোলাদি কাথ । প্রস্তুতবিধি ১০৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

খদিরাষ্টক । হাম, বসন্ত, পানিবসন্ত, বিসর্প ও বিস্রমি প্রভৃতি রোগে
ইহা প্রয়োগে ঐ সকল রোগ ও তদাঙ্কবন্দিক জ্বর অতি শীঘ্র প্রশমিত হয় ।
ঐ সকল রোগে অতীসার হইলে, এই কাথ প্রয়োগে তাহাও বন্ধ হয় । সিন্দূর-
যোগ বা কঙ্কলীষোগের অহুপানরূপে ইহা প্রয়োগ করা যায় ।

খদিরাষ্টক । ধূসর, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিম্বালা, গোলাতা, গুলঞ্চ ও বাসক-
হাল প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেব ৮ তোলা ।

জাত্যাদি কাথ । কঠরোধ হইলে, এই কাথ দ্বারা রোগীকে কবল
করিতে দিবে ।

জাত্যাদি কাথ । জাতি অর্থাৎ মালভাকুলের পাতা, বস্ত্রিষ্ঠা, দারুহরিজা, হুপারীচূর্ণ, নমৌবৃক্ষের (শাইগাছের) ছাল, আমলকী ও বটুবধু প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

ইন্দুকলা বটী । গুটিকা পাকিতে আরম্ভ করিলে ও তজ্জন্ত বায়ুর অত্যন্ত রুদ্ধতা প্রকাশ পাইলে, এই মহৌষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক । বসন্ত-রোগে গুটী পাকিবার সময়ে বায়ু বৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক, সুতরাং এই ঔষধ গুটী পাকিবার উপক্রমে প্রয়োগ একান্ত কর্তব্য । গুটী পাকিলে ও তাহা হইতে অধিক আব হইলে, ঔষধ বন্ধ করিবে । তদ্ব্যতীত আরোগ্যলাভ পর্যন্ত প্রযোজ্য । **অমুপান**—কোন একটি কাথ বা রুদ্রাক্ষ ঘসা ।

ইন্দুকলা বটী । শিলাজতু, লৌহ ও স্বর্ণ-ভঙ্গ সমভাগ, তুলসীর রসে মর্দন । বটী ২ রতি ।

সর্বতোভদ্র রস । গুটী পাকিলে ও তাহা হইতে অত্যধিক পুষ্প আব হইলে, যাবৎ আব বন্ধ না হয়, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে । **অমুপান**—কোন একটি কাথ বা রুদ্রাক্ষ ঘসা ।

সর্বতোভদ্র রস । রসসিন্দূর, অঙ্গ, রৌপ্য, স্বর্ণভঙ্গ ও বিশোধিত মনঃশিলা প্রত্যেকে ১ তোলা, বংশলোচন ২ তোলা ও বিত্তক গুগ্গলু ৭ তোলা । প্রথমে গুগ্গলু দৃভদ্রা পেষণ করিয়া পরে অগ্ন্যন্ত চূর্ণ তৎসহ ক্রমশঃ মিশ্রিত করিবে । মাত্রা এক আনা ।

পঞ্চতিক্ত ঘৃত । রোগীর বিকার রহিত ও জ্বর হ্রাস হইলে, এই ঘৃত সর্বাঙ্গে তুলিবার প্রয়োগ করিবে ও সেবন করিতে দিবে । **অমুপান**—গরম দুগ্ধ ।

পঞ্চতিক্তঘৃত । প্রস্তুতবিধি ৪৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

পদ্মক ঘৃত । বিকার এবং জরের বেগ হ্রাস হইলে, এই ঘৃত বাত-পিত্তাধিক রোগীকে প্রয়োগ করিবে ।

পদ্মকঘৃত । প্রস্তুতবিধি ১০৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগ্গলু । গুটিকা পাকিলে ও তাহা হইতে অত্যধিক আব হইলে, যাবৎ আব রহিত ও ক্ষত শুদ্ধ না হয়, তাবৎ ক্ষতস্থানে পঞ্চবল্লচূর্ণ ছড়াইয়া দিবে ও এই ঘৃত সেবন করাইবে ।

পঞ্চতিক্তঘৃত গুগ্গলু । প্রস্তুতবিধি ১০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

মধুকাদি প্রলেপ ও আশ্চ্যাতন । চক্ষুতে গুটিকা উঠিলে ইহার লেপ চক্ষুপল্লবে দিবে এবং ইহার কাথ চক্ষুতে সেচন করিবে ।

মধুকাদি প্রলেপ ও আশ্চ্যাতন । যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মৃচীমূখী, দারু-হরিদ্রা, নীলশূল, বেণারমূল, লোধ ও মল্লিষ্ঠা, এই সকল সমভাগে বাটিয়া অক্ষিপল্লবে প্রলেপ দিবে ও কাথ করিয়া সেই জল ছাকিয়া চক্ষুর অভ্যন্তরে সেচন করিবে ।

বসন্তরোগোক্ত সমস্ত ঔষধ বসন্তরোগাক্রান্ত শিশু ও বালকদিগকে প্রয়োগ করা যায় ।

পথ্যাপথ্য ।

পথ্য । বসন্তের গুটি যে পর্য্যন্ত বাহির না হয়, তাবৎ নবজ্বরের ত্রায় রোগীকে জলসাপ্ত, জলবার্ণি, জল এরারুট, ঠৈর মণ্ড, মসুর, মুগ বা বুটের দাইলের ঘূষ পথ্য দিবে । ঐ সকল দ্রব্যে মিশ্রী ও লেবুর রস মিশাইয়া দিবে । জনপদে গুটিকার প্রাহুর্ভাব হইলে, একবারে নিরসু উপবাস দিবে না । গুটিকা বাহির হইলে, ঠৈর মণ্ড শ্রেষ্ঠ পথ্য ; তদ্ব্যতীত যবের মণ্ড, কাঁচা মুগ, মসুর বা বুটের ঘূষও দেওয়া যায় । ঘূষ ঘৃতসম্বরা দিয়া ও সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া দিবে । গুটী পাকিতে আরম্ভ করিলে পায়রা, ছাগল, চড়ুই, ডাহক বা মুরগীর ঘূষ অবশ্য দিবসে একবার দিবে । ঘূষ ঘৃতসম্বরা দিয়া দিবে । বিকার কাটিয়া গেলে, ভাতের মণ্ড, মাংসের ঝোল, দাউলের ঘূষ এবং পলুতা, করলা, উচ্ছে, শজিনা, কাঁচাকলা, পটোল, বেগুন প্রভৃতির তরকারী বিবেচনামত পথ্য দিবে ।

অপথ্য । মৈথুন, বেদ-প্রয়োগ, মৎস্য, পরিশ্রম, তৈলমর্দন বা ভক্ষণ, ক্রোধ, রৌদ্রের উত্তাপ, বায়ুসেবন, দূষিত জল পান, একত্র হৃৎ মাংসাদি বিকল্প দ্রব্য-ভোজন, শিম, আলু, শাক, সৈন্ধব ব্যতীত অল্প লবণ, অসময়ে আহার, কটু ও অন্ন দ্রব্য ভোজন এবং মলমূত্রাদির বেগধারণ ; এই সকল বসন্ত রোগীর পরিত্যাজ্য ।

রসস্থানসূরি-চিকিৎসা ।

(পানিবসন্ত বা জলবসন্ত)

ইংরাজীতে বাহাকে চিকেনপক্স বা ওয়াটারপক্স কহে, সংস্কৃতে তাহাকে রসগত মসুরিকা ও বাঙ্গালায় পানিবসন্ত বা জলবসন্ত কহে । নানাকারণে দোষ প্রকৃপিত হইয়া রস-ধাতুকে আশ্রয় করিয়া এই রোগ উৎপাদন করে । ইহাও সংক্রামক ও স্পর্শাক্রামক ; একজনের হইলে ক্রমশঃ গ্রাম, নগর বা জনপদ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে । শিশু ও বালকেরাই এই রোগে সমধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে, চারি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ইহার আক্রমণ দ্রুতবেগে প্রকাশ পায়, চারি বৎসর হইতে দ্বাদশবৎসর বয়সের মধ্যে আক্রমণ অপেক্ষাকৃত বিরল এবং তাহার পর অত্যন্ত বিরল, বয়স্ক বা বৃদ্ধদিগের কচিং এই রোগ প্রকাশ পায় । ১০৭৬ পৃষ্ঠায় লক্ষণ দেখ ।

প্রায়শঃ প্রথমে জ্বর হইয়া চব্বিশ ঘণ্টা বা একদিন একরাত্রির মধ্যে গুটী উদ্গত হয় । অধিক সংখ্যক গুটী বহির্গত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, জ্বরের বেগ প্রায়শঃ প্রবল হয় ও যাবৎ সমগ্র গুটী নিঃশেষে বাহির না হয়, তাবৎ জ্বরের বেগ ও উত্তাপ হ্রাস হয় না । গুটী উঠিবার পূর্বে প্রায়ই জ্বর, সর্দির ভাব ও গা-ব্যথা প্রকাশ পায় । কিন্তু কচিং গুটীর সঙ্গে সঙ্গে জ্বর দেখা দেয় ।

প্রথমতঃ লালবর্ণ বিন্দু বিন্দু চিহ্ন দেখা দেয়, ক্রমশঃ দুই, তিন বা চারি-ঘণ্টার মধ্যেই সেগুলি মটরের তায় বড় বড় হয়, উহা জলে পূর্ণ থাকে এবং শরীরে জলবিন্দু পতিত হইলে যেরূপ দেখা যায়, কিছা মটরের আকারবিশিষ্ট জল-বুদ্বুদ যেরূপ দেখা যায়, ইহাও দেখিতে তদ্রূপ ।

প্রথমতঃ প্রায়শঃ বক্ষঃস্থলে, পৃষ্ঠদেশে, স্কন্ধদ্বয়ে বা তল্লিকটবর্ত্তীস্থানে, মাথায় বা বাহুদ্বয়ে গুটী উদ্গত হয়, তৎপরে হস্তপদাদি অগ্রাণ্ড অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, মুখমণ্ডলে অল্প প্রকাশ পায়, গুটীকাগুলি গোল বা অণ্ডাকার । ইহার প্রায়শঃ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বহির্গত হয়, কচিং দুই তিনটি এক-সঙ্গেও উঠে । গুটীকাগুলির তল-দেশ লালবর্ণ হয় । গুটীকার সূচনা হইতে তিন দিবসের মধ্যেই প্রায়শঃ সমস্ত গুটী বহির্গত হয়, পরে কতকগুলি বা

অন্ন পূৰ্ণ হয়, কতকগুলি বা রসপূর্ণ হয়, ক্রমশঃ সেগুলি কঁটাত হরিদ্রাবর্ণের মামড়ীদ্বারা আবৃত হয় ও চারি পাঁচ দিবসের মধ্যেই মামড়ী খসিয়া পড়ে। এই রোগে ত্বকের বিকৃতি ঘটে না। এই রোগ সুখ-সাধ্য।

চিকিৎসা। এই রোগের যত্নগা প্রায়শঃ তিন দিবসের অধিক স্থায়ী হয় না। অর প্রকাশ পাইলে, বসন্তরোগোক্ত কফচিস্তামণি বা স্বল্প-লক্ষ্মী-বিলাস প্রয়োগ করিবে এবং উপসর্গ থাকিলে, হামরোগোক্ত মুষ্টিযোগ অবস্থা-ভেদে প্রয়োগ করিবে। গুটীকা প্রকাশ পাইলে, বসন্তরোগোক্ত নিষ্কাদি-কষায় পান করিতে দিবে। কোষ্ঠ-কাঠিষ্ঠ ও গা-ব্যথা থাকিলে, ঐ কাথের সহিত তেউড়ীচূর্ণ মিশাইয়া পান করিতে দিবে। গুটীকা উঠিতে আরম্ভ করিলে, এই রোগে বিরচন প্রয়োগ করিয়া দেহ শুদ্ধ করা যাইতে পারে, কিন্তু বমন করাইবার প্রয়োজন নাই। দুগ্ধমাণ্ড, তৃক্ষু ও খৈরমণ্ড, কাঁচাঘুগের ঘৃষ প্রভৃতি পথ্য দিবে। এই রোগে কেহ কেহ কাঁচা মাষকলাইর দাইল ও অন্ন এবং কেহ কেহ বা কলমীর ঝোল ও অন্ন ভোজন করিতে ব্যবস্থা দেয় ও তাহার ফলে জ্বরের বেগ এবং ভোগ-কাল বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু ঐরূপ পথ্যের পরিবর্তে নিষ্কাদিকাথ বা ভাজা যেথী ভিজানজল প্রয়োগ করিলেও গুটী নিঃশেষে বহির্গত হয় অথচ জ্বরের বেগ বর্দ্ধিত হয় না, বরং ক্রমশঃ কমিয়া আইসে। গল-দেশে গুটী উঠিলে ও তজ্জন্ত রোগী পথ্য-গ্রহণে অক্ষম হইলে, বসন্তরোগে যে কবল গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেই কবল গ্রহণ করিতে দিবে।

রোমাণ্টী-চিকিৎসা।

সংস্কৃতে বাহাকে রোমাণ্টী কহে, ইংরাজীতে তাহাকে মিঙ্গেলুস ও বাঙ্গালায় চলিত কথায় হাম কহে। বঙ্গদেশের কোন ২ স্থানে ইহাকে রুতী বা লুতী কহে। ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসেই ইহার সমধিক প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়, কিন্তু কদাচিৎ ইহা অল্প সময়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১০৭৬পৃষ্ঠায় লক্ষণ দেখ।

হাম ও অরসংযুক্ত একপ্রকার সংক্রামক ও স্পর্শাক্রামক ফোটক। ইহা অরপূর্কিকা ব্যাধি—অগ্রে জ্বর হয় ও পরে হাম বহির্গত হয়। শরীর রোমাণ্ডিত

হইলে, লোমকূপ সকল যেরূপ উচ্চ হয়, ইহার আকার তরুণ হয় বলিয়া, ইহাকে রোমান্টী কহে । প্রায়শঃ জ্বর প্রকাশের পরবর্তী চতুর্থদিবসে প্রথমতঃ কপালে ও হস্তপদে পশ্চাৎ সর্বাস্থে রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণু প্রকাশ পায়, কচিং পক্ষ্ম, ঘট্ট, সপ্তম বা অষ্টম দিবসেও নির্গত হইয়া থাকে । জ্বরের সঙ্গে সর্দি ও কাস বর্তমান থাকে, ক্রমশঃ জ্বরের বেগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং অস্থিরতা, আলস্য, বিরক্তি, চক্ষু সজল ও রক্তবর্ণ, চক্ষুর ভিতরে বেদনা, আলোকে কষ্ট-বোধ, গলা-বেদনা, নাসিকা হইতে তরল শ্লেষ্ম-নির্গমন ও সময়ে সময়ে হাঁচি, এবং প্রবলদাহ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় । এই রোগে প্রথমতঃ মল-রোধ ও উদরাগ্নান হয়, কিন্তু হাম নিঃশেষে উঠিলে, উদরাময় উপস্থিত হয় । জ্বা-বস্থায় কখনও ২ প্রলাপ, নাসারন্ধ্র হইতে রক্তশ্রাব, কপালে বেদনা, বক্ষঃস্থলে বেদনা ও ভার-বোধ এবং শ্বাস, কাস প্রভৃতিও উপস্থিত হইতে দেখা যায় । এইরূপে তিন দিবস অতীত হইলে, চতুর্থ দিবসে মুখে ও কপালে লাল দাগ প্রকাশ পায়, ক্রমশঃ সেগুলি উচ্চ হয় ও সর্বপের আকার ধারণ করে, বার ঘণ্টা এইরূপ অবস্থায় রহিয়া পরে ঐগুলি ত্বকের সমান হইয়া যায় । কণু নিঃশেষে বাহির হইয়া গেলে তৎসঙ্গে উপসর্গও হ্রাস পায় । ঘট্ট বা অষ্টম দিবসে কণু-গুলি শুষ্ক হয় ও তাহার উপস্থিত চামড়া চূর্ণ হইয়া উথিত হইতে থাকে । জ্বর পরিত্যাগ এবং গুটী শুষ্ক হইলেও কাস, অরুচি ও উদরাময় দুই চারি দিন বা তদধিক কাল বিদ্যমান থাকে । জ্বর প্রায়শঃ শীতকম্পপূর্বক হয়, কিন্তু বালকদিগের কদাচিৎ আক্ষেপপূর্বক প্রকাশ পায় । আয়ুর্বেদ মতে রোমান্টী একই প্রকার, কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা বলেন, রোমান্টী দুইপ্রকার, একপ্রকার রোমান্টী মূহলক্ষণযুক্ত ও একপ্রকার তীব্রলক্ষণযুক্ত । আয়ুর্বেদে-দুই প্রকারের উল্লেখ নাই । বোধ হয়, মৃদু ও তীব্র লক্ষণ-ভেদে ডাক্তারেরা উহাকে দুই শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন ।

চিকিৎসা । এ রোগেও বসন্তের জ্বর প্রথমে জ্বর প্রকাশ পায়, এবং তদানুসঙ্গিক দুই একটি উপসর্গ প্রকাশ পাইলেই হাম উঠিবে কিনা স্থির করা যায় না, তবে জনপদে ঐ রোগের প্রাদুর্ভাব থাকিলে, হাম উঠিবে, এরূপ আত্মনানিক সিদ্ধান্ত করা বাইতে পারে । এই রোগেও যথাসম্ভব হামের অবিরোধী বা অহুকূল চিকিৎসা-ক্রম অবলম্বন করিবে । হাম সামান্য রোগ,

আপনিই সারে, উহাতে ঔষধ দিতে নাই, এসকল কার্জের কথা নহে, অনেকে সময় সময় এসকল বাজে কথায় মুগ্ধ হইয়া শেষে বিপন্ন হইয়া থাকেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আবার অনেকে যে সে লোকের কথায় উঠতি-ঝোল, বসুতি ঝোল, এই প্রবাদবাক্যের অনুসরণ করিয়া লতা পাতার ঝোল খাইয়া স্বীয়জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলেন। এসকল ব্যবস্থায় উপেক্ষা-প্রদর্শন করাই বুদ্ধিমানের কার্য।

অর প্রকাশ পাইলেই বসন্তরোগের ঞ্চায় স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস বা কফচিস্তামণি ইহাদের মধ্যে কোনও একটি ঔষধ পানেররস ও মধুর সহিত দিবসে ২৩ বার প্রয়োগ করিবে। যাবৎ গুটী উদ্গত না হয়, তাবৎ এই প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে জ্বরের উপশম হয় এবং গুটীও সহজে উদ্গত হয়। গুটী উদ্গত হইলেই বমন বিরেচনের জন্তু নিয়ের ক্রম অবলম্বন করিবে। বসন্ত এবং পানিবসন্তও বমনবিরেচনের উপকারিতা বর্ণিত হইয়াছে। হামও ঐ জাতীয় রোগ, সুতরাং ইহাতেও ঐরূপ বমনবিরেচন উপকারী। গুটী দেখা-দিলেই উচ্ছেপাতা বা করলাপাতার রসে হরিদ্রাচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে। উচ্ছেপাতা ও করলাপাতা উভয়ই সমগুণবিশিষ্ট, উভয়ের মধ্যে যেটি পাওয়া যায়, সেইটি প্রয়োগ করা চলে। ইহা বমন ও বিরেচন উভয় গুণবিশিষ্ট, অথচ তীব্র নহে, অক্লেশে বমন ও বিরেচন হয়। মাত্রা, বয়স্ক-দিগের পক্ষে রস ৮ তোলা ও চূর্ণ চারি আনা। অল্প বয়স্কদিগের মাত্রা কম। বমন ও বিরেচনদ্বারা দেহ শুদ্ধ হইলে, রোগের প্রবল আক্রমণ রহিত ও রোগীর যত্নগার লাঘব হয়, বিশেষতঃ রোগ কদাপি মারাত্মক হইবার আশঙ্কা থাকে না।

এইরূপে বমন বিরেচন দ্বারা দেহ পরিশুদ্ধ হইলে, পরদিবস হইতে প্রত্যহ প্রাতে নিম্বাদি কাথ প্রয়োগ করিবে, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, ঐকাথে ভেউড়ী-চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। এইরূপ মধ্যে মধ্যে একবার বিরেচন দিলে, পরে উদরাময় হওয়ার আশঙ্কা থাকে না, এবং রোগও প্রবল হয় না। এই রোগে শৈত্যক্রিয়াও যেমন অপকারী, রুদ্ধক্রিয়াও তেমনি অপকারী। মাতিশীতোষ্ণ ক্রিয়া করিবে। এইরূপ চিকিৎসাক্রম অবলম্বন করিলে রোগ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না।

এই রোগে সময় সময় বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পায় ও তজ্জন্ত প্রলাপ, মুচ্ছা প্রভৃতি নানা উপসর্গ উপস্থিত হয়, তখন আবশ্যক হইলে অররোগোক্ত কস্তুরীভূষণ বা কস্তুরীভূষণ (মতান্তরে) প্রয়োগ করা যাইতে পারে। উপসর্গ উপস্থিত হইলে, মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিবে।

পিপাসা নিবারণের জন্ত গরম জলে যষ্টিমধু বা মোরী ভিজাইয়া ছাকিয়া সেই জল পান করিতে দিবে। অরুচি নিবারণের জন্ত আমরুল শাক কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণসহ সিদ্ধ করিয়া খাইতে দিবে অথবা পুরাতন আমসব্ব কিষা অতি পুরাতন অন্নরসবিহীন তেঁতুল অন্নপরিমাণে খাইতে দিবে। এই রোগে হাম বহির্গত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রায়ই দান্ত বন্ধ ও উদরাগ্নান বিজ্ঞমান থাকে, কিন্তু তাহাতে ভয়ের কোনই কারণ নাই। নিষাদিক্কাথ তেউড়ী-চূর্ণসহ পান করাইলেই ক্রমশঃ দান্ত খোলাসা হয় ও উদরাগ্নান হ্রাস পায়। পাতলা ভেদ হইলে, বাসাদিক্কাথ পান করিতে দিবে। এই রোগে অধিক শৈত্যক্রিয়া করা উচিত নয়, কারণ তাহাতে বৃকে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া শুষ্ক হইতে পারে, যদি ঐরূপে শ্লেষ্মা শুষ্ক হয় অথচ দান্ত পরিকার না থাকে, তবে যষ্টিমধু, বাসক ছাল, কিস্মিস ও মরিচ এই চারিটা দ্রব্যের কাথ পান করাইবে। আর যদি শ্লেষ্মা শুষ্ক ও অধিক দান্ত হয়, তবে যষ্টিমধু, পানের বোটা, মরিচ ও বাসকছাল ইহাদের কাথ পান করাইবে। শ্লেষ্মা তরল হওয়ার জন্ত বৃকে পুরাতন ঘৃত মাশিষ করিয়া পান একটু গরম করিয়া তদ্বারা শ্বেদ দিবে অথবা আদা, পান ও পেঁয়াজ এই তিনটি দ্রব্যের রস কাপড়ে ছাকিয়া একটু গরম করিয়া খাওয়াইয়া দিবে। ইহাতে সহজে শ্লেষ্মা তরল হইয়া খাসকষ্ট নিবারিত হয়। কাসের বেগ অত্যন্ত প্রবল হইলে চন্দ্রামৃতরস অথবা তালীশাদি চূর্ণ ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে জরের জন্ত পৃথক্ ঔষধের প্রায়ই আবশ্যকতা হয় না, কারণ উক্ত কাথ সেবনেই জ্বর ও অগ্নাশ্রয় সমস্ত উপসর্গ প্রশমিত হয়। হাম যতই বেশী পরিমাণে বহির্গত হয়, ততই মঙ্গল, রীতিমত বহির্গত না হইলে গরম জল ঠাণ্ডা করিয়া তাহাতে কাপড় ভিজাইয়া তদ্বারা সর্কাক মুছাইয়া দিবে। গা-মুছাইবার জন্ত তৈলাক্ত গামছা ব্যবহার করিবে না। নিষাদি কাথ প্রয়োগ করিলেই, সমস্ত ঐহী বহির্গত হয়, স্নতরাং হাম বসিয়া যাইবার আশঙ্কা

থাকে না । তদভাবে ভাজা মেথীর জল তিন বেলা ব্যবস্থা করিলেও উদ্দেশ্য-
সিদ্ধ হয় ।

রোমান্তীরোগে—ঔষধ ।

স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস । রোমান্তীরোগে গাবাথা ও অর প্রভৃতি প্রকাশ
পাইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায় । অহুপান—পানের রস ও মধু ।

স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস । প্রস্তুতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

কফচিন্তামণি । স্বল্পলক্ষ্মীবিলাসের পরিবর্তে এই ঔষধ প্রয়োগ করা
যায় । অহুপান—পান বা তুলসীপাতার রস ও মধু ।

কফচিন্তামণি । প্রস্তুতবিধি ১০৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

কস্তুরীভূষণ । হামসংযুক্ত অরে বিকার উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ
প্রয়োগ করা যায় ।—অহুপান—রুদ্রাক্ষরস ও মধু ।

কস্তুরীভূষণ । প্রস্তুতবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

নিষাদিকাথ । গুটা উদগত হইলেই এই কাথ প্রয়োগ করিবে ।
ইহা জ্বরাদি উপসর্গ নাশক ও অন্ন বিরেচক ।

নিষাদিকাথ । প্রস্তুতবিধি ১০৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বাসাদিকাথ । রোগীর উদরাময় প্রকাশ পাইলে, নিষাদির পরিবর্তে
এই কাথ ব্যবস্থা করিবে ।

বাসাদিকাথ । প্রস্তুতবিধি ৮২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

কুষ্ঠরোগ-চিকিৎসা ।

কুষ্ঠের প্রকারভেদ । কুষ্ঠ দুইপ্রকার, ক্ষুদ্রকুষ্ঠ ও মহাকুষ্ঠ ।

ক্ষুদ্রকুষ্ঠ ও মহাকুষ্ঠের প্রকারভেদ । মহাকুষ্ঠ সাত প্রকার ও
ক্ষুদ্রকুষ্ঠ একাদশ প্রকার, সূত্ররাং কুষ্ঠ সর্বসমেত অষ্টাদশ প্রকার ।

সপ্তপ্রকার মহাকুষ্ঠের লক্ষণ ।

১। চামড়ার উপর কিঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণ, দ্বৈব রক্তবর্ণ বা খাপরার আয় বর্ণ-
বিশিষ্ট অথচ ক্রমশঃ কৰ্কশ এবং অধিক বেদনায়ুক্ত যে কুষ্ঠ উৎপন্ন হয়,
তাহাকে কাপালকুষ্ঠ কহে । ইহা দৃষ্টিকিৎসা ।

২। যে কুষ্ঠ চর্ম্মের উপরিভাগে জন্মে এবং বজ্রদুগুরের আয় আকৃতিবিশিষ্ট,
রক্তবর্ণ, বেদনা ও কণ্ডুযুক্ত অথচ তাহার উপরিস্থ লোম কপিলবর্ণ, তাহাকে
ঐড়ুঘর কুষ্ঠ কহে ।

৩। যে কুষ্ঠ কিঞ্চিৎ শ্বেত ও দ্বৈব রক্তবর্ণ, কঠিন এবং আর্দ্রভাবাপন্ন,
যিদ্ধ অথচ উচ্চ ও মণ্ডলাকারে উত্থিত হইয়া পরস্পর সংলগ্ন হয়, তাহাকে
মণ্ডলকুষ্ঠ কহে । ইহা কষ্টসাধ্য ।

৪। যে কুষ্ঠে চর্ম্ম তাম্রবর্ণ বা লাউফুলের আয় শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট হয় এবং
অমূল্যদ্বারা ঘর্ষণ করিলে, বাহা হইতে গুলির আয় নির্গত হয়, তাহাকে
সিদ্ধকুষ্ঠ কহে । এই রোগ প্রায়শঃ বক্ষঃস্থলে উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহাও
একপ্রকার ছলী ।

৫। যে কুষ্ঠের মধ্যস্থল গুল্লী বা কুষ্ঠের আয় রক্তবর্ণ ও পার্শ্বদেশ কৃষ্ণবর্ণ
কিধা পার্শ্ব রক্তবর্ণ ও মধ্যভাগ কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট অথচ তীব্রবেদনায়ুক্ত এবং পাকে-
না, তাহাকে কাককুষ্ঠ কহে । ইহা ত্রিদোষের প্রকোপহেতু উৎপন্ন হয়
বলিয়া অসাধ্য ।

৬। যে কুষ্ঠে উল্লত চিহ্নসকল রক্তবর্ণের পাতার আয় মধ্যস্থলে শ্বেতবর্ণ
ও পার্শ্বে রক্তবর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহাকে পুণ্ডরীক কুষ্ঠ কহে ।

৭। যে কুষ্ঠের চিহ্নসকল ভন্নূকের জিহ্বার আয় আকৃতিবিশিষ্ট,
কৰ্কশ, বেদনামিত, মধ্যস্থল শ্যামবর্ণ ও পার্শ্বদেশ রক্তবর্ণ, তাহাকে ধাক্কজিহ্ব
কুষ্ঠ কহে ।

একাদশপ্রকার ক্ষুদ্রকুষ্ঠের লক্ষণ ।

১। যে কুষ্ঠে অধিকাংশস্থান হইতে মাছের আইসের আয় উল্লত হয়,
এবং রোগীর ঘর্ম্ম হয় না ; তাহাকে এককুষ্ঠ কহে ।

২। যে কুষ্ঠে গজচর্ম্মের ত্রায় চর্ম্ম স্থূল, ক্লক ও কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহাকে গজচর্ম্ম কুষ্ঠ কহে।

৩। যে কুষ্ঠে রক্তবর্ণ, বেদনা ও কণ্ডুযুক্ত এবং স্পর্শাসহ ক্ষোটিক উদ্গাত অথচ চর্ম্ম বিদীর্ণ হয়, তাহাকে চর্ম্মদলকুষ্ঠ কহে।

৪। যে কুষ্ঠে শ্রামবর্ণ, কণ্ডু বিশিষ্ট অথচ অত্যধিক আবগুক্ত পিড়কা উদ্গাত হয়, তাহাকে বিচর্জিকা কহে। বিচর্জিকা হস্তে ও পদে উৎপন্ন হয়।

৫। যে রোগে দাহবিশিষ্ট ও আবগুক্ত বহুসংখ্যক কণ্ডু বা কুহ্ন ক্ষুদ্র পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে পামা কহে। উক্ত পামা বৃহৎ আকারে উৎপন্ন হইলে এবং তাহাতে অত্যধিক দাহ থাকিলে, তাহাকে কচ্ছু কহে। পামা ও কচ্ছু একই রোগ, পামার আকার বৃহৎ হইলে কচ্ছু নামে অভিহিত হয়। পামা ও কচ্ছু হস্তদ্বয়ে ও নিতম্বদেশে বেশী পরিমাণে হয়।

৬। রক্তবর্ণ কণ্ডুযুক্ত পিড়কা মণ্ডলাকারে উৎপন্ন হইলে, তাহাকে দদ্রু কহে।

৭। যে কুষ্ঠে শ্রাম বা রক্তবর্ণ ক্ষোটিক উৎপন্ন হয় ও ঐ ক্ষোটিকের চর্ম্ম অত্যন্ত পাতলা হয়, তাহাকে বিক্ষোট কহে।

৮। যে কুষ্ঠে চর্ম্ম শ্রামবর্ণ, ধ্বংসস্পর্শ ও শুষ্ক ব্রণস্থানের ত্রায় কর্কশ ও ক্লক হয়, তাহাকে কটিম কুষ্ঠ কহে।

৯। যে কুষ্ঠে রক্তবর্ণ কণ্ডু দ্বারা আবৃত বৃহৎ ক্ষোটিক উৎপন্ন হয়, তাহাকে অলসক কুষ্ঠ কহে।

১০। যে কুষ্ঠে রক্ত বা শ্রামবর্ণ অথচ দাহবিশিষ্ট বহুসংখ্যক ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে শতাক্র কহে।

১১। হস্ততল ও পদতল ফাটিয়া সেই স্থানের চর্ম্ম ও মাংস কষ্টিন এবং বেদনাত্মক হইলে, তাহাকে বিপাদিকা কহে।

১২। ঋত্নকুষ্ঠ।

বিপাদিকাকে অনেকেই কুষ্ঠমণ্যো গণনা করেন না, সুতরাং ক্ষুদ্রকুষ্ঠ একাদশ প্রকার।

১. পুথাতুগত কুষ্ঠের লক্ষণ ।

রসগত কুষ্ঠ । রসধাতুগত কুষ্ঠে দেহের বিবর্ণতা, ক্লান্ততা, রোমাঞ্চ
অতিশয় বর্ষোৎসব ও চর্মের স্পর্শজ্ঞান রহিত হয় ।

রক্তগত কুষ্ঠ । রক্তধাতুগত কুষ্ঠে কণ্ডু ও পুথ উৎপন্ন হয় ।

মাংসগত কুষ্ঠ । মাংসগত কুষ্ঠে কুষ্ঠরোগের প্রাবল্য, মুখশোণ, দেহের
কর্কণতা, ক্ষুদ্র পিড়কার উৎপত্তি, হৃদী-বিদ্ধবৎ বেদনা ও স্থিরভাবাপন্ন ফোটক
উৎপন্ন হয় ।

মেদোগত কুষ্ঠ । মেদোগত কুষ্ঠে হস্তকম্প, অঙ্গভঙ্গ, গমনাগমনের
ব্যাঘাত ; সর্কাসে বেদনা ও ক্ষত হয় এবং ঐ ক্ষত সর্কশরীরে প্রসারিত হয়
অথচ রক্ত এবং মাংসগত কুষ্ঠের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

অস্থিগত কুষ্ঠ । অস্থিগত কুষ্ঠে নাসা-ভঙ্গ, চক্ষু রক্তবর্ণ এবং রোগীর
শরভঙ্গ হয়, পরন্তু ক্ষতস্থানে বেদনা ও পোকা জন্মে ।

মজ্জাগত কুষ্ঠ । মজ্জাগত কুষ্ঠের লক্ষণ অস্থিগত কুষ্ঠের স্থায় ।

শুক্রগত কুষ্ঠ । কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তির শুক্র অতিশয় দূষিত হইলে,
সেই দূষিত শুক্র হইতে যে সন্তান জন্মে, সেই সন্তানও কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া
থাকে । এই রোগে কুষ্ঠ শুক্রকে আশ্রয় করে বলিয়া জাত সন্তানেরও রস-
রক্তাদি ধাতুগত কুষ্ঠের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায় ।

কুষ্ঠরোগের বিশেষ লক্ষণ । কুষ্ঠরোগে বাতাদি দোষত্রয়ের মধ্যে
কোনটির প্রবলতাবশতঃ কিরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা সহজে নির্ণয়
করিবার কতকগুলি সঙ্কেত আছে ; যথা—কুষ্ঠরোগে বায়ুর প্রবলতাবশতঃ
কুষ্ঠ খরস্পর্শ, শ্রামবর্ণ বা রক্তবর্ণ অথচ ক্লঞ্চ ও বেদনাবিশিষ্ট হয় । পিত্তের
প্রবলতাবশতঃ কুষ্ঠ রক্তবর্ণ, দাহযুক্ত ও আবিশিষ্ট হয় । শ্লেষ্মার প্রবলতা-
বশতঃ কুষ্ঠ কণ্ডুযুক্ত ও গাঢ় বা ঘন রূপবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, গুরু ও শীতল হয় । এই-
রূপ দ্বিদোষজ কুষ্ঠে দুই দোষের মিলিত লক্ষণ এবং সাদ্বিপাতিক কুষ্ঠে
তিনদোষের মিলিত লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

কুষ্ঠরোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ । রসগত, রক্তগত, মাংসগত এবং

বাতশ্লেগ্নাধিক কুষ্ঠ সাধ্য। বাতশ্লেগ্নাধিক কুষ্ঠ অর্থাৎ সিদ্ধ, এককুষ্ঠ, গজচর্ম্ম, বিপাদিকা, কিটম ও অলসক। মেদোগত কুষ্ঠ ও দ্বন্দ্বকুষ্ঠ বাপ্য, মজ্জা ও অস্থিগত কুষ্ঠ অসাধ্য, সান্নিপাতিক কুষ্ঠরোগীর দাহ, অগ্নিমান্দ্য ও কুষ্ঠে কীট উৎপন্ন হইলে, তাহাও অসাধ্য।

কুষ্ঠরোগীর অরিফ্ট বা মৃত্যু-লক্ষণ। কুষ্ঠরোগীর অঙ্গ বিদীর্ণ হইয়া যদি পুণ্যাদি স্রাব হয় এবং চক্ষু রক্তবর্ণ ও স্বরভঙ্গ হয় অথচ বমনবিরচনা দিহারা কোন উপকার না হয়, তাহা হইলে সেই রোগীর মৃত্যু হয়।

শ্বিত্রের লক্ষণ। অগ্নাত কুষ্ঠ যেসকল কারণে উৎপন্ন হয়, শ্বিত্রকুষ্ঠও সেই সকল কারণে উৎপন্ন হয়। পার্থক্য এই—অগ্নাত কুষ্ঠ হইতে স্রাব হয়; কিন্তু এই কুষ্ঠ হইতে স্রাব হয় না। অগ্নাত কুষ্ঠ সান্নিপাতিক বা ত্রিদোষোৎপন্ন, কিন্তু শ্বিত্র বায়ু, পিত্ত ও কফ, এই তিনটি দোষ হইতে পৃথকরূপে উৎপন্ন। বায়ু, পিত্ত ও কফ, পৃথকরূপে রক্ত, মাংস ও মেদ এই ধাতুত্রয়কে আশ্রয় করিয়া শ্বিত্র উৎপাদন করে। কিলাস নামক কুষ্ঠ, শ্বিত্রের প্রকারভেদমাত্র। রক্তবর্ণ শ্বিত্রকে কিলাস কহে।

দোষ-ভেদে শ্বিত্রের লক্ষণ। বায়ুজনিত শ্বিত্র রুক্ষ ও রক্তবর্ণ। পিত্তজন্ম শ্বিত্র তাম্রবর্ণ, পদপাতার ছায়, দাহযুক্ত এবং লোমক্ষয়কারী। কফজন্ম শ্বিত্র শ্বেতবর্ণ, গাঢ়, গুরু ও কণ্ডুবিশিষ্ট হইয়া থাকে। বাতজন্ম-রক্তবর্ণ শ্বিত্র রক্তধাতুগত, পিত্তজন্ম তাম্রবর্ণ শ্বিত্র মাংসধাতুগত এবং কফজন্ম শ্বেতবর্ণ শ্বিত্র মেদোদাতুগত।

শ্বিত্র দুই প্রকার, যথা ;—দোষজ ও ব্রণজ। যাহা কেবলমাত্র বায়ু, পিত্ত ও কফ দূষিত হইয়া উৎপাদন করে, তাহা দোষজ এবং অগ্নিদগ্ধাদিব্রণ বা ক্ষত হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকে ব্রণজ কহে। এই উভয় প্রকার শ্বিত্রই বর্ণভেদে দোষাশ্রিত এবং রক্ত, মাংস ও মেদোগত হইয়া থাকে।

শ্বিত্রের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ। যে স্থানে শ্বিত্র জন্মে, সেই স্থানে অঙ্গ লোম থাকিলে এবং সেই সকল লোম কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হইলে, অথচ ঐ শ্বিত্র অধিক দিনের ও পরস্পর সংলগ্ন না হইলে এবং উহা অগ্নিদগ্ধজনিত ক্ষত হইতে যদি উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে, সাধ্য। ‘এতদ্ব্যতীত অন্তপ্রকার লক্ষণবিশিষ্ট শ্বিত্র অসাধ্য।

কিলাসনামক শ্বিত্রের অসাধ্য লক্ষণ । মলদ্বার, শিশ্ন, বোনি, হস্ত ও পদতল এবং ওষ্ঠজাত কিলাসনামক শ্বিত্র অল্পকালোৎপন্ন হইলেও, অসাধ্য ।

এক দেহ হইতে অন্য দেহে সংক্রমণ । কুষ্ঠ, জ্বর, যক্ষ্মা, চক্ষু-উঠা, এবং অশ্রুত উপসর্গিক (পাপরোগ যেমন ফিরঙ্গ, বিষাক্ত মেহ প্রভৃতি) রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সহিত মৈথুন, একত্র ভোজন, এক শয্যায় শয়ন অথবা এক আসনে উপবেশন করিলে, কিম্বা তাহাদিগের গাত্র সংস্পর্শ, নিঃশ্বাস-গ্রহণ অথবা তাহাদিগের ব্যবহৃত বস্ত্র, মালা বা অনুলেপন ব্যবহার করিলে, সেই সেই রোগ উৎপন্ন হয় । ঐ সকল রোগীর শুশ্রূষা সতর্কতার সহিত করা কর্তব্য ।

কুষ্ঠরোগ-চিকিৎসা-বিধি ।

বিরুদ্ধ অন্ন ও পানীয় (ক্ষীর, দধি বা দুগ্ধসহ মৎস্য বা মাংস একত্র ভক্ষণ), তরল, স্নিগ্ধ ও গুরুপাক দ্রব্য সেবন, বমন ও মলমূত্রাদির বেগ-ধারণ, ভোজনের পরেই অত্যন্ত ব্যায়াম (পরিশ্রম), অগ্নির উত্তাপ বা রৌদ্র সেবন, ঘর্ষাজ্ঞ, পরিশ্রান্ত ও ভয়াক্রান্ত হওয়ার পরেই শীতলজল পান, অপক অন্ন ভোজন বা অধ্যশন অর্থাৎ ভুক্তদ্রব্য পরিপাক না হইতেই পুনর্বার ভোজন, পক্ষকর্ম্ম (বমন, বিরেচন, নিরুহণ, অনুবাসন ও নস্ত) প্রয়োগের পর অপচার, নূতন-অন্ন, দধি, মৎস্য, লবণ, অন্নদ্রব্য, মাষকলায়, মূলা, পিষ্টক, তিল, দুগ্ধ ও শুষ্ক অত্যধিক ভোজন, ভুক্তদ্রব্যের বিদগ্ধাজীর্ণ অবস্থায় মৈথুন, দিবানিদ্রা, ব্রাহ্মণ ও গুরুজনের অপমান এবং অশ্রুত নানাপ্রকার পাপকার্য্যদ্বারা বায়ু, পিত্ত ও কফ এককালীন প্রকুপিত হইয়া ত্বক্, রক্ত, মাংস ও জলীয় ধাতুকে দূষিত করিয়া কুষ্ঠরোগ উৎপাদন করে ।

কুষ্ঠ অষ্টাদশপ্রকার, তন্মধ্যে মহাকুষ্ঠ সাতপ্রকার ও ক্ষুদ্র কুষ্ঠ একাদশ-প্রকার । কাপাল, উডুধর, মণ্ডল, সিংহ, কাকণ, পুণ্ডরীক ও ঋক্ষজিহ্ব এই কয়েকটিকে মহাকুষ্ঠ কহে এবং এককুষ্ঠ, গজচর্ম্ম, চর্ম্মদল, বিচচ্চিকা, বিপাদিকা, পামা, কচ্ছ, দন্দ্র, বিস্ফোট, ক্রিটিম ও অলসক ; এই কয়েকটিকে ক্ষুদ্রকুষ্ঠ কহে । সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগই ত্রিদোষোৎপন্ন, কিন্তু তন্মধ্যে আবার একটি বা দুইটি দোষের প্রাবল্য অনুসারে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, বাত-পৈত্তিক,

বাতশ্লেষ্মিক, পিত্তশ্লেষ্মিক এবং সান্নিপাতিকভেদে কুষ্ঠরোগ সাতভাগে বিভক্ত। বায়ুর প্রাবল্যে কাপাল, পিত্তাধিক্যে উড়ুঘর, শ্লেষ্মাধিক্যে মণ্ডল ও বিচর্চ্চিকা, বাতপিত্তাধিক্যে ঋক্ষজিহ্বর, বাতশ্লেষ্মাধিক্যে চর্মকুষ্ঠ, এককুষ্ঠ, কটিম, সিদ্ধ, অলসক ও বিপাদিকা, পিত্তশ্লেষ্মাধিক্যে দদ্রু, শতরু, পুণ্ডরীক, বিফোট, পামা ও চর্মদল এবং ত্রিদোষের আধিক্যে কাকণকুষ্ঠ জন্মে।

কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বে রোগাক্রান্ত স্থানের চর্ম নরুণ, রুক্ষ বা খরস্পর্শ, ঘর্মবিহীন, বিবর্ণ ও স্পর্শজান-রহিত অর্থাৎ অসাড় হয় এবং ঐস্থানে দাহ, কণ্ডু, হৃচীবিক্রবৎ বেদনা ও কোঠ (মণ্ডলাকার চিহ্ন) উৎপন্ন হয়, ত্রণ-সকল শীঘ্র উৎপন্ন, অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, ত্রণের অক্ষুরসকল অত্যন্ত রুক্ষ ও অল্প কারণেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং রোগীর ক্রান্তি, রোমাঞ্চ, ও রক্ত রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। অধিকাংশ চর্ম রোগেও ত্বকে বেদনা এবং কণ্ডু বা ত্রণ উৎপন্ন হইতে পারে, সুতরাং ঐ লক্ষণদ্বারা কুষ্ঠরোগ কিনা তাহা স্থির করা যায় না। যেস্থানে কুষ্ঠ উৎপন্ন হইবে, সেই স্থানের ত্বকের অসাড়তা বা স্পর্শশক্তি-রাহিত্য ও বিবর্ণতা প্রধান লক্ষণ, প্রায়শঃ এই দুইটি লক্ষণদ্বারা সহজে কুষ্ঠ রোগ নির্ণয় করা যায়।

লোকের সাধারণ বিশ্বাস যে কুষ্ঠ অনাধ্যরোগ, কখনও আরোগ্য হয় না। কুষ্ঠরোগ যে কঠিন বা দুর্ভারোগ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু তন্মধ্যে কতকগুলি এক্রপণ্ড আছে যে, সহজে আরোগ্য হয়, আর কতকগুলি দুর্ভারোগ্য অতিকষ্টে আরোগ্য হয়। কুষ্ঠ সম্বন্ধে যাহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা অবশ্যই অবগত আছেন, কুষ্ঠরোগমাত্রই অসাধ্য নহে। এতদেশে কতিপয় কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার বিষয়গী পাঠ করিলেও একধার বাধার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে।

চিকিৎসা-সংক্ষেপ। যে কোনপ্রকার কুষ্ঠই হউক না কেন, তাহা বাতাদি কোন দোষোৎপন্ন প্রথমন্তঃ নির্ণয় করা উচিত। বায়ুর প্রকোপে উৎপন্ন কুষ্ঠে আক্রান্ত স্থান খরস্পর্শ, রুক্ষ, গ্রামবর্ণ বা রক্তবর্ণ এবং হৃচীবিক্রবৎ বেদনায়ুক্ত হয়, পিত্তের প্রকোপে উৎপন্ন হইলে, আক্রান্ত স্থান রক্তবর্ণ, বেদনা ও দাহযুক্ত হয় এবং তাহাতে উৎপন্ন কুষ্ঠ হইতে পুষ্ণ শ্রাব হয়, শ্লেষ্মার প্রকোপে উৎপন্ন হইলে, আক্রান্তস্থান দেখিতে চক্চকে, কণ্ডুযুক্ত ও ঐ কণ্ডু-

হইতে গাঢ় শুষ্কবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এইরূপ বাতশৈথিল্য কুষ্ঠে বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ লক্ষণ, বাতশৈথিল্য কুষ্ঠে বাত ও শ্লেষ্মার প্রকোপ লক্ষণ, পিত্তশৈথিল্য কুষ্ঠে পিত্তশ্লেষ্মার প্রকোপ লক্ষণ এবং সান্নিপাতিক কুষ্ঠে ত্রিদোষের প্রকোপ লক্ষণ প্রকাশ পায় । কুষ্ঠাক্রান্ত স্থানে বেরূপ বাতাদি-
দোষের প্রকোপ লক্ষণ প্রকাশ পায়, তদ্রূপ শরীরেও প্রকাশ পায় ও তজ্জন্ত শরীর বাতাদিক, পিত্তাদিক ও শ্লেষ্মাদিক হয়, বাতাদিক্যে শরীর অত্যন্ত রুক্ষ, পিত্তাদিক্যে অস্ত্রদাহ ও শ্লেষ্মাদিক্যে শরীর ভায়বৃত্ত হয় । এই সকল লক্ষণ-
দ্বারা রোগ সহজে নির্ণয় করা যায় । কুষ্ঠ রোগতই হউক বা রক্ত কিম্বা মাংসগতই হউক, রোগারম্ভক বাতাদি দোষের প্রকোপ লক্ষণ অবশ্যই প্রকাশ পাইবে ।

বমনবিরেচন । কুষ্ঠরোগে বমনবিরেচন দ্বারা প্রথমতঃ দেহ শুদ্ধ-
করা একান্ত প্রয়োজন । বমনবিরেচনের জন্ত বসন্ত রোগোক্ত ক্রম অবলম্বন
করিবে ।

বমন বিরেচনদ্বারা দেহ শুদ্ধ হইলে, স্থানিক ও আন্তর্যমুখিক উভয়প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত । এইরূপ ঔষধ প্রয়োগে রোগ বর্জিত হইতেত
পারেই না, পরন্তু স্থানিক রোগ ও উপসর্গ ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আইসে, সঙ্গে
সঙ্গে শরীরও ক্রমশঃ সূস্থ হইতে থাকে । একবেলা কাথ, একবেলা ঘটিকা ও
একবেলা গুণ্ণুলু ব্যবস্থা করিলেই যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়, এমন কি
অনেকস্থলে রোগ একবারে আরোগ্য হইয়া থাকে । এই রোগে যে
কাথ ব্যবস্থা করা যাইবে, রুগ্ন স্থানে ক্ষত থাকিলে ঐ কাথ দিগুণ মাত্রার
প্রস্তুত করিয়া অর্দ্ধেক প্রত্যহ প্রাতে পান ও অর্দ্ধেকদ্বারা ক্ষতধোত করিতে
দিবে । ক্ষত ধোত করা হইলে, একটি প্রলেপ যোজন্য করিয়া ক্ষতস্থান
বান্ধিয়া রাখিবে কিম্বা বান্ধিয়া রাখা অসম্ভব হইলে, তৈলে তুলা ভিজাইয়া
সেই তুলা ক্ষতস্থানে যোজন্য করিবে এবং তৈল শুকাইয়া গুলে পুনর্বার
তুলি দ্বারা ঐ তৈল লাগাইবে ; ফলতঃ ক্ষতস্থান একেবারে খোলা রাখিবে না
এবং তৈল শুষ্ক হইলেই পুনর্বার ভিজাইয়া দিবে । কুষ্ঠরোগের প্রারম্ভে বা
যাবৎ ক্ষত না হয়, তাবৎ কাথ দ্বারা ধোত না করিয়া রুগ্নস্থানে কেবলমাত্র
তৈল মর্দন করিবে ।

বাতিক ও বাতপৈত্তিক গলংকুষ্ঠে ক্ষত হইতে স্রাব হইলে, দেবদারুলেপ, পটোলাদিকাথ এবং অমৃতাগুগ্‌গুলু, কৈশোরগুগ্‌গুলু বা ত্রিফলাগুগ্‌গুলু প্রয়োগ করিবে। পৈত্তিক ও পিত্তশ্লেষ্মিক গলংকুষ্ঠে ক্ষত হইতে রুদ্র বা রস নির্গত হইলে, কুষ্ঠাদি লেপ, খদিরাষ্টক কাথ, অমৃতাগুগ্‌গুলু বা রসান্ধগুগ্‌গুলু এবং নিম্বাদিচূর্ণ ও গলংকুষ্ঠারিস প্রয়োগ করিবে। শ্লেষ্মিক ও বাতশ্লেষ্মিক কুষ্ঠে তাললেপ, খদিরাষ্টককাথ, কৈশোরগুগ্‌গুলু ও বিম্বেররস প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক কুষ্ঠে ক্ষত হইতে নানাবর্ণের রুদ্র ও রস নির্গত হইলে, বিড়ঙ্গাদি লেপ, মঞ্জিষ্ঠাদি বা বৃহৎ মঞ্জিষ্ঠাদি কাথ, কৈশোরগুগ্‌গুলু ও মাণিক্যরস প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। বিম্বেররস, গলংকুষ্ঠারিস, মাণিক্যরস এবং কুষ্ঠকালানলরস সর্বদা ব্যবহার্য ঔষধ। কুষ্ঠরোগে-বাতাদি দোষের বিচারনা করিয়াও এই সকল ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। এইরূপ তাল-ভস্ম, মহাতালেধররস, পঞ্চনিম্ব, পঞ্চনিম্ব (মতাস্তরে), অমৃতাঙ্গুর-লৌহ ও পঞ্চতিক্তয়ুত গুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ সর্বপ্রকার কুষ্ঠে সর্বদা ব্যবহার্য। এতদ্ব্যতীত গর্জনতৈল, তুবরকতৈল ও নিমের তৈল পান ও মর্দনে সর্বপ্রকার কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়। লক্ষাদিবারা বাতাদি দোষের প্রকোপ-লক্ষণ স্থির করিতে না পারিলে, ঐ সকল ঔষধ প্রয়োগ করিলেও চলে। ইচ্ছা-সত্ত্বেও নানা কার্য্যানুরোধে যাহাদের ঔষধ সংগ্রহ করিবার অবসর নাই বা ততটুকু ক্লেশ স্বীকার করিবার ইচ্ছা নাই, তাহাদের পক্ষে উক্ত তিনপ্রকার তৈলের মধ্যে একটি ব্যবহার করিলেই চলিতে পারে। গর্জনতৈল বেণে দোকানে পাওয়া যায়, তুবরকতৈল বা চাউলমুগরার তৈল ও নিমের তৈল উভয়ই ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। তুবরকতৈলের মাত্রা প্রভৃতি ৮৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। তুবরকতৈল কুষ্ঠরোগে—বিশেষতঃ ফিরঙ্গজনিত কুষ্ঠে মহোপকারী, পুনঃ পুনঃ উহার ফল প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। উহার কোন-একটি তৈলপানের সঙ্গে সঙ্গে বাতাদিদোষ ভেদে অথ কোন তৈল শরীরে বা ব্যাধিতস্থানে মর্দন করিলেও চলে। বাতপ্রধান কুষ্ঠে বাতরক্তোক্ত বিষতিলুক তৈল, পিত্তপ্রধান কুষ্ঠে সোমরাজী বা বৃহৎ সোমরাজী তৈল এবং শ্লেষ্মপ্রধান কুষ্ঠে বৃহৎ মরিচাদি তৈল রুগ্ন স্থানে ও সর্বাস্থে মাশিশের ব্যবস্থা করিবে।

কুষ্ঠরোগে তৈল দ্বত প্রয়োগে অসাধারণ উপকার হয়, রোগের মূলোচ্ছেদ-
করিতে তৈল দ্বতের শক্তি অসাধারণ । কুষ্ঠে, বায়ু বা পিত্তের প্রকোপ
দৃষ্ট হইলে, তৈল দ্বত প্রয়োগ নিতান্ত প্রয়োজন । বাতিক, পৈত্তিক ও
বাতপৈত্তিক কুষ্ঠে সোমরাজী তৈল বা বৃহৎ সোমরাজীতৈল ও মহাতিক্তদ্বত ;
শ্লেষ্মিক, পিত্তশ্লেষ্মিক ও বাতশ্লেষ্মিক কুষ্ঠে বৃহৎ মরিচাদি তৈল বা বিষতিলক-
তৈল ও পঞ্চতিক্ত দ্বত গুগ্গুলু ; বাতিক, শ্লেষ্মিক, বাতশ্লেষ্মিক, পিত্তশ্লেষ্মিক
ও সান্নিপাতিক কুষ্ঠে মহাপিণ্ডতৈল, রুদ্রতৈল বা মহারুদ্রতৈল ও পঞ্চতিক্ত-
দ্বত গুগ্গুলু যথাক্রমে মর্দন ও পানের ব্যবস্থা করিবে । পৈত্তিককুষ্ঠে
অাবশ্যক হইলে, মালিশের জন্য বৃহৎ গুড়ুচ্যাতি তৈল ও পানের জন্য পঞ্চ-
তিক্ত দ্বত প্রয়োগ করা যায় । কুষ্ঠরোগে ত্রণ হইতে ক্রৈদ নির্গত হইলে,
বিষ্যন্দনতৈল তুলি দ্বারা লাগাইবে ।

সোমরাজী তৈল ২০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । বৃহৎ সোমরাজী তৈল ২০১ পৃষ্ঠায়
দ্রষ্টব্য । বৃহৎ মরিচাদিতৈল ৮৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । গজর্নতৈল ও নিমেরতৈলের
মাত্রা প্রভৃতি ভূবরক তৈলের ন্যায় । মহাতিক্তদ্বত ৪১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । পঞ্চ-
তিক্তদ্বত ৪৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । পঞ্চতিক্তদ্বত গুগ্গুলু ৭০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।
বিষতিলক তৈল ৭২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । মহারুদ্রতৈল ৭০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । বৃহৎ
গুড়ুচ্যাতি তৈল ৪১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । রুদ্রতৈল ৭০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । বিষ্যন্দন-
তৈল ২০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । ফিরঙ্গরোগে ভূবরক তৈলের প্রয়োগ প্রণালী দ্রষ্টব্য ।

এইরূপ আরও কতকগুলি প্রসিদ্ধ তৈল দ্বত কুষ্ঠরোগে সমধিক উপ-
কারী । পৈত্তিক বা পিত্তশ্লেষ্মিক কুষ্ঠে সোমরাজীদ্বত, বাতিক, পৈত্তিক,
শ্লেষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লেষ্মিক, পিত্তশ্লেষ্মিক ও সান্নিপাতিককুষ্ঠে মহা-
ধদিরাদি দ্বত, বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক কুষ্ঠে বাসারুদ্রতৈল,
বাতিককুষ্ঠে কুষ্ঠকালানল তৈল, শ্লেষ্মিককুষ্ঠে মরিচাদিতৈল, বিষতৈল বা কুষ্ঠ-
রাক্ষসতৈল প্রয়োগ করা যায় ।

এককুষ্ঠ । এই রোগ একটু কঠিন, সহজে আরোগ্য হয় না । বিগুহ
গন্ধকচূর্ণ সরিষার তৈলে মিশ্রিত করিয়া হৃদয়ের উত্তাপে পাক করিবে । এই
তৈল মর্দনে অনেক সময় রোগ আরোগ্য হয় । যদি উহাতে ফল না হয়,
তাহা হইলে মরিচাদিতৈল বা বিষতৈল মালিশের ব্যবস্থা করিবে এবং

সেবনের জ্ঞা পঞ্চনিষ ব্যবস্থা করিবে । কুষ্ঠ রক্তদুষ্টিজনিত হইলে, চাউলমুগরার তৈল প্রয়োগ করিবে ।

গজচর্ম ও কিটিম । দ্রু, চর্মকুষ্ঠ ও কিটিম প্রায় একই জাতীয়-পীড়া এবং একই ঔষধে আরোগ্য হয় । দ্রুরোগে যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করা হইল, তদ্বারাই চর্মকুষ্ঠ ও কিটিম আরোগ্য হয় । যদি ঐ সকল প্রলেপে না সারে, তাহাহইলে, মরিচাদি বা বৃহৎ মরিচাদিতৈল মর্দন করিতে দিবে । দ্রু এবং চর্মকুষ্ঠ ও কিটিমের পার্থক্য এই—দ্রু মণ্ডলাকাররূপে সীমাবদ্ধস্থানে উৎপন্ন হয় ও ঘামাচির আয় কণ্ডুযুক্ত হয়, কিন্তু চর্মকুষ্ঠ যেস্থানে উৎপন্ন হয়, সেস্থানের চামড়া হস্তীর চামড়ার আয় পুরু, ঋষ্মসে ও ক্লম্বর্ণ দৃষ্ট হয় এবং কিটিম যেস্থানে উৎপন্ন হয়, সেস্থানের চামড়া শ্যামবর্ণ, ঋষ্মসে অথচ পাতলা দৃষ্ট হয়, হস্তি চর্মের আয় পুরু হয় না । সেবনের জ্ঞা পঞ্চনিষ প্রয়োগ করা যাইতে পারে । রক্তদুষ্টিজনিত হইলে চাউলমুগরার তৈল প্রয়োগ করিবে । গজচর্মকুষ্ঠের অপর নাম চর্মকুষ্ঠ ।

বৈপাদিক । এই রোগে হাত ও পায়ের তলা ফাটিয়া যায় এবং সেই ফাটা স্থানের চর্ম ও মাংস কঠিন ও বেদনাবিশিষ্ট হয় । এই রোগে ধনা, সৈন্ধব লবণ, গুড়, মধু, ঘৃত ও মোম একত্র পাক করিয়া আঠার মত হইলে নামাইয়া তদ্বারা প্রলেপ দিবে । রক্তদুষ্টিজনিত হইলে চাউল-মুগরার তৈল ও মোম একত্র গলাইয়া প্রয়োগ করিবে ।

চর্মদল কুষ্ঠ । ইহাতে মহারুদ্রতৈল বা বিষতৈল লাগাইবে ও শীত-পিত্ত রোগোক্ত অমৃতাদি কাথ সেবন করিতে দিবে । রক্তদুষ্টিজনিত হইলে, চাউলমুগরার তৈল প্রয়োগ করিবে ।

বিস্ফোট, অলসক ও শতাক নামক কুষ্ঠের চিকিৎসা চর্মদলকুষ্ঠের আয় করিবে ।

বিচর্চিকা । এই রোগ জাম্বুদেশে বা হাঁটুর নিম্নে উৎপন্ন হয় । কদাচিৎ হাতে কনুয়ের নিম্নেও হইয়া থাকে । বিচর্চিকার প্রচলিত নাম "বিকাচ বা কাউরের ঘা । ইংরাজীতে ইহাকে এক্জিমা কহে । এই রোগে শ্যামবর্ণ ও ঘনসন্নিবিষ্ট ছোটবড় পিড়কা উৎপন্ন হয় । ঐ পিড়কা অত্যন্ত

চুল্‌কায় এবং চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে রস নির্গত হয় ও কণ্ডুগুলি পাকে, পাকিলে স্থল স্থল বহু ছিদ্রযুক্ত হয়। বিচর্চিকা বালক, যুবা ও বৃদ্ধ সকলেরই জন্মে, বর্ষাকালে অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং শরৎ ও হেমন্ত ঋতুর সমাগমে কমিতে আরম্ভ করে ও শীতকালে প্রশমিত হয়, আবার শীতাগমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা ফিরঙ্গরোগ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে, চাউলমুগরার তৈল ও গন্ধকচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ফিরঙ্গজনিত না হইলে, চিতল মাছের আইস্ অস্ত্র্‌মে দ্রব করিয়া তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে কিম্বা গর্জনতৈল বা আল্‌কাতরার সহিত গন্ধক চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। আল্‌কাতরা আঙুণে গরম করিয়া পাতলা করিয়া লইতে হয়। প্রলেপ যোজনা করিয়া কলার নরম পাতা বা পান-পাতা দ্বারা বান্ধিয়া রাখিবে। এই রোগে মরিচাদি ও বৃহৎ মরিচাদিতৈল ব্যবস্থা করিয়া দেখা গিয়াছে, রোগ নিস্কূল হয় না। উক্ত তৈল প্রয়োগ করিলে পিড়কাগুলি পাকিয়া উঠে, বেদনা বেশী হয়, তৎপরে রস নির্গত হয়, এবং একটু নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও কণকিৎ প্রশমিত হয় মাত্র। সেবনের জ্ঞান পক্ষনিম্ন উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পামা, কচ্ছ ও পাচড়া। বাঙ্গালায় যাহাকে চুলকণা কহে, স স্কতে তাহাই পামা নামে অভিহিত, উহাই একটু বড় আকারের হইলে আবার কচ্ছ-নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কচ্ছর প্রচলিত নাম খোস্। খোস্ পাকিয়া রস নির্গত হইলে তাহাকে পাচড়া কহে। পামা ও কচ্ছ উভয়ই হস্তদ্বয়ে ও নিতম্বদেশে বাহুল্যরূপে উদ্গত হয়। পামা ও কচ্ছরোগে শীতপিত্ত-রোগোক্ত দুর্লাদি লেপ, আমলাদি বোণ, সিদ্ধার্থলেপ এবং অমৃতাদি কাথ ও হরিদ্রাখণ্ড উপকারী। কচি নিমগ্নতা ও কাঁচা হলুদ সমভাগে বাটিয়া লেপন করিলেও রোগ সারে। রোগ বেশী দিনের হইলে, উক্ত কাথ প্রয়োগ করা আবশ্যক। পাচড়া হইলে, সরিষারতৈল ও মোম একত্র গলাইয়া তাহাতে বিস্তৃত গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মলমের আয় লাগাইবে। যদি উহাতে না সারে বা পাচড়া হইতে বেশী রস নির্গত ও তাহার উপর পচলা সঞ্চিত হয়, তাহা হইলে, চূর্ণ এক ভাগ, তুঁতেপোড়া এক ভাগ ও বিস্তৃত-

গন্ধকচূর্ণ এক ভাগ একত্র করিয়া তৈলের সহিত মিশাইয়া লেপন করিবে । রক্তদৃষ্টিজনিত হইলে, ইহাতে নাও সারিতে পারে, তখন ঐ দুই পদ ঔষধে তৈলের পরিবর্তে চাউলমুগরার তৈল মিশাইয়া মলম প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে ।

দ্রুত । যাহাকে বাঙ্গালায় দাদ কহে, তাহাই সংস্কৃতে দ্রুদ নামে খ্যাত । ইহাও ক্ষুদ্র কুষ্ঠমধ্যে গণ্য । এরোগ সর্বসাধারণের পরিচিত । ইহা চামড়ার উপরে মণ্ডলাকারে উত্থিত হয় ও মণ্ডলাকার চিহ্নের মধ্যবর্তীস্থান বামাচির আয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্ডুযুক্ত হয়, কণ্ডুগুলি সময় সময় চুলকায় এবং তাহা- হইতে রস নির্গত হয় । দ্রুদ দেখিতে রক্ত বা শ্রামবর্ণ । বিত্তল গন্ধকচূর্ণ ও গর্জনতৈল একত্র করিয়া লাগাইলে দ্রুদ বিনষ্ট হয় । দ্রুদরোগে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইলে, একটি বিষয় স্মরণ রাখা উচিত । একবার ঔষধ প্রয়োগেই দাদ আরোগ্য হয় না, কয়েক দিনের জন্ত যাপ্য থাকে মাত্র, কিছুকাল পরে আবার দেখা দেয় ; সুতরাং পুনর্ব্বার প্রকাশ পাইবামাত্রই ঔষধ প্রয়োগ একান্ত আবশ্যক, এইরূপে উপর্য্যুপরি ২০ বার ঔষধ প্রয়োগ করিলেই রোগ একবারে আরোগ্য হয় । যাহাদের বিশ্বাস এরোগ একবারে সারে না, তাঁহারা ঐ নিয়মে ঔষধ ব্যবহার করিলেই একবার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন । গর্জনতৈল, চাকুন্দেবীজ ও কালকাসুন্দেবীজ একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে অথবা চাকুন্দেবীজ, কুড়, সৈন্ধবলবণ, শ্বেতসর্ষপ ও বিড়ঙ্গ বাটিয়া লেপন করিলে কিম্বা কেবলমাত্র সোন্দালপাতা ও সোমরাজী-বীজ কাঁজিতে বাটিয়া লেপ দিলে দাদ আরোগ্য হয় । এতদ্ব্যতীত কাল-কাসুন্দে পাতার রস ও চাকুন্দে পাতাররস সমভাগে লইয়া তৎসহ সোহাগার-থে ও গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে দ্রুদ সারে ; তুলসীপাতা ও সৈন্ধব একত্র রগড়াইয়া লাগাইলেও দ্রুদ সারে ।

ছুলী বা সিদ্ধকুষ্ঠ । চন্দনঘসা, সোমরাজীবীজ, চাকুন্দেপাতা ও কাল-কাসুন্দে পাতা সমভাগে বাটিয়া প্রলেপ দিবে কিম্বা ২ ভাগ চন্দনঘসা ও ১ ভাগ বিত্তল হরিতালঘসা ছাগলের মূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে অথবা আপাং পাতার রসদ্বারা মুলারবীজ পেষণ করিয়া লাগাইবে ।

শ্বিত্রকুষ্ঠ । বাঙ্গালায় যাহাকে ধবল বা শ্বেতী কহে, তাহাই সংস্কৃতে

শিথ্রকুষ্ঠ নামে অভিহিত ।* কুষ্ঠ ও শিত্রের চিকিৎসা একই । কোন অঙ্গ আঙুণে দক্ষ হইলে, তাহা হইতেও শিথ্র উৎপন্ন হয় । বিদুন্ধ হরিতাল এক ভাগ ও সোমরাজীবীজ ৪ ভাগ একত্র করিয়া গোমূত্রে মর্দন পূরক প্রলেপ দিবে । কুঁচ ও রক্তচিটার মূল সমভাগে জলদ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিবে । কেবল রক্তচিটার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলেও শিথ্র নষ্ট হয় । চিতামূল ফোঁকা-কারক, কিন্তু খুব পাতলা করিয়া প্রলেপ দিলে এবং উপযুক্তপরি তিন দিন প্রয়োগ করিয়া তিন দিন বন্ধ করিলে ফোঁকা হয় না, ফোঁকা হইলে তাহাতে ভয়ের কারণ নাই । ফোঁকা উঠিয়া যা হয় এবং রোগ আরোগ্য হয় । চিতামূল বা আকন্দকীরের প্রলেপ দিলে, সেইস্থানে কদাচ জল লাগাইবে না । ঐ স্থান কাপড়ে আবৃত করিয়া স্নান করা উচিত । সৈন্ধবলবণ আকন্দের কীরে বাটিয়া লেপন করিলেও বিশেষ উপকার হয় । মুখে হইলে বিদুন্ধ গন্ধক, চিতামূল, হীরাকস, হরিতাল এবং হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার ছাল সমানভাগে লইয়া জলে বাটিয়া প্রলেপ দিবে । যে সকল কুষ্ঠ হইতে রস স্রাব হয়, তদ্ব্যতীত অগ্নাত্ত কুষ্ঠ প্রলেপ দিতে হইলে, ডুমুর পাতা বা বলাড়ুমুর পাতা-দ্বারা রোগাক্রান্তস্থান ঘর্ষণ করিয়া পশ্চাৎ প্রলেপ লাগাইবে । এই রোগে সেবনের অগ্ন পঞ্চনিষ উৎকৃষ্ট ঔষধ । অম্বুপান—ঘৃত ও মধু । এতদ্ব্যতীত গলংকুষ্ঠারি রস, খেতারি এবং কুষ্ঠকালানলরস নিমছালের কাথসহ প্রয়োগ করা যায়, মালিশের অগ্ন মরিচাদিতৈল, বৃহৎ মরিচাদিতৈল, কুষ্ঠরাক্ষসতৈল, কুষ্ঠকালানলতৈল, সোমরাজীতৈল বা বৃহৎ সোমরাজীতৈল বাতাদিদোষ-ভেদে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, কিন্তু উক্ত প্রলেপ অগ্রে প্রয়োগ করা উচিত, কারণ প্রলেপ দ্বারা রোগ আরোগ্য হইলে, অগ্ন ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় না ।

কুষ্ঠরোগে-ঔষধ ।

দেবদারুলেপ । বাতিক ও বাতপৈত্তিক কুষ্ঠে ক্ষতস্থান হইতে ক্লেদ বা রস নির্গত হইলে এবং ত্রণে হৃচিবিদ্ধবৎ বেদনা ও ক্লম্বতা প্রকাশ পাইলে, পটোলাদি কাথদ্বারা ক্ষত ধোত করিয়া এই লেপ লাগাইবে ।

দেবদারুলেপ । দেবদারু, খয়ের, নিমগাভা, বিড়ঙ্গ ও করবীযুক্তের মূলের ছাল, প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দন করিয়া প্রলেপ দিবে ।

কুষ্ঠাদিলেপ । পৈত্তিক ও পিত্তশ্লেষ্মিক কুষ্ঠে ক্ষতস্থানে অত্যধিক দাহ প্রকাশ পাইলে, এবং ক্ষত হইতে পীতবর্ণের ক্লেদ ও রস নির্গত হইলে, খদিরাষ্টক কাথদ্বারা ক্ষত ধৌত করিয়া এই লেপ তাহাতে লাগাইবে ।

কুষ্ঠাদি লেপ । কুড়, চাকুন্দে বীজ, কালকান্দে বীজ ও ডহরকরঞ্জ বীজ প্রত্যেকে সম-ভাগ, জলে মর্দন করিয়া প্রলেপ লাগাইবে ।

তাললেপ । শ্লেষ্মিক ও বাতশ্লেষ্মিক কুষ্ঠে ক্ষত হইতে পাণ্ডু বা খেত-বর্ণের ক্লেদ নির্গত হইলে, এই লেপ ক্ষতস্থানে লাগাইবে । অগ্রে খদিরাষ্টক কাথদ্বারা ক্ষত ধৌত করিয়া পশ্চাৎ প্রলেপ লাগাইবে ।

ভাললেপ । হরিতাল, মনঃশিলা ও মরিচ ; প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দন করিয়া প্রলেপ লাগাইবে ।

বিড়ঙ্গাদিলেপ । সাম্প্রপাতিক কুষ্ঠে ক্ষত হইতে নানাবর্ণের ক্লেদ নির্গত হইলে, মঞ্জিষ্ঠাদি বা বৃহৎ মঞ্জিষ্ঠাদি কাথদ্বারা ক্ষত ধৌত করিয়া এই লেপ লাগাইবে ।

বিড়ঙ্গাদি লেপ । বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, হরীতকী, সোমরাজী বীজ, খেতিসর্বপ, ডহরকরঞ্জ বীজ ও হরিদ্রা প্রত্যেকে সমভাগ ; জলে মর্দন করিয়া প্রলেপ লাগাইবে ।

পটোলাদি কাথ । বাতিক ও বাতপৈত্তিক কুষ্ঠে ক্ষত হইতে ক্লেদাদি নির্গত হইলে, রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে এই কাথ পান করিতে দিবে ।

পটোলাদি কাথ । পোলতা, খয়ের, নিমছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কালিয়ালতা (কেলেকড়া) ও কটকী, সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

খদিরাষ্টক । পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, পিত্তশ্লেষ্মিক ও বাতশ্লেষ্মিক কুষ্ঠে ক্ষত হইতে লক্ষণানুযায়ী ক্লেদাদি নির্গত হইলে, রোগীকে এই কাথ প্রত্যহ প্রাতে পান করিতে দিবে ।

খদিরাষ্টক । প্রস্তুতবিধি ১০২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

মঞ্জিষ্ঠাদি কাথ । সাম্প্রপাতিক গলংকুষ্ঠে ক্ষত হইতে নানাবর্ণের স্রাব নির্গত হইলে, রোগীকে এই কাথ প্রত্যহ সকালে পান করাইবে ।

মঞ্জিষ্ঠাদি কাথ । মঞ্জিষ্ঠা, সোমরাজী বীজ, চাকুন্দে বীজ, নিমছাল, হরীতকী, হরিদ্রা,

আমলকী, বাসকছাল, শতমূলী, বেড়েলা, গোক্ষরচাকুলে, যষ্টিমধু, গোছুর, পোলতা, বেণার মূল, গুলঞ্চ ও রক্তচন্দন প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

বৃহৎ মঞ্জিষ্ঠাদি ক্কাথ । সান্নিপাতিক কুষ্ঠে ক্ষত হইতে নানাবর্ণের স্রাব নির্গত হইলে, রোগীকে এই ক্কাথ প্রত্যহ প্রাতে পান করাইবে ।

বৃহৎ মঞ্জিষ্ঠাদি ক্কাথ । মঞ্জিষ্ঠা, কুড়ী ছাল, গুলঞ্চ, মুখা, বচ, শুঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কটকারী, নিমছাল, পোলতা, কটকী, বামনহাটী, বিড়ঙ্গ, চাকুলেন্দ্রীক, স্থচীমুখী, দেবদারু, ইন্দ্রবর, ভীষ্মরাজ, পিপুল, বলাড়মুর, আকনাদি, শতমূলী, খয়ের, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তিরতা, খোড়ানিমের ছাল, শালছাল, সোন্দালের আঠা, প্রিয়ঙ্গু, দোমরাজীকীক, রক্তচন্দন, বরুণছাল, দন্তীমূল, শেওড়াছাল, বাসকছাল, ক্ষেপাপুড়া, অনন্তমূল, আতৈন, হরালভা, রাখালশশার মূল ও বালা প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২১ তোলা, জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা ।

অমৃতগুগ্গলু । বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লেষ্মিক ও সান্নিপাতিক কুষ্ঠে ক্ষতস্থানে দাহ, পকতা, কণ্ডূতা ও স্পর্শ শক্তির অভাব প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এবং ক্ষত হইতে লক্ষণানুযায়ী নানাবর্ণের স্রাব নির্গত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে সেবন করিতে দিবে ।
অমুপান—গরম দুগ্ধ ।

অমৃতগুগ্গলু । প্রস্তুতবিধি ১০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

কৈশোরগুগ্গলু । বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লেষ্মিক ও সান্নিপাতিক কুষ্ঠে ক্ষতস্থানে দাহ, পকতা, কণ্ডূতা থাকিলে ও ক্ষত প্রকাশ এবং তাহা হইতে নানাবর্ণের স্রাব নির্গত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে সেবন করিতে দিবে । ইহা দ্বারা শীঘ্র দাহ ও স্রাবাদি উপসর্গ প্রশমিত হইয়া থাকে । কুষ্ঠরোগে ইহার আয় উপকারী ঔষধ বিরল ।
খিত্রকুষ্ঠেও ইহা অতি উপকারী । অমুপান—গরম দুগ্ধ ।

কৈশোরগুগ্গলু । প্রস্তুতবিধি ১০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

ত্রিফলাগুগ্গলু । সান্নিপাতিক কুষ্ঠে বাত ও পিত্তের প্রবল প্রাকোপ দৃষ্ট হইলে কিম্বা, বাতিক ও বাতপৈত্তিককুষ্ঠে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে । ইহা প্রয়োগে কুষ্ঠজনিত ক্ষত হইতে রক্তাদি নিঃসরণ বন্ধ অথচ

ক্রমস্থানের দাহ, বেদনা ও পকতা প্রভৃতি উপসর্গ সমূহ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

ত্রিকলাগুগ্ণু । প্রস্তুতবিধি ১০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

নিম্বাদিচূর্ণ । পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক ও পিত্তশ্লেষ্মিক কুষ্ঠে ক্ষত প্রকাশ পাইলে এবং তাহাতে নানাপ্রকার উপসর্গ, বেদনা ও শ্রাব থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । কুষ্ঠরোগে এক্রপ উপকারী ঔষধ বিরল । শিত্রকুষ্ঠেও ইহা অতি উপকারী । অমুপান—গরম দুগ্ধ ।

নিম্বাদি চূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ১০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

রসান্নগুগ্ণু । বাতিক, পৈত্তিক ও পিত্তশ্লেষ্মিক কুষ্ঠে ক্ষত হইতে লক্ষণানুযায়ী ক্লেদ বা রস নির্গত হইলে এবং ক্ষতস্থানে নানাপ্রকার উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অমুপান—গরম দুগ্ধ ।

রসান্নগুগ্ণু । প্রস্তুতবিধি ১০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

গলং কুষ্ঠারিরস । পৈত্তিক ও পিত্তশ্লেষ্মিক কুষ্ঠে ক্ষত হইতে ক্লেদ বহির্গত হইলে এবং নানাপ্রকার উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । শিত্রকুষ্ঠেও ইহা উপকারী । অমুপান—দুগ্ধ ।

গলংকুষ্ঠারিরস । কঙ্কলী ২ তোলা এবং তাম্র, লৌহ, বিণ্ডু গুগ্গু, রক্তচিতারমূল, শিলাজতু, বিণ্ডু কুটিল ও বচ, ইহাদের প্রত্যেকে এক তোলা ও অত্র এবং করঞ্জ-বীজ প্রত্যেকে ৪ তোলা ; সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া যথুদ্বারা নর্দনপূর্বক, ঘৃতসহযোগে বটিকা করিবে । মাত্রা—এক আনা ।

বিশ্বেশ্বররস । বাতিক, শ্লেষ্মিক, বাতশ্লেষ্মিক ও পিত্তশ্লেষ্মিক ও গলং-কুষ্ঠে ক্ষত হইতে লক্ষণানুযায়ী শ্রাব ও উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা সাধারণ ব্যবহার্য্য ঔষধ । প্রায় অধিকাংশ-স্থলেই লক্ষণাদির প্রবিচার না করিয়া চিকিৎসকেরা ইহা প্রয়োগ করেন । ক্ষিরদ্বজনিত কুষ্ঠ, স্নায়ুগত বাত ও বাতরক্তের ইহা অমোঘ ঔষধ । অমুপান—নিম্বাচালের রস বা কাথ ।

বিশ্বেশ্বর রস । প্রস্তুতবিধি ১০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

মাণিক্যরস । সান্নিপাতিক কুষ্ঠে ক্ষত হইতে নানা বর্ণের স্রাব ও লক্ষণানুযায়ী নানা উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাও সর্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ, অধিকাংশ স্থলে রোগের লক্ষণাদি বিচার না করিয়াও প্রয়োগ করা হয়। **অম্বুপান**—গুলঞ্চের রস বা নিম-ছালের কাথ অথবা দুগ্ধ ।

মাণিক্যরস । বিস্তৃত হরিতাল ৮ তোলা, বিস্তৃত গন্ধক ৮ তোলা, মনঃশিলা ৪ তোলা এবং পারদ, সীসা, তাম্র, অজ ও লৌহ, ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা একত্র করিয়া বটের ক্ষীরে মর্দন করিবে। প্রথমতঃ গন্ধক ও পারদ কজ্জলী করিয়া পশ্চাৎ সমস্ত দ্রব্য বটের ক্ষীরে মর্দন করিবে। অনন্তর নিমের কাথে তিনদিন ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, পরে উহার সহিত গুলঞ্চ, বালা, সোমরাজীবীজ, আলকেশী, নীলগিটী, শঙ্খিনাছাল, মুরারীংসী, ধোয়া, নিশিন্দাছাল ও করবীমূলের ছাল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিয়া মলে মর্দন পূর্ব্বক ম্যার মধ্যে রাখিয়া পুটপাক করিবে। **মাত্রা**—২ রতি ।

কুষ্ঠকালানলরস । বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লেষ্মিক, পিত্তশ্লেষ্মিক ও সান্নিপাতিক কুষ্ঠের যে কোন লক্ষণ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। ইহা সর্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ। **অম্বুপান**—দুগ্ধ বা গুলঞ্চের রস ।

কুষ্ঠকালানলরস । কজ্জলী ২ তোলা এবং সোহাগার বৈ, তাম্র, লৌহ ও পিপুলচূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা এহণপূর্ব্বক নিমের পাতা, ফল, মূল, ফুল ও ছালের কাথে, ত্রিফলার কাথে এবং সোন্দালের শাসের কাথে যথাক্রমে সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া লইবে। **বটী** ৩ রতি ।

তালভস্ম । ইহা গলং কুষ্ঠের পরীক্ষিত ঔষধ। কুষ্ঠরোগে হস্ত এবং পদ গলিতপ্রায় হইলে অথবা ক্ষতস্থানে কণ্ডু, অতিশয় দাহ, নানা প্রকার বেদনা ও ক্ষত হইতে ক্লেদনির্গমন হইলে এবং শুষ্ক রোগীর গাত্র-শুক্লতা ও অগ্রাঙ্ক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। **অম্বুপান**—নিমের পাতা বা ছালচূর্ণ ও গব্য স্নাত ।

তালভস্ম । প্রস্তুতবিধি ১০৬ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য ।

মহাতালকেতুর রস । কুষ্ঠে হাত পা ও অঙ্গুলি প্রভৃতি গলিতপ্রায়

হইলে, এবং কতস্থানে বেদনা, দাহ, রোগীর পিপাসা ও গাত্র-গুরুতা প্রভৃতি নানা উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, অথচ কত হইতে ক্রন্দ নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া যায়। অন্নপান—নিমের পাতা, বা ছাল-চূর্ণ ও ঘৃত ।

মহাতালকেধর রস । প্রস্তুতবিধি ৭০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

পঞ্চনিষ । ইহা গলৎকুষ্ঠেও উপকারী, শ্বিত্র প্রভৃতিতেও উপকারী, যে কোন কুষ্ঠের যে কোন অবস্থাতেই প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু পিত্তপ্রধান-কুষ্ঠে প্রয়োগ করিলে গাত্র-দাহ, চর্ম্মের উপর নানা প্রকার কণ্ডুর উদ্গম ও তাহাতে জ্বালা প্রভৃতি উপসর্গ অতি শীঘ্র প্রশমিত হইয়া থাকে । পঞ্চনিষ প্রস্তুতের ক্লেশ স্বীকার করিতে বাহারা রাজী নহেন, তাঁহারা নিমের তৈল দুগ্ধসহ সেবন করিতে পারেন । ফল একই । সহপান—ঘৃত ও মধু অন্ন-পান—দুগ্ধ ।

পঞ্চনিষ । নিমের পাতা, ফল, ফুল, মূল ও ছাল প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে । চূর্ণ বৈশীদিন অবিকৃত থাকে না, দুই তিন মাসের পরই বীৰ্য্যহীন হয়, এতদ্ব্যতীত চূর্ণকে নিমছালের বা পাতার রসদ্বারা বাটিয়া বটা করিয়া, লইতে পারা যায় । বটিকা প্রায় একবৎসর অবিকৃত থাকে ।

পঞ্চনিষ (মতান্তরে) । পঞ্চনিষ যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োগ করিবে । শ্বিত্রকুষ্ঠেও ইহা মহোপকারী । সহপান—ঘৃত ও মধু, অন্নপান—দুগ্ধ ।

পঞ্চনিষ (মতান্তরে) । নিমের ফুল, ফল, পাতা, ছাল ও মূল প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা এবং হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, গুঠ, পিপুল, মরিচ, বক্রীশাক, পোকুর, ভেলা, চিতামূল, বিড়ঙ্গশাস, ঢামার-শালু, লৌহ, গুলঞ্চ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সোমরাজীবীজ, সোমশালের শাস, কুড়, ইন্দ্রযব ও আকনাদি, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া থয়ের, শাল ও নিমছাল, ইহাদের প্রত্যেকের কাথে ও ভীমরাজের স্বরসে যথাক্রমে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে । চূর্ণ বা বটিকার মাত্রা—এক আনা হইতে চারি আনা ।

অমৃতাকুর-লৌহ । যে কোন প্রকার কুষ্ঠরোগের যে কোন অবস্থায় বাতাদি দোষের বিচার না করিয়া ইহা প্রয়োগ করা যায় । তবে প্রয়োগকালে

কিঞ্চিৎ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক । ইহাতে পর্পটী ও ভেলা আছে, স্নতরাং বায়ুপ্রধান শরীরে প্রয়োগ করিলে বায়ুর প্রকোপ অর্থাৎ মাথাঘোরা প্রভৃতি উপসর্গ আশঙ্ক্য বর্দ্ধিত হয় এবং পিত্তপ্রধান শরীরে প্রয়োগ করিলে পিত্তের প্রকোপও সমধিক বর্দ্ধিত হয় অর্থাৎ হাত পা বা সর্বাঙ্গে দাহ উপস্থিত হয় । ঐ সকল উপসর্গ নিবারণের জন্ত দুগ্ধ কিছু বেশী পরিমাণে পান করিতে দিবে এবং প্রত্যহ বা সহমত নারিকেলের জল পান করিতে দিবে । সহপান ঘৃত ও মধু, অল্পপান—দুগ্ধ বা নারিকেলের জল ।

অনুতাকুর লৌহ । হিঙ্গুলোথ পারদ ৮ তোলা ও বিস্তক আমলাসা গন্ধক ৮ তোলা, একত্র কজ্জলী করিয়া কিঞ্চিৎ জলসহযোগে পিণ্ডাকার করিবে ও একটি পাথরের পাত্রে রাখিবে, পরে একটি তামার পাত্র আশ্রয়ে গরম করিয়া ঐ পিণ্ডের উপরে ঢাপিয়া ধরিবে, এইরূপে ঐ পিণ্ড পর্পটীর স্তায় হইলে, পর্পটীর ঘোল ভাগের এক ভাগ মোহাণা পর্পটীর সহিত মিশ্রিত করিয়া একটি মুষামধ্যে রাখিয়া পুটপাক করিবে । যে পর্যন্ত গন্ধকের গন্ধ বহির্গত হইবে, তাৎপাক করিবে, গন্ধকের গন্ধ রহিত হইয়া আসিলেই অবিলম্বে মুষা উঠাইবে । অনন্তর উহার সহিত লৌহ ৮ তোলা, তাম্র ৮ তোলা, ভেলা ৮ তোলা, অত্র ৮ তোলা, বিস্তক গুগগুলু ৮ তোলা ও ঘৃত ১৬ তোলা মিশ্রিত করিয়া, ত্রিফলার কাথে পাক করিবে । পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে, পাত্র অবতরণ করিয়া তাহাতে হরীতকীচূর্ণ ৪ তোলা, বহেড়াচূর্ণ ৪ তোলা ও আমলকীচূর্ণ ১২০ তোলা প্রক্ষেপ দিবে । ত্রিফলার কাথ প্রস্তুতের নিয়ম এই—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ১/২ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের, শেষ ৮ সের । মাত্রা—এক আনা হইতে দুই আনা ।

শ্বেতারি । ইহা শ্বিত্রকুষ্ঠের মহৌষধ । শ্বিত্রের যে কোন অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা যায় । অল্পপান—ঘৃত ও মধু ।

শ্বেতারি । কজ্জলী ২ ভাগ এবং হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ভীমরাজ, চাকুন্দেবীজ, ভেলা, কৃষ্ণভিল ও নিমফল, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমান ভাগে লইয়া ভীমরাজের রসে ক্রমাগত ২১ দিন ভাবনা দিবে । বটী ৫ রতি ।

সোমরাজীঘৃত । পৈত্তিক ও পিত্ত-শ্লেষ্মিক কুষ্ঠে এবং শ্বিত্রকুষ্ঠে অশ্রাণ্ড ঔষধে উপকার না হইলে এই ঘৃত প্রয়োগ করিবে । অল্পপান—গরম দুগ্ধ ।

সোমরাজী ঘৃত । গব্যঘৃত ৮ সের । কক্কজব্য—সোমরাজীবীজ ৩২ তোলা, যবের ৮ তোলা, বিস্তক গুগগুলু ১৬ তোলা এবং পটোলমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বলা-

ডুমুর, দুৱালভা ও কটুকী প্রত্যেকে ২ তোলা। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথাৱীতি ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা—১০ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত।

মহাখদিরাদিঘৃত। ক্ষুদ্রকুষ্ঠ ও মহাকুষ্ঠের যে কোন অবস্থায় ইহা সেবন করান যায়। ইহা পানেও যেমন উপকার হয়, মর্দনেও তদ্রূপ উপকার হইয়া থাকে। গলংকুষ্ঠে ক্ষত হইতে নানাবর্ণের স্রাব হওয়া, রোগস্থানে চিচ্চিম্ বেদনা, অসাড়তা বোধ, দাহ, রোগীর গাত্র-দাহ, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, শরীরের বিবর্ণতা, বর্ষরোধ, গাত্রে শুঙ্কু করা বা পিপীলিকা সঞ্চরণবৎ বোধ, স্ফটিকবৎ বেদনা, বোলতা দংশনের আশ্রয় শরীরে চাকা চাকা দাগ, ক্লান্তিবোধ, রোমাঞ্চ ও রক্তের কৃষ্ণবর্ণাভা প্রভৃতি উপসর্গ এবং স্থিত ও নানা প্রকার ক্ষুদ্রকুষ্ঠ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। ইহা সালসার মত রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক। অম্বপান—গব্যদুগ্ধ।

মহাখদিরাদি ঘৃত। গব্যঘৃত ১৬ সের। কঙ্কজব্য—ছাতিমছাল, আতিইষ, সোন্দালের শাস, কটুকী, আকনাড়ি, মুখা, বেণারমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পোলতা, নিম-ছাল, ক্ষেপাপড়া, দুৱালভা, রক্তচন্দন, পিপুল, গজপিপুল, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, রাবালশশা, স্ত্রীমালতা, শতমূলী, অনন্তমূল, ইন্দ্রযব, বাসক, স্ফটিকমুখী, গুলঞ্চ, চিরতা, যষ্টিমধু ও বলাড়ুমুর প্রত্যেকে ৮ তোলা। কাথ্যজব্য—খয়ের ৬২০ সের, শিঙগাছের ছাল ১২০ সের, শালবৃক্ষের ছাল ১২০ সের এবং ডহরকরঞ্জার ছাল, নিমছাল, অন্নবেতসের ছাল, ক্ষেপাপড়া, কুড়ীছাল, বাসকছাল, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সোন্দাল, গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তেউড়ীমূল ও ছাতিমছাল, প্রত্যেকে ৬০ সোয়া ছয় সের, জল ৬৪০ সের, শেষ ৮০ সের। যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা—অর্দ্ধতোলা হইতে ২ তোলা।

বাসারুদ্রতৈল। বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক গলংকুষ্ঠে কিঞ্চিৎ প্রভৃতি কুষ্ঠে বাতপিণ্ডের প্রকোপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল রোগস্থানে ও রোগীর সর্বত্র মর্দন করিতে দিবে। ইহা প্রয়োগে রোগীর গাত্র-দাহ, গাত্রকম্প, ঘুমঘুমে জ্বর, রোগস্থানের পকতা, ত্রণের স্রাব প্রভৃতি উপসর্গ দ্বয় নিবৃত্তি হয়। নালী-বা বা হুষ্ঠ ঘায়ে এই তৈল লাগাইলে ক্ষত অবিলম্বে বিস্তৃত ও শুষ্ক হয়। পামা, বিচর্জিকা, কণ্ডু, খোস, পাচড়া, শীতপিত্ত এবং নানাবিধ চর্মরোগে ইহা মহোপকারী। বাতিক, পৈত্তিক ও

বাতপৈত্তিক বিসর্প, বিদ্রাবি ও বিস্ফোট প্রভৃতি রোগে ইহা মর্দনে অসাধারণ উপকার হয় ।

বাসারুই-তৈল । তিলতৈল /৪ সের। যথাবিধানে মুছুরী পাক করিবে । কঙ্কজব্য— হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিম্বালা, ভালমূলী, ব্যাকুড়, কণ্টকারী, পুনর্নবা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বাসকছাল, নিশিন্দাপাতা, পোলতা, কনকধূতুরার মূল, হরিভাল, মনঃশিলা, কুড়, ঙ্গলাঙ্গলা, দাড়িমের খোসা, আপাং, মিঠাবিষ, জয়ন্তীপাতা, নাটাকরঞ্জছাল ও কটুফল, প্রত্যেকে ৪ তোলা । গুলকের রস বা ক্রাথ ১৬ সের, পবাতৃক্ষ ১৬ সের ও বাসকপাতার রস ১৬ সের । যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে ।

কুষ্ঠকালানল তৈল । বাতিক গলংকুষ্ঠে রোগস্থানের অসাড়তা, স্থচী-বিক্ষবৎ বেদনা ও দপদ্পানি প্রকাশ পাইলে এবং ক্ষত হইতে শ্রাব নিবারণের জন্য এই তৈল প্রয়োগ করিবে । ইহা প্রয়োগে বাতিককুষ্ঠের নানাবিধ উপসর্গ শীঘ্রই প্রশমিত হয় ।

কুষ্ঠকালানল তৈল । কঙ্কলী ২ তোলা এবং বিত্তক মনঃশিলা ও হরিভাল প্রত্যেকে ১ তোলা একত্র করিয়া ৪ তোলা কাঁজি দ্বারা পেষণ করিবে, অনন্তর উক্ত পিষ্টপদার্থ দ্বারা এক টুকরা কপড় লিপ্ত করিয়া রৌদ্রে শুক করিবে, পরে বাতির ত্রায় পাকাইয়া ও তিল-তৈল লিপ্ত করিয়া প্রজ্বলিত করিবে ও অল্প অল্প পরিমাণে তৈল বাতির উপরে ঢালিবে এবং বাতির নীচে একটি পাত্র রাখিবে, এই প্রক্রিয়া মত যে তৈল পাত্রে পতিত হইবে, তাহা কুষ্ঠে লেপন করিবে ।

মরিচাদি তৈল । শ্লেষ্মিক গলংকুষ্ঠে বা ফিরঙ্গ জনিত কুষ্ঠে এই তৈল মহোপকারী । ফিরঙ্গজনিত পিড়কা বিনষ্ট করিতে ইহা অসীম শক্তিশালী । নানাবিধ চর্মরোগ বা খোস, পাচড়া ও চুলকনা প্রভৃতি রোগে স্থানিক মালিশ করিলে, বিশেষ উপকার হয় । ইহা সর্বাস্থে মর্দন করিলে রক্ত বিগুহ্ন হয়, কিন্তু মস্তকে মর্দন নিষেধ ; বিশেষতঃ বালকের মস্তকে কদাপি প্রয়োগ করিবে না । ফিরঙ্গরোগোক্ত বৃহৎ মরিচাদিতৈলও প্রয়োগ করা যায় ।

মরিচাদি তৈল । কটুতৈল /৪ সের। যথাবিধি মুছুরী পাক করিবে । কঙ্কজব্য—মরিচ, হরিভাল, মনঃশিলা, মুখা, আকন্দের ক্ষীর, কয়বীণাছের মূল, জটামাংসী, ডেউড়ীমূল, মেথু-ব-রের রস, রাখালশশার মূল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দেবদারু ও রক্তচন্দন, প্রত্যেকে

৪ তোলা ও মিঠাবিধ ৮ তোলা কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং ১৬ সের চোনাধারা পাক সমাপন করিয়া ছাকিয়া লইবে।

বিষতৈল। গ্লেয়িক গলংকুঠে এই তৈল স্থানিক প্রয়োগে ক্ষুধাধারণ উপকার হয়। ইহা খোস, পাঁচড়া ও চুলকণা প্রভৃতি রোগে মর্দনের ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু শিশুগণের মস্তকে প্রয়োগ করিবে না। এই তৈল সর্বদা ব্যবহার্য্য, শ্বিত্রকুঠেও পরম উপকারী, মরিচাদি তৈলের পরিবর্তে প্রয়োগ করা যায়।

বিষতৈল। কটুতৈল ১৪ সের। যথাবিধি মুছাই পাক করিবে। কঙ্কজব্য—ডহর-করঞ্জবীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকন্দেদ ক্ষীর, তগরপাত্রকা, করবীমূল, বচ, কুড়, হাপর-মালী, রক্তচন্দন, জাতী বা মালতীমূলেরপাতা, নিশিন্দাপাতা, মঞ্জিষ্ঠা ও ছাতিমছাল, প্রত্যেকে ৪ তোলা এবং বিশুদ্ধ মিঠাবিধ ৮ তোলা কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে ও ১৬ সের জলসহ পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

কুষ্ঠরাক্ষসতৈল। গ্লেয়িক বা বাতগ্লেয়িক গলংকুঠে এই তৈল স্থানিক ও সার্বাঙ্গিক প্রয়োগ করা যায়। নানাবিধ খোস, চুলকণা, পাঁচড়া প্রভৃতি রোগে এই তৈল অতি উপকারী। শ্বিত্ররোগে স্থানিক মর্দনে অসাধারণ উপকার হয়। এই তৈলে কাপড়ের টুকরা ভিজাইয়া ক্ষতস্থানে লাগাইলে ক্ষত শুক্ক হয়।

কুষ্ঠরাক্ষস তৈল। কটুতৈল ১১ সের, যথাবিধি মুছাই পাক করিবে। কঙ্কজব্য—কঙ্কলী ৪ তোলা এবং কুড়, ছাতিমছাল, চিতামূল, মেটেসিন্দূর, রহুন, হরিভাল, সোমরাজী বীজ, সোমরাজীবীজ, ভায়া ও মনঃশিলা, প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা; সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ তৈলে মিশ্রণ করিয়া প্রত্যহ রৌদ্রের উত্তাপে রাখিবে ও প্রয়োগ করিবে।

কুষ্ঠরোগে-পথ্যাপথ্য।

পথ্য। আমনতণ্ডুলের অন্ন, কাঁচা মুগ, অড়হর ও মসুরের দ্ব্যতপক দাইল, বেতাগ্র, পলতা, উচ্ছে, কল্লা, নিমপাতা বা হিঞ্চাশাকের শুদ্ধ, খেড়, মোচা, বিলে, কুমড়া, ডুমুর, কাঁচকলা, আলু, পটোল, শিম প্রভৃতির দ্ব্যতপক ব্যঞ্জন ও সহমত দুগ্ধ এই রোগে অপথ্য।

অপথ্য। তৈলপক দাইল ও তরকারী, অন্নদ্রব্য, মৈথুন, শারীরিক-

পরিশ্রম, রোদ্র বা অগ্নির উত্তাপ লাগান, মাষকলায়ের দাইল ; নূতন চাউলের অন্ন, পিত্ত ও কফবর্জক দ্রব্য, দধি, মদ্য, গুড়, দিবানিদ্রা, মৎস্ত ও মাংসাহার এই রোগের কুপথ্য । নিত্যম্ভ মৎস্তাহারের ইচ্ছা হইলে মাগুর বা রোহিত-মৎস্তের ঝোল মধ্যে মধ্যে দিবে । মিষ্টদ্রব্য যত কম আহার করা যায়, ততই ভাল ।

পিত্তরোগ-চিকিৎসা ।

পিত্তরোগের লক্ষণ । কেশের অকালপকতা, চক্ষুর রক্তিমতা ও পীত-বর্ণতা, মল ও মূত্রের পীততা, নথের রক্তাল্পতা ও পীতবর্ণতা, দন্ত ও দেহের পীতবর্ণতা, অন্ধকারবৎ দর্শন, মূত্রের অন্নতা, নিঃশ্বাসবায়ুর উষ্ণতা, ধূমোদগার, ভ্রম, ক্লান্তি, ক্রোধ, দাহ, মলভেদ, অগ্নি ও সূর্য্যোত্তাপে অনিচ্ছা, শৈত্য-সেবনেচ্ছা, সঙ্ঘোষাভাব, কার্য্যে অনিচ্ছা, ভুক্তদ্রব্যের বিদাহ, তীক্ষ্ণাগ্নি, রক্তোদগীরণ, রক্তভেদ, মলের তরলতা ও উষ্ণতা, মূত্রের উষ্ণতা ও কৃচ্ছতা, শুক্রের অল্পতা, তরলতা ও উষ্ণতা, দেহের উষ্ণতা, বর্ষ, শরীরের দুর্গন্ধ, দেহের প্রাবরণতা, শরীরের অবসন্নতা ও পাক ; এই চল্লিশপ্রকার পিত্তজ ব্যাধি ।

পৈত্তিকরোগ-চিকিৎসা-বিধি ।

যেমন বাতব্যাধি বা বাতজব্যাধি লক্ষণভেদে আণীপ্রকার, তদ্রূপ পিত্তজ-ব্যাধি বা পৈত্তিকরোগ লক্ষণভেদে চল্লিশপ্রকার । কটু, অন্ন ও লবণরসবিশিষ্ট-দ্রব্য, উষ্ণ, বিদাহী ও তীক্ষ্ণদ্রব্য ভোজন, দধি, মত্ত, মাষকলায়, তিল, তিসি ও কাঁজি প্রভৃতি ভোজন, তৃষ্ণা ও ক্ষুধা উপস্থিত হইলে, পানাহার না করা এবং ক্রোধ, উপবাস ও রোদ্রসেবন ; এই সকল কারণে ও ভোজনের মধ্যভাগে, ভুক্তদ্রব্যের পচ্যমান অবস্থায়, মধ্যাহ্নে, মধ্য রাত্রিতে এবং গ্রীষ্ম ও শরৎকালে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া পৈত্তিকব্যাধি উৎপাদন করে । এতদ্ব্যতীত পিত্তশুদ্ধক শরীরে পিত্তজ ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

পৈত্তিকব্যাধির লক্ষণভেদে নানাপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা যায় । গুড়-

চ্যাদি লৌহ, পিত্তান্তক লৌহ, পিত্তান্তক রস, গুড়ুচ্যাদি তৈল প্রভৃতি অবস্থা বুঝিয়া প্রয়োগ করিবে ।

পৈত্তিকরোগে—ঔষধ ।

গুড়ুচ্যাদি লৌহ । পিত্তের প্রকোপবশতঃ হাত পা ও সর্বদেহে দাহ প্রকাশ পাইলে কিম্বা রক্তদুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথবা রাত্রিতে নিদ্রার ব্যাঘাত হইলে, অথবা পিত্তবৃদ্ধির অন্যান্য লক্ষণ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । অমুপান—হিষ্কার রস বা পলতার রস, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে উচ্ছে বা করলাপাতার রস ।

গুড়ুচ্যাদি লৌহ । প্রস্তুতবিধি ৪১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

পিত্তান্তক লৌহ । গুড়ুচ্যাদি লৌহ যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই সেই অবস্থায় সেই সেই অমুপানে প্রয়োজ্য ।

পিত্তান্তকলৌহ । প্রস্তুতবিধি ৪০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

পিত্তান্তক রস । পিত্তবৃদ্ধির সহিত তরল দান্ত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে । অমুপান—ধনে ও পলতাভিজান জল ।

পিত্তান্তকরস । প্রস্তুতবিধি ৪০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

মহাপিত্তান্তকরস । পিত্তান্তকরস যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই সেই অবস্থায় সেই অমুপানে প্রয়োজ্য । পিত্তান্তকরস অপেক্ষা মহাপিত্তান্তকরস সমধিক গুণবিশিষ্ট ।

মহাপিত্তান্তকরস । প্রস্তুতবিধি ৪০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

গুড়ুচ্যাদি তৈল । পিত্তবৃদ্ধি বশতঃ হাত পা বা সর্বদেহে অত্যধিক দাহ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল মর্দন করিতে দিবে, কিন্তু অরসে মর্দন বিধেয় নহে । নিদ্রা না হইলে মস্তকে মালিশ করা যায় ।

গুড়ুচ্যাদি তৈল । প্রস্তুতবিধি ৪১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বৃহৎ গুড়ুচ্যাদি তৈল । গুড়ুচ্যাদি তৈল অপেক্ষা ইহা সমধিক উপকারী ।

বৃহৎ গুড়ুচ্যাদি তৈল । প্রস্তুতবিধি ৪১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

পিত্তরোগে—পথ্যাপথ্য।

পথ্য। পিত্তরোগে তিক্ত, মধুর ও কষায় রস বিশিষ্ট দ্রব্য, শীতল বায়ু, ছায়া, নিশাবায়ু, ব্যঞ্জন, চক্ষুরিকরণ, মৃত্তিকা নির্মিত গৃহ, ফোয়ারার জল, পদ্ম, জীর গাত্রস্পর্শ, ঘৃত, হৃৎক, বিরেচন, পরিষেচন, রক্তমোক্ষণ ও শীতল-প্রলেপ প্রভৃতি হিতকর।

অপথ্য। কটুরস, অন্নরস, উষ্ণবীর্য, বিদাহী, তীক্ষ্ণ ও লবণরস দ্রব্য, ক্রোধ, উপবাস, রোদ্র, জীসংসর্গ, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বেগধারণ, ব্যায়াম, মত্ত, মাংসকলায়, তিল, কুলথকলায়, মৎস্য, মেঘমাংস, গব্যাদি ও গব্যাত্ত্ব, এই-সকল পিত্তরোগে অহিতকর; অর্থাৎ এই সমুদয় দ্বারা পিত্ত বর্দ্ধিত হয়।

কফরোগ-চিকিৎসা।

কফরোগের লক্ষণ। মুখের মধুরতা, লিপ্ততা ও মুখ হইতে লালান্নাব, নিদ্রাদিক্য, কণ্ঠদেশে ঘর্ ঘর্ শব্দ, কটু ও উষ্ণদ্রব্যে আকাজ্জা, বুদ্ধির জড়তা, চৈতন্যশক্তির হ্রাস, অলসতা; তৃপ্তিবোধ, অগ্নিমান্দ্য, মলের আধিক্য ও শীতলতা, মূত্রাধিক্য, মূত্রের গুরুতা, গুরুত্বের আধিক্য, শরীরের আর্দ্রতা, গুরুতা ও শীতলতা; এই সকল কফজ ব্যাধির লক্ষণ।

কফরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

গুরুদ্রব্য, মধুররসবিশিষ্ট দ্রব্য, অন্নদ্রব্য, মিষ্ণুদ্রব্য, লবণরসবিশিষ্ট দ্রব্য, তরলদ্রব্য, দধি ও শীতল দ্রব্য এই সকল ভোজন এবং দিবানিদ্রা, অগ্নিমান্দ্য, পরিশ্রম না করা প্রভৃতি নানা কারণে এবং দিবা ও রাত্রির প্রথমভাগে, ভোজনান্তে, হেমন্ত ও বসন্তকালে শ্লেষ্মা প্রকৃপিত হইয়া শ্লেষ্মিকরোগ উৎপাদন করে। এতদ্ব্যতীত শ্লেষ্মপ্রধান শরীরেও এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শ্লেষ্মিকরোগ উৎপন্ন হইলে, লক্ষণভেদে শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস, শ্লেষ্মকালানলরস, মহা শ্লেষ্মকালানলরস, কফচিহ্নামণি, কফকেতু ও বৃহৎ কফকেতু প্রভৃতি ষাণ্ণ-দ্রুপানে প্রয়োগ করা যায়।

কফরোগে-ঔষধ ।

কফকেতুরস । কফের আধিক্যবশতঃ নাসাশ্রাব, শ্বাস, কাস, গল-রোগ, গলাব্যথা, মুখরোগ, শিরোরোগ, দন্তরোগ, কর্ণরোগ ও চক্ষুরোগ উপস্থিত হইলে, প্রথমাবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিবে, কিন্তু এই সকল রোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে, ইহা দ্বারা তাদৃশ উপকার হয় না । অমুপান—আদার রস ও মধু ।

কফকেতুরস । সোহাগার বৈ, শিপুল, শঙ্খভঙ্গ ও শোধিত বিব প্রত্যেকে সমভাগ, আদাররসে মর্দন । বটী ১ রতি ।

কফকেতু (মতান্তরে) । উক্ত কফকেতু অপেক্ষা ইহা সমধিক-বীৰ্য্যবান্ । অমুপান—আদার রস ও মধু ।

কফকেতু (মতান্তরে) । শুঠ, শিপুল, মরিচ, হিজলগুজ, শঙ্খভঙ্গ, বিষ্ণু বিব ও মরিচ প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দন । বটী মরিচ পরিমাণ ।

কফচিন্তামণি । কফকেতু যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োগ করিবে । রোগের প্রথমাবস্থায়ই বিশেষ উপকারী । অমুপান—আদার রস ও মধু ।

কফচিন্তামণি । প্রস্তুতবিধি ১০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বৃহৎ কফকেতু রস । কফরোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী কিম্বা রোগীর প্রকৃতি স্বভাবতঃ শ্লেষ-প্রধান হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে ।

বৃহৎ কফকেতুরস । প্রস্তুতবিধি ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

শ্লেগ্মহৃন্দরস । বৃহৎ কফকেতু যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োজ্য । অমুপান—পানের রস ও মধু ।

শ্লেগ্মহৃন্দরস । প্রস্তুতবিধি ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বৃহৎ কফকেতু (মতান্তরে) । ইহার প্রয়োগ-প্রণালী ও অমুপান বৃহৎ কফকেতুর স্থায় ।

বৃহৎ কফকেতু (মতান্তরে) । প্রস্তুতবিধি ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

শ্লেষ্মকালানলরস । ইহা সাধারণ ঔষধের মধ্যে উৎকৃষ্ট । শ্লেষ্মাধিক-
উর্দ্ধজক্রগত যে কোনও রোগে প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু ধাতুক্ষয়জনিত বা
দীর্ঘকালস্থায়ী শিরোরোগে বেশী ফলপ্রদ নহে । সাধারণতঃ মাথাধরা,
গাথা, শরীরের জড়তা ও অলসতা প্রভৃতি বিনাশ করে । অমুপান—
পানের রস, তুলসীপাতার রস কিম্বা আদার রস ও মধু ।

শ্লেষ্মকালানলরস । পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বিষ ৪ তোলা, শুঠ, শিপুল ও
মরিচচূর্ণ সমভাগে মিলিত ৮ তোলা এবং হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কুড়, যমানী, ধন-
যমানী, বিড়ঙ্গ, কটুফল, চই, লবঙ্গ, তেউড়ীমূল, দস্তাভীজ ও পঞ্চলবণ ; ইহাদের প্রত্যেকের
১ তোলা । তুলসীপাতার রসে মর্দন করিয়া সাতবার ভাবনা দিবে । বটা ৩ রতি ।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস । বাতিক ও শ্লেষ্মিক শিরোরোগে অথবা বায়ুপ্রধান,
শ্লেষ্মপ্রধান অথবা বাতশ্লেষ্মপ্রধান সান্নিপাতিক শিরঃসীড়ায় এই ঔষধ মহোপ-
কারী । ঐ সকল শিরোরোগের সহিত রোগীর আমবাত, বাত, মুখে, জিহ্বায়
বা গলনালীতে বা অথবা কাণপাকা, নাসাস্রাব ও দন্তরোগ প্রভৃতি থাকিলে,
ইহা প্রয়োগ করিবে । এতদ্ব্যতীত উর্দ্ধজক্রগত সর্বপ্রকার রোগে অর্থাৎ
চক্ষু ইহাতে জলস্রাব, পিচুটিপড়া ও দৃষ্টিহানি, মাথায় ভার, দন্তমাড়ীর-
ক্ষীভতা প্রভৃতি থাকিলে, ইহা অমৃতের জ্বর উপকারী । কোষ্ঠ পরিষ্কার
থাকিলে, জয়পাল-বীজ দিবে না, কিম্বা ইহার পরিবর্তে মহাশ্লেষ্মকালানল
প্রয়োগ করিবে । অমুপান—নিসিন্দাপাতার রস বা পানের রস ও মধু ।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস । প্রস্তুতবিধি ৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

মহা শ্লেষ্মকালানলরস । শ্লেষ্মকালানল যে যে অবস্থায় প্রয়োগ
করা যায়, ইহাও সেই সেই অবস্থায় সেই অমুপানে প্রয়োগ করা যায় ।

মহাশ্লেষ্মকালানলরস । হিঙ্গুলোথ পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা, সোহাগার থৈ, ভাদ্র, অভ্র,
বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, বংশপত্র হরিতাল, ধূতুরারবীজ সৈন্ধবলবণ, কুড়, হিং, শিপুল, কটুফল,
দস্তাভীজ, সোমরাজীভীজ, সোলালের আঠা ও তেউড়ী ; ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ ।
সীজের ক্ষীরে মর্দন । বটা মাষকলাইয়ের জ্বায় ।

ধূস্তুরতৈল । এই তৈল মর্দনে কফরোগ বিনষ্ট হয় ।

ধূস্তুরতৈল । কটুতৈল /৪°সের । কাথ্যদ্রব্য—ডাল, পাতা ও মূলসহ ধূতুরাগাছ সাড়ে-

বার সের, জল ৬৪ সের, শেঁষ ১৬ সের । কক্‌দ্রব্য—ধূতুরাপাতা ১/১ সের । যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে । ক্রিমিরোগোক্ত ধূতুরতৈল প্রয়োগ করিলেও চলে ।

কফরোগে—পথ্যাপথ্য ।

কৃষ্ণ, ক্ষার, কষায়, তিক্ত ও কটু রসবিশিষ্ট দ্রব্য ভোজন, শারীরিক পরিশ্রম, নিগ্ধবন ত্যাগ, ধূমসেবন, উষ্ণবীৰ্য্য দ্রব্যভোজন, শ্বেদ, উপবাস ও রৌদ্রসেবন এইসকল কফরোগে হিতকর । কফজনক ও গুরুদ্রব্য ভোজন, লবণ, মধুর, অম্ল ও মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ, মাষকলায়, তিল, তরলদ্রব্য, দধি, দিবা-নিদ্রা, শৈত্যক্রিয়া ও গুতভক্ষণ কফরোগে হিতকর নহে ।

শিরোরোগ-চিকিৎসা ।

বাতিকশিরোরোগের লক্ষণ । এই রোগে বায়ুর প্রকোপবশতঃ অকস্মাৎ মস্তকে তীব্র বেদনা হয় এবং ঐ বেদনা রাত্রিতে বাড়ে । বজ্রাদি দ্বারা মস্তকবন্ধন বা মস্তকে শ্বেদাদি প্রয়োগ করিলে, এই রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

পৈত্তিকশিরোরোগের লক্ষণ । এই রোগে পিত্তের প্রকোপবশতঃ মস্তক, চক্ষু ও নাসিকাতে এত প্রদাহ উপস্থিত হয়, বোধ হয় যেন, জলন্ত অঙ্গার দ্বারা মস্তক আবৃত হইয়াছে এবং চক্ষু ও নাসাভ্যন্তর হইতে ধূম নির্গত হইতেছে । শীতল ক্রিয়া দ্বারা এবং রাত্রিকালে এইরোগ স্বভাবতঃ প্রশমিত হয় ।

শ্লেষ্মিকশিরোরোগের লক্ষণ । এই রোগে শ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ মস্তক শ্লেষ্মা দ্বারা লিপ্ত, ভারগ্রস্ত, শুক ও শীতল বোধ হয় এবং মুখে ও অন্ধিপন্নবে (চক্ষুর পাতায়) শোথ উৎপন্ন হয় ।

সান্নিপাতিকশিরোরোগের লক্ষণ । এই রোগে ত্রিদোষের প্রকোপবশতঃ বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক শিরোরোগের লক্ষণ একবারে প্রকাশ পায়

রক্তজশিরোরোগের লক্ষণ । এই রোগে রক্তহৃৎবশতঃ পৈত্তিক শিরোরোগের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পায়, অধিকন্তু মস্তক স্পর্শাসহ অর্থাৎ মস্তক স্পর্শ করিলেও রোগী অত্যন্ত কষ্টবোধ করে বা চম্কাইয়া উঠে ।

ক্ষয়জশিরোরোগের লক্ষণ । মস্তকের রক্ত, বসা ও প্লেয়ার অত্যধিক ক্ষয়বশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হয় । এই রোগে মস্তকে অত্যধিক যন্ত্রণাদায়ক বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে । শ্বেদ-প্রয়োগ, বমন, ঘুম ও নশ্তগ্রহণ কিম্বা রক্তমোক্ষণ করিলে, এরোগ বাড়ে । ইহা কষ্টসাধ্য ।

ক্রিমিজশিরোরোগের লক্ষণ । এইরোগে মস্তকের অভ্যন্তরে হৃৎবিদ্ধবৎ অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হয় এবং ক্রিমি সঞ্চরণ (চলিয়া বেড়ান) ও দংশন করে (কামড়ায়), পরন্তু নাসারন্ধ্র হইতে জলমিশ্রিত পু্য এবং কখনও কখনও বা ক্রিমি বহির্গত হইয়া থাকে । এই রোগ অতি যন্ত্রণাদায়ক ।

সূর্য্যাবর্তরোগের লক্ষণ । এই রোগে সূর্য্যোদয় হইতে চক্ষু ও জ্বরে অল্প অল্প বেদনা আরম্ভ হইয়া সূর্য্যের উত্তাপবৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ ঐ বেদনা বাড়ে, আবার সূর্য্যাস্ত হইলে বেদনা কমে, পরন্তু শীতল বা উষ্ণ ক্রিয়া কিছুতেই বেদনা কমে না । সূর্য্যাবর্তরোগ ত্রিদোষের প্রকোপে উৎপন্ন হয়, স্তত্রাং অতিশয় কষ্টসাধ্য ।

অনন্তবাতের লক্ষণ । বায়ু, পিত্ত ও কফ ত্রিদোষ প্রকুপিত হইয়া গ্রীবার পশ্চাৎ দিগের মস্তানামক শিরাদ্বয়কে পীড়ন করিয়া গ্রীবার পশ্চাৎ দিকে তীব্র বেদনা, দাহ ও গুরুতা জন্মায়, অনন্তর ঐ বেদনা ক্রমশঃ চক্ষু, জ্বরে ও শব্দদেশে উপস্থিত হয়, এবং গণ্ডপার্শ্বের কম্পন, হস্তগ্রহ ও চক্ষুর নানাপ্রকার পীড়া উৎপাদন করে । ইহার নাম অনন্তবাত ।

অর্দ্ধাবভেদক-শিরোরোগের লক্ষণ । রুক্ষদ্রব্য ভোজন, আহার পরিপক না হইতে পুনর্বার ভোজন, হিমলাগান, পুর্কমিকের বায়ু সেবন, মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগ-ধারণ, পথপর্য্যটন ও পরিশ্রম, এই সকল কারণে বায়ুপ্রকুপিত ও প্রবল হইয়া স্বয়ং কিম্বা প্লেয়ার সহযোগে মস্তকের অর্দ্ধাংশ আশ্রয় করিয়া সেই অর্দ্ধাংশের মস্তা, ক্র, শব্দ, কণ, চক্ষু ও ললাটে অজ্ঞানত

বা বজ্রপাতের ঝায় তীব্র বেদনা জন্মায় । এই রোগে সমস্ত মস্তকের অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ একচক্ষু, মস্তার শিরাদ্বয়ের একটি, একটি ক্র এবং শঙ্খ ও ললাটের অর্দ্ধাংশ ও একটি কর্ণ পীড়িত হয়, একারণ ইহাকে অর্দ্ধাবভেদক বা অধকপালে মাথাধরা কহে । এই রোগ অতিশয় বর্ধিত হইলে, চক্ষু বা কর্ণ নষ্ট হইতে পারে ।

শঙ্খকশিরোরোগের লক্ষণ । রক্ত, পিত্ত ও বায়ু প্রকুপিত, বর্ধিত ও পরস্পর সম্মিলিত হইয়া শ্লেষ্মার সহযোগে শঙ্খদেশে তীব্রবেদনা ও দাহযুক্ত অথচ রক্তবর্ণ দারুণ শোথ উৎপাদন করে, ঐ শোথ বিধের ঝায় বেগবান হইয়া ভরায় মস্তক ও কণ্ঠদেশকে অবরোধ করিয়া তিন দিনের মধ্যে রোগীর জীবনহরণ করে, কিন্তু রোগী যদি তিন দিনের অধিক জীবিত থাকে, তাহা হইলে তাহার জীবন রক্ষা পাইলেও পাইতে পারে ।

শিরোরোগ-চিকিৎসা-বিধি ।

শিরোরোগ অর্থাৎ শিরঃশূল বা মস্তকের শূল এগার প্রকার । ইহার চলিত নাম মাথাধরা বা মাথাব্যথা । বাতিক, পৈতিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক, রক্তজ, ধাতুক্কয়জ, ক্রিমিজ, সূর্য্যাবর্ত, অনন্তবাত এবং অর্দ্ধাবভেদক ও শঙ্খক । শিরঃপীড়া সচরাচর পুরুষদিগকে দশ হইতে পঁচিশ এবং পঁয়ত্রিশ হইতে পয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে এবং স্ত্রীদিগকে আট বৎসরের পর পঁচিশ বৎসর বয়সে আক্রমণ করে । নানাকারণে এই রোগ জন্মে । চিকিৎসা-কালে রোগোৎপত্তির কারণ সর্বাগ্রে নির্ণয় করা আবশ্যক । নানাপ্রকার অহিত আহার-বিহারাদি অর্থাৎ পানভোজন, এবং অধিক মানসিক পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে বায়ু, পিত্ত বা কফ প্রকুপিত হইয়া শিরঃপীড়া জন্মায়, তদ্ব্যতীত জ্বর, ফিষ্টল, বা বিবাক্তমেহবশতঃ রক্তদুষ্টি, স্নায়ু দৌর্বল্য, ধাতুদৌর্বল্য, অধিক শুক্রক্কয়, মধুমেহ, কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ, রক্তহীনতা, স্বপ্নদোষ, স্ত্রীদিগের ঋতুর গোলযোগ বা আর্ন্তবহুষ্টি প্রভৃতি বহুবিধরোগের উপসর্গ স্বরূপ শিরঃপীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে । ক্রিমি হইতে এক প্রকার শিরঃপীড়া জন্মে, তাহাকে ক্রিমিজনিত শিরঃপীড়া কহে । ধাতুক্কয় বশতঃ যে শিরঃপীড়া জন্মে, তাহাকে ক্কয়জ শিরঃপীড়া কহে ; অতিরিক্ত মদ্য-পান এবং সীসা প্রভৃতি বিবাক্ত দ্রব্য উদরস্থ হইলে,

শিরঃপীড়া হয় । ফলতঃ রোগ যে কারণেই হউক, তত্তৎ কারণ দূরীভূত এবং রক্তদৃষ্টি ও বিষাক্ত মেহ প্রভৃতি রোগ হইতে উৎপন্ন হইলে, তত্তৎ রোগ বিনষ্ট অর্থাৎ রক্তসংশোধন বা বিস্তৃদ্ধ এবং বিষাক্ত মেহ প্রভৃতি আরোগ্য না হইলে, শিরঃপীড়া প্রশমিত হয় না, এইরূপ জ্বালোকের ঋতুদৃষ্টিবশতঃ পীড়া হইলে, আর্দ্রব শোষিত না হইলেও রোগ প্রশমিত হয় না ; সুতরাং শিরঃপীড়া যে-রোগের সহস্বর্তী বা উপসর্গ-স্বরূপ প্রকাশ পাইবে, সেই রোগের প্রতীকারে অবশ্যই মনঃসংযোগ করা কর্তব্য । এই রোগে নবজ্বরের সংশ্রব না থাকিলে, সাধারণতঃ লৌহ, অন্ন, রোপ্য ও স্বর্ণাদি ষাণ্ডুঘটিত বল-পুষ্টিকারক ঔষধ-সকল প্রয়োজ্য এবং ষাণ্ডুক্য বা ষাণ্ডু-দৌৰ্বল্য, আর্দ্রবদৃষ্টি, এবং বিষাক্ত ও মধুমেহ প্রভৃতি রোগে প্রায়শঃ নবজ্বরের সংশ্রব থাকে না, সুতরাং ঐ সকল রোগেও লৌহাদি ষটিত ঔষধ মহোপকারী ।

জ্বরাদিরোগের উপসর্গস্বরূপ শিরঃপীড়া প্রকাশ পাইলে, ঐ সকল রোগে বর্ণিত শিরোরোগের চিকিৎসা-ক্রম অবলম্বন করিবে ।

বাতিক শিরঃপীড়ার মস্তকে মুচুকুন্দ তুল কিম্বা দারুচিনি জলদ্বারা বাটিয়া অথবা ঘোলদ্বারা কুড়, এরণ্ডমূল ও শুঁঠ বাটিয়া প্রলেপ দিবে এবং দুধ জ্বাল-দেওয়া মাটির হাড়ী বা কড়াই আগুনে গরম করিয়া তাহার উত্তাপ মস্তকে লাগাইবে । দশমূল তৈল নস্যরূপে নাসারন্ধ্রে গ্রহণ ও মস্তকে বা কপাটির রূপে মালিশের ব্যবস্থা করিবে । খাসরোগোক্ত খাসকুঠাররসের নস্য প্রয়োগে মহোপকার হয় । স্বল্প পঞ্চমূল কাথ পানেরও ব্যবস্থা করা যায় । ৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

পৈত্তিক ও রক্তজ্ব শিরোরোগে রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও বেণার মূল বাটিয়া অথবা রক্তচন্দন ঘষিয়া প্রলেপ দিবে এবং অত্যধিক দাহ থাকিলে শতধৌত-দ্রত মালিশ করিবে । স্বল্পপঞ্চমূল কাথ (৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) বা পঞ্চমূলদি ক্ষীর (১১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) পান ও ষড়্বিন্দু তৈল নস্যরূপে গ্রহণ এবং মস্তকে মর্দন করিতে দিবে ।

প্লৈয়িক শিরঃপীড়ায় কাপড়ের পুটলী গরম করিয়া তদ্বারা শ্বেদ এবং আদার রস গরম করিয়া কুলি করিতে দিবে । দেবদারু, তগরপাছকা, কুড়, জটামাংসী ও শুঁঠ বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে । গুজ্জাভৈল অথবা

দশমূলতৈল নস্যরূপে গ্রহণ ও মস্তকে মালিশ করিতে দেওয়া যায় :
আবশ্যক হইলে, বৃহৎ পঞ্চমূল অর্থাৎ বেলছাল, শোণাছাল, গাভারীছাল,
পারুলছাল ও গণিয়ারী ছালের কাথ পান করান যায় ।

সান্নিপাতিক শিরঃপীড়ায় বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা, এই তিন দোষের মধ্যে
যাহার প্রকোপ দৃষ্ট হইবে, তদোষনাশক চিকিৎসা করিবে ।

ক্রিমিজনিত শিরোরোগের চিকিৎসা ৪৬৪ পৃষ্ঠা ও ৪৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

ধাতুক্ষয়জনিত শিরোরোগে ধাতুপোষক তৈল মর্দন ও স্নাত পানের ব্যবস্থা
করিবে ।

স্বর্ধ্যাবর্ত ও অর্দ্ধাবভেদক শিরোরোগে অনন্তমূল, নীলোৎপল, কুড় ও
বটিমধু কাঁজি বা জলধারা বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিবে কিম্বা হড়হড়ের বীজ
(কোন কোন দেশে ইহাকে শুইলটা কহে) হড়হড়ের রসে বাটিয়া প্রলেপ
দিবে । এতদ্ব্যতীত দুগ্ধধারা তিল বাটিয়া প্রলেপ বা উহা গরম করিয়া সেক
দিলেও ঐ উভয় রোগ সারে । চিনি মিশ্রিত দুগ্ধ, নারিকেল জল, শীতলজল
বা স্নাতধারা নস্য গ্রহণ করিলেও আধকপালে ও স্বর্ধ্যাবর্তরোগ বিনষ্ট হয় ।
কুম্ভভিল ও বেণারমূল বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে, ঐ উভয়রোগ দূরীভূত হয় ।
এতদ্ব্যতীত বড়বিন্দুতৈলের নস্য ও মর্দন উপকারী । এই সকল ঔষধ শম্বক
এবং অনন্তবাতরোগেও উপকারী । অনন্তবাত অত্যধিক প্রবল হইলে,
হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হরিত্রা, গুলঞ্চ, চিরতা ও নিমছাল ; ইহাদের
কাথ করিয়া নাসিকাধারা পান বা নস্য গ্রহণ করিতে দিবে । এই প্রক্রিয়া-
ধারা মুহূর্ত্তমধ্যে রোগীর যন্ত্রণা অর্থাৎ জ্ব, শম্ব, ললাট, কর্ণ, চক্ষু, ও শিরোহর্দ-
শূল দূরীভূত হয় । এতদ্ব্যতীত শিরোরোগে নানাপ্রকার বটিকা প্রয়োগ করা
যায় । লক্ষ্মীবিলাস, স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস, মহালক্ষ্মীবিলাস, বৃহৎ নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস,
নারদীয় মহালক্ষ্মীবিলাস, কফরোগোক্ত শ্লেষ্মশৈলেশ্বরস, শ্লেষ্মকালানলরস,
মহাশ্লেষ্মকালানলরস, কফকেতু, কফচিন্তামণি ও অররোগোক্ত কন্তুরীভূষণ
প্রভৃতি নানাপ্রকার বটিকা অবস্থাভেদে যথাহুপানে প্রয়োগ করা যায় ।

শিরোরোগে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে বা কোষ্ঠবদ্ধতাবশতঃ শিরঃপীড়া
হইলে, বিরোচন দিবে । তেউড়ী-চূর্ণ বৃদ্ধ ও যুবা সকলের পক্ষেই উপযোগী,
মাত্রা—দুই আনা হইতে চারি আনা বা অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত ।

ঋতুর গোলমাল, আর্ন্তবহুটি কিস্বা জ্বীদিগের রজোলোপ বা অজ্ঞাত কারণে শিরঃপীড়া হইলে, বক্ষ্যমাণ জ্বীরোগের জ্ঞায় চিকিৎসা করিবে এবং তৎসঙ্গে শিরোরোগে লক্ষণ অনুযায়ী দোষের প্রকোপ স্থির করিয়া যে দোষ প্রবল দৃষ্ট হইবে, তদোষ নাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে ।

কতকগুলি সর্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ আছে, তাহা প্রায় সর্বপ্রকার শিরঃপীড়ায় প্রয়োগ করা যায় । ষষ্টিমধু চূর্ণ চারি ভাগ ও শোধিত বিষচূর্ণ এক ভাগ মিশ্রিত করিয়া নস্ত্র লইবে । ক্লিকভক্ষ ও নিশাদল চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া তাহার ঘ্রাণ লইবে । ক্লিকজীরা কাপড়ের পোটলায় করিয়া বান্ধিয়া রগড়াইবে ও ঘ্রাণ লইবে । এতদ্ব্যতীত টাটকা চূর্ণ ও মধু একত্র করিয়া পানের টুকরায় মাখাইয়া রগের উপর লাগান যায় । কর্পূরের স্তম্ভ-চূর্ণের নস্ত্র গ্রহণ করা যায় । গোলমরিচ জলের সহিত দদিয়া রগে লাগান যায় । অর্দ্ধনাড়ী নাটকেশ্বরের নস্য প্রয়োগেও সর্বপ্রকার শিরোরোগ নষ্ট হয় ।

শিরোরোগে-ঔষধ ।

লক্ষ্মীবিলাস । বাতিক ও শ্লেষ্মিক শিরোরোগে কিস্বা বাতাধিক বা শ্লেষ্মাধিক সান্নিপাতিক শিরোরোগে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । শিরঃপীড়ার সহিত নাসাস্রাব, গলায় ঘা, জিহ্বায় ঘা, গলাব্যথা, মুখে ঘা ও ব্যথা এবং কর্ণরোগ প্রভৃতি থাকিলেও ইহা উপকারী । অহুপান—পানেররস ও মধু । কোষ্ঠ-কাঠিঙ্গ থাকিলে, আদার রস ও মধু । পানের সহিত বটিকা চর্ষণ করিয়াও ভক্ষণ করা যায় ।

লক্ষ্মীবিলাস । প্রস্ততবিধি ২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

স্বল্প-লক্ষ্মীবিলাস । বাতিক ও শ্লেষ্মিক কিস্বা বায়ু বা শ্লেষ্মপ্রধান সান্নিপাতিক শিরোরোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায় । শিরোরোগের সহিত গলরোগ, চক্ষুরোগ, মুখরোগ, জিহ্বারোগ, কর্ণরোগ এবং নাসারোগ প্রভৃতি বর্তমান থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যায় । অহুপান—পানের রস ও মধু, কোষ্ঠ-কাঠিঙ্গ-আদার রস ও মধু ।

স্বল্প লক্ষ্মীবিলাস । প্রস্ততবিধি ২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

লক্ষ্মীবিলাস (মতান্তরে) । মহালক্ষ্মীবিলাস যে যে অবস্থায় প্রয়োগ

করা যায়, ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োজ্য । অমুপান—পানের রস বা আদার রস ও মধু ।

লক্ষ্মীবিলাস (মতান্তরে) । প্রস্ততবিধি ৬০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

মহালক্ষ্মীবিলাস । যে কোন প্রকার শিরোরোগে ইহা অমৃতের জায় উপকারী । শিরোরোগের সহিত অগ্নিমান্দ্য, অক্ষুধা, অস্নোদগার, অস্ত্রবৃদ্ধি, রক্তদোষ, ষাভুক্ষয় বা ষাভু দোষ জন্ম কৃষ্ট, প্রমেহ, স্রীপদ (গোদ) নালী দা, ক্ষতকাস, নাসাস্রাব, যক্ষ্মা, কর্ণরোগ, নাসারোগ, মুখরোগ, গলরোগ, জিহ্বা-রোগ, ওষ্ঠরোগ ও স্ত্রীদিগের স্ত্রীরোগ বর্তমান থাকিলে, বিশেষতঃ প্রসবাস্তে প্রসূতির পক্ষে ইহা মহোপকারী । ইহা বল, পুষ্টি ও কাম-বর্দ্ধক । অমুপান—পানের রস বা আদার রস ও মধু ।

মহালক্ষ্মীবিলাস । প্রস্ততবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বৃহৎ নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস । মহালক্ষ্মীবিলাস যে যে অবস্থায় প্রয়োজ্য, ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, বিশেষতঃ জ্বর, মাথা-ব্যথা, মাথাতার, বাক্যের জড়তা, শ্রবণশক্তির হ্রাস, গলায় ব্যথা এবং ভার-বোধ অথবা মুখ, নাসিকা বা জিহ্বা প্রভৃতিতে ক্ষত থাকিলে, এই ঔষধ অমৃত-বৎ উপকারী । প্রসবাস্তে প্রসূতির জ্বরাদি যে কোন উপসর্গ থাকিলে, ইহা প্রয়োজ্য । অমুপান—পান বা আদার রস ও মধু ।

বৃহৎ নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস । প্রস্ততবিধি ৬০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

নারদীয় মহালক্ষ্মীবিলাস । ইহাপেক্ষা শিরোরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই । অন্যান্য ঔষধে যে শিরোরোগ আরোপ্য না হয়, ইহাতে তাহাও আরোপ্য হয়, ফলতঃ শিরঃপিড়ার যে কোন অবস্থায় ইহা নির্বিচারে প্রয়োগ করা যায় । এই মহৌষধ প্রয়োগ করিলে, আর অন্য কোন ঔষধের আবশ্য-কতা হয় না । ষাভুক্ষয় বা স্ত্রীলোকের আর্ন্তবৃদ্ধি হইতে যে শিরোরোগ জন্মে, ইহাতে তাহাও অচিরে বিনষ্ট হয় । ইহা ধাতুপোষক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, আর্ন্তবশোধক এবং অনন্তবাত ও শল্যকনামক শিরোরোগ নাশক ।

নারদীয় মহালক্ষ্মীবিলাস । প্রস্ততবিধি ৬০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

মহালক্ষ্মীবিলাস (মতান্তরে) । বাতিক, পৈত্তিক, ক্লেমিক ও

সান্নিপাতিক শিরোরোগের প্রথমাবস্থায় ইহা অত্যন্ত উপকারী । শিরোরোগের সহিত অক্ষুধা, পাতলাদান্ত, অল্পপিত্ত, দুর্বলতা, গলাব্যথা, মুখে ঘা, জিহ্বায়-
ঘা, শরীরের জড়তা, আলস্য, নাসাস্রাব, কাস ও সর্দি প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে,
তাহাও ইহাতে বিনষ্ট হয় । প্রসবান্তে প্রয়োগ করিলে হ্তিকারোগে আক্রমণ
করিতে পারে না এবং শীঘ্র শরীর সুস্থ ও সবল হয় । অমুপান—আদার
রস ও মধু ।

মহাগন্ধীবিলাস (মতান্তরে) । লৌহ, অন্ন, বিষ, মূখা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া,
গুঠ, পিপ্পল, মরিচ, পুস্তুরবীজ, রক্তদারকবীজ, ভাস্কবীজ ও পিপ্পলমূলচূর্ণ প্রত্যেকে এক-
তোলা এবং গোক্ষুরচূর্ণ দুই তোলা, গুস্তুরপত্র রসে ভাবনা ৭টা । বটী ২ রতি ।

শিরোবজ্ররস । বাতিক, পৈতিক, শ্লেষিক ও সান্নিপাতিক শিরো-
রোগে কিসা অত্যন্ত শিরোরোগের প্রথম অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিবে ।
কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, ইহা প্রয়োগে কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে । শিরোরোগের
সহিত নাসাস্রাব, চক্ষুর দৃষ্টিহানি, মুখস্রাব এবং গলাব্যথা প্রভৃতি উপসর্গও
ইহাতে বিনষ্ট হয় । অমুপান—আদার রস ও মধু ।

শিরোবজ্ররস । কঙ্কলী ১৬ তোলা, লৌহ আট তোলা, অন্ন ৮ তোলা, ভাস্ক ৮ তোলা,
শোধিত গুগ্গুলু ৩২ তোলা, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সমভাগে মিলিত ১৬ তোলা
এবং কুড়, যষ্টিমধু, পিপ্পল, গুঠ গোক্ষুর, বিড়ঙ্গ, বেলছাল, শোণাছাল, গাঙ্গারীছাল,
পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, ব্যাকুড়, কণ্টকারী ও গোক্ষুরচূর্ণ প্রত্যেকে
১ তোলা । সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া দশমূলের কাথে ৭ বাব ভাবনা দিয়া সূতসংযোগে বটিকা
করিবে । মাত্রা—দুই আনা ।

অন্ধনাড়ীনাটকেশ্বর । শিরোরোগে এই নস্য অতি উপকারী । জল বা

শুনহৃদয়সহ বসিয়া নস্যের ত্রায় ব্যবহার করিতে হয় ।

অন্ধনাড়ীনাটকেশ্বর । কড়িম্ব ও মোহাগার ঐ প্রত্যেকে ২০ তোলা, মরিচচূর্ণ ২ তোলা
ও বিষচূর্ণ ৩ তোলা ; একত্র করিয়া শুনহৃদয় দ্বারা মর্দন করিয়া বটিকা করিবে ।

নস্ত্র । শিরোরোগে বায়ুদ্বারা মস্তকের প্রেমা শুষ্ক হইলে এবং রোগীর
সর্দি বা নাসাস্রাব বহুকাল বাবৎ বদ্ধ থাকিলে, নাসারন্ধ্রে এই চূর্ণ সর্ষপপ্রমাণ
নস্যের ত্রায় প্রয়োগ করিবে, বেশী প্রয়োগ করিলে হাঁচিতে হাঁচিতে নাসা-

বিবরের শ্লেষ্মিক কিল্লী ছিন্ন হইয়া রক্তশ্রাব হইতে পারে। যদি ঐরূপ হয়, দূর্ব্বার রস করিয়া নস্তগ্রহণ করিলে, তৎক্ষণাৎ রক্তশ্রাব বন্ধ হইবে।

নস্ত। বিছুটা পাতা অর্থাৎ বড় চোতরা পাতা শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে।

দশমূলতৈল। বাতিক ও শ্লেষ্মিক শিরোরোগে কিম্বা সান্নিপাতিক শিরোরোগে বায়ু বা শ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে, এই তৈলের নস্য অতি উপকারী। মস্তকের কপাটিতে বা সমস্ত মস্তকে মর্দনের ব্যবস্থা করিবে। শিরোরোগের সহিত পুরাতন জ্বর থাকিলে, সর্ব্বাঙ্গে মর্দন করিতে দিবে।

দশমূলতৈল। কটুতৈল /৪ সের। মুছাঁপাক করিবে। কাথ্যজব্য—দশমূল সাড়েবার সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কঙ্কজব্য—দশমূল সমভাগে মিলিত এক সের। দুগ্ধ ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

মধ্যমদশমূলতৈল। দশমূল তৈল যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রযোজ্য। দশমূলতৈল অপেক্ষা ইহা বেশী শক্তিশালী। পুরাতন জ্বরের সহিত শিরোরোগ থাকিলে সর্ব্বাঙ্গে মর্দন করা কর্তব্য।

মধ্যমদশমূলতৈল। কটুতৈল /৪ সের। মুছাঁপাক করিবে। কাথ্যজব্য—দশমূল এবং করঞ্জবীজ, নিশিন্দা পাতা, জয়ন্তীপাতা ও পুতুরাপাতা, এই চৌদ্দ জ্বেরের প্রত্যেকে ৪৮ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কঙ্কজব্য—এ চৌদ্দটিজ্বেরের প্রত্যেকে ৬ তোলা। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

বৃহৎ দশমূলতৈল। ইহা মধ্যমদশমূলতৈল অপেক্ষা বেশী কলপ্রদ, উর্দ্ধজক্রগত রোগ, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক এবং অর্দ্ধাবভেদক ও হৃদ্যাবর্ত্ত প্রভৃতি শিরোরোগে অতি প্রশস্ত। নস্যে, মর্দনে ও পানে ব্যবস্থা করা যায়।

বৃহৎ দশমূলতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথাবিধি মুছাঁপাক করিবে। কাথ্যজব্য—দশমূল প্রত্যেকে ৪০ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। আদাররস /৪ সের। নিশিন্দাপাতার রস /৪ সের। কঙ্কজব্য—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিত্রামূল, শুঠ, মরিচ, পিপুল, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শেতসর্ষপ, সৈন্ধব, যবক্ষার, ভেউড়ীমূল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

বৃহৎ দশমূলতৈল (মতান্তরে)। ইহা বৃহৎ দশমূলতৈল অপেক্ষা সামান্যিক গুণবিশিষ্ট, বিশেষে এই যে, যুথ, চক্ষুর পাঠা, নাসিকা ও কর্ণ প্রভৃতিতে

শোথসহ বেদনা থাকিলে ইহা প্রয়োগে স্ফঃ কল পাওয়া যায় । নশ্র, পান ও মস্তকে বা সর্ব্বাঙ্গে মর্দনের ব্যবস্থা করা যায় ।

বৃহৎ দশমূলতৈল । (মতান্তরে) । কটুতৈল ১৬ সের, যথানিয়মে মুচ্ছাঁপাক করিবে । কাথাদ্রব্য—দশমূল ১২৥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । পুতুরাপাতা ১২৥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । নিশিন্দাপাতা ১২৥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । পুনর্গবা- ১২৥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । কঙ্কদ্রব্য—বাসকছাল, বচ, দেবদারু, শটী, রাস্না, যষ্টিমধু, মরিচ, পিপুল, শুঠ, কৃষ্ণজীরা, কটুফল, করঞ্জবীজ, শজিনাছাল, কুড়, তেঁতুলছাল, বনশিম ও চিতামূল প্রত্যেকে ৮ তোলা । যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে ।

মহাদশমূলতৈল । ইহা বৃহৎ দশমূলতৈল অপেক্ষা সমধিক ফলপ্রদ, বাতিক ও গ্লেট্টিক শিরোরোগ নাশক । নশ্র, পান ও মর্দনে প্রয়োগ করা যায় ।

মহাদশমূলতৈল । কটুতৈল ১৬ সের । যথাবিধি মুচ্ছাঁপাক করিবে । কাথাদ্রব্য—দশমূল ১২৥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । গোড়ালেবুর রস ১৬ সের, আদার রস ১৬ সের, পুতুরাপাতার রস ১৬ সের । কঙ্কদ্রব্য—পিপুল, গুলক, দারুহরিলা, শুল্ফা, পুনর্গবা, শজিনা- ছাল, পিপুল, কটুকা, করঞ্জবীজ, কৃষ্ণজীরা, খেতসর্বপ, বচ, শুঠ, গজপিপুল, চিতামূল, শটী, দেবদারু, বেড়োলা, রাস্না, হুড়ুছুড়ে, কটুফল, নিসিন্দাপাতা, চই, গেরিমাটি, পিপুলমূল, শুষ্কমুলা, যমানী, জীরা, কুড়, বনযমানী ও বিস্তারকবীজ ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা । যথারীতি তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে ।

ষড়্বিন্দুতৈল । ইহা পৈত্তিক ও রক্তজ শিরোরোগে এবং অনন্তবাত, শঙ্খক ও সূর্য্যাবর্ত্তরোগে মহোপকারী । নশ্র ও মর্দনে প্রয়োগ করা যায় ।

ষড়্বিন্দুতৈল । কৃষ্ণতিল তৈল ৪ সের । ছাগদুগ্ধ ৪ সের ও ভীমরাজের রস ১৬ সের, কঙ্কদ্রব্য—এরুণ্ডমূল, তগরপাটকা, শুল্ফা, জীবন্তী, রাস্না, সৈন্ধবলবণ, দারুচিনি, বিড়ঙ্গ, যষ্টি- মধু ও শুঠ সমভাগে মিলিত এক সের । যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে ।

শিরোরোগে—পথ্য ।

শালি ও যষ্টিক ধাতের তণ্ডুলের অন্ন, আটার রুটি, যুগের দাইল, মহুরের দাইল, দুগ্ধ, পটোল, শজিনা, বেতোশাক, করম্না ও উচ্ছে প্রভৃতির যতপক- তরকারী, মাগুর, কই, রোহিত ও খলিশা মাছের ষোল প্রভৃতি শিরোরোগে সুপথ্য ।

চক্ষুরোগ-চিকিৎসা ।

(নেত্র দৃষ্টিগত—রোগ) ।

প্রথমপটলাশ্রিত চক্ষুরোগের লক্ষণ । দৃষ্টিমণ্ডলের সর্বনিম্নে কালকাস্থিস্থিত প্রথম পটল (প্রথম আবরণ) দূষিত হইলে, রোগীর দৃষ্টিবিভ্রম জন্মে অর্থাৎ রোগী কখন কখন অস্পষ্ট এবং কখন কখন বা স্পষ্টরূপে দেখিতে পায় ।

দ্বিতীয়পটলাশ্রিত চক্ষুরোগের লক্ষণ । দৃষ্টিমণ্ডলের মেদাশ্রিত দ্বিতীয় পটল (দ্বিতীয় আবরণ) দূষিত হইলে, অধিক দৃষ্টিবিভ্রম জন্মে, সুতরাং রোগী তজ্জন্ম মশা, মাছি, কেশ, জাল, মণ্ডল, পতাকা, রশ্মি (কিরণ), কুণ্ডলাকার, জলপ্লাবিতবৎ, দৃষ্টি ও অন্ধকার প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রতিবিম্ব দর্শন করে এবং দৃষ্টিবিভ্রমহেতু নিকটস্থ বস্তুকে দূরস্থ ও দূরস্থ বস্তুকে নিকটস্থ দেখে, পরন্তু অতি কষ্টেও হৃচিকার (হৃচের) ছিদ্র দেখিতে পায় না ।

তৃতীয় পটলাশ্রিত চক্ষুরোগের লক্ষণ । দৃষ্টিমণ্ডলের মাংসাশ্রিত তৃতীয় পটল দূষিত হইলে, রোগী সর্বদা উর্দ্ধদিকে নিরীক্ষণ করে, অথো-
দিকের বস্তু দেখিতে পায় না, উর্দ্ধদিকের স্তূলাকার দ্রব্যসকল বস্তুদ্বারা আবৃত-
বৎ বোধ হয় এবং জীবজন্তুর কর্ণ, নাসিকা ও চক্ষু বিকটাকার দৃষ্ট হয় । এই-
রোগে যে দোষ প্রকৃপিত হয়, দৃশ্য বস্তুসকল সেই সেই দোষজনিত বর্ণে রঞ্জিত
দৃষ্ট হইয়া থাকে, বায়ুর প্রকোপে রক্তবর্ণ, পিত্তের প্রকোপে পীত বা নীলবর্ণ
এবং শ্লেষ্মার প্রকোপে গুরুবর্ণ দৃষ্ট হয় ।

দোষের অবস্থান-ভেদে রোগের লক্ষণ । পটলের বা আবরণক-
পর্দার নিম্নভাগ দূষিত হইলে, নিকটের দ্রব্য, উর্দ্ধভাগ দূষিত হইলে দূরের
দ্রব্য এবং পার্শ্বদেশ দূষিত হইলে, পার্শ্বের দ্রব্য দেখা যায় না । একেবারে
সমস্ত পটল দূষিত হইলে, নানাবিধরূপ মিলিতভাবে এক সময়ে দৃষ্ট হয়,
পটলের মধ্যস্থল দূষিত হইলে বড়দ্রব্য ছোট দেখায় । পটল তির্যাকভাবে
(বক্রভাবে) দূষিত হইলে একটি দ্রব্য দুইটির আয় দেখায়, দুই পার্শ্বদূষিত
হইলে একটি দ্রব্য দ্বিধা দৃষ্ট হয় এবং দোষ পটলের নানা স্থানে অবস্থান
করিলে একটি বস্তুকে বহুসংখ্যক বলিয়া বোধ হয় ।

চতুর্থ পটলশ্রিত চক্ষুরোগের লক্ষণ । দৃষ্টিমণ্ডলের রসরক্তাশ্রিত চতুর্থ বা বাহু পটল দূষিত হইলে সৰ্ব্বতোভাবে দৃষ্টিরোধ হয়, কিন্তু দোষের অল্পতা থাকিলে, রোগী চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ ও অলঙ্কারাদির জ্যোতি বা দীপ্যমান বস্তু দেখিতে পায় । ইহাকে তিমিররোগ কহে । লিঙ্গ-নাশ, নীলিকা ও কাচ এই তিনটি তিমিররোগের নামান্তর ।

কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্টিমণ্ডলরোগের নাম ও সংখ্যা । দৃষ্টিমণ্ডলে ষাটপ্রকার রোগ জন্মে, তন্মধ্যে লিঙ্গ-নাশ ছয়প্রকার, যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক, রক্তজ ও পরিম্বায়ী । অপর ছয় প্রকার এই—পিত্ত-বিদগ্ধদৃষ্টি, শ্লেষ্মবিদগ্ধদৃষ্টি, ধূমদর্শন, ব্রহ্মজাড্য, নকুলান্ধ্য ও গভীরক ।

বাতিক তিমিরের লক্ষণ । এইরোগে রোগী দৃশ্যবস্তু চঞ্চল, আবিল (ঘোলা'টে) বা কিঞ্চিৎ লোহিতবর্ণ এবং কুটিলরূপ দর্শন করে ।

পৈত্তিক তিমিরের লক্ষণ । এইরোগে রোগী সূর্য্য, জোনাকীপোকা, রামধনু ও বিদ্যুতের আয় রূপ দর্শন করে এবং দৃশ্যবস্তু ময়ূর-পুচ্ছের আয় দেখিতে পায় ।

শ্লেষ্মিক তিমিরের লক্ষণ । এইরোগে রোগী সমুদয় দৃশ্যবস্তু বড়, নিক (তৈলাক্ত বা দৃতাক্ত), শুক্লবর্ণ ও জলসিক্ত দ্রব্যের আয় আর্দ্র দেখিতে পায় ।

রক্তজনিত লিঙ্গনালের লক্ষণ । এইরোগে রোগী দৃশ্যবস্তু সকল রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ দেখিতে পায় ।

সান্নিপাতিক তিমিরের লক্ষণ । এইরোগে রোগী দৃশ্যবস্তু সকল নানা বর্ণে রঞ্জিত এবং বিধা বা বহুধা বিভক্ত, অঙ্গহীন কিম্বা বহু অঙ্গবিশিষ্ট দেখিতে পায় ও নানা প্রকার জ্যোতি দর্শন করিয়া থাকে ।

পরিম্বায়ীর লক্ষণ । দূষিত রক্ত পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে । এই রোগে রোগী চতুর্দিক পীতবর্ণ এবং উদ্ভিত সূর্য্যের আয় অথবা বৃক্ষসমূহ জোনাকী পোকা বা অগ্নি দ্বারা আবৃতবৎ দেখে ।

বাতাদিজনিত দৃষ্টিনাশে দৃশ্যবস্তু যেক্রপ বর্ণে রঞ্জিত দৃষ্ট হয়, তাহা কথিত

হইল, এক্ষণে বাতাদির প্রকোপে নেত্রমণ্ডল কি প্রকার বর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহাই কথিত হইতেছে ।

দৃষ্টিমণ্ডলের বর্ণের সামান্য লক্ষণ । বাতিক লিঙ্গনাশে (তিমিরে) দৃষ্টিমণ্ডল রক্তবর্ণ, পরিমায়ী ও পৈত্তিক লিঙ্গনাশে দৃষ্টিমণ্ডল নীলবর্ণ, পীতবর্ণ, শ্লেষ্মিক দৃষ্টিনাশে শুক্লবর্ণ, রক্তজ দৃষ্টিনাশে রক্তবর্ণ এবং সান্নিপাতিক দৃষ্টিনাশে নেত্রমণ্ডল নানা বর্ণবিশিষ্ট হয় ।

দৃষ্টিমণ্ডলের বর্ণের বিশেষ লক্ষণ । বাতিক দৃষ্টিনাশে দৃষ্টিমণ্ডল লোহিতবর্ণ, চঞ্চল ও রুদ্ধ হয় । পৈত্তিক দৃষ্টিনাশে দৃষ্টিমণ্ডল নীলবর্ণ, পীতবর্ণ অথবা কাসার পাত্রেয় তায় শুক্লবর্ণ হয় । শ্লেষ্মিক দৃষ্টিনাশে দৃষ্টিমণ্ডল স্নিগ্ধ এবং শব্দ, কুম্পপুষ্প ও চন্দ্রের তায় শুক্লবর্ণ বা পাণ্ডুবর্ণ অথবা পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর তায় চঞ্চল ও শুক্লবর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে । সান্নিপাতিক দৃষ্টিনাশে উক্ত বাতাদি ত্রিদোষের বর্ণ ও লক্ষণ মিলিতভাবে দৃষ্ট হয় । রক্তজ দৃষ্টিনাশে দৃষ্টিমণ্ডল প্রবাল এবং রক্তপদ্মপত্রের তায় কিম্বা স্থূল অথচ লোহিতবর্ণ কাচের তায় আভাবিশিষ্ট হয় । পরিমায়ীরোগে দৃষ্টিমণ্ডল স্নানতাবাপন্ন ও নীলবর্ণ হইয়া থাকে । এইরোগে সময় সময় দোষের লাঘব হয় ও তজ্জগ্ন স্বয়ং দর্শনশক্তি উপস্থিত হয় অর্থাৎ রোগী কখন কখন দেখিতে পায় । পরন্তু বাতাদি দোষভেদে নেত্রে দাহ, গুরুতা ও বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে ।

পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টির লক্ষণ । প্রকুপিত পিত্ত প্রথম ও দ্বিতীয় পটল আশ্রয় করিলে দৃষ্টি পীতবর্ণ হয় এবং রোগী দৃশ্য সমস্ত পদার্থ পীতবর্ণ দর্শন করে । প্রকুপিতপিত্ত তৃতীয় পটলকে আশ্রয় করিলে, রোগী দিনে দেখিতে পায় না, কিন্তু রাত্রিতে শৈত্যতাবশতঃ পিত্তপ্রশমিত হয় বলিয়া সমস্ত বস্তু দেখিতে পায় ।

শ্লেষ্মাবিদগ্ধদৃষ্টির লক্ষণ । দূষিত শ্লেষ্মা প্রথম ও দ্বিতীয় পটল আশ্রয় করিলে, রোগী সমস্ত দ্রব্য শুক্লবর্ণ দর্শন করে । তৃতীয় পটল আশ্রয় করিলে, রাত্র্যক্লান্তা উপস্থিত হয়, কিন্তু দিবাভাগে সূর্য্য, উদিত ও শ্লেষ্মার লাঘব হয় বলিয়া দেখিতে পায় ।

ধূমদর্শনের লক্ষণ । শোক, জ্বর ও পরিশ্রম হেতু এবং মস্তকে রোদ্রা-
দির উতাপ লাগা এই সকল কারণে দৃষ্টি আহত হইলে, রোগী দৃশ্যমান সকল
বস্তুকে ধূমরা আকৃষ্টবৎ দর্শন করে, এই রোগকে ধূমদর্শন কহে ।

ব্রহ্মজড়তার লক্ষণ । এই রোগে দিবাভাগে বড় বস্তু অতি কষ্টে
ক্ষুদ্রবৎ দৃষ্ট হয় এবং রাত্রিকালে পরিমাণ মত দৃষ্ট হয়, এ কারণ ইহাকে ব্রহ্ম-
জড়তা বা ব্রহ্ম-জাড্য কহে ।

নকুলাক্ষ্যরোগের লক্ষণ । এই রোগে রোগী দিবাভাগে বাবতীয় বস্তু
চিত্রবিচিত্র দর্শন করে এবং রাত্রিকালে চক্ষুর দীপ্তি নকুলের ত্রায় উজ্জ্বল হয় ।

গস্তীরকের লক্ষণ । এই রোগে সমগ্রদৃষ্টি-মণ্ডলে বায়ু প্রকুপিত হইলে
দৃষ্টি বিকৃতিভাবাপন্ন হয় এবং পার্শ্ববেষ্টন হেতু সমুচিত হইয়া অভ্যন্তরে
প্রবেশ করে ও গাঢ় বেদনায়িত হয় ।

উক্ত দৃষ্টিনাশ ব্যতীত নিমিত্তজ ও অনিমিত্তজ ভেদে আরও দুইপ্রকার
আগন্তজ দৃষ্টিনাশ রোগ আছে, তাহাদের লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে ।

নিমিত্তজ দৃষ্টিনাশের লক্ষণ । বিষাক্ত পুষ্পাদি দ্বারা দূষিত বায়ুর
খাস গ্রহণ করিলে মস্তক সন্তপ্ত হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয় । এই রোগের
লক্ষণ রক্তজ অভিভ্রাম্যরোগের ত্রায় ।

অনিমিত্তজ দৃষ্টিনাশের লক্ষণ । দেবতা, ঋষি ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি দর্শন
করিলে, দৃষ্টি আহত হইয়া এই রোগ জন্মে । এই রোগে অন্ধি-গোলক
অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, জ্যোতিবিশিষ্ট ও নির্মল হয়, কিন্তু দর্শন শক্তি-লোপ
পাইয়া থাকে ।

নেত্র-কৃষ্ণগত-রোগ ।

কৃষ্ণগতরোগের নাম ও সংখ্যা । গুরু, অত্রণ গুরু, অন্ধি-
পাকাত্যয় এবং অজকাজাত এই চারি প্রকার রোগ চক্ষুর কৃষ্ণমণ্ডলে জন্মে ।

সত্রাণশুক্লের লক্ষণ । এই রোগে চক্ষুর মধ্যস্থ কৃষ্ণবর্ণ মণির উপর
নিমগ্নরূপ গোলাকার, গুরুবর্ণ অথচ স্থিতিবিদ্ধবৎ বেদনায়ুক্ত চিহ্ন জন্মে ও চক্ষু-
হইতে অনবরত উষ্ণ জলপ্রাব হয় ।

সত্রণশুল্কের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ । সত্রণশুল্ক দৃষ্টির নিকটবর্তী বা গাঢ়-মূল অর্থাৎ দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্বক্ আশ্রিত না হইলে এবং অল্প শ্রাব ও স্নেহং বেদনা বিশিষ্ট অথচ একটি মাত্র শুল্ক চিহ্ন উৎপন্ন হইলে, কদাচিৎ আরোগ্য হয়, কিন্তু উহার বিপরীত লক্ষণযুক্ত অর্থাৎ শুল্কবর্ণ দুইটি চিহ্ন উৎপন্ন হইলে ও তাহাতে অত্যন্ত বেদনা এবং শ্রাব থাকিলে তাহা অসাধ্য ।

অব্রণশুল্কের লক্ষণ । অভিযান্দহেতু অব্রণশুল্ক কক্ষমণ্ডলে শঙ্খ, চন্দ্র বা কুন্দপুষ্পের ঝায় আভাযুক্ত অথবা আকাশের বা অন্নের ঝায় স্বেতব্রণবিশিষ্ট এবং দাহযুক্ত চিহ্ন উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অব্রণ শুল্ক কহে । ইহা সাধ্য ।

কৃষ্ণসাধ্য অব্রণশুল্কের লক্ষণ । অব্রণশুল্ক গম্বীর মূলবিশিষ্ট অর্থাৎ দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্বগাশ্রিত, পুষ্ট এবং বহুকালোৎপন্ন হইলে, অতি কষ্টে আরোগ্য হয় ।

অব্রণশুল্কের অসাধ্য লক্ষণ । যদি মাংসবিশীর্ণতা বর্ণনঃ অব্রণশুল্কের মধ্যস্থান নিম্ন (ডোবর), মাংসাতুরদ্বারা আবৃত, সচল, লোহিতবর্ণ এবং দুইটি বা তিনটি পটল ব্যাপিয়া অথচ শিরাতে উৎপন্ন হয় এবং তাহা দীর্ঘকালজাত হয় ও দর্শনশক্তি নষ্ট করে, তাহা হইলে অসাধ্য ।

অনুপ্রকার অসাধ্য লক্ষণ । কেহ কেহ বলেন, কৃষ্ণ মণিতে যদি মুগের ঝায় পিড়কা উৎপন্ন হয় ও তাহা হইতে উষ্ণ অশ্রুপাত হয়, তাহা হইলে, তাহাও অসাধ্য । পরন্তু তিত্তিরপাখীর পাখার ঝায় বর্ণবিশিষ্ট শুল্ক চিহ্ন উৎপন্ন হইলে, তাহাও অসাধ্য ।

অক্ষিপাকাত্যয়ের লক্ষণ । বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপবর্ণনঃ সমস্ত কক্ষমণ্ডল (মণি) শুল্কবর্ণ হইলে, তাহাকে অক্ষিপাকাত্যর কহে । এই রোগ অসাধ্য ।

অজকাজাতের লক্ষণ । চক্ষুর কক্ষমণ্ডলে কিঞ্চিৎ লোহিত ও বেদনা-যুক্ত অথচ ছাগলের শুক্ক বিষ্ঠার ঝায় শোথ উৎপন্ন হইলে, এবং তাহা হইতে রক্তমিশ্রিত অথচ পিচ্ছিল অশ্রু নির্গত হইলে, তাহাকে অজকাজাত কহে ।

নেত্রসন্ধিগত রোগ ।

নেত্র-সন্ধিগত রোগ ছয় প্রকার, যথা—পক্ষসন্ধি, বস্মসন্ধি, বস্ম ও শুক্রগত সন্ধি, শুক্র ও কৃষ্ণগত সন্ধি, কৃষ্ণ ও দৃষ্টিগতসন্ধি এবং কনীনিকা সন্ধি ।

সন্ধিগতরোগের নাম ও সংখ্যা । সন্ধিগতরোগ নয় প্রকার, যথা—পুয়ালস, উপনাহ, চারি প্রকার আব, পার্শ্বনিকা, অলজী এবং ক্রিমি-গ্রন্থি ।

পুয়ালসের লক্ষণ । কনীনিকা-সন্ধিতে (নেত্রান্তে নাসাসমীপে) হৃদিবিন্দবৎ বেদনায়ুক্ত শোথ উৎপন্ন হইয়া তাহা পাকিলে ও তাহা হইতে দুর্গন্ধ পুথ নির্গত হইলে, তাহাকে পুয়ালস কহে ।

উপনাহের লক্ষণ । কৃষ্ণমণ্ডল ও দৃষ্টি মণ্ডলের সন্ধিস্থানে অল্প-বেদনা ও পাকবিশিষ্ট অথচ কণ্ডুযুক্ত গ্রন্থি উৎপন্ন হইলে, তাহাকে উপনাহ কহে ।

চতুর্বিধস্রাবের সম্প্রাপ্তি । কুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফ নেত্রগত সমস্ত সন্ধিকে আশ্রয় করিয়া স্বীয় স্বীয় লক্ষণবিশিষ্ট চারি প্রকার স্রাব উৎপাদন করে । কেহ কেহ ইহাকে নেত্রনাড়া (নাগী) নামে অভিহিত করেন । ইহাদের লক্ষণ কথিত হইতেছে—

পৈত্তিকস্রাবের লক্ষণ । পৈত্তিক স্রাবে সন্ধিগত নাড়া হইতে হরি দ্রাব বর্ণবিশিষ্ট বা পীতবর্ণ উষ্ণ জলের তায় তরল ও স্বচ্ছ পুথ নির্গত হয় ।

শ্লেষ্মিক স্রাবের লক্ষণ । ইহাতে সন্ধিগত নাড়া হইতে শুক্রবর্ণ, ঘন ও পিচ্ছিল পুথ স্রাব হয় ।

সান্নিপাতিক স্রাবের লক্ষণ । ইহাতে চক্ষুর সন্ধিস্থান পাকে ও তাহা হইতে পুহস্রাব হয় ।

রক্তজ স্রাবের লক্ষণ । ইহাতে সন্ধিগত নাড়া হইতে নিরন্তর উষ্ণ ও পাতলা রক্তস্রাব হয় ।

পার্বণিকার লক্ষণ । কৃষ্ণমণ্ডল ও শুক্রমণ্ডল উভয়ের সন্ধিস্থানে দাহ ও পাকবিশিষ্ট অথচ তাম্রবর্ণ ও গোলাকার শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে পার্শ্বনিকা কহে ।

অলজীৱ লক্ষণ । কৃষ্ণ ও শুক্রমণ্ডলের সন্ধিস্থানে অলজী নামক প্রমেহ-
পিড়কার লক্ষণযুক্ত পিড়কা (ফোটক) উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অলজী কহে ।

ক্রিমিগ্রন্থির লক্ষণ । যে রোগে বস্ম ও পক্ষের সন্ধিস্থানে ক্রিমি
জন্মিয়া কণ্ডু উৎপাদন করে এবং ক্রমে ক্রমে ঐ ক্রিমিগণ বস্ম ও শুক্রের সন্ধি-
স্থানে প্রবেশ করিয়া দর্শনশক্তি বিনষ্ট করে, তাহাকে ক্রিমিগ্রন্থি কহে ।

নেত্রশুক্রগত রোগ ।

শুক্রগতরোগের নাম ও সংখ্যা । চক্ষুর শুক্রভাগে সর্বসময়ে এগার-
প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়, যথা প্রস্তার্যাস্ম, শুক্রাস্ম, রক্তাস্ম, অধিমাংসাস্ম ও
দ্রাব্যাস্ম এই পাঁচ প্রকার এবং শুষ্কি, অর্জুন, পিষ্টক, শিরাজাল, শিরাজ পিড়কা
ও বলাসগ্রন্থি এই ছয় প্রকার ।

প্রস্তার্যাস্মরোগের লক্ষণ । এই রোগে শুক্রমণ্ডলে গ্রাম বা রক্তবর্ণ
অথচ পাতলা ও বিস্তৃত মাংস উৎপন্ন হয় ।

শুক্রাস্মের লক্ষণ । এই রোগে শুক্রমণ্ডলে কিঞ্চিৎ শুক্রবর্ণ অথচ
কোমল মাংস উৎপন্ন হইয়া বিলম্বে বর্ধিত হয় ।

রক্তাস্মের লক্ষণ । এই রোগে শুক্রমণ্ডলে রক্তবর্ণ অথচ কোমলমাংস
উৎপন্ন হয় ।

অধিমাংসাস্মের লক্ষণ । এই রোগে শুক্রমণ্ডলে বিস্তৃত, পুষ্ট অথচ
কোমল এবং যকৃতের ত্রায় কিঞ্চিৎ কৃষ্ণমিশ্রিত লোহিতবর্ণ মাংস সঞ্চিত
হইয়া থাকে ।

দ্রাব্যাস্মের লক্ষণ । প্রস্তার্যাস্মরোগ হইতে ইহা উৎপন্ন হয় । এই
রোগে কঠিন ও আবরহিত বহুমাংস কৃষ্ণমণ্ডলে সঞ্চিত হয় ।

শুষ্কির লক্ষণ । চক্ষুর শুক্রমণ্ডলে গ্রামবর্ণ অথবা মাংসের কিঞ্চিৎ
কের ত্রায় বর্ণবিশিষ্ট বিন্দু বিন্দু মাংসসকল সঞ্চয় হয় ।

অর্জুনের লক্ষণ । এই রোগে চক্ষুর শুক্রমণ্ডলে শশকের রক্তের ত্রায়
লোহিতবর্ণ একটীমাত্র বিন্দু উৎপন্ন হয় ।

পিষ্টকের লক্ষণ । • এই রোগে বায়ু ও পিত্তের প্রকোপবশতঃ চক্ষুর শুক্রমণ্ডলে পেষিত তণ্ডুলের আয় কোমল অথচ মলিন দর্পণের আয় স্বচ্ছ মাংস উদ্গত হয় ।

শিরাজালের লক্ষণ । এই রোগে চক্ষুর শুক্রমণ্ডলে জালের আয় ছিদ্র-বিশিষ্ট, কঠিন, কিঞ্চিৎ লোহিতবর্ণ এবং শিরাজালদ্বারা আবৃত বিন্দুমাত্র মাংস উদ্গত হয় ।

শিরাজ পিড়কার লক্ষণ । এই রোগে শুক্রমণ্ডলের উপর শিরাসমূহ-দ্বারা আবৃত খেতবর্ণ পিড়কা উৎপন্ন হয় । ইহা শুক্রমণ্ডলের সমীপবর্তী শিরা-হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া শিরাজ পিড়কা নামে অভিহিত হয় ।

বলাসগ্রস্থির লক্ষণ । এই রোগে শুক্রমণ্ডলের উপরে কঁাসার আয় খেতবর্ণ, কঠিন ও জলবিন্দুর আয় কিঞ্চিৎ উন্নত মাংস উদ্গত হয় ।

নেত্র-বত্মর্গরোগ ।

বত্মর্গরোগের নাম ও সংখ্যা । উৎসঙ্গিনী, কুস্তিকা, পোথকী, বত্মর্গর্করা, বত্মর্গাশ, শুষ্কার্শ, অজ্ঞানদৃষিকা, বহুলবত্ম, বত্মবন্ধক, ক্লিষ্টবত্ম, বত্ম-কর্দম, শ্রামবত্ম, প্রক্লিষ্টবত্ম, বত্মাক্ষুদ, নিমেষ, শোণিতার্শ, নগণ, বিষবত্ম এবং কুঞ্জন এই একবিংশতি প্রকার বত্মরোগ ।

উৎসঙ্গ পিড়কার লক্ষণ । গ্রিদোধের প্রকোপ বশতঃ বত্মমধ্যে (চক্ষুগোলকের আবরক পটলদ্বয়ে) স্থল কণ্ডুযুক্ত, উন্নত ও তাম্রবর্ণ অথচ অভ্যন্তরে মুখবিশিষ্ট পিড়কা উৎপন্ন হইলে, তাহাকে উৎসঙ্গ পিড়কা কহে ।

কুস্তিকার লক্ষণ । এই রোগে চক্ষুর বত্মমধ্যে কুস্তীবীজ সদৃশ দাড়িমফলের আয় (ফলবিশেষ) পিড়কা উৎপন্ন হয় ও তাহা বিদীর্ণ হইয়া আব নির্গত হইতে থাকে এবং পুনর্বার ক্ষীত হয় ।

পোথকীর লক্ষণ । বত্মমধ্যে কণ্ডু ও আববিশিষ্ট অথচ গুরু ও বেদনাহিত রক্তসর্ষপাকার পিড়কা উৎপন্ন হইলে, তাহাকে পোথকী কহে ।

বত্সর্শকরার লক্ষণ । বত্সর্শকরার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা দ্বারা বেষ্টিত স্থলা-
কার ও খরস্পর্শ পীড়কা উৎপন্ন হইলে, তাহাকে বত্সর্শকরা কহে ।

বত্সর্শের লক্ষণ । বত্সর্শের মধ্যে কাণ্ডবীজ সদৃশ অথচ তীক্ষ্ণাগ্র ও অল্প-
বেদনাবিশিষ্ট পিড়কা উৎপন্ন হইলে, তাহাকে বত্সর্শ কহে ।

শুষ্কার্শের লক্ষণ । বত্সর্শের মধ্যে দীর্ঘ অক্ষুরবিশিষ্ট অথচ খরস্পর্শ,
অত্যন্ত কঠিন ও শুষ্ক মাংসাক্তর উৎপন্ন হইলে তাহাকে শুষ্কার্শ কহে ।

অঞ্জনদূষিকার লক্ষণ । বত্সর্শের মধ্যে দাহ ও সূচিবদ্ধবৎ কিম্বা অল্প-
বেদনায়ুক্ত, কোমল অথচ তাগ্রবর্ণ পিড়কা উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অঞ্জন-
দূষিকা কহে ।

বহ্লবত্সের লক্ষণ । সমস্ত বত্সের উপরে চত্বের ত্রায় বর্ণবিশিষ্ট,
কঠিন ও অচল বহুসংখ্যক পিড়কার উৎপত্তি হইলে, তাহাকে বহ্লবত্স-
কহে ।

বত্সবন্ধকের লক্ষণ । এই রোগে বত্সদ্বয়ে কণ্ডু ও অল্প বেদনাবিশিষ্ট
বৃহৎ শোথ উৎপন্ন হয় বলিয়া রোগী সম্যক্ৰূপে চক্ষুগোলক আচ্ছাদন করিতে
পারে না ।

ক্লিষ্টবত্সের লক্ষণ । বত্সদ্বয় প্রথমে কোমল, তাগ্রবর্ণ এবং অল্প
বেদনাবিশিষ্ট হইয়া অকস্মাৎ রক্তবর্ণ হইলে, তাহাকে ক্লিষ্টবত্স কহে ।

বত্সকর্দমের লক্ষণ । ক্লিষ্টবত্স রোগে পিত্ত অত্যন্ত প্রকৃপিত হইলে,
রক্ত দূষিত হইয়া কর্দমবৎ আদ্র ক্লেদ আব হয়, এই রোগের নাম বত্সকর্দম ।

শ্রামবত্সের লক্ষণ । বত্সের বহির্দেশে ও অভ্যন্তরে কণ্ডু ও অল্প-
বেদনাবিশিষ্ট অথচ শ্রামবর্ণ ও আদ্রতাবাপন্ন শোথ জন্মিলে, তাহাকে
শ্রামবত্স কহে ।

প্রক্লিষ্টবত্সের লক্ষণ । বত্সের বহির্দেশে অল্প বেদনাবিশিষ্ট শোথ
উৎপন্ন ও তাহা হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে, তাহাকে প্রক্লিষ্ট বত্স কহে ।

অক্লিষ্টবত্সের লক্ষণ । যে রোগে বত্সদ্বয় পাকে না অথচ ধৌত না

করিলে পরস্পর সংলগ্ন হয়, কিন্তু পুনঃ পুনঃ ধৌত করিলে আবার পৃথক হয়, তাহার নাম অক্লিন্নবস্ম ।

বাতহীতবস্মের লক্ষণ । এই রোগে বস্ম (নেত্রাবরণ) সন্ধি হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে, সুতরাং রোগী নিমেষোন্মেষরহিত (মিলনোন্মীলন রহিত) হয়, পরন্তু সন্ধোচনে অক্ষমতা প্রযুক্ত চক্ষু মুদ্রিত থাকে, মেলিতে পারে না ।

বস্মার্জবদূদের লক্ষণ । এই রোগে বস্মের অভ্যন্তরে বিষম (অস-
মান), কিঞ্চিৎ বেদনাবিশিষ্ট, দীপং রক্তবর্ণ অথচ পাকরহিত অর্কুদ জন্মে ও শীঘ্র বর্ধিত হয় ।

নিমেষের লক্ষণ । এই রোগে বায়ু প্রকুপিত হইয়া বস্ম ও শুক্রের সন্ধিস্থিত মিলনোন্মীলনকারী সূক্ষ্ম শিরাসমূহে প্রবেশ করিয়া বস্মদ্বয়কে (নেত্রাবরণদ্বয়কে) অতিশয় সঞ্চালিত করে ।

শোণিতার্শের লক্ষণ । এই রোগে প্রদুষ্টরক্ত বস্মে (নেত্রাবরণচর্মে) কোমল এবং রক্তর্ণ মাংসাদ্ধর উৎপাদন করে, ইহা ছেদভেদ করিলেও পুনর্ব্যার বর্ধিত হয় ।

নগণের লক্ষণ । প্লেয়ার প্রকোপবশতঃ বস্মের উপরে কঠিন, স্থূল, কণ্ডূযুক্ত, পিচ্ছিল অথচ পাকরহিত বদরের ঝায় যে গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাকে নগণ কহে ।

বিষবস্মের লক্ষণ । ত্রিদোষের প্রকোপবশতঃ বস্মের বহির্দেদেশে শোথ উৎপন্ন হইলে এবং ঐ শোথ বহুসংখ্যক ছিদ্রবিশিষ্ট ও সেই সকল ছিদ্র হইতে জলের ঝায় অথচ বিষাক্ত স্রাব হইলে, তাহাকে বিষবস্ম কহে ।

কৃষ্ণনের লক্ষণ । এই রোগে বাতাদি ত্রিদোষের প্রকোপবশতঃ বস্মদ্বয় সঙ্কুচিত হইলে, তজ্জন্ম রোগী দোষিতে পায় না ।

(পক্ষ্ম অর্থাৎ বস্ম—লোমগত রোগ ।)

পক্ষ্মগতরোগের নাম ও সংখ্যা । পক্ষ্মগতরোগ দুই প্রকার, যথা—পক্ষ্মকোপ ও পক্ষ্মশাত ।

পক্ষ্মকোপরোগের লক্ষণ । এই রোগে বায়ুর প্রকোপবশতঃ পক্ষ্ম (বহ্ম-লোম) সঞ্চালিত এবং নেত্রাবরণ হইতে স্থলিত হইয়া চক্ষুর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় ও তজ্জন্ত পুনঃ পুনঃ চক্ষু ঘর্ষণে কৃষ্ণমণ্ডল ও শুক্রমণ্ডলে শোথ জন্মে ।

পক্ষ্মশাতের লক্ষণ । পিত্ত প্রকুপিত হইয়া বয়ে দাহযুক্ত কণ্ডু উৎপাদন করিয়া পক্ষ্ম-লোম স্থলিত করিলে, তাহাকে পক্ষ্মশাত কহে ।

(নেত্রসর্বগতরোগ)

নেত্রাভিঘ্নান্দ ।

অভিঘ্নান্দরোগের নাম ও সংখ্যা । অভিঘ্নান্দরোগ চারি প্রকার, যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক ও রক্তজ ।

সর্বপ্রকার অভিঘ্নান্দরোগের সাধারণ লক্ষণ । সর্বপ্রকার অভিঘ্নান্দরোগে অত্যন্ত বেদনার সহিত জলশ্রাব হয় এবং সর্বনেত্রগত অত্যাশ্র উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে ।

বাতিক অভিঘ্নান্দের লক্ষণ । এই রোগে চক্ষুতে স্থচিবিন্ধবৎ বেদনা, চক্ষুর জড়তা, চক্ষুর মধ্যে করু করু করা, চক্ষুর রুদ্ধতা, মস্তক-বেদনা, রোমাঞ্চ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয় এবং এবং চক্ষু হইতে শীতল অশ্রু নির্গত হইয়া থাকে, কিন্তু দৃষ্টির কোন প্রকার ব্যাঘাত জন্মে না ।

পৈত্তিক অভিঘ্নান্দের লক্ষণ । এই রোগে চক্ষু অত্যন্ত জ্বালা করে, গীতবর্ণ হয় ও পাকে এবং চক্ষু হইতে ধূম নির্গতবৎ বোধ ও উষ্ণজলশ্রাব হইয়া থাকে । পরন্তু চক্ষুতে শীতলক্রিয়া করিলে সুখবোধ হয় ।

শ্লেষ্মিক অভিঘ্নান্দের লক্ষণ । এই রোগে চক্ষু ভার, শীতল ও নিম্ন বোধ হয় এবং চক্ষুতে শোথ ও কণ্ডু উৎপন্ন হইয়া থাকে ও চক্ষু হইতে পিচ্ছিল অশ্রু নির্গত হয় । পরন্তু চক্ষুতে উষ্ণক্রিয়া করিলে সুখ-বোধ হয় ।

রক্তজ অভিঘ্নান্দের লক্ষণ । এই রোগে পৈত্তিক অভিঘ্নান্দের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, অধিকন্তু চক্ষু ভাববর্ণ বা রক্তবর্ণ হয় এবং চক্ষুর চতুর্দিক দীর্ঘাঙ্গুল অত্যন্ত রক্তবর্ণ হইয়া থাকে ।

অধিমহুরোগের কারণ ও সংখ্যা । চতুর্বিধ অভিযান্দ চিকিৎসা না করিলে, ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া তীব্রবেদনাবিশিষ্ট অধিমহুরোগ উৎপাদন করে । অধিমহু চারি প্রকার ।

চতুর্বিধ অধিমহুরোগের সাধারণ লক্ষণ । সর্বপ্রকার অধিমহুরোগেই চক্ষু উৎপাটিত ও মণ্ডিত হওয়ার ঝার বোধ হয় এবং মস্তকের অর্দ্ধাংশে অর্দ্ধাবভেদক শিরঃশূল জন্মে ।

চতুর্বিধ অধিমহুরোগের বিশেষ লক্ষণ । বাতিক অধিমহুরোগে বাতিক অভিযান্দের লক্ষণ, পৈতিক অধিমহুরোগে পৈতিক অভিযান্দের লক্ষণ, শ্লেষ্মিক অধিমহুরোগে শ্লেষ্মিক অভিযান্দের লক্ষণ এবং রক্তজ অধিমহুরোগে রক্তজ অভিযান্দের লক্ষণ প্রকাশ পায় । তদ্ব্যতীত অধিমহুরোগের সামান্য লক্ষণও প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

অধিমহুরোগের অরিক্ত লক্ষণ । অধিমহুরোগাক্রান্তব্যক্তি অহিতাচরণ করিলে, বাতিক অধিমহুরোগে ছয় রাত্রির মধ্যে, পৈতিক অধিমহুরোগে তিন-রাত্রির মধ্যে, শ্লেষ্মিক অধিমহুরোগে সাত রাত্রির মধ্যে ও রক্তাধিমহুরোগে পাঁচ রাত্রির মধ্যে দৃষ্টি-নাশ হয় ।

শোথবিশিষ্ট অক্ষিপাকের লক্ষণ । শোথ অক্ষিপাকে চক্ষু পাকায়জ্জড়বুরের ঝার রক্তবর্ণ এবং প্রলিপ্ত (লিপ্তবৎ) অথচ কণ্ডু, শোথ ও আব-বিশিষ্ট হয় ও পাকে ।

শোথশূন্য অক্ষিপাকের লক্ষণ । শোথ না হইয়া অক্ষিপাকিলে, উক্ত শোথ অক্ষিপাকের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

অক্ষির সামতা বা অপক লক্ষণ । সামাবস্থায় অথবা অপকাবস্থায় চক্ষুতে অত্যন্ত বেদনা, স্থচিবিন্ধবৎ বেদনা ও শূলবেদনা হয় এবং চক্ষু রক্তবর্ণ ও চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইয়া থাকে ।

অক্ষির নিরাম বা পক লক্ষণ । নিরাম বা পকাবস্থায় চক্ষুর বেদনা এবং শোথ ও জলস্রাবের অল্পতা, চক্ষুতে কণ্ডুর উৎপত্তি এবং চক্ষু পরিষ্কার হইয়া থাকে ।

হতাধিমহুর লক্ষণ। বাতিক অধিমহু যথাসময়ে চিকিৎসা না করিলে, সহসা চক্ষুকে শোষণ ও তীব্রবেদনায় ব্যথিত করে। ইহাকে হতাধিমহু কহে। এই রোগ অসাধ্য।

বাতপর্যায়ের লক্ষণ। প্রকুপিত বায়ু চক্ষু ও ক্রমশঃ পর্যায়ক্রমে পুনঃ পুনঃ সন্ধুচিত ও তাহাতে বেদনা উৎপাদন করিলে, তাহাকে বাত-পর্যায় কহে।

শুষ্কাগ্নিপাকের লক্ষণ। যে রোগে চক্ষু মূদিত ও দাহবিশিষ্ট হয়, অক্ষিপুট কঠিন ও রুদ্ধ হয় এবং রোগী চক্ষু মেলিতে কষ্টবোধ ও দৃশ্যবস্তু আবিলবর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহার নাম শুষ্কাগ্নিপাক।

অন্ত্যতোবাতের লক্ষণ। মস্তক, ষাড়, মস্তা (গ্রীবার পশ্চাদিকের-শিরাময়), কর্ণ, ও হস্ত কিস্তা অন্ত্য অন্ত্যিত বায়ু প্রকুপিত হইয়া ক্র ও চক্ষুতে বেদনা উৎপাদন করিলে, তাহাকে অন্ত্যতোবাত কহে।

অগ্নাধ্যুষিতের লক্ষণ। অতিরিক্ত অন্নদ্রব্য ভক্ষণে চক্ষুর মধ্যভাগ কিঞ্চিৎ নীলবর্ণ ও চতুর্পার্শ্ব রক্তবর্ণ হইলে এবং চক্ষুতে দাহ, শোণ, পকতা ও শ্রাব থাকিলে, তাহাকে অগ্নাধ্যুষিত কহে।

শিরোৎপাতের লক্ষণ। চক্ষুর শিরাজাল কখনও তাব্রবর্ণ, কোন সময় রক্তহীন বা বিকৃতবর্ণ, কখনও বেদনায়ুক্ত এবং কখনও বা বেদনাবিহীন হইলে ও চক্ষু হইতে অধিক শ্রাব নির্গত হইলে, তাহাকে শিরোৎপাত কহে। এই রোগে রোগীর দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হইয়া থাকে।

শিরাগ্রহর্ষ রোগের লক্ষণ। যে রোগে চক্ষু তাব্রবর্ণ ও গাঢ় শ্রাব-বিশিষ্ট হয় এবং রোগীর দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায়, তাহাকে শিরাগ্রহর্ষ কহে।

নেত্ররোগ-চিকিৎসা-বিধি।

সর্বসমেত নেত্রমণ্ডলের পরিমাণ স্বীয় স্বীয় বুদ্ধাজলির দুই অঙ্গুলি মাত্র। পদ্ম (চক্ষুর পাতার লোম), বয়্র (চক্ষুর আবরণ বা পাতা), মণ্ডলাকার শুক্লাংশ এবং দৃষ্টি এই কয়েকটি চক্ষুর অঙ্গ বা অবয়ব অর্থাৎ চক্ষু ঐ কয়েকটি অঙ্গ দ্বারা পূর্ণাবয়ব। চক্ষুতে সর্বসমেত আটাত্তর প্রকার রোগ জন্মে, দৃষ্টিমণ্ডলে চৌদ্দপ্রকার, ক্রমণ্ডলে চারিপ্রকার, শুক্লমণ্ডলে এগারপ্রকার,

চক্ষুর বয়ে' একুশ' প্রকার,* পক্ষে দুইপ্রকার, সন্ধিতে নয়প্রকার এবং সমস্ত নেত্র ব্যাপিয়া সতর প্রকার ।

রৌদ্রাদির উত্তাপে তাপিত ব্যক্তির শীতল জলে অবগাহন (সর্বাঙ্গ ডুবাইয়া নান' করা), দূরের বস্তু দর্শন, নিদ্রা-বিপর্যায় অর্থাৎ দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া ও রাত্রিকালে জাগরণ, চক্ষুতে অগ্নি প্রভৃতির সস্তাপ লাগা ও ধূলি বা ধূম প্রবেশ, বমনের বেগধারণ, অতিরিক্ত বমন, শুক্ল, আরনাল, জল, কুর্খি-কলাই ও মাষকলাই অধিক পরিমাণে ভক্ষণ, মলমূত্রের বেগধারণ, অতিশয় ক্রন্দন, শোকজ্ঞপ্ত সস্তাপ, মস্তকে আঘাত, দ্রুতগামী যানে ভ্রমণ, গাছবিপর্যায়, কামক্রোধাদি বশতঃ দৈহিক পীড়া, অধিক মৈথুন, অশ্রুর বেগধারণ এবং অতিশয় হৃদয়বস্তু দর্শন ; এই সকল কারণে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেমা নেত্রাশ্রিত উর্দ্ধগামী শিরাসমূহকে আশ্রয় করিয়া চক্ষুর সর্ব অবয়বে ঐ আর্টাক্তরপ্রকার রোগ উৎপাদন করে ।

চক্ষুর কক্ষমণ্ডলের মধ্যস্থলে দৃষ্টি অবস্থিত, দৃষ্টির পরিমাণ অর্দ্ধ বা দ্বিধণ্ডিত মন্থর দাইলের ঞায় । উহা নিমেষে জোনাকী পোকার ঞায় এবং নিমেষরহিত অবস্থায় অগ্নিকণার ঞায় দৃষ্ট হয় । উহা হ্রদ্বিশিষ্ট ও বাহুপটল (পর্দা) দ্বারা আচ্ছাদিত, পরন্তু শীতলক্রিয়াদ্বারা দৃষ্টি প্রসন্ন থাকে । দৃষ্টি তেজোময় পদার্থ, সূত্রাং পঞ্চভূতাত্মক ও অব্যয় অর্থাৎ অবিনাশী ।

পটল অর্থাৎ পর্দা চারিপ্রকার ও চারিস্তরে সাজান । দৃষ্টিশক্তির বাহু-পটলদ্বারা আচ্ছাদিত । বাহু অর্থাৎ প্রথম বা বহির্ভাগের পটল রসরক্ত, দ্বিতীয় পটল মাংস, তৃতীয় পটল মেদ এবং চতুর্থ পটল কালকাস্থিকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে । এই চারিটি পটলের মিলিত স্থূলতা, দৃষ্টিমণ্ডলের পাঁচ-ভাগের এক ভাগ ।

পদদ্বয় হইতে মস্তক পর্যন্ত দুইটি স্থূল রক্তবাহিনী শিরা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, এবং ঐ শিরাদ্বয় হইতে আবার বহুসংখ্যক হৃদয় হৃদয় শিরা বহির্গত হইয়া নেত্রা-ভিমুখে গমন করিয়াছে । দোষ ঐ শিরাসমূহকে আশ্রয় করিয়া চক্ষুরোগ উৎপা-দন করে, এই জন্ত চক্ষুতে ধূলি বা ধূম প্রবেশ করিলে অথবা সস্তাপাদি লাগি-লেও যেমন চক্ষুরোগ উৎপন্ন হইতে পারে, তদ্রূপ আবার পদদ্বারা ধূলি প্রভৃতি, ময়লা সংঘটন ও পীড়ন কী ঘাটাপাটি ও মর্দন করিলে, কিম্বা পদদ্বয়ে অগ্নি

প্রভৃতির উত্তাপ লাগাইলেও চক্ষুরোগ হইতে পারে, একারণে চক্ষুদ্বয়কে নীরোগ রাখিতে হইলে, পদদ্বয় ধোত করা ও পরিষ্কার রাখা একান্ত কর্তব্য, পরন্তু পদদ্বয়ে উত্তাপ প্রভৃতি বাহাতে লাগিতে না পারে, তৎপ্রতি মনঃসংযোগ করা অত্যাবশ্যক । পদপ্রক্ষালন বা ধোত করিলে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিলে, স্নানের পূর্বে ও রাত্রিতে শয়নকালে পায়ে তৈল মর্দন এবং সর্বদা পাতুকা অর্থাৎ জুতা প্রভৃতি ব্যবহার করিলে, সহসা চক্ষুরোগ উপস্থিত হয় না ।

চক্ষুরোগের চিকিৎসা নানাপ্রকার । পদদ্বয়ে ঔষধসিদ্ধকাথজল-সেচন, ঔষধজব্য মর্দন বা প্রলেপ-প্রয়োগ এবং স্থানিক ঔষধ প্রয়োগ ।

পদদ্বয় হইতে মস্তক ও নেত্রপর্য্যন্ত স্থূল শিরাদ্বয় ও সূক্ষ্ম শিরাসমূহ ব্যাপ্ত থাকাতে পদদ্বয়ে ঔষধ প্রয়োগ করিলে, মস্তকে, চক্ষুদ্বয়ে এমন কি সর্বাস্থে তাহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়, একারণে পদদ্বয়ে ঔষধ প্রয়োগ করিলে, অনেক রোগ আরোগ্য হয় । অত্যন্ত সর্দি বা নাসা-স্রাব ও তৎসঙ্গে মাথাব্যথা উপস্থিত হইলে, গরমজলে পদদ্বয় ডুবাইয়া রাখিলে, সমধিক উপকার হয় । চক্ষুদ্বয়ে অত্যধিক দাহ থাকিলে, গুলঞ্চ, পলতা ও যষ্টিমধুর কাপ প্রস্তুত করিয়া শীতলাবস্থায় তন্মধ্যে পদদ্বয় নিমগ্ন করিয়া রাখিলে, তৎক্ষণাৎ দাহ প্রশমিত হয় । মাথা গরম হইলে, পদদ্বয়ে তৈল অথবা তৈল ও জল মিশ্রিত করিয়া যে ফেণা উদ্ভগত হয়, তাহা কিম্বা তৎসদৃশ কোন বায়ু পিত্ত নাশক শৈত্যজব্য মর্দন করিলে, তৎক্ষণাৎ মাথা ঠাণ্ডা হয়, পিত্তবৃদ্ধি বশতঃ সর্বাস্থে কণ্ডু জন্মিলে ও তৎসহ প্রবল দাহ থাকিলে, গুড়ু-চ্যাতিলৌহ প্রয়োগ করিয়াও যেহুলে কোন উপকার হয় নাই, সেইহুলে কাঁচা পটোলপত্র ছেচিয়া পদদ্বয় দ্বারা রগ রাইবার ব্যবস্থা করিয়া রোগের প্রতীকার হইতে দেখা গিয়াছে । বসন্ত রোগীর চক্ষুদ্বয়ে অধিক প্রদাহ উপস্থিত হইলে, এইরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিলে, বেশ উপকার হয় ।

জ্বর এবং অতীসার, গ্রহণী, বিলম্বিকা, প্রবাহিকা, ব্রণ ও প্রতিষ্ঠায় বা নাসাস্রাব প্রভৃতি কতকগুলি রোগের বৈকল্প সাম ও নিরাম দুইটি অবস্থা আছে এবং সামাবস্থায় কোন কোন ঔষধ প্রয়োগ নিষিদ্ধ, চক্ষুরোগেরও তদ্রূপ সাম ও নিরাম দুইটি অবস্থা এবং সামাবস্থায় কোন কোন ঔষধ প্রয়োজ্য নহে । যাবৎ চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ দৃষ্ট ও তাহা হইতে অশ্রু নির্গত হয় এবং তৎসঙ্গে

নেত্রাত্যস্তরে কর্ কর্ করা; ছুঁচ ফুটান মত বেদনা এবং শূলবিদ্ধবৎ প্রভৃতি নানাপ্রকার বেদনা বর্তমান থাকে, তাবৎ নেত্ররোগের আমাবস্থা, এই অবস্থায় রোগীকে অঙ্গন, ঘৃত ও কাথ পান, এবং গুরুভোজন ও স্নান ব্যবস্থা করিবে-না, সেক, আশ্চ্যাতন, প্রলেপ, এবং বাষ্প শ্বেদপ্রভৃতি ও লজ্জন বা অবস্থা-ভেদে লণু ভোজনের ব্যবস্থা করিবে। এই অবস্থায় মধুর ও তিক্তরসবিশিষ্ট দ্রব্যের পথ্য অতি উপকারী।

অপক অভিষ্যন্দ রোগের চিকিৎসা।

প্রায়ই অগ্রে অভিষ্যন্দ প্রকাশ পায় ও তাহা হইতে নানাপ্রকার চক্ষুরোগ জন্মে, সুতরাং অভিষ্যন্দ প্রকাশ পাইবামাত্র নানাবিধ যোগ প্রয়োগ করিবে। অভিষ্যন্দ বা চক্ষুরোগের আমাবস্থার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, নানাপ্রকার প্রলেপ, সেক বা সেচন, আশ্চ্যাতন, পিণ্ডী, বিড়ালক, তর্পণ ও পুটপাক প্রভৃতি প্রয়োগদ্বারা নেত্ররোগীর চিকিৎসা করিবে। এই সকল চিকিৎসার পর কিঞ্চিৎ নেত্ররোগ আমাবস্থা অতিক্রম করিয়া পকাবস্থা বা নিরামাবস্থা-প্রাপ্ত হইলে, অঙ্গনাদি প্রয়োগ এবং ঘৃত বা কাথ পানের ব্যবস্থা করিবে। পাঁচ ছয় দিন বা এক সপ্তাহ অতীত হইলে, পকাবস্থা উপস্থিত হয়।

সেক, আশ্চ্যাতন, পিণ্ডী, বিড়ালক, তর্পণ ও

পুটপাক-প্রয়োগ।

অভিষ্যান্দের চলিত নাম চক্ষু উঠা, অভিষ্যন্দ নেত্রসর্কগত রোগ। নেত্রের সর্ক অবয়ব ব্যাপিয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়। অভিষ্যন্দ রোগের পূর্বরূপ বা লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, কাঁচা হলুদের রসে পরিষ্কার কাপড়ের টুকরা দিল্প করিয়া হস্তে রাখিবে এবং চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত বা চক্ষু চুলুকাইতে ইচ্ছা হইলে, তদ্বারা অশ্রু মুছিয়া ফেলিবে, পুনঃ পুনঃ অশ্রু লি বা হস্তদ্বারা চক্ষুর পাতা ঘর্ষণ করা অপেক্ষা এই নিয়মটি ভাল। এই অবস্থায় দেবদারুচূর্ণ, আত্ম-চূর্ণ ও লোধচূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া তৎসহ অল্প সৈন্ধবচূর্ণ মিশাইয়া একটি কাপড়ের পোটলায় করিয়া চক্ষুর পাতার বহির্ভাগে পুনঃ পুনঃ ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিবে অর্থাৎ বুলাইবে, একপভাবে বুলাইবে যেন চূর্ণের কিয়দংশ চক্ষুর পাতায় পতিত হয়। গরমজ্বালে গব্যঘৃত মিশ্রিত করিয়া কাপড়ের পোটলায়

বান্ধিয়া তাহার উষ্ণ স্বেদ পুনঃ পুনঃ চক্ষুতে লাগাইবে। কাঁচা আমলকীর-
 রস পিচ্কারীতে পূর্ণ করিয়া রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া ২১০ বিন্দু
 চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রয়োগ করিবে। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পোস্তদানা
 ও দারুচিনি সমভাগে আফিংগোলা জলে বাটিয়া পুটলী বান্ধিয়া চক্ষুর উপরে
 বুলাইবে, শুকাইয়া গেলে পুনর্বার আফিংয়ের জলে ভিজাইয়া লইবে। আম-
 লকী সূচীদ্বারা বিদ্ধ করিলে, যে রস বাহির হয়, সেই রস চক্ষুতে দেওয়া যায়।
 করবী ফুলের কচিপাতা ভাঙ্গিলে, যে রস বহির্গত হয়, তাহাও চক্ষুর অভ্যন্তরে
 দেওয়া যায়। শঙ্কিনার ছালের রস চক্ষুর মধ্যে প্রয়োগ করিলে বেশ উপ-
 কার হয়। হাতী শুঁড়ার রস অতি উপকারী, ইহার রস ২১০ দিনের বেশী
 প্রায়শঃ প্রয়োগ করিতে হয় না। এইরূপ আপাঙ্গের মূল ভামার পাত্রে দধির
 মাত দ্বারা বধিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া চক্ষুর অভ্যন্তরে
 প্রয়োগ করা যায়, ইহাতে একটু জ্বালা করে, কিন্তু সেই জ্বালাটুকু সহিয়া
 থাকিলে, কিছুক্ষণ পরে বিলক্ষণ আরামবোধ হয়। কোন কোন ঔষধ অভ্য-
 স্তরে দিলে জ্বালা করে, কিন্তু উহাতে সক্ষিত অশ্রু বহির্গত হইয়া যায় বলিয়া
 যথেষ্ট উপকার হয়। দারুহরিদ্রার ছাল, গেরিমাটি, হরীতকী ও রসায়ন এই
 চারিটি দ্রব্য কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ ও জল সহযোগে বাটিয়া চক্ষুর পরিমাণমত
 একটুকরা কাপড়ে মাধাইবে, অনন্তর উহার অপর পৃষ্ঠ নিম্নোক্ত বা মুদ্রিত
 চক্ষুর উপরে লেপের ন্যায় লাগাইয়া অথ কাপড়ের টুকরা দ্বারা বান্ধিয়া
 রাখিবে। লোধকাঠ অল্প ঘূতে আঙণের জ্বালে মৃত্তিকাপাত্রে ভাজিয়া জলসহ
 বাটিয়া লইবে, এই প্রলেপ চক্ষুর বহির্দর্শে পাতার চতুর্দিকে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ
 করিবে। গেরিমাটি, রক্তচন্দন, শুঁঠ, খড়ী ও বচ সমভাগে জলসহ বাটিয়া
 কিছা ভূঁই আমলা কাঁজি দ্বারা ভামার পাত্রে বসিয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধব মিশাইয়া
 চক্ষুর বহির্ভাগে পাতার উপর লেপ দেওয়া যায়। অত্যধিক দাহ থাকিলে
 রক্তচন্দন বধিয়া এবং বেদনা থাকিলে আফিং গুলিয়া তদ্বারা পুনঃ পুনঃ
 পাতার উপর প্রলেপ দিবে। রাতকানা রোগে পানের রস চক্ষুর মধ্যে দিলে
 রোগ বিনষ্ট হয়।

অভিষ্যন্দের প্রথম অবস্থায় ঐ সকল ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার
 নাই হইলে, কিছা প্রথমাবস্থায় তুচ্ছ তাজ্জিল্য বশত ঔষধ প্রয়োগ না করিলে,

প্রথম অবস্থার আক্রমণ হ্রাস হইয়া দ্বিতীয় অবস্থা উপস্থিত হয়। প্রথম অবস্থাতে প্রবল প্রকোপ লক্ষিত হইলে, দ্বিতীয় অবস্থার এই সকল ঔষধও প্রয়োগ করা যায়। কাহারও কাহারও ৫৭ দিবসেই রোগ আরোগ্য হয়, আবার কাহারও কাহারও বা ২৩ মাসেও সারে না। দ্বিতীয় অবস্থায় নানা-প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। গোলাপজলে কিটকারী মিশাইয়া সেই জল চক্ষুর অভ্যন্তরে ফোটা ফোটা দেওয়া যায়। উৎকৃষ্ট মধু অথবা মধুর সহিত কপূর মিশাইয়া পক্ষীর পালকে করিয়া চক্ষুর অভ্যন্তরে দেওয়া যায়। পদ্মমধু সর্দাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, কিন্তু তাহা দৃশ্যাপ্য, তদভাবে অথ মধু প্রয়োগ করিলেও উপকার হয়, কিন্তু যে কোন মধু হউক অকৃত্রিম হওয়া দরকার। কপূর বেণে দোকানে যাহা পাওয়া যায়, তাহা শোধন করিয়া প্রয়োগ করা উচিত।

কপূরশোধন প্রণালী। কপূর হস্ত চূর্ণ করিয়া একখানি কাঁসার পাতলা অথচ ছোট রেকাব বা থালায় উপর রাখিবে এবং তদুপরি একটি কাঁসার ছোট অথচ পাতলা বাটী উপড় করিয়া স্থাপন করিবে, অনন্তর ময়দা ছানিয়া তদ্বারা বাটী ও থালা উভয়ের সন্ধিস্থান বন্ধ করিবে, পরে নির্দোষিত কাঠের কয়লার অগ্নিতে ঐ থালা বসাইবে, এবং বাটীর উপর পুনঃ পুনঃ নীতল জল দিবে, এইরূপে অগ্নির উত্তাপে বাটীর উর্দ্ধ অর্থাৎ তলদেশে নির্মল কপূর সঞ্চিত হইবে, এই প্রক্রিয়া দ্বারা যে কপূর পাওয়া যাইবে, তাহা অতি নির্মল, চক্ষুতে তাহাই প্রয়োগ করা কর্তব্য।

সেক বা সেচন। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক ও রক্তজ এই চারি-প্রকার অভিযান্দে সেক প্রয়োগ করা যায়। অগ্রে মৃত্তিকা নির্মিত একটি ঘাটের তলদেশে ১০-১২টি স্থল ছিদ্র করিবে, পরে রোগীকে চিৎ করিয়া শয়ন করাইয়া চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সমস্ত চক্ষুর পরিমাণমত কাঁচি দ্বারা কাপড়ের টুকরা কাটিয়া চক্ষুর উপর স্থাপন করিবে এবং ঐ ছিদ্রবিশিষ্ট ঘাটের তলা অঙ্গুলিদ্বারা চাপিয়া যে দ্রবদ্রব্য সেচন করিতে হইবে, তাহা পূর্ণ করিবে, পরে রোগীর চক্ষুর দুই অঙ্গুলি উর্দ্ধে উক্ত ঘট ধরিয়া ছিদ্র হইতে অঙ্গুলি সরাইয়া লইলেই স্থল দ্বারা কাপড়ের উপর জল পতিত হইবে। এই নিয়মে তরল ঔষধ অর্থাৎ দুগ্ধসিদ্ধ কাথ, দুগ্ধ বা ঔষধসিদ্ধ কাথ সেচন করাকে সেক কহে। শাস্ত্রোক্ত নিয়ম এই, কিন্তু ইদানীং চক্ষুর উপরে কাপড়ের টুকরা

বিছাইয়া এবং রোগীর চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সেচন করা হয় না, পরন্তু কেহ কেহ ঘণ্টের পরিবর্তে পিচ্কারী দ্বারা সেচন করেন। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই— চক্ষু মুদিত বা নিম্নীলিত করিয়া সেচন করিলেও চলে বা কাপড়ের টুকরা না বিছাইয়া কাপড়দ্বারা ছাকিয়া লইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু পিচ্কারী দ্বারা উদ্দেগুসিদ্ধ হয় না, কারণ একসময়ে চক্ষুর সর্ব অবয়বে ঔষধ পতিত হয় না, ঘণ্টে কতকগুলি ছিদ্র করিয়া লইলে, ঐ উদ্দেগু সিদ্ধ হয়।

বাতিক অভিষান্দে দশমূলের দ্বারা বা তেরেণ্ডার পাতা ও মূলের ছালের দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া ছাকিয়া দ্বিগুণ উষ্ণ থাকিতে সেচন করিবে; পৈত্তিক ও রক্তজ অভিষান্দে রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও গুলঞ্চ দ্বারা প্রস্তুত কাথ শীতল করিয়া সেচন করিবে এবং শ্লেষ্মিক অভিষান্দে বেল, শোণা, গাম্ভারী, পাকুল ও গণিয়ারী ইহাদের ছালের কাথ সেচন করিবে। কিন্তু বাতপিত্তাদির প্রাবল্য স্থির করিতে না পারিলে, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ারদ্বারা কাথ করিয়া সেচন করিবে, ইহা সেচনে সর্বপ্রকার চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়। বসন্ত রোগে চক্ষুর অভ্যন্তরে গুটী উদ্গত হইলে, ত্রিফলার কাথ অথবা যষ্টিমধু, গুলঞ্চ ও রক্তচন্দনের কাথ সেচন করিলে, অসীম উপকার হয়, অচিরে জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হইয়া থাকে। দিবাভাগেই সেক দেওয়া উচিত, তবে নিতান্ত প্রয়োজন হইলে, রাত্রিকালেও দেওয়া যাইতে পারে।

আশ্চেত্যন । রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া উন্মীলিত নেত্রের অভ্যন্তরে কাথজল বা দুগ্ধ প্রভৃতি তরল দ্রব্যের বিন্দুপাতনকে আশ্চেত্যন কহে। রোগীর নেত্র উন্মীলিত না রহিলে, যে কোন উপায়ে উন্মীলিত করিয়া লইবে। এই বিন্দুপাতন কার্য ক্ষুদ্র পিচ্কারী দ্বারা চলিতে পারে। দিবাভাগেই আশ্চেত্যন প্রয়োগ করিবে, রাত্রিকালে কদাচ প্রয়োগ করিবে না। আট হইতে বার বিন্দু পাতন করিবে, ইহাপেক্ষা বেশী প্রয়োজ্য নহে। সেচনের জন্ত যে সকল কাথ কথিত হইয়াছে, তাহা আশ্চেত্যনেও প্রয়োগ করা যায়। ফলতঃ বাতিক চক্ষুরোগে স্নিগ্ধ অথচ তিক্তদ্রব্যের, পৈত্তিকে শীতল অথচ মধুর দ্রব্যের এবং শ্লেষ্মিকে রুক্ষ, তীক্ষ্ণ অথচ উষ্ণবীৰ্য্য দ্রব্যের সেক ও আশ্চেত্যন প্রয়োজ্য। ত্রিফলার জল বা কাথের সেক ও আশ্চেত্যন সর্বাবস্থায় প্রয়োজ্য, যেহেতু ত্রিফলা ত্রিদোষ-নাশক। জীবিত বড় বড় শামুক

অথবা গুগলী সংগ্রহ করিয়া পাথরে কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে, যে জল বাহির হয়, তাহা আশেচাতনে প্রয়োগ করিলে, সত্ত্বর প্রবল দাহ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

পিণ্ডী । একটি কিম্বা দুই চারিটি বা তদধিক দ্রব্য সমভাগে বাটিয়া কাপড়ের পোটলায় বান্ধিয়া নেত্রের উপরে বুলাইলে, তাহাকে পিণ্ডী কহে । পিণ্ডীর প্রয়োগপ্রণালী ইতঃপূর্বে কথিত হইয়াছে ।

বিড়ালক । নেত্রের বহির্দেশে পদ্মলোম ব্যতীত অর্থাৎ কেবল পাতার উপর যে প্রলেপ দেওয়া যায়, তাহাকে বিড়ালক কহে । প্রলেপ ইতঃপূর্বে কথিত হইয়াছে । তর্পণ ও পুটপাক-চিকিৎসা এক্ষণে প্রচলিত নাই, তজ্জন্তু কথিত হইল না ।

পকু অভিমান্দ রোগের চিকিৎসা ।

ঐ সকল ক্রিয়াদ্বারা চক্ষুর আমাবস্থা দূরীভূত হইয়া পকাবস্থা অর্থাৎ বেদনার অন্ততা, কক্ষু অর্থাৎ চুলকণার উদগম, শোথ ও অশ্রু স্রাবের অন্ততা এবং চক্ষু পরিষ্কার হওয়া, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে, অঙ্গন, কাথ ও ঘৃত প্রয়োগ করিবে । আমাবস্থায় অঙ্গনাদি প্রয়োজ্য নহে ।

অঙ্গন । শলাকা বা তদভাবে পানের পোটা অথবা অঙ্গুলি দ্বারা কক্ষ-মণ্ডলের অধোভাগে ঔষধের বটিকা, রস বা চূর্ণ প্রয়োগ করাকে অঙ্গন-দেওয়া কহে । এই নিয়মে বালকদিগকে কাজল দেওয়া হয় । পাখীর পালক দ্বারাও দেওয়া যায় । অঙ্গন প্রয়োগের জন্তু স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ বা প্রস্তর নির্মিত শলা ব্যবহার করা কর্তব্য । প্রাতঃকালে এবং সায়াংকালে অঙ্গন প্রয়োগ প্রশস্ত । শ্রান্ত, রোদনকারী, ভীত, মত্তপানকারী, নবজন্ম-ক্রান্ত, অজীর্ণগ্রস্ত এবং যাহার মলমূত্রের বেগ উপস্থিত হইয়াছে, এই সকল-ব্যক্তিকে অঙ্গন দিবে না ।

আমলকী-বীজের শাস এক ভাগ, বহেড়ার শাস দুই ভাগ ও হরীতকীর শাস তিনভাগ একত্র জল দ্বারা পেষণ করিয়া মটরপ্রমাণ বটিকা করিবে, ইহা জলসহ ঝরিয়া অঙ্গনরূপে প্রয়োগ করিলে, অশ্রুস্রাব ও বেদনা প্রশমিত হয় । মনসাসীজের পাতার ঘৃত মাখাইয়া প্রদীপের উপরে ধরিলে, যে কালী পট্টে, তাহার কাজল অশ্রুস্রাব ও বেদনা প্রশমন করিতে অসাধারণ শক্তিশালী ।

রাত্র্যঙ্কতা । রসাজন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মালতীকুল ও কচি নিম-
পাতা সমভাগে লইয়া গোময় রসে বাটিয়া মটরপ্রমাণ বটিকা করিয়া তদ্বারা
চক্ষুতে অঞ্জন দিলে, রাত্র্যঙ্করোগ বিনষ্ট হয় ।

ছানি । চক্ষুতে ছানি পড়িলে, লৌহপাত্রে লেবুর রস দ্বারা কালো
ঝায়া ঘসিয়া প্রলেপ দিলে সমধিক উপকার হয় । জ্বরিত লৌহচূর্ণ
পোটলায় বান্ধিয়া লেবুর রসে ভিজাইয়া চক্ষে দুই এক বিন্দু দিবে ।
চক্ষুরোগ নানাপ্রকার, এবং তাহার ঔষধও অনন্ত, তন্মধ্যে যে সকল ঔষধ
সমধিক উপকারী, তাহারই প্রয়োগপ্রণালী কথিত হইবে । প্রথমাবস্থায় যে
সকল ঔষধ উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই রোগ আরোগ্য হয়, কিন্তু পুরাতন
হইলে অথবা পকাবস্থায় পরিণত হইলে, বর্ত্তি প্রভৃতি দ্বারা অঞ্জনপ্রয়োগ,
স্বতপান ও তৈলের নস্য ব্যবস্থা করিলেই চলিতে পারে । চক্ষ্রোদয়া ও সূখা-
বতী প্রভৃতি বর্ত্তি, বজ্জল, ভৃঙ্গরাজ্যজ্বৈতলের নস্য এবং ত্রিফলাজ বা মহা-
ত্রিফলাজঘৃত, বাসাদিকাথ বা রহং বাসাদি কাথ, সপ্তানুত লৌহ, নয়নানুত-
লৌহ বা নেত্রাশনি রস প্রভৃতি অবস্থা-ভেদে প্রয়োগ করিবে ।

নেত্ররোগে—ঔষধ ।

চন্দনলেপ । চক্ষু উঠিলে বা উঠিবার উপক্রমে চক্ষুতে অত্যন্ত দাহ
উপস্থিত হইলে ও তজ্জন্ত অনবরত জলস্রাব হইলে, এই প্রলেপ চক্ষুর আবরক
পাতার উপর লাগাইবে ।

চন্দনলেপ । রক্তচন্দন ঘসা ও শোধিত কপূর একত্র মিশাইয়া লেপ দিবে ।

নিষ্পত্রযোগ । চক্ষু উঠিলে যখন লালবর্ণ হয় ও কব্জকর করিতে
ধাকে এবং চক্ষু হইতে অনবরত জলস্রাব হয়, তখন এই ঔষধ পরিষ্কার
কাপড়ের পোটলায় বান্ধিয়া ও পোটলা টিপিয়া তাহার রস তিন বেলা এক-
এক ফোটা চক্ষুর অত্যন্তরে দিবে ।

নিষ্পত্রযোগ । কচি নিমপাতা বাটা চারি আনা, রক্তচন্দন ঘসা অর্দ্ধ তোলা ও মধু
পাঁচ ফোটা একত্র করিয়া কাপড়ের পোটলায় বান্ধিয়া তাহার রস চক্ষুর মধ্যে দিবে ।

কপূরযোগ । চক্ষুতে ছানি পতিত হইলে, এই ঔষধ পক্ষীর পালক-
দ্বারা চক্ষুর মধ্যে অঞ্জনের দ্বায় লাগাইবে ।

কপূরযোগ । শোধিত কপূর ও উৎকৃষ্ট মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া লাগাইবে ।

নীলযোগ । চক্ষুর মণি বহির্গত হইয়া ঝুলিয়া পড়িলে, এই ঔষধ চক্ষুর পাখার উপর লাগাইবে, কিন্তু ভিতরে প্রয়োগ নিষিদ্ধ ।

নীলযোগ । নীল ৯০ তোলা, পটা আমের আটগার শাস ১ তোলা ও জীয়লীর আঠা ২ তোলা জলসহ বাটিয়া লাগাইবে ।

চন্দ্রোদয়াবর্তি । অধিমাংস বা মাংস-বৃদ্ধি, তিমির, কাচ, পটল, অর্কুদ, রাত্রাক্ষ ও পুষ্পরোগে এই বর্তি মধু বা জলসহ ঘসিয়া তদ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে ।

চন্দ্রোদয়াবর্তি । শঙ্খনাভি ভক্ষ, বহেড়ার শাস, হরীতকী, মনঃশিলা, পিপুল, মরিচ, কুড় ও বচ সমভাগ, ছাগ দুগ্ধে মর্দন করিয়া বাতির জায় প্রস্তুত করিয়া শুষ্ক করিবে ।

বৃহৎ চন্দ্রোদয়াবর্তি । পিচ্ছ, তিমির ও কণ্ডু প্রভৃতি চক্ষুরোগে এই বর্তির অঞ্জন প্রয়োগ করিবে, ইহা প্রয়োগে ঐ সকল রোগ বিনষ্ট এবং চক্ষু প্রসন্ন বা নিখল হয় ।

বৃহৎ চন্দ্রোদয়াবর্তি । রসাজ্ঞন, শিলাজতু, কুসুম, মনঃশিলা, শঙ্খনাভি ভক্ষ, শঙ্খিনাবীজ ও চিনি সমভাগে জলসহ বাটিয়া বর্তি প্রস্তুত করিবে ।

কুমারিকাবর্তি । দৃষ্টিমণ্ডলে বা চক্ষুর মণিতে ছানি পতিত হইবার উপক্রমে বা পতিত হইলে এই বর্তি জলসহ ঘসিয়া তদ্বারা রোগীর চক্ষুর কৃষ্ণ-মণ্ডলের নিম্নে অঞ্জন দিবে ।

কুমারিকাবর্তি । তিলফুল ৮০ টা, পিপুলের দানা ৬০ টা, জাতি বা মালতী ফুল ৫০ টা ও মরিচ ১৬টা একত্র মর্দন করিয়া বর্তি করিবে ।

দৃষ্টিপ্রদাবর্তি । চক্ষুর মণি বহির্গত হইয়া ঝুলিয়া পড়িলে, এই বর্তি দুগ্ধ বা জলদ্বারা ঘসিয়া তদ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে ।

দৃষ্টিপ্রদাবর্তি । হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুরগীর ডিমের খোসা, হীরাবস, মারিত লোহ, নীলোৎপল, বিড়ঙ্গ ও সমুদ্রফণ প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া ভামার পাত্রে ছাগদুগ্ধদ্বারা মর্দন করিবে ও সাতবার ভাবনা দিয়া ছাগদুগ্ধদ্বারা বর্তি প্রস্তুত করিবে ।

চন্দ্রোদয়াবর্তি । তিমির রোগ অতি প্রবল হইলে, এই বর্তির অঞ্জন চক্ষুতে প্রয়োগ করিবে ।

চন্দনাদ্যবর্তি । রক্তচন্দন, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সুপারী কুকের আঠা ও পলাশ-
গাছের আঠা প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দন করিয়া শুক করিবে ।

চন্দ্রপ্রভাবর্তি । চক্ষুরোগে ইহা সর্বদা ব্যবহার্য্য । যে স্থলে অঙ্গ-
প্রয়োগ অনিবার্য্য, সেই স্থলে ইহা প্রয়োগে অঙ্গ প্রয়োগ করিতে হয় নাই,
অথচ রোগ আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে । অর্কুদ, কাচ, পটল, তিমির,
রক্তরাজিকা, অধিমাংস, অশ্ম ও রাত্র্যাক্ততা প্রভৃতি নানা প্রকার চক্ষুরোগে
ইহার অঙ্গন অতি উপকারী ।

চন্দ্রপ্রভাবর্তি । রসায়ন, শজিনা বীজ, পিপুল যষ্টিমধু, বহেড়ার শাস, শঙ্খনাভি ভষ্ম ও
মনঃশিলা প্রত্যেকে সমভাগ, ছাগদুগ্ধে মর্দন ও ছায়ায় শুক করিয়া বর্তি প্রস্তুত করিবে ।

পঞ্চশতিকাবর্তি । তিমির, কাচ, অশ্রুশ্রাব ও পটল প্রভৃতি রোগে
এবং অগ্নাশ্রু সর্বপ্রকার চক্ষুরোগে এই ঔষধ মহোপকারী । ইহা উৎকৃষ্ট মধু
বা জল কিম্বা দুগ্ধসহ ঘসিয়া অঙ্গন দিবে ।

পঞ্চশতিকাবর্তি । নীলোৎপলের পাতা একশত, কাঁচা সোণামুগ ১০০টা, ধোঁসা ছাড়ান
যব ১০০টা, জাতী বা মালভীতুল ১০০ টা ও পিপুলের দানা ১০০ টা একত্র বাটিয়া বর্তি
প্রস্তুত করিবে ।

কজ্জল । সর্বপ্রকার চক্ষুরোগে বিশেষতঃ দৃষ্টিহানি ঘটিলে, এই
কজ্জল চক্ষুতে প্রয়োগ করিবে ।

কজ্জল । কেঁচুয়া (কেচো) আলতার জলে ৭ দিন ভিজাইয়া রাখিবে, অনন্তর রৌদ্রে
শুক করিয়া চূর্ণ করিবে, পরে উহার সহিত সমভাগ যষ্টিমধু চূর্ণ মিশাইয়া আলতার পাতার
মধ্যে স্থাপন পূর্বক সূতা দ্বারা বান্ধিয়া বর্তির জায় প্রস্তুত করিবে; অনন্তর উহাতে সূত
মাখাইয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার উপরে রাখিয়া তদুপরি একটি কাঁচের পাত্র ধরিবে, ঐ
কাঁচের পাত্রে যে কজ্জল পাওয়া যাইবে, তাহাই গ্রহণ করিয়া চক্ষুতে কজ্জল দিবে ।

ভূঙ্গরাজতৈল । চক্ষুরোগে জালায়ন্ত্রণা ও জলস্রাব প্রভৃতি যে কোন
উপসর্গ থাকিলে, এই তৈলের নস্য প্রত্যহ প্রাতে গ্রহণ করিতে দিবে ।

ভূঙ্গরাজতৈল । কৃষ্ণতিলের তৈল অর্দ্ধ সের। যথাবিধি মুচ্ছাণাক করিবে । ভূঙ্গ-
রাজের স্বস ৪ সের ও কুটিত ও যষ্টিমধু ৮ তোলা একত্র পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে ।

যড়্বিন্দুতৈল । চক্ষুরোগের যে কোন অবস্থায় এই তৈলের নস্য
প্রয়োগ করা যায় ।

বড়বিন্দুতৈল । প্রস্তুতবিধি ১১৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

অভিজিত তৈল । চক্ষুরোগের যে কোন অবস্থায়, এই তৈলের নস্ত প্রয়োগ করা যায় ।

অভিজিততৈল । কৃষ্ণ তিলের তৈল অর্দ্ধ সের । মুছাঁপাক করিয়া আমলকীর রস বা কাথ চারি সের, দুধ চারি সের ও কুট্টিত ষষ্টিমধু ৮তোলা একত্র পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে ।

বাসকাদি কাথ । চক্ষুরোগের আমাবস্থা অতীত হইলে এবং চক্ষু-হইতে জল বা রক্তস্রাব হইলে এই কাথ পান করিতে দিবে । ইহা চক্ষুতে সেচন করা যায় । পানের জগ্ৰ ব্যবস্থা করিতে হইলে শোধিত গুণ্ণুলু চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা বা চারিআনা প্রক্ষেপ দিবে ।

বাসাদি কাথ । বাসকছাল, হরীতকী, নিমছাল, আমলকী, মুখা, বহেড়া ও পলতা ; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

বৃহৎ বাসাদি কাথ । চক্ষুরোগের আমাবস্থা অতীত হইলে, এই কাথ পান করিতে দিবে । ইহা পানে তিমির, কাচ, পটল ও অর্কুদ প্রভৃতি সর্বপ্রকার চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয় ।

বৃহৎ বাসাদি কাথ । বাসক ছাল, মুখা, নিমছাল, পলতা, কটকী, গুলক, রক্তচন্দন, কুড়চা, ইল্লম্বব, দারুহরিজা, চিতামূল, শুঠ, চিরতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শ্যামালতা ও খোসা ছাড়ান যব, প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । ছাকিয়া পান করিতে দিবে ।

নেত্রাশনি রস । চক্ষুরোগের যে কোন অবস্থায় যে কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দেওয়া যায় । চক্ষু হইতে রক্তস্রাব এবং রক্তজ ও বাতজ, পিত্তজ বা শ্লেষজ অভিঘন্দ, রাত্র্যন্ধতা (রাতকানা), তিমির, কাচ, নীলিকা, পটল প্রভৃতি সর্বপ্রকার চক্ষুরোগে ইহা নির্বিচারে প্রয়োগ করা যায় । অল্পপান—উষ্ণজল ।

নেত্রাশনিরস । মারিত অত্র, তাম্র, লৌহ, স্বর্ণমাস্কিক, রসায়ন ও শোধিত আমলাসাগন্ধক প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা লইয়া ত্রিকলার কাথ ও ভূঙ্গরাজের রস দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ সাতটি করিয়া ভাবনা দিবে, অনন্তর শুদ্ধ হইলে, চূর্ণ করিয়া ভাহার সহিত শিপুলমূল, যষ্টিমধু, এলাচি, পুনর্নবা, দেবদারু, আঁকান্দোলতা, ভীষ্মরাজ, শঠী, বচ, নীলোৎপল ও রক্তচন্দন

ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া লৌহপাত্রে রাখিয়া লৌহদণ্ড দ্বারা মধু ও ঘৃতসহ মর্দন করিবে । বটী ৩ রতি ।

নয়নামৃত লৌহ । ইহা নেত্রাশনি রসের ন্যায় সর্বপ্রকার চক্ষুরোগের সর্বাবস্থায় প্রয়োজ্য । অহুপান—ভৃঙ্গরাজের রস ও মধু ।

নয়নামৃত লৌহ । গুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কঁকড়াশুকী, শঠা, রায়ী, গুঁঠ, কিসূমিস, নীলোৎপল, কাকোলী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কেণ্ডুষো, কণ্টকারী, বৃহতী (ব্যাকুড়), লৌহ ও অঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা । ভীমরাজ ও ত্রিকলার কাথদ্বারা পৃথক পৃথক সাতবার ডাবনা দিবে । মাত্রা—কুলবীজের ত্রায় ।

তিমিরহর লৌহ । তিমির রোগের যে কোন অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা যায় । অগ্নাশ চক্ষুরোগেও সমধিক উপকারী । অহুপান—ঘৃত ও মধু ।

তিমির হরলৌহ । হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পদ্মকান্ঠ ও যষ্টিমধু প্রত্যেকে এক তোলা এবং লৌহ পাঁচ তোলা, জলে মর্দন, বটী ৩ রতি ।

ক্ষতশুল্কহরগুণ্ডুলু । নেত্রশুল্কগত রোগে অর্বাণ্ড ক্ষতশুল্ক এবং ব্রণ-শুল্ক ও অন্ত্রশুল্ক রোগে কিম্বা কাচরোগে ইহা প্রয়োগ করা যায় । অহুপান—ঘৃত, মধু ও গরম দুগ্ধ ।

ক্ষতশুল্কহর গুণ্ডুলু । লৌহ, যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও পিপুল ইহারা প্রত্যেকে এক তোলা ও বিস্তৃত গুণ্ডুলু ৬ তোলা । গুণ্ডুলুর সহিত সমস্ত চূর্ণ ক্রমশঃ মিশ্রিত করিবে । মাত্রা দুই আনা ।

সপ্তামৃত লৌহ । সর্বপ্রকার চক্ষু রোগে এবং উর্দ্ধজত্রগত রোগে ইহা অগৃহের ত্রায় উপকারী । অহুপান—মধু ও ঘৃত ।

সপ্তামৃত লৌহ । হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যষ্টিমধু ও লৌহভঙ্গ প্রত্যেকে সমভাগ, জল বা ত্রিকলার কাথসহ মর্দন । বটী ৩ রতি ।

ত্রিফলাশ্রু ঘৃত । তিমির নামক চক্ষুরোগে ইহা পরমোপকারী । সক্ষ্যাকালে সেব্য । অহুপান—উষ্ণ দুগ্ধ ।

ত্রিফলাশ্রু ঘৃত । পৰ্যায় ৪ সের । যথাবিধি মুচ্ছাপাক করিবে । কাথ্যক্রব্য—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সমভাগে মিলিত ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, পৰ্যায় ৪ সের । কক্কক্রব্য—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সমভাগে মিলিত এক সের । যথাবিধি পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা ইহাতে এক তোলা ।

দ্বিতীয় ত্রিফলাগ্ন ঘৃত । ত্রিদোষজ তিমির এবং পৈত্তিক অভিযান্ধ ও পিত্তপ্রধান ব্যক্তির চক্ষুরোগে এই ঘৃত মহোপকারী । অহুপান—উষ্ণ জল ।

দ্বিতীয় ত্রিফলাগ্ন ঘৃত । গব্য ঘৃত /৪ সের । যথাবিধি মুচ্ছাণীপাক করিবে । ত্রিফলার-কাথ ১৬ সের ১ শতমূলীর রস ১৬ সের । কঙ্কজব্য—কুট্টিত যষ্টিমধু এক সের । যথাবিধি পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা—অৰ্দ্ধ তোলা হইতে এক তোলা ।

বৃহৎ ত্রিফলাদ্য ঘৃত । সৰ্ব্বপ্রকার নেত্ররোগের আমাষস্থা গত হইলে, ইহা প্রয়োগ করা যায় । তিমির, চক্ষু হইতে রক্ত, পুষ বা জলস্রাব, কাচ ও অৰ্জুদ প্রভৃতি সৰ্ব্বপ্রকার নেত্ররোগে এবং বিসর্প, প্রদর, কণ্ডু, বাত-পিত্তাদিক শোথ, কেশের খালিত্য ও পকতা, বিষমজ্বর এবং নেত্রবন্ধ গত রোগে ইহা প্রয়োগ করা যায় । অহুপান—উষ্ণ দুগ্ধ ।

বৃহৎ ত্রিফলাগ্ন ঘৃত । গব্য ঘৃত /৪ সের, যথাবিধি মুচ্ছাণীপাক করিবে । কাথ্যজব্য—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ৪৮ সের, শেষ ১২ সের । গব্য দুগ্ধ /৪ সের । কঙ্কজব্য—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঠ, পিপ্পল, মরিচ, কিস্মিস্, যষ্টিমধু, কটকী, পুণ্ডরীকা কাষ্ঠ, ছোট এলাচি, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর, নীলোৎপল, অনন্তমূল, ঋষালতা, রক্তচন্দন, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা প্রত্যেকে ২ তোলা । যথানিয়মে ঘৃতপাক-করিয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা—অৰ্দ্ধ তোলা হইতে এক তোলা ।

মহাত্রিফলাদ্য ঘৃত । নেত্ররোগে যে সকল ঘৃত আছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট । বাতজ, পিত্তজ ও শ্লেষ্মজ সৰ্ব্বপ্রকার নেত্ররোগে ইহা প্রয়োগ করা যায় । বাতজাদি চারি প্রকার অভিযান্ধ, চক্ষু হইতে অনবরত বা অধিক পরিমাণে অশ্রু বা-রক্তস্রাব, রক্তদৃষ্টি ও তজ্জনিত চক্ষুরোগ, রাত্র্যন্ধতা, তিমির, কাচ, পটলাশ্রিত চক্ষুরোগ, নীলিকা, চক্ষুর্য়থাহু অৰ্জুদ, অধিমহু, পদ্মকোপ, দৃষ্টিহানি বা ছানি পড়া অথবা অন্নদৃষ্টি, কণ্ডু ও দূরদৃষ্টি, এই সকল অবস্থায় প্রয়োগ করিলে, রোগদূরীভূত হইয়া শীঘ্রই চক্ষু প্রশম্ন এবং শারীরিক বল ও পুষ্টি বৃদ্ধি হয় । অহুপান—উষ্ণ দুগ্ধ ।

মহাত্রিফলাগ্ন ঘৃত । গব্য ঘৃত /৪ সের । কাথ্যজব্য—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের, ভৃঙ্গরাজের স্বরস /৪ সের, বাসক পাতার রস /৪ সের, শতমূলীর রস /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের, গুলকৈর রস /৪ সের, আমলকীর রস /৪ সের । কঙ্কজব্য—পিপ্পল, চিনি, কিস্মিস্, হরীতকী, আম-

লকী, বহেড়া, নীলোৎপল, বটমধু, ক্ষীরকাকোলী, গুলঞ্চ ও কণ্টকারী প্রত্যেকে সমভাগে-
মিলিত এক সের। মাত্রা—মধ্ব তোলা হইতে এক তোলা ।

নেত্ররোগে—পথ্যাপথ্য ।

শালি বা রক্ত শালিতণ্ডুলের অন্ন, মুগের দাইল, খোড়, ঘোঁচা, বেগুণ, উচ্ছে, করলা, পলতা, বেতাগ্র, কাচকলা, পটোল, আন্, বিঙ্গে ও মূলা প্রভৃতির ঘৃতসস্তুলিত তরকারী, পুনর্নবাশাক, শালিঙ্গাশাক, ও কাকমাচীশাক, ময়ূর, বগ্ন কুকুট, ফিঙ্গে ও লাবপক্ষীর মাংস, গুল্লী বা শামুকের মাংস, মধু ও দুগ্ধ এবং ঘৃত প্রভৃতি সুপথ্য । অন্ন থাকিলে, জ্বরোক্ত পথ্য ব্যবস্থা করিবে ।

এই রোগে ক্রোধ, শোক ও মৈথুন নিষেধ । অশ্রু, বায়ু, মল, মূত্র, নিদ্রা ও বমির বেগ ধারণ, ক্ষুদ্র বা স্তম্ভ বস্ত্র দর্শন, দন্তমার্জন, স্নান, রাত্রিকালে ভোজন, রৌদ্রের উত্তাপ সেবন, তরল দ্রব্য পান, প্লা ও প্ম সেবন, বিরুদ্ধভোজন, অধিক কথা বলা, বমন, অধিক জলপান, মৌয়া, দধি, পত্রশাক, তরমুজ, তিলবাটা, মৎস্ত, মগ্ন, জাঙ্গলমাংস ব্যতীত অগ্ন মাংস, তাম্বুল, অন্নরস ও লবণ-রসবিশিষ্ট দ্রব্য, পিত্তবৃদ্ধিকর দ্রব্য, তীক্ষ্ণদ্রব্য, কটুদ্রব্য, উষ্ণদ্রব্য এবং গুরুপাক অন্ন ও পানীয় পরিত্যাজ্য ।

কর্ণরোগ-চিকিৎসা ।

কর্ণশূলের লক্ষণ । কর্ণরন্ধ্রগত বায়ু নানাকারণে কুপিত এবং কফ, পিত্ত ও রক্ত দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া প্রতিলোমভাবে কর্ণবিবরে বিসরণ করিলে, অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক বেদনা জন্মে, ইহাকে কর্ণশূল কহে ।

কর্ণশূলের অসাধ্যলক্ষণ । কর্ণশূলে মুচ্ছা, দাহ, জ্বর, কাস, শ্বাস ও বমি এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে, রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয় ।

কর্ণনাদের লক্ষণ । কর্ণবিবরে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ রোগী ভেরী, মূলজ ও শব্দের শব্দের তায় নানাপ্রকার শব্দ শ্রবণ করিলে, তাহাকে কর্ণনাদ কহে ।

বাধির্যের লক্ষণ । কর্ণবিবরগত শব্দবহবায়ু স্বয়ং কিম্বা শ্রোত্রের সহিত

মিলিত হইয়া কর্ণবিবরকে অবরুদ্ধ করিলে শ্রবণশক্তি বিনষ্ট হয়, এই রোগের নাম বাধির্ঘ্য ।

বান্ধির্ঘ্যের অসামান্য লক্ষণ । বালকের, বৃদ্ধের এবং দীর্ঘকালের বাধি-
রতা অসামান্য ।

কর্ণক্ষেড় রোগের লক্ষণ । পিত্ত ও শ্লেষ্মার সহিত বায়ু মিলিত হইয়া কর্ণছিদ্রকে অবরুদ্ধ করিলে, কাণের মধ্যে বংশীধ্বনির জায় শব্দ হয়, এই রোগের নাম কর্ণক্ষেড় ।

কর্ণশ্রাবের লক্ষণ । মস্তকে আঘাত লাগা, জলে নিমগ্ন হওয়া কিম্বা কর্ণবিদ্রুপি পাকিলে, কর্ণরন্ধ্র গত বায়ু প্রকুপিত হইয়া তথা হইতে পূন, রস ও জলশ্রাব করায় ইহাকে কর্ণশ্রাব কহে ।

কর্ণকণ্ডুর লক্ষণ । কর্ণরন্ধ্র গত কুপিত বায়ু শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইয়া কর্ণে কণ্ডু উৎপাদন করিলে, তাহাকে কর্ণকণ্ডু কহে ।

কর্ণগূথরোগের লক্ষণ । কর্ণরন্ধ্র গত পিত্তের উদ্ভাঙ্গার কফ শুষ্ক হইলে কর্ণমধ্যে যে ময়লা উৎপন্ন হয়, তাহাকে কর্ণগূথ কহে ।

প্রতিনাহ রোগের লক্ষণ । কর্ণরন্ধ্র গত ময়লা তরল হইয়া মুখবিবর ও নাসারন্ধ্র হইতে নির্গত হইলে, তাহাকে কর্ণ প্রতিনাহ বলে । ইহাতে অর্দ্ধাবভেদক শিরোরোগ জন্মে ।

ক্রিমিকর্ণের লক্ষণ । কর্ণে ক্রিমি উৎপন্ন হইলে কিম্বা মক্ষিকাগণ ডিম্ব প্রসব করিলে, তাহাকে ক্রিমিকর্ণরোগ কহে ।

কর্ণরন্ধ্র মধ্যে পতঙ্গাদি প্রবেশ করিলে, তাহার লক্ষণ । কর্ণ-
বিবরে পতঙ্গ কিম্বা শতপদী প্রবেশ করিলে কর্ণে অত্যন্ত বেদনা হয় ও তজ্জন্ম
রোগী অত্যন্ত ব্যাকুল এবং অস্থির হয়, অধিকন্তু প্রবিষ্ট কীট কর্ণবিবরে বিচরণ
করিলে অত্যন্ত বেদনা হয় এবং ঐ কীট স্থির থাকিলে বেদনা প্রশমিত থাকে ।

দ্বিবিধ কর্ণবিদ্রুপির লক্ষণ । কর্ণে ক্ষত কিম্বা আঘাতাদিবশতঃ অথবা
দোষের প্রকোপ হইতে বিদ্রুপি উৎপন্ন হইলে, তাহাতে সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা,
দাহ এবং তাপ বিদ্যমান থাকে, অধিকন্তু রক্তমিশ্রিত পীতবর্ণ বা রক্তবর্ণ-
শ্রাব নির্গত হয়, ইহাকে কর্ণবিদ্রুপি কহে । কর্ণ-বিদ্রুপি দুই প্রকার । • ক্ষত :

[কিস্বা আঘাতবশতঃ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে আগন্তজ কহে এবং দোষের প্রকোপবশতঃ হইলে তাহাকে দোষজ কহে ।

কর্ণপাকের লক্ষণ । পিত্তের প্রকোপবশতঃ কর্ণ-বিবর দুর্গন্ধ ও রক্ত-বিশিষ্ট হইলে, তাহাকে কর্ণপাক বলা যায় ।

পুতিকর্ণের লক্ষণ । কর্ণ-বিদ্রুধি পাকিলে কিস্বা কর্ণে জল প্রবেশ করিলে কর্ণরন্ধ্র হইতে যে দুর্গন্ধযুক্ত পুঁথ ও রস নির্গত হয়, তাহাকে পুতিকর্ণ কহে ।

কর্ণশোথের লক্ষণ । কর্ণে চারিপ্রকার শোথ উৎপন্ন হয়, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক ও রক্তজ । ইহাদের লক্ষণ বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক ও রক্তজ শোথের তায় ।

কর্ণাৰ্ৰুদের লক্ষণ । কর্ণে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, রক্তজ, মাংসজ, মেদোজ ও শিরাজ এই সাত প্রকার অৰ্ৰুদ জন্মে, ইহাদের লক্ষণ বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, রক্তজ, মাংসজ, মেদোজ ও শিরাজ অৰ্ৰুদের তায় ।

কর্ণার্শের লক্ষণ । কর্ণে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক ও রক্তজ, এই চারিপ্রকার অর্শোরোগ জন্মে । ইহাদের লক্ষণ বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক ও রক্তজ অর্শের তায় ।

শুষ্কতোক্ত আটশ প্রকার কর্ণরোগ কথিত হইল, এক্ষণে চরকোক্ত চতুর্বিধ অর্থাৎ বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক ও সান্নিপাতিক কর্ণরোগ বর্ণিত হইতেছে ।

বাতিক কর্ণরোগের লক্ষণ । বাতিক কর্ণরোগে কর্ণ-বিবরে নানা-প্রকার শব্দ ও অত্যন্ত বেদনা হয় এবং কর্ণমল শুষ্ক ও শ্রবণশক্তি হ্রাস হয় । পরন্তু কর্ণ-রন্ধ্র হইতে তরল স্রাব নির্গত হইয়া থাকে ।

পৈত্তিক কর্ণরোগের লক্ষণ । এই রোগে কর্ণ রক্তবর্ণ এবং তাহাতে শোথ, দাহ ও বিদীর্ণবৎ বেদনা হয় । পরন্তু কর্ণ হইতে দুর্গন্ধ অথচ পীতবর্ণ স্রাব নির্গত হইয়া থাকে ।

শ্লেষ্মিক কর্ণরোগের লক্ষণ । এই রোগে কর্ণে কণ্ডু, শোথ ও অন্ন-

বেদনা জন্মে এবং কর্ণরক্ত হইতে গুরুবর্ণ ও ম্লিক্স স্রাব নির্গত হয় ও রোগী বাক্যাদির শব্দ অস্পষ্ট প্রকার শ্রবণ করে।

সান্নিপাতিক কর্ণরোগের লক্ষণ। এই রোগে বাতাদি ত্রিদোষের লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পায় এবং যে দোষের প্রবলতা থাকে, সেই দোষ-জনিত বর্ণের স্রাব নির্গত হয়।

পরিপোটকের লক্ষণ। কর্ণপালি ক্রমশঃ বৃদ্ধি না করিয়া শীঘ্র বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলে, কর্ণের কোমলতাবশতঃ কর্ণে শোথ, বেদনা, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণতা এবং শুষ্কতা উপস্থিত হয় ও কর্ণের চর্ম অল্প বিদীর্ণ হইয়া থাকে। এই রোগের নাম পরিপোটক।

কর্ণোৎপাতের লক্ষণ। গুরু (ভারী) আবরণ-ধারণ কৃষ্ণা অত্যন্ত তাড়ন বা ঘর্ষণাদি দ্বারা কর্ণপালিতে দাহ, বেদনা ও পাকবিশিষ্ট অথচ শ্রাম বা রক্তবর্ণ শোথ উৎপন্ন হইলে তাহাকে কর্ণোৎপাত কহে।

উন্মূহকের লক্ষণ। বলপূর্বক কর্ণপালি বৃদ্ধি করিলে, কক্ষের সহিত বায়ু প্রকুপিত হইয়া কর্ণে কণ্ডু ও অল্প লেদনায়ুক্ত শুষ্ক শোথ উৎপাদন করে, এই রোগকে উন্মূহক কহে।

দুঃখবর্দ্ধনের লক্ষণ। কর্ণপালি যথানিয়মে বিদ্ধ না হইলে কর্ণে কণ্ডু, দাহ ও বেদনায়ুক্ত শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই রোগ ত্রিদোষসমুদ্ভূত, ইহাকে দুঃখবর্দ্ধন কহে।

পরিলেহীর লক্ষণ। এই রোগে কফ, রক্ত ও ক্রিমি প্রবৃদ্ধ হইয়া কর্ণপালিতে সর্ষপ আকৃতি, বিসর্পবান্ অথচ কণ্ডু ও দাহযুক্ত শোথ উৎপাদন করে। এই রোগ প্রসর্পিত হইয়া সমস্ত কর্ণকে আচ্ছাদন করত ক্রমে শুল্কণী ও পালীকে মাংসহীন করিয়া থাকে।

কর্ণরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

সুশ্রুতে কর্ণরোগ আটশ প্রকার কথিত হইয়াছে। কর্ণ-শূল, কর্ণনাদ, বাধির্ঘা, কর্ণক্লেদ, কর্ণস্রাব, কর্ণকণ্ডু, কর্ণগুণ্ড, প্রতিনাহ, ক্রিমিকর্ণ, দ্বিবিধ-কর্ণ-বিজ্রম্বি, কর্ণপাক, পুতিকর্ণ, চারিপ্রকার কর্ণার্শ, সাত প্রকার কর্ণবর্ধুদ।

এবং চারি প্রকার কর্ণশোধ । এতদ্ব্যতীত চরকে চারি প্রকার কর্ণরোগ কথিত হইয়াছে, যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক ও সান্নিপাতিক ।

আয়ুর্বেদ-মতে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপই যাবতীয় রোগোৎপত্তির মূলীভূত কারণ এবং চিকিৎসা কালে রোগটী বাতজ, পিত্তজ কিম্বা শ্লেষ্মজ, বায়ু, পিত্ত ও কফের মধ্যে একটি দুইটি বা দোষত্রয় এককালীন প্রকোপিত হইয়াছে, কোনদোষ প্রকোপিত হইয়া রোগ উৎপাদন করিয়াছে, ইত্যাদি বিচারপূর্বক তত্ত্ব রোগ-প্রশমক ঔষধ নির্দাচন করিতে হয় ।

যাবতীয়রোগের ঔষধ নির্দাচন-প্রণালী একই প্রকার । কর্ণরুদ্ধগত বায়ু নানাকারণে প্রকোপিত এবং শ্লেষ্মা, পিত্ত ও রক্তদ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া প্রতিলোম-ভাবে কর্ণবিবরে বিচরণ করিলে, কর্ণশূল জন্মে । এক্ষণে দেখিতে হইবে, বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা ও রক্ত এই চারিটির প্রকোপবশতঃ কর্ণশূল উৎপন্ন হইলেও উহাদের মধ্যে একটির প্রকোপ অধিক কিম্বা দুইটির প্রকোপ অধিক-বায়ুর প্রবলতা অধিক কিম্বা শ্লেষ্মার প্রবলতা অধিক । ফলতঃ কোন্ দোষের প্রকোপ অধিক, কোন্ দোষের প্রকোপ কম অথবা দুইটি বা দোষত্রয়ের প্রকোপ অধিক, তাহা স্থির করিতে না পারিলে, ঔষধ নির্দাচন বা রোগোপশম অসম্ভব ।

কর্ণশূল অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হইলেও মারাত্মক নহে, তবে দীর্ঘকালজাত এবং উপসর্গবিশিষ্ট হইলে, অসাধ্য হইয়া থাকে, কিন্তু প্রথমাবস্থায় এই রোগ কঠিন নহে, অথচ এই রোগেও যথাযোগ্য ঔষধ নির্দাচন করিতে না পারিলে শীঘ্র ফললাভের আশা ছরাশামাত্র । কর্ণশূলে বায়ুর প্রকোপ অধিক থাকিলে বায়ুনাশক মাষতৈল বা মহামাষতৈল প্রয়োগ অর্থাৎ কর্ণরুদ্ধে পুরণ ও নস্য-রূপে গ্রহণ করিলে সহর ঐ শূল প্রশমিত হয় । এইরূপ শ্লেষ্মার কিম্বা বায়ু ও শ্লেষ্মা উভয়েরই প্রকোপ সমধিক থাকিলে, শিরোরোগোক্ত দশমূল বা মহা-দশমূলতৈলের নস্য ও কর্ণবিবরে প্রয়োগ হিতকর । বায়ু ও পিত্ত উভয়ের প্রবল প্রকোপ থাকিলে, মাষবলাদিতৈলের বা ষড়্বিন্দু তৈলের নস্য ও কর্ণরুদ্ধে প্রয়োগ উপকারী । প্রথম অবস্থায় প্রায়শঃ বায়ু ও শ্লেষ্মার সমধিক প্রকোপ থাকে; সুতরাং শিরোরোগোক্ত বাতশ্লেষ্মানাশক লক্ষ্মীবিলাস, স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস ও মহালক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি কিম্বা কফরোগোক্ত কফকেতু, কফচিন্তামণি,

মহা শ্লেষ্মকালানল ও বৃহৎ কক্ষকেতু প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে অথবা বৃদ্ধ ব্যক্তির হইলে, বায়ুনাশক চিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধও প্রয়োগ করা যায় । বাতাদিভেদে এই সকল তৈল ও ঔষধ কর্ণনাদ, কর্ণক্ষেদ্র ও বধিরতায় প্রয়োজ্য ।

মুষ্টিযোগ ।

প্রথম অবস্থায় মুষ্টিযোগ প্রয়োগেই প্রায়শঃ রোগ বিনষ্ট হয় । আদার-রস চারি আনা, মধু দুই আনা, সৈন্ধবলবণ সিকি রতি ও তিলতৈল দুই আনা একত্র করিয়া একটি বিলুকে রাখিয়া গরম করিবে ও ঈষদুষ্ণ অবস্থায় কর্ণরন্ধ্রে দিবে । এইরূপ কলার বাগুড়া আদা অথবা শজিনার ছাল এই তিনটির মধ্যে কোন একটির রস কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণবিবরে দেওয়া যায় । আকন্দের পাকা পাতায় কিঞ্চিৎ গব্যদুগ্ধ মাখাইয়া আঙুণে উত্তপ্ত করিয়া যোচড় দিলে, যে রস বাহির হইবে, তাহা কর্ণবিবরে দিলে, শীঘ্র বেদনার লাঘব হয় । বাতশ্লেষ্মাধিক শূলে এই সকল ঔষধ প্রশস্ত । কর্ণে নানাপ্রকার শব্দ অশুভব হইলে এবং তৎসঙ্গে শূলবেদনা ও ক্লেদস্রাব থাকিলে, ছাগমূত্র গরম করিয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধব সহযোগে কর্ণরন্ধ্রে দিবে । ত্রিদোষজ কর্ণশূলে, ইহা মহৌষধ । এতদ্ব্যতীত আকন্দের মূলের ছালদ্বারা অথবা গুঁঠ, হিং ও সৈন্ধব সহযোগে সর্ষপতৈল সিদ্ধ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে ত্রিদোষজ কর্ণশূল বিনষ্ট হয় । কর্ণনাদ, বাধির্য (বধিরতা) এবং কর্ণক্ষেদ্র রোগেও এই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে । বাতশ্লেষ্মাধিক কর্ণশূলে ব্যবস্থিত ঔষধ-সকল, বাতশ্লেষ্মাধিক কর্ণনাদ, বধিরতা ও কর্ণক্ষেদ্র রোগে এবং ত্রিদোষজ-কর্ণশূলে ব্যবস্থিত ঔষধ ত্রিদোষপ্রবল কর্ণনাদ প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করিবে । কর্ণনাদ ও কর্ণক্ষেদ্র রোগে কটুতৈল উষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলেও বেদনা কমে । বধিরতা ও কর্ণনাদে গুঁঠের কাথে কিঞ্চিৎ গুড় মিশ্রিত করিয়া নস্য লইবে । কর্ণে ক্ষত ও তজ্জন্ত পুণ্য বা রসস্রাব হইলে, জাতী বা মালতী পাতার কাথ অথবা বটছাল, অখথছাল, যজ্ঞডুমুর ছাল, পাকুড় ছাল ও অন্নবেতসের ছাল এই পঞ্চদ্রব্যের কাথ পিচুকারী পূর্ণ করিয়া তদ্বারা দুইবার কর্ণ ধৌত করিবে । ইহা পুতিকর্ণ অর্থাৎ কাণ পচারোগেও মহোপকারী । পুতিকর্ণ ও কর্ণ-

শ্রাব প্রভৃতি রোগে ঈষৎ উষ্ণ গোমূত্র দ্বারা কর্ণরন্ধ্র ধৌত করিলেও উপকার হয় । কর্ণে গুণ্ড অর্থাৎ ময়লা সঞ্চিত হইলে, কটু তৈল উষ্ণ করিয়া কর্ণে প্রয়োগ করিয়া কিছুক্ষণ কর্ণরন্ধ্র তুল্যদ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে, পরে শয্যা বা শোন্না দ্বারা আশ্রয়ে আশ্রয়ে ময়লা টানিয়া আনিবে । কর্ণে ক্রিমি বা কীট উৎপন্ন হইলে, সরিষার তৈল কর্ণরন্ধ্রে পূরণ করিলে, তৈলের ঝাঁজে কীটসকল বহির্গত হয়, যদি এই প্রক্রিয়ায় কীট বাহির না হয়, তাহা হইলে পুতুরা পাতার রস ও কপূর মিশাইয়া তাহা অথবা ক্রিমিরোগোক্ত ধূতুরতৈল কিম্বা বিড়ঙ্গতৈল কর্ণে প্রয়োগ করিবে । গুঁঠ, পিপুল ও মরিচ দ্বারা কাথ করিয়া সেই কাথজল ছাকিয়া কর্ণরন্ধ্রে প্রয়োগ করিলেও ক্রিমি বিনষ্ট হয় । যে কোন কাথ বা তৈল কর্ণে প্রয়োগ করিয়া কর্ণরন্ধ্র ধৌত করা এবং তুল্যদ্বারা মুছিয়া ফেলা উচিত । শলাকায় কার্পাসের তুলা জড়াইয়া তুলি প্রস্তুত করিয়া লইবে । মালতীপাতার রস দ্বারা পক্ষ সরিষার তৈল কিম্বা স্তনহৃৎদ্বারা ঘষা রসায়ন কাণপচা ও কর্ণশ্রাবের মহৌষধ । কর্ণ পাকিলে, ক্ষতজ বিসর্পের স্থায় তাহার চিকিৎসা করিবে । কর্ণে বিদ্রুপ হইলে, বিদ্রুপ রোগোক্ত অন্তর্জিহ্বা রোগের চিকিৎসাক্রম অবলম্বন করিবে অর্থাৎ শজিনার ছালের রস সহ মহালক্ষ্মী-বিলাস প্রভৃতি বটিকা সেবন ও শজিনার ছালের স্বেদ ব্যবস্থা করিবে । কোন রস বা তৈল কর্ণবিবরে প্রয়োগ করিয়া কাপাসের পেঁজা তুল্যদ্বারা কর্ণছিদ্র আবৃত করিয়া রাখিবে, যেন তৈল বা রস প্রয়োগ করিবামাত্র বহির্গত হইয়া না যায়, কিছুক্ষণ কর্ণরন্ধ্রে থাকে ।

কর্ণে কণ্ডু উৎপন্ন হইলে, দশমূল বা মহাদশমূল তৈল প্রয়োগ করিবে । কর্ণপ্রতিদাহরোগে অর্দ্ধাবভেদক অর্থাৎ আধকপালে মাথা বাধা প্রকাশ পায়, স্তত্রাং ঐ অবস্থায় মহাদশমূল তৈল নস্য ও মর্দনে প্রয়োগ করিবে । কর্ণে পতঙ্গাদি প্রবেশ করিলে, তাহা বাহির করিবে । কর্ণে অর্ধদ প্রকাশ পাইলে, অর্ধদ রোগোক্ত ঔষধ এবং অর্শ জন্মিলে অর্শোরোগের স্থায় তাহার চিকিৎসা করিবে । সান্নিপাতজরে কর্ণমূলে মারাত্মক শোথ উৎপন্ন হইতে পারে, ঐ অবস্থায় ত্রণশোধের চিকিৎসা করিবে ।

কর্ণরোগের প্রথম অবস্থায় লক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতির স্থায় ভৈরবরস প্রয়োগ করা যায় এবং লক্ষ্মীবিলাসে উপকার না হইলে, বৈষ্ণব মহা লক্ষ্মীবিলাস ও

বৃহৎ কফকেতু প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায়, তজ্জপ ইন্দ্রবটী ও সারিবাতি বটী প্রয়োগ করা যায়। বাতশৈথিল্য কর্ণনাদ, বধিরতা, কর্ণক্লেদ ও কর্ণশূল যেরূপ দশমূল বা মহা দশমূল তৈল প্রয়োগ করা যায়, তজ্জপ বিষতৈল প্রয়োগ করা যায়। কর্ণে নালীবা হইলে, মরিচাদি, বৃহৎ মরিচাদি, সোমরাজী বা বৃহৎ সোমরাজী তৈল কর্ণে দিবে। কর্ণনালীতে শল্কূকাদিতৈল মহোপকারী, অনেকস্থলে ইহার মহোপকারিতা উপলব্ধি হইয়াছে। দার্ক্যাদিতৈল নানা প্রকার কর্ণরোগে প্রয়োগ করা যায়। কর্ণরোগে এরূপ উৎকৃষ্ট তৈল আর নাই বলিলেও চলে। কর্ণশ্রাব, কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বারিধী, পুতিকর্ণ, কর্ণক্লেদ, ক্রিমিকর্ণ, কর্ণপাক, কর্ণকণ্ডু, কর্ণপ্রতীনাহ ও সর্বপ্রকার কর্ণশোধ এই তৈল প্রয়োগে আরোগ্য হয়, কিন্তু ঔষধ যত বড়ই হউক না কেন, রোগোৎপত্তির মূলীভূত কারণ অগ্রে নির্ণয় করা কর্তব্য, ইহা প্রত্যেক চিকিৎসকেরই প্রতিমুহূর্ত্তে স্মরণ রাখা উচিত। যেহেতু অনেকস্থলে ফিরঙ্গ-প্রভৃতি রোগে রক্তদুষ্টি বশতঃ কিম্বা জ্বরাদি নানা প্রকার ব্যাদি দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ায় রক্ত নিস্তেজ ও দূষিত হইলে, কর্ণরোগ উপস্থিত হয়, এবং তাহাতে মূলরোগের ঔষধ প্রয়োগ না করিলে, কর্ণরোগ বিনষ্ট হয় না, সুতরাং ঐ অবস্থায় লৌহস্বর্ণাদিষটি রক্তশোধক ও বলকারক ঔষধ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ফিরঙ্গরোগের পরিণামে কর্ণের পশ্চাদ্বর্ত্তী মস্তকাস্থি আক্রান্ত হওয়ায় কর্ণরন্ধ্র হইতে অনবরত পুথ শ্রাব হইতে দেখা গিয়াছে। আয়ুর্বেদীয় ঔষধ সাধারণতঃ মিশ্র ও যোগবাহী, বিশেষতঃ এক একটা ঔষধ অনেক গুণযুক্ত বহুসংখ্যক ঔষধের সমন্বয়ে প্রস্তুত, অথচ রক্তশোধক ও বলকারক স্বর্ণলৌহাদি সংযুক্ত, সুতরাং সাধারণতঃ সারিবাতি বটী প্রভৃতি প্রয়োগ করিলেই চলে, তবে অত্যধিক রক্তদুষ্টি থাকিলে, ফিরঙ্গরোগোক্ত পৃথক ঔষধ অর্থাৎ পঞ্চতিক্ত দ্রব গুগ্গলু বা মশলার জল প্রভৃতি প্রয়োগ করা কর্তব্য। কর্ণরোগে আনুষঙ্গিক জ্বরাদি উপসর্গ থাকিলে সেই সকল উপসর্গ বিনষ্ট অথচ কর্ণরোগ প্রশমিত হয়, এরূপ যোগবাহী ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। কর্ণরোগে তরুণ জ্বর থাকিলে বা প্লেয়ার প্রবলতা থাকিলে, জ্বররোগোক্ত কস্তুরীভূষণ প্রয়োগ করিবে।

কর্ণরোগে—ঔষধ ।

ভৈরবরস । কর্ণরোগে কর্ণবিবরে ক্ষত ও তাহা হইতে শ্রাব নির্গত হইলে এবং বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে । তুঁৎসঙ্গে অর, অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী বা শ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে এই ঔষধে তাহারও বিশেষ উপকার হয় । অমুপান—নিসিন্দাপাতা ও আদার রস এবং মধু ।

ভৈরবরস । পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগার গৈ, কড়িভস্ম ও মরিচ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ, আদার রসে ভাবনা সাতবার । বটী ৩ রতি ।

ইন্দুবটী । কর্ণনাদ, কর্ণশূল, কর্ণক্ষেদ, কর্ণশ্রাব, বধিরতা, কর্ণবিদ্রুধি, কর্ণপ্রতীনাহ, কর্ণার্শ ও কর্ণশোথ প্রভৃতি রোগে কিম্বা ঐ সকল কর্ণরোগ রক্তদ্রুষ্টি, প্রমেহ অথবা বিষাক্তমেহ হইতে উৎপন্ন হইলে, কিম্বা কর্ণরোগে বাতিক বা পৈত্তিক শিরঃপীড়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে । সাধারণ অমুপান—আমলকীর রস বা কাথ, কর্ণবিদ্রুধিতে শজিনার ছালের রস ও কর্ণশোথে পুনর্নবার রস ।

ইন্দুবটী । শোধিত শিলাজতু, অভ্র ও লৌহ প্রত্যেকে : তোলা এবং স্বর্ণভস্ম ১০ আনা একত্র করিয়া কাকমাটীররস, শতমূলীররস, আমলকীররস বা কাথ এবং পদ্মপুষ্পেররসদ্বারা সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে । বটী ২ রতি ।

সারিবাতি বটী । কর্ণনাদ, কর্ণশূল, কর্ণশ্রাব, বধিরতা, কর্ণক্ষেদ, কর্ণবিদ্রুধি, কর্ণশোথ, কর্ণপাক ও কর্ণার্শ প্রভৃতি রোগে ইন্দুবটী ও মহালক্ষ্মী-বিলাস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগে উপকার না হইলে অথবা ঐ সকল রোগ রক্তদ্রুষ্টি প্রমেহ, শিরঃপীড়া ও অন্নপিণ্ড প্রভৃতি রোগ হইতে উৎপন্ন হইলে, বিশেষতঃ ফিরঙ্গবিষ ও বিষাক্ত মেহরোগ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ নির্দ্বিচারে প্রয়োগ করিবে । সাধারণ অমুপান—চন্দনের কাথ । ইন্দুবটীর ত্রায় অস্ত্রান্ত রোগের অমুপান কর্ত্তব্য করিবে

সারিবাতি বটী । অনন্তমূল, যষ্টিমধু, কুড়, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাচি, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপলমূল, গুলঞ্চ, লবঙ্গ, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, সর্বচূর্ণের সমান অভ্র এবং অভ্রের সমান লৌহ সমস্ত একত্র করিয়া কেণ্ডুযোর-রস, অঁজুনছালের কাথ, যবের কাথ এবং কাকমাটীররস ও কুঁচমূলের কাথে সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া বটিকা করিবে । মাত্রা—৬ রতি ।

বিষতৈল। বধিরতা, কর্ণশ্রাব, পুতিকর্ণ, কর্ণশূল ও কর্ণনাদ রোগে এই তৈল কর্ণবিবরে প্রয়োগ করিবে।

বিষতৈল। তিলতৈল ১ সের। যথাবিধি মুছাঁপাক করিবে। কক্কত্রব্য—কুট্টি-বেলন্ত ৮ তোলা। ছাগদুগ্ধ ৪ সের ও গোমূত্র ৪ সের। যথাবিধি তৈলপাক করিয়া চাকিয়া লইবে।

শম্বু কাদিতৈল। ইহা সর্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ। কর্ণনালী ঘায়ে-প্রশস্ত, নালীবিশতঃ কর্ণরন্ধ্র হইতে শ্রাব হইলে, ইহা প্রয়োগ করিবে।

শম্বু কাদি তৈল। কটুতৈল ১ সের। যথাবিধি মুছাঁপাক করিবে। মুছাঁপাক করিয় শাম্বকের টাটকা মাংস একপোয়া তৈলে নিঃক্ষেপ করিবে এবং চটপট শব্দের বিরাম হইলে, নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। ইদানীং শম্বু কাদি তৈল বা কিকুশুক প্রভৃতি তৈলের মুছাঁপাক প্রচলিত নাই। কিন্তু মুছাঁপাক করা কর্তব্য, মুছাঁপাকে তৈলের প্রভাব বন্ধিত হয়।

দার্ব্যাদিতৈল। কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বধিরতা, পুতিকর্ণ, কর্ণক্ষেদ্র, ক্রিমিকর্ণ, কর্ণপাক, কর্ণকণ্ডু, কর্ণপ্রতিনাহ, কর্ণশোথ ও কর্ণ শ্রাব প্রভৃতিরোগে এই তৈলদ্বারা কর্ণপূরণ করিবে।

দার্ব্যাদিতৈল। তিলতৈল ৪ সের। যথানিয়মে মুছাঁপাক করিবে। কাষ্যত্রব্য—দারুহরিদ্রা ১২০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দশমূল সমভাগে মিলিত ১২০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। যষ্টিমধু ১২০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কদলী-মূলের রস ১৬ সের। কক্কত্রব্য—কুড়, বচ, শজিনারবীজ, গুল্ফা, রসায়ন, দেবদারু, যবক্ষার, সাতিক্কার, বিটলবণ ও সৈন্ধব; ইহারা সমভাগে মিলিত এক সের। যথাবিধি তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

কর্ণরোগে—পথ্যাপথ্য।

কর্ণরোগে ময়দা ও যবের দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য এবং পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন, বেতাগ্র, পলতা, কচি নিমপাতা, উচ্ছে, করলা, শিয়লীকুলের পাতা ও হিঙ্গা প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্যের শুক্ল, পটোল, কচি বেগুন, শজিনার খাড়া, খোড়, মোচা, কুমড়া, আলু, মান, কাচকলা, ডুম্বুর প্রভৃতির তরকারী, মাগুর, কই, খলিসা প্রভৃতি ক্ষুদ্র টাটকা মৎস্তের ঝোল এবং ভিতিরি, ও লাব পক্ষী, কুকড়া, ময়ূর, হরিণ ও ছাগলের মাংস পথ্য দিবে। "এই-

রোগে বিরুদ্ধ অন্ন পানীয়, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, অধিক কথা বলা, দন্ত-
মার্জন, শ্লেষ্মবর্জক দ্রব্য, তরল দ্রব্য, ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম প্রভৃতি
এককালে পরিত্যাগ্য ।

নাসারোগ-চিকিৎসা ।

পীনসরোগের লক্ষণ । এইরোগে নাসিকা গাঢ় শ্লেষ্মা দ্বারা আর্দ্র-
ভাবাপন্ন বা শুষ্ক শ্লেষ্মা দ্বারা আবদ্ধ ও স্তম্ভপবিশিষ্ট হয়, পরন্তু আত্মাণশক্তি ও
মধুরাদিরসজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, ইহাকে পীনস বা অপীনসরোগ কহে । এই রোগে
বাতশ্লেষ্মিক প্রতিক্রিয়া রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

পীনসের অপক লক্ষণ । পীনসরোগের অপকাবস্থায় রোগীর মস্ত-
কের গুরুতা, অরুচি, নাসিকা হইতে তরল স্রাব, শ্রবভঙ্গ ও পুনঃ পুনঃ নিদ্রাবন
(খুথু) নির্গত হইয়া থাকে ।

পীনসের পক লক্ষণ । পীনসের পকাবস্থায় অপকাবস্থার লক্ষণ
অর্থাৎ মস্তকের গুরুতা, অরুচি ও নাসিকা হইতে তরলস্রাব প্রভৃতি লোপ
পায় এবং নাসাস্থিত কক্ষ গাঢ় হইয়া নাসারন্ধ্রে সংলগ্ন হয় এবং রোগীর শ্রব
পরিষ্কার ও শ্লেষ্মার বর্ণ স্বাভাবিক দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

পুতিনস্ত্রের লক্ষণ । প্রচুটরক্ত, পিত্ত ও শ্লেষ্মাদ্বারা গল ও তালু-
মূলস্থ বায়ু পুতিভাবাপন্ন হইলে, মুখ ও নাসারন্ধ্রে হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়,
ইহার নাম পুতিনস্য ।

নাসা-পাকের লক্ষণ । যে রোগে নাসাস্থিত পিত্ত বলবান্ হইয়া
নাসিকাতে বহুসংখ্যক ত্রণ উৎপাদন করে এবং ঐসকল ত্রণ পাকিয়া দুর্গন্ধ ও
ক্লেদ নির্গত হয়, তাহাকে নাসাপাক কহে ।

পুয়রক্তের লক্ষণ । রক্ত ও পিত্তের আধিক্য কিম্বা ললাটে আঘাতাদি-
বশতঃ নাসিকা হইতে রক্তমিশ্রিত পুয় নির্গত হইলে, তাহাকে পুয়-
রক্ত কহে ।

ক্ষবথুর লক্ষণ । নাসিকাস্থিত শৃঙ্গাটক নামক মৰ্ম্ম দূষিত হইলে, বায়ু কফের সহিত প্রবল শব্দসহ নাসারন্ধ্র দিয়া নির্গত হয়, তাহাকে ক্ষবথু কহে । বাঙালায় ইহাকে হাচি বলে ।

আগন্তুজ ক্ষবথুর লক্ষণ । সর্ষপাদি তীক্ষ্ণদ্রব্য অধিক ভক্ষণ বা তাহার ভ্রাণ লইলে কিম্বা হৃদ্য নিরীক্ষণ অথবা স্ত্রোমাদি দ্বারা নাসিকাস্থিত তরুণাস্থি নামক মৰ্ম্ম সঞ্চালিত করিলে, অকস্মাৎ ক্ষবথু অর্থাৎ হাচি হয় ।

ভ্রংশথুর লক্ষণ । যে রোগে মস্তকের পূর্কসন্ধিত গাঢ় ও লবণরসায়ক কফ, পিত্তদ্বারা বিদগ্ধ ও সত্তপ্ত হইয়া নাসারন্ধ্র হইতে নির্গত হয়, তাহাকে ভ্রংশথু কহে ।

দীপ্তিরোগের লক্ষণ । যে রোগে নাসিকাতে অত্যন্ত জ্বালা হয় বা নাসারন্ধ্র জলন্ত অগ্নিদ্বারা জলিয়া যাইতেছে, এইরূপ বোধ হয় এবং নাসিকা-হইতে ধূমবৎ বায়ু নির্গত হয়, তাহাকে দীপ্তিরোগ কহে ।

প্রতিনাহের লক্ষণ । বায়ুর সহিত কফ মিলিত হইয়া নাসারন্ধ্রকে রুদ্ধ করিলে তাহাকে প্রতিনাহ কহে ।

নাসা-স্রাবের লক্ষণ । নাসারন্ধ্র হইতে পীত বা শ্বেতবর্ণ গাঢ় অথবা তরল কফ নির্গত হইলে, তাহাকে নাসাস্রাব কহে ।

নাসা-শোষের লক্ষণ । নাসারন্ধ্র গত কফ বায়ু ও পিত্তদ্বারা শোষিত হইয়া গাঢ় হইলে, রোগী অতিকষ্টে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে, এই রোগের নাম নাসাশোষ ।

বাতিক প্রতিশ্রায়ের লক্ষণ । এই রোগে নাসারন্ধ্র বন্ধ, নাসিকা হইতে জলস্রাব, গলা, তালু ও ওষ্ঠশোষ, ললাটের দুইপার্শ্বে বেদনা, পুনঃ পুনঃ হাচি এবং মুখের বিরসতা ও স্রবভঙ্গ হয় ।

পৈত্তিক প্রতিশ্রায়ের লক্ষণ । এই রোগে নাসারন্ধ্র হইতে উষ্ণ ও পীতবর্ণ কফ নির্গত হয় এবং রোগী ক্রুশ, পাণ্ডুবর্ণ ও সত্তপ্ত হয় পরন্তু নাসা-রন্ধ্র হইতে ধূমবৎ নির্গত হইয়া থাকে ।

শ্লেষ্মিক প্রতিশ্রায়ের লক্ষণ । এই রোগে নাসারন্ধ্র হইতে শ্বেত-

বর্ষ অথচ শীতল কফ বহুপরিমাণে শ্রাব হয় এবং রোগীর শরীর পাণ্ডুবর্ণ, অক্ষিপন্নবে শোথ, মস্তকে গুরুতা এবং গলা, তালু, ওষ্ঠ ও মস্তকে কণ্ড, উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

সান্নিপাতিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ । এই রোগ পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পায় ও ইচ্ছা আবার প্রশমিত হয় এবং কখন পকু কখনবা অপকু কফশ্রাব হইয়া থাকে ।

রক্তজ প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ । এই রোগে নাসিকা হইতে রক্তশ্রাব, রোগীর চক্ষু তাম্রবর্ণ এবং নিশ্বাসে ও মুখে দুর্গন্ধ হয় এবং পৈশ্তিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, পরন্তু রোগী গন্ধ-গ্রহণে অসমর্থ ও বন্ধঃস্থলে বেদনা, জ্বর এবং কাস প্রভৃতি রোগে পীড়িত হইয়া থাকে ।

প্রতিশ্যায়ের কৃচ্ছ্রসাধ্য লক্ষণ । যে প্রতিশ্যায়রোগে নাসারক্ত, কখনও আর্দ্র, কখনও শুষ্ক, কখনও নাসারক্ত, অবরুদ্ধ ও কখনও পরিষ্কার হয় এবং রোগীর শ্রাণশক্তি বিনষ্ট ও নিঃশ্বাসের সহিত দুর্গন্ধ বাহির হয়, তাহা কষ্টসাধ্য ।

প্রতিশ্যায়ের অসাধ্য লক্ষণ । ষাণ্মসয়ে চিকিৎসা না করিলে, সর্ব-প্রকার প্রতিশ্যায় রোগই অসাধ্য হইয়া থাকে ।

বর্দ্ধিত প্রতিশ্যায়ের ক্রিমির লক্ষণ । প্রতিশ্যায়রোগ বর্দ্ধিত বা পুরাতন হইলে, কফ হইতে স্থল স্থল ক্রিমি উৎপন্ন হয়, ক্রিমি উৎপন্ন হইলে, ক্রিমিজ্ঞ শিরোরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

বর্দ্ধিত প্রতিশ্যায়ের অপর লক্ষণ । প্রতিশ্যায় বর্দ্ধিত বা পুরাতন হইলে, বধিরতা, অন্ধতা, শ্রাণশক্তির অন্ততা, প্রবল চক্ষুরোগ, শোথ, অগ্নিমান্দ্য এবং কাস প্রভৃতি রোগও তৎসঙ্গে উপস্থিত হইতে পারে ।

নাসা-রোগ-চিকিৎসা-বিধি ।

নাসারোগে যে রোগ জন্মে, তাহাকে নাসারোগ কহে । নাসারোগ সর্ব-সম্মত চৌত্রিশ প্রকার । পীনস, পূতিনাসা, নাসাপাক, পুন্নরক্ত, কবধু, জ্বন্ধু, দীপ্তি, প্রতিনাহ, পরিশ্রাব, নাসা-শোথ, পাঁচপ্রকার প্রতিশ্যায়,

সাত প্রকার অর্কুদ, চারি প্রকার অর্শ, চারি প্রকার শোথ এবং চারি প্রকার রক্তপিত্ত ।

নাসারোগ নানাকারেণে উৎপন্ন হয় । পীনস ও প্রতিশ্যায় প্রায় একপ্রকার লক্ষণাবিতবীয়াধি, যেহেতু পীনসরোগেও প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । আবার প্রতিশ্যায় যেসকল কারণে জন্মে, পীনস হইতে প্রতিশ্যায়-পর্যন্ত রোগগুলিও সেইসকল কারণেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । পরন্তু অধিকাংশস্থলে অগ্রে পীনস বা প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ প্রকাশ পায়, পশ্চাৎ নানাকারেণে পরিণ্যাস প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয় ।

অর্কুদ, অর্শ, শোথ ও উর্দ্ধগত রক্তপিত্ত যেসকল কারণে জন্মে, নাসার্কুদ, নাসার্শ, নাসা-শোথ ও নাসাগত রক্তপিত্ত সেই সকল কারণে জন্মে ।

প্রতিশ্যায়রোগ সত্ত্বোজনক ও চয়াদিক্রমজনক এই দুই প্রকারে উৎপন্ন হয় । রোগোৎপত্তির কারণের প্রবলতাবশতঃ অবিলম্বে দোষ প্রকৃপিত ও সঞ্চিত হইয়া রোগ উৎপাদন করে অথবা ধীরে ধীরে সঞ্চয়াদিক্রম অল্পসারে রোগ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ রোগের কারণ হইতে দোষের সঞ্চয়, সঞ্চয় হইতে দোষের প্রকোপ, প্রকোপ হইতে প্রসার বা বিস্তার, প্রসার হইতে স্থানান্তর, আশ্রয় হইতে ব্যক্ততা (প্রকাশমানতা) এবং ব্যক্ততা হইতে ভেদ হইয়া থাকে ।

মলমূত্রাদির বৈগধারণ, অজীর্ণ, নাসারন্ধ্রে ধূলি প্রবেশ, অধিক বাক্যালাপ, ক্রোধ, ঋতু-চর্য্যার বিপরীত আচরণ, মস্তকে রোজাদির স্তম্ভাপলাগান, দিবানিত্রা, রাক্ষসাগরণ, শীতলজল ও হিমনিবেশন, মৈথুন, ক্রন্দন এবং মস্তকে কফ সঞ্চয় ; এই সকলকারণে সত্ত্বপ্রতিশ্যায় জন্মে ।

দোষপ্রকোপজনক নানাপ্রকার আহারবিহারদ্বারা বাতাদিদোষ ও শোণিত পৃথক্ বা মিলিতভাবে সঞ্চিত ও প্রকৃপিত হইয়া মস্তক আশ্রয়পূর্ব্বক চয়াদিক্রমজনক প্রতিশ্যায় উৎপাদন করে ।

প্রতিশ্যায় উৎপন্ন হইবার পূর্বে হাচি, মস্তকভার, শরীরের শুষ্কতা, গাত্রবেদনা, রোমাঞ্চ, নাসারন্ধ্র হইতে ধূম নির্গমবৎবোধ, তালু-প্রদাহ, নাসাত্রাব ও মুখ-ত্রাব প্রভৃতি উপসর্গ সকল উপস্থিত হয় ।

প্রতিশ্যায় বা পীনসরোগের চলিত নাম সর্দি । এই রোগ সর্কলেরই

পরিচিত। সকলেরই জানা আছে যে, সর্দি সাধারণতঃ সহজসাধ্য ব্যাধি, কিন্তু তাহাও অনেক সময়ে তুচ্ছতাজ্জিলাবশতঃ বা মিথ্যা আহারবিহারাদি-
 দ্বারা নানাবিধ কঠিন বা অসাধ্যরোগে পরিণত হইয়া থাকে। বদাৰাহল্য,
 স্বাস্থ্য-পালন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাই ইহার কারণ। শরীর সুস্থ না থাকিলে
 যে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বিধ সম্পত্তি লাভ অসম্ভব, তাহা অনে-
 কেই বুঝিবার শক্তি নাই, আর কেহ কেহ বা বুঝিয়াও তুচ্ছতাজ্জিলা
 বা অগ্রাহ্য করে অথবা লোভবশতঃ কুপথ্যাди গ্রহণ করে, ফলে কুকর্মের ফলও
 সঙ্গে সঙ্গে ফলিয়া থাকে। যে স্বাস্থ্যের সহিত শরীরের নিত্যসম্বন্ধ, যে শরীর
 একটু বিকল বা অসুস্থ হইলে, চতুর্বিধ সম্পত্তিও নগণ্য বোধ হয়, সেই শরীর
 বা স্বাস্থ্য কিসে ভাল থাকে, সেবিষয়ে অন্ততঃ সাধারণ জ্ঞানটুকু না থাকা
 নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। পক্ষান্তরে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান না থাকিলেও
 উপদেষ্টার উচ্চ আসন গ্রহণ করিতে কেহই সঙ্কুচিত হয় না, তাই দেখা যায়
 সর্দি হইলে, কেহ বলে গরম গরম কয়েকখানা জিলেপী খাও, কেহ বলে
 গরমে সর্দি হইয়াছে, এক গ্রাস মিশ্রীর সরবৎ খাও, আবার কেহ বলে,
 বেশ করিয়া তেল মাখিয়া অবগাহন স্বান কর, গরম কাটিবে ও সর্দি সারিয়া
 যাইবে, এইরূপ নানাভাবে নানাপ্রকার পরামর্শ দেয়, কিন্তু যে বিষয়ের অভি-
 জ্ঞতা নাই, সেবিষয়ে এইরূপ যতায়ত পরিব্যক্ত করা যে কতদূর দোষের, করিলে
 তাহা হইতে যে পরিণামে কিরূপ বিষময় ফলের উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা
 কেহ ভ্রমেও একবার চিন্তা করেন না। শৈত্যক্রিয়াদ্বারা বহির্গমনোন্মুখ প্লেগা
 বহির্গত হইতে না পারিয়া বলিয়া যায় ও নানাপ্রকার শৈত্যিকবিকার অর্থাৎ
 মারাত্মক বাতপ্লেগজ্বর, নিউমোনিয়া অর্থাৎ ফুস্ ফুস্ বিকৃতি কিম্বা কাস ও
 কাস হইতে যক্ষ্মা বা শোষ পর্যন্ত উৎপাদন করে। সর্দির পরিণাম ফল
 এতাদৃশ শোচনীয়, তাহা জানা থাকিলে বোধ হয়, কেহই শৈত্যক্রিয়া করিতে
 পরামর্শ দিতেন না।

প্রতিশ্রাব্যের পূর্বরূপ বা রূপ প্রকাশ পাইলে, কিঞ্চিৎ উষ্ণক্রিয়া করা
 কর্তব্য। স্বান ও পানে উষ্ণজল ব্যবহার এবং দান্ত বন্ধ হইলে বা কোষ্ঠকাঠিন্য
 প্রকাশ পাইলে, একটি মৃদুবিরেচন লওয়া আবশ্যিক। এই অবস্থায় গায়ে ঠাণ্ডা
 লাগান উচিত নহে, একটা জামা সর্বদা ঘেঁষা গায়ে থাকে, কারণ কুপথ্যাদিরাও

যেমন অনিষ্ট হয়; ঠাণ্ডা লাগিলেও তদ্রূপ অনিষ্ট হইতে পারে, সর্দির অবস্থায় অধিকাংশস্থলে গায়ে ঠাণ্ডা লাগিয়া প্রবল নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে ।

প্রতিশ্রাব্যের পূর্বলক্ষণ প্রকাশ পাইলেই বায়ুশূন্য গৃহে অবস্থান এবং মোটা কাপড়দ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া রাখা কর্তব্য । পীনস এবং প্রতিশ্রাব্যরোগে লক্ষ্মীবিলাস, স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস, কফকেতু প্রভৃতি প্রয়োগ, নস্তগ্রহণ এবং আহার বিহারে একটু সতর্কতা অবলম্বন করিলে, অনায়াসেই সর্দি সারিয়া যায় । প্রথম অবস্থায় ঐ সকল ঔষধের কোন একটি প্রয়োগ করিবে, অনন্তর স্নেহায় পক-লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, শিরোরোগোক্ত বিধান মত কৃষ্ণজীরার নস্ত, কপূরচূর্ণের নস্ত, শোভাজ্ঞন নস্ত, বড় চোত্রা পাতার নস্ত কিম্বা মহাদশমূল বা যড়বিন্দু-তৈলের নস্য ব্যবস্থা করিবে । প্রাতঃকালে আদার কুচি সৈন্ধবলবণ সহ ভক্ষণ করিলে, সর্দি সারে । কৃষ্ণজীরা বাটা গব্যমূত্রসহ মিশ্রিত করিয়া গরম ভাতের সহিত মাখিয়া খাইলে উপকার হয় । একটি গামলায় অথবা বালতীতে গরম জল রাখিয়া তাহাতে ১০।১৫ মিনিট পদদ্বয় ডুবাইয়া রাখিলে, বিশেষ উপকার হয় । জল হইতে পদদ্বয় উঠাইয়া কাপড়দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে, যেন ঠাণ্ডা লাগিতে না পারে । কিঞ্চিৎ আদার রস মধুসহ পান করিলে উপকার হয় । এতদ্ব্যতীত কাসরোগোক্ত তালীশাদি চূর্ণ প্রয়োগ করা যায় । কটফলাদি চূর্ণ ও ব্যোষাদি চূর্ণ অথবা বাসাকাথ পীনসাদি রোগে অথবা পীনস বা প্রতিশ্রাব্য হইতে কাস, বৃকে ব্যাথা, জ্বরভাব ও স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে, অভ্যস্ত উপকারী । ক্রিমিরোগোক্ত ত্রিকটুকাস্ত নস্ত প্রয়োগ করা যায় । সূত, গুগ্গলু ও মোম সমভাগে লইয়া তদ্বারা ধূম প্রয়োগ করিলে, উপকার হয় । মস্তকে দশমূল বা মহাদশমূল তৈল মর্দন করিয়া কাপড়ের পোটলা গরম করিয়া বেদ দেওয়া যায় । এই সকল ঔষধ ও পথ্যাদি প্রয়োগে পীনস, সর্কপ্রকার প্রতিশ্রাব্য, পুতিনাসা, নাসাত্রাব, ভ্রংশধু, কবধু (হাঁচি) ও দীপ্তি নামক নাসারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে । গৃহদুমাশ্র তৈল প্রয়োগে নাসার্শ বিনষ্ট হয় । নাসারন্ধ্র হইতে রক্তস্রাব হইলে, রক্তপিত্তরোগোক্ত উর্জগত রক্তপিত্তের চিকিৎসা করিবে । ফিরঙ্গ-বিষ শরীরে অবস্থান করিলে, অথবা অর্শোরোগীর রক্তস্রাব অকস্মাৎ বন্ধ করিলে, নাসা হইতে রক্তস্রাব হইতে

পারে, এই অবস্থায় উর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগোক্ত ঋণলৌহাদি ষটিত ঔষধ প্রস্তুত । ফিরঙ্গ বিষের লক্ষণ সমধিক প্রকাশ পাইলে, ফিরঙ্গরোগোক্ত মশ-
নার জল ব্যবস্থা করিবে । নাসিকায় আঘাত লাগিয়া রক্তস্রাব হইলে, কচি-
দুর্কার রসের নস্ত প্রয়োগ করিবে । শুষ্ক আমলকী বাটিয়া ঘৃতসহযোগে নাসি-
কার বহির্দেশে বা উপরে প্রলেপ দিলেও রক্তস্রাব বন্ধ হয় । ক্রিমিনাসারোগে
ক্রিমিরোগোক্ত ত্রিকটুকাত্ত নস্য বা অপামার্গ তৈলের নস্য প্রয়োগ করিবে ।
নাসার্শ্বরোগকে চলিত কথায় নাসা কহে । নাসা ভাঙ্গিয়া দিলে, রক্তস্রাব
হইয়া প্রশমিত হয়, কিন্তু আবার হয়, এইরূপ পুনঃ পুনঃ ভাঙ্গিয়া দিলে, কিছু-
দিনের জন্য প্রশমিত হয়, কিন্তু আবার দেখা দেয় ।

শ্লেষ্ম-প্রধান শরীরে প্রতিশ্রায় রোগ এরূপভাবে আক্রমণ করে যে,
রোগীর তৈলমর্দন বা শীতল জলে স্নান পর্য্যন্তও সহ হয় না, ঐ অবস্থায় শ্লেষ্ম-
শৈলেশ্বরস সেবন ও মহাদশমূলতৈল মাখিতে দিবে, যদি উক্ত তৈল মর্দন সহ
না হয়, তবে তৈল মাখা একেবারে বন্ধ করিবে ।

নাসাপাকে বট, অশ্বথ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও অন্নবেতসের কাথ সেবন
করিতে দিবে । পুণ্ডরিকরোগে উর্দ্ধগত রক্তপিত্তনাশক ঔষধ ও দুর্কাণ্ড নস্য
প্রয়োজ্য । দীপ্তিরোগে আমলকীর কাথজলের নস্য গ্রহণ এবং আমলকী-
বাটা বা চন্দন ঘষার প্রলেপ নাসিকার বহির্ভাগে প্রয়োগ করিবে ।

পীনস ও প্রতিশ্রায় রোগে শ্লেষ্মার পক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, নস্য এবং
তৈল প্রয়োগ করিবে । প্রথম অর্থাৎ অপক অবস্থায় অগ্নাত ঔষধ প্রয়োগ
করা উচিত । তেঁতুলপাতার কাথ করিয়া হিং ও মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান
করিতে দিবে । পঞ্চামৃত রস, কফরোগোক্ত কফকেতু, কফচিত্তামণি ও
লক্ষ্মীবিলাস রস প্রভৃতি এই রোগের প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করিবে । রোগ
পুরাতন বা কঠিন হইলে, শিরোরোগোক্ত মহালক্ষ্মীবিলাস, শ্লেষ্মশৈলেশ্বরস
বা শ্লেষ্মকালানলরস প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে । চিত্রকহরীতকী সর্বপ্রকার
নাসারোগে প্রয়োগ করা যায় ।

নাসারোগে-ঔষধ ।

বাসা-কাথ । পীনস, প্রতিশ্রায়, পুণ্ডরিক, নাসাপাক, নাসাপ্রতীনাহ,

নাসাত্রাব ও ক্ষবধু প্রভৃতি নাসারোগে এই কাপ প্রয়োগ করা যায় । হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া বা শৈত্যসংযোগে বৃকে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলে, ইহা প্রয়োগে অসাধারণ উপকার হয় । ইহা সেবনে শ্লেষ্মা তরল ও কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় এবং উদরাগ্নান হ্রাস পায় । বাতশ্লেষ্মিকজ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর, নিউমোনিয়া বা ফুসফুস বিকৃতি অথবা কাসরোগে বক্ষঃস্থল শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত হইলে, ইহা ব্যবস্থা করা যায় ।

বাসা কাথ । বাসকছাল, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্ ও পিপুল প্রত্যেক অর্ধতোলা, জল-৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

কটফলাদি চূর্ণ । পীনস ও প্রতিশায় প্রভৃতি রোগে এবং ঐ সকল রোগের সহিত স্রবভঙ্গ, তমকশ্বাস, শ্লেষ্মিক ও সান্নিপাতিক কাস, জ্বরভাব ও শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । অমুপান—আদার রস ও মধু ।

কটফলাদি চূর্ণ । কটফল, কুড়, কঁাকড়াশুঙ্গী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, তুরালভা ও কৃষ্ণ-জীরা ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগ, একত্র করিবে ।

ব্যোষাদি চূর্ণ । পীনস ও প্রতিশায় রোগে এই ঔষধ লেহন করিতে দিবে । ঐ সকল রোগের সহিত শ্বাস, কাস বা অরুচি প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, তাহাও ইহা সেবনে বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

ব্যোষাদি চূর্ণ । শুঠ, পিপুল, মরিচ, চিতান্নল, তালীশপত্র, তেঁতুল, অন্নবেতস (খৈকল), চই ও কৃষ্ণজীরা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, এলাচিচূর্ণ বার আনা, দারুচিদি চূর্ণ বার আনা ও তেজপাতাচূর্ণ বার আনা । সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিয়া বটিকা করিবে । পুরাতন গুড়ের অভাবে নূতন ইক্ষুগুড় রৌদ্রে চারিপ্রহর শুষ্ক করিয়া লইবে । মাত্রা—দুই আনা

শোভাজ্ঞন নস্ত্র । পীনস ও প্রতিশায় রোগে শ্লেষ্মার পক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই নস্ত্র প্রয়োগ করিবে ।

শোভাজ্ঞন নস্য । শঙ্কিনাবীজ, পিপুল, বিড়ঙ্গ ও মরিচ প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ । একত্র করিয়া প্রয়োগ করিবে ।

পঞ্চামৃত রস । পীনস ও প্রতিশায় রোগ হইলে কিম্বা ঐ সকল রোগে

অন্ন, গাত্রগুরুতা, আলস্য, মাথাধরা কাণ কামড়াই, চক্ষু রসে ছল ছল করা এবং মুখ রসে টল্ টল্ করা প্রভৃতি শ্লেষপ্রধান উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অমুপান—আদার রস ও মধু ।

পঞ্চায়তরস । পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, সোহাগার গৈ ৩ ভাগ, নিম ৪ ভাগ ও ময়িচ ৫ ভাগ একত্র করিবে । আদাররসে মর্দন । বটী ৩ রতি ।

নাসারোগে—পথ্যাপথ্য ।

পীনস ও প্রতিশ্চায় রোগের প্রথমে অবস্থান্তেদে লজ্জন দিতে হয় । উষ্ণ জল পান, উষ্ণ জলে স্নান, যবের ছাতু, আঁটার রুটি, শালিতণ্ডুলের অন্ন, মুগ বা মসুর দাইল, পাঠা, ভেড়া ও মুরগীর মাংস, পলতা, বেতাগ্র, উচ্ছে, করলা, কচি নিমপাতা ও শিয়লীপাতার শুক, বেগুন, কাচকলা, ডুমুর, খোড়, মোচ ও মুলার ঘণ্ট বা ঝোল এবং স্নিগ্ধ অগচ উষ্ণবীর্ষাদ্রব্য প্রভৃতি ভোজন করিতে দিবে । বিরুদ্ধ ভোজন, দিবানিদ্ৰা শ্লেষবর্ধক দ্রব্য ভোজন ও তরল দ্রব্য পান এবং ভূমিতে শয়ন পরিত্যাজ্য ।

ওষ্ঠরোগ-চিকিৎসা ।

বাতিক ওষ্ঠরোগের লক্ষণ । বাতিক ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠ কৰ্কশ, রুদ্ধ, শুষ্ক ও স্থচীবিদ্ধবৎ বেদনায়ুক্ত হয় এবং ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ বিদীর্ণ হইয়া থাকে ।

পৈতিক ওষ্ঠরোগের লক্ষণ । পৈতিক ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠ পাকে, ওষ্ঠে জ্বালা হয় এবং পীতবর্ণ পিড়কা উৎপন্ন ও পৈতিক বেদনা হইয়া থাকে ।

শ্লেষ্মিক ওষ্ঠরোগের লক্ষণ । শ্লেষ্মিক ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠের উপরে শরীরের বর্ণবিশিষ্ট ও কণ্ডুযুক্ত অথচ বেদনাবিহীন পিড়কা উৎপন্ন হয় এবং পীড়িত ওষ্ঠ পিচ্ছিল, শীতল ও শুষ্ক বোধ হয় ।

সান্নিপাতিক ওষ্ঠরোগের লক্ষণ । ত্রিদোষের প্রকোপে ওষ্ঠের উপর কখনও কৃষ্ণবর্ণ, কখনও পীতবর্ণ এবং কখনও বা শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট বহু পিড়কা উৎপন্ন হয় ।

রক্তজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ । রক্তজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠরক্তবর্ণ দৃষ্ট হয়, ওষ্ঠের উপরে খেজুরের বর্ণবিশিষ্ট পিড়কা উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে রক্ত-স্রাব হইয়া থাকে ।

মাংসজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ । মাংসজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় মাংসপিণ্ডের আয় গুরু, স্থূল ও উন্নত হয় এবং তাহাতে ক্রিমি জন্মে ।

মেদোজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ । মেদোজনিত ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয়ে ঘূতের আয় আভাবিশিষ্ট অথচ গুরু কণ্ডু উৎপন্ন হয় এবং ঐ কণ্ডু হইতে ক্ষটিকের আয় স্বচ্ছ স্রাব বহুপরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে ।

অভিঘাতজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ । কোনপ্রকার আঘাত লাগিয়া ওষ্ঠ বিদীর্ণ হইলে, ওষ্ঠরক্তবর্ণ এবং কণ্ডুযুক্ত হয়, এই রোগকে অভিঘাতজ ওষ্ঠরোগ কহে ।

ওষ্ঠরোগের অসাধ্য লক্ষণ । মাংসজ, রক্তজ ও সন্নিপাতজ ওষ্ঠ-রোগ অসাধ্য ।

ওষ্ঠরোগ-চিকিৎসা-বিধি ।

মুখ-গহ্বরে যে রোগ জন্মে, তাহাকে মুখরোগ বলা যায় । ওষ্ঠদ্বয়, দন্ত, দন্ত মূল, জিহ্বা, তালু ও কণ্ঠদেশ এই সপ্ত অঙ্গ মুখ গহ্বরের অন্তর্গত, সুতরাং উহার যে কোন অঙ্গে রোগ উৎপন্ন হইলে, তাহাই মুখরোগনামে অভিহিত হইয়া থাকে ।

মুখরোগ সর্বসমেত ৬৭ সাতঘটি প্রকার । ওষ্ঠে ৮ আট প্রকার, দন্তে আট প্রকার, দন্ত-মূলে ১৬ ষোল প্রকার, জিহ্বাতে পাঁচ প্রকার, তালুতে ৯ নয়প্রকার, কণ্ঠে আঠার প্রকার এবং মুখের সপ্তাঙ্গ অর্থাৎ ওষ্ঠাদি কণ্ঠপর্য্যন্ত সর্বমুখ ব্যাপিয়া ৩ তিন প্রকার । ঐ সপ্তাঙ্গের মধ্যে ওষ্ঠদ্বয়ে রোগ জন্মিলে, তাহাকে ওষ্ঠরোগ, দন্তে হইলে দন্তরোগ, দন্ত মূলে হইলে দন্ত-বেষ্টরোগ, জিহ্বাতে হইলে জিহ্বারোগ, তালুতে হইলে তালুরোগ, কণ্ঠে বা গলদেশে হইলে কণ্ঠ বা গল-রোগ এবং ওষ্ঠাদি কণ্ঠপর্য্যন্ত সপ্তাঙ্গ এক সময়ে রোগাক্রান্ত হইলে, তাহাকে সর্বস্বরোগ বলা যায় ।

সজলভূমিজাত প্রাণীরা মাংস, হৃৎ, দধি এবং মাষকলায় ও অন্ত প্রভৃতি

শ্লেষ-বর্জক দ্রব্য ভক্ষণ করিলে, শ্লেষা প্রকৃপিত ও বর্জিত হইয়া বায়ু ও পিত্তের সহায়তায় মুখ-গহ্বরে উক্ত ৬৭ প্রকার রোগ উৎপাদন করে। এস্থলে কেবলমাত্র আট প্রকার ওষ্ঠরোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা বর্ণিত হইতেছে, দন্তরোগ ও দন্ত-বেষ্টরোগ প্রভৃতির লক্ষণ ও চিকিৎসা ক্রমশঃ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বর্ণিত হইবে।

মুখ-গহ্বরের রোগমাত্রেরি শ্লেষার প্রাধান্য থাকে, সুতরাং মুখরোগ নানা-প্রকার এবং স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত হইলেও, শ্লেষ-নাশক ঔষধ-মাত্রেরি উপকারী। ওষ্ঠরোগ বাতপিণ্ডাদি দোষ-ভেদে আট প্রকার।

বাতিক ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠ রুক্ষ ও কর্কশবোধ হয় এবং ফাটিয়া যায়, পরন্তু স্থচীবিদ্ধবৎ বেদনায়ুক্ত হয়। ষ্ঠেতধুনা চূর্ণ ও মোম সমভাগে লইয়া স্নাতের সহিত মিশ্রিত করিয়া আঙুণে ফুটাইয়া পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলে, বাতিক ওষ্ঠরোগ প্রশমিত হয়।

পৈত্তিক ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠের উপরে পীতবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা উৎপন্ন হয়, এবং সেগুলি পাকে ও তাহাতে বেদনা থাকে। জাতী বা মালতী ফুলের পাতা বাটিয়া ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিয়া পুনঃ পুনঃ লাগাইলে পৈত্তিক ওষ্ঠরোগ প্রশমিত হয়। জাতীফুল বাটিয়া লাগাইলেও রোগ আরোগ্য হয়। জাতী-ফুলকে মালতীফুল বা চামেলীফুল কহে।

শ্লেষ্মিক ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠ পিচ্ছিল ও ভারবোধ হয় এবং ওষ্ঠের উপর কণ্ডু-বেষ্টিত পিড়কা উৎপন্ন হয়; কিন্তু তাহাতে বেদনা থাকে না। এই রোগে ওষ্ঠ, পিপুল ও মরিচ চূর্ণ সমভাগে মিলিত ও মধুসংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিবে। আদাররস উষ্ণ করিয়া কুলি করিলে বিশেষ উপকার হয়।

মেদোজনিত ওষ্ঠরোগে, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধুসহ মিলিত করিয়া প্রলেপ দিবে।

ওষ্ঠে ক্ষত হইলে, ষ্ঠেতধুনা, গেরিমাটী, নৈকবলবণ ও মোম ঘৃতসহ ফুটাইয়া পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিবে, ইহাতে ক্ষত শুষ্ক হয়। ঘায়ের উপরে পচলা সঞ্চিত হইলে, ঈষদ্ব্যজলদ্বারা ধৌত করিয়া সোহাগার ষ্ঠে চূর্ণ করিয়া মধুসহ-ঘোমে লাগাইবে। ইহাতে ক্ষত পরিকার হয়। গাধার দুধ কিম্বা ভেড়ার দুধ লাগাইলে বা অতিশীঘ্র শুষ্ক হইয়া থাকে।

ত্রিদোষজ ওষ্ঠরোগে যে দোষের প্রবলতা দৃষ্ট হইবে, সেই দোষনাশক চিকিৎসা করিবে ।

পিত্তজ, রক্তজ ও অভিষাতজ ওষ্ঠরোগে রক্তচন্দন ঘসিয়া য়তসহযোগে পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে । রক্তজ বা অভিষাতজ ওষ্ঠরোগে রক্তশ্রাব হইলে কচি দুর্জাঘাসবাটা, রক্তচন্দন ঘসা ও বষ্টিমধু বাটা একত্র করিয়া য়তসহযোগে পুনঃ পুনঃ লেপ দিবে ।

দন্তরোগ-চিকিৎসা ।

দালনের লক্ষণ । বায়ুর প্রকোপবশতঃ দন্তে বিদীর্ণবৎ বেদনা হইলে, তাহাকে দালন কহে ।

ক্রিমিদন্তের লক্ষণ । বায়ু প্রকোপবশতঃ দন্তে কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্র, দন্তমূলে শোথ ও তাহা হইতে শ্রাব হইলে এবং আঘাতাদি কারণ ব্যতীত তাহাতে অত্যন্ত বেদনা হইলে, পরন্তু ঐ দন্ত চালিত হইলে (নড়িলে), তাহাকে ক্রিমিদন্ত কহে ।

ভঞ্জনকের লক্ষণ । কফ ও বায়ুর প্রকোপবশতঃ দন্তভগ্ন ও মুখবক্র হইলে, তাহাকে ভঞ্জনক কহে ।

দন্ত-হর্ব । বায়ু ও পিত্তের প্রকোপবশতঃ দন্তে শীতল (বরফ, শিল বা ঠাণ্ডা জল), কৃষ্ণ, অম্লস্রব্য ও বায়ু লাগিলে রোগী চমকাইয়া উঠে ; তাহাকে দন্ত-হর্ব কহে ।

দন্ত-শর্করা । দন্তে ময়লা সংলগ্ন এবং কফ ও বায়ুদ্বারা সেই দস্তাশ্রিত মল শুষ্ক হইয়া শর্করার আয় ধরস্পর্শ হইলে, তাহাকে দন্ত-শর্করা কহে ।

কপালিকা । দন্তে ময়লা সংলগ্ন ও তাহা হইতে শর্করা উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ কঠিন ও মৃত্তিকা নির্মিত খাপরার আয় আকার হইলে, তাহাকে কপালিকা কহে ।

শ্রাবদন্ত । রক্ত ও পিত্তের প্রকোপবশতঃ দন্ত অগ্নিদগ্ধবৎ এবং শ্রাম বা নীলবর্ণ দৃষ্ট হইলে, তাহাকে শ্রাব দন্ত কহে ।

করাল-দন্ত । দস্তাশ্রিত বায়ুধারা, দন্ত-সমূহ ক্রমশঃ বিকটাকার দৃষ্ট হইলে, তাহাকে করাল-দন্ত কহে ।

ফিরঙ্গদন্ত । আগ্নেয় ফিরঙ্গরোগগ্রস্ত ব্যক্তির দন্ত স্বাভাবিক দন্ত-অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও সরু, দন্তের অগ্রভাগ গর্তবিশিষ্ট বা খাচকাটা, দন্তগুলি মাটির সহিত ঘন ঘন সন্নিবিষ্ট নহে,—ফাঁক ফাঁক করিয়া প্রথিত ।

অাধ্য লক্ষণ । গ্রাবদন্ত, দালন ও ভঙ্গনরোগ অসাধ্য ।

দন্তরোগ-চিকিৎসা-বিধি ।

কারণ । দন্তরোগ, মুখ-গহ্বরের রোগ, স্ততরাং মুখরোগ-মধ্যে পরি-গণিত । দন্তরোগ আট প্রকার । দালন, ক্রিমিদন্ত, ভঙ্গনক, দন্তহর্ষ, দন্ত-শর্করা, কপালিকা, গ্রাবদন্ত ও করালদন্ত । দধি, দুগ্ধ, মাষকলায় ও অন্নাদি গ্লেম্ম-বর্জক দ্রব্য সেবনে গ্লেম্মা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পিত্ত ও বায়ুকে দূষিত করিয়া দন্তরোগ উৎপাদন করে । এতদ্ব্যতীত জলাভূমিতে বাস, গ্লেম্মপ্রধান শরীর অধিক শৈত্যক্রিয়া বা দন্তে বরফ প্রভৃতি অধিক শৈত্য-দ্রব্যের সংযোগ, কঠিন-দ্রব্য চর্বণ ও পারদ ভক্ষণ প্রভৃতি কারণেও দন্তরোগ জন্মে । যেস্থলে শরীর হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ ও নীরোগ অথচ অকালে দন্ত শিথিল বা পতিত হয়, সেস্থলে গ্লেম্ম-প্রধান শরীর দন্ত শিথিল ও পতিত হওয়ার কারণ দুৰ্ব্বিতে হইবে । পারদ যেরূপ যকৃতের উপর সমধিক ক্রিয়া করে, দাঁতের মাটির উপরেও তদ্রূপ সমধিক ক্রিয়া করে, এইজন্য পারদ সেবন করিলে, দাঁতের গোড়া শিথিল ও ক্ষীণ হয় । ফিরঙ্গরোগে আক্রান্ত হইলে, গ্লেম্মা দূষিত হয়, এবং সূচিকিৎসার অভাবে ক্রমশঃ তাহা সঞ্চিত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে । ঐরোগে পীড়িত ব্যক্তিকে পারদ সেবন করাইলে, লাল্য নির্গত হয়, উক্ত লালার মধ্যে ফিরঙ্গ-বিষ অবস্থান করে ; স্ততরাং লাল্য যত বেশী নিঃসৃত হয়, তত অধিক উপকার হয় । যে কারণে হউক লাল্য সম্যক্রূপে নিঃসৃত না হইলে শরীর ভার ও আত্মব্রতাদিতবৎবোধ কিম্বা আমবাত প্রভৃতি গ্লেম্মাধিকরোগসকল উপস্থিত হয়, যকৃত ক্রিয়া বিহীন হয়, পরিপাক শক্তি কমিয়া যায়, ঠাণ্ডা বা শৈত্য মোটেই সহ্য হয় না । এইরূপ অবস্থাপন্ন রোগীর শরীর স্বতঃই গ্লেম্ম-প্রধান, এই অবস্থায় দন্ত শিথিল ও দন্তমূল ক্ষীণ হয় । এতদ্ব্যতীত যকৃতের দোষ বা পাক-

স্থলীর পরিপাক করিবার শক্তি হ্রাস হইলে কিম্বা উদরাময় বা অন্তরোগগ্রস্ত ব্যক্তির দস্ত শিথিল হয়। গর্ভাবস্থায় দালন (দস্তশূল) ও ক্রিমিদস্তের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঐদস্তশূল আবার প্রায়ঃ ৪ : ৫ মাসের পর স্বয়ংই প্রণ-মিত হইয়া থাকে।

দস্তোগদম-কাল। জন্মের পর প্রথম দস্তোগদমকে দাঁত উঠা বা ছুধে দাঁত কহে। প্রথম দস্তোগদমের সময় ছয় মাস হইতে আড়াই বৎসর পর্য্যন্ত, যেহেতু দেশ, জলবায়ু, বংশানুক্রমিক দেহ এবং অত্যাচ্ছন্নানাবিধকারণে দস্তোগদম-সময়ের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। অতি কোমল অস্থিবিশিষ্ট শিশুর বিলম্বে দস্ত উদগত হয়। এই ছুধে দাঁত আগার সাতবৎসর বয়সে পতিত হইতে আরম্ভ করে।

প্রথম দস্তোগদমকালে শিশুদিগের নানা উপদর্গ উপস্থিত হয়, তাহাদের লক্ষণ ও চিকিৎসা বালরোগে বর্ণিত হইবে।

চিকিৎসা। দস্তশূলে ক্ষত বা ক্ষতি না থাকিলেও দস্তে বিদার্নবৎ বেদনা হয়, ইহাকে দালন বা দস্তশূল বলা যায়। এইরোগে কর্পরচূর্ণ জলে মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা কুলি করিলে মহোপকার হয়। ত্রিফলার উষ্ণ কাপ বা দস্তশূলের কাথদ্বারা কুলি করিলেও উপকার হয়।

ক্রিমিদস্তরোগে-হিং আণ্ডণে গরম করিয়া দাঁতের ছিদ্রমধ্যে টিপিয়া টিপিয়া লাগাইয়া রাখিবে। কপূর, ছাতিম গাছের আঠা বা বটের আঠা লাগাইলে ক্রিমি পতিত ও বেদনার লাঘব হয়। মধু ও তৈল সমভাগে মিশ্রিত ও গরম করিয়া তদ্বারা কুলি করিলেও যন্ত্রণার লাঘব হয়। এই রোগে কখনও কখনও দাঁতে এমন বেদনা উপস্থিত হয় যে, রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হয়। এই অবস্থায় অনেক স্থলে দস্ত উৎপাটন করিলে সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণার লাঘব হইয়া থাকে।

ভগ্ননরোগে রোগীর দস্ত ভগ্ন ও মুখ বক্র হইলে, আদার রসের এবং পূর্কোক্ত শিরোরোগের মহাদস্তশূল তৈলের কুলি অতি উপকারী। এতদ্ব্যতীত আদা ও শজিনার ছাল কলার পাতায় রাখিয়া আণ্ডণে গরম করিয়া পুনঃ পুনঃ মুখের বক্রস্থানের উপরে স্বেদ দিবে। মাষকলায় সিদ্ধ করিয়া স্বেদ দিলেও পরম উপকার হয়।

দন্ত-হর্বরোগে আদাররস এবং তৈল সমভাগে মিশ্রিত ও গরম করিয়া তদ্বারা কুলি করিলে, যন্ত্রণার লাভ হয়। দন্তশর্করারোগে দন্তমূলে আঘাত না লাগে একপভাবে আন্তে আন্তে শর্করা তুলিয়া লাক্ষা বা গালার চূর্ণে মধু মিশাইয়া তদ্বারা দন্ত আন্তে আন্তে ঘর্ষণ করিবে। ইহাতে পুনর্ব্বার শর্করা জন্মিবার আশঙ্কা থাকে না। কপালিকারোগে দন্তশর্করার ঞায় শর্করা তুলিয়া মধু-সংযুক্ত লাক্ষাচূর্ণ ঘর্ষণ করিবে ও প্রত্যহ প্রাতে আদাররস মিশ্রিত তৈল গরম করিয়া কুলি করিতে দিবে। শ্যাবদন্তরোগে শুষ্ক আমলকীর কাথদ্বারা এবং করালদন্তরোগে ত্রিফলার কাথদ্বারা প্রত্যহ কুলি করিতে দিবে। দন্ত নড়িলে বকুলবৃক্ষের ছাল বা অপক ফল ছেচিয়া মুখে রাখিলে চলদন্ত অর্থাৎ নড়াদাঁত শক্ত হয়। বকুলাত্তৈল এই রোগে অতি প্রশস্ত। সর্ব্বপ্রকার দন্তরোগে স্থায়ী ফললাভের জন্য দন্তরোগাশনিচূর্ণ বা দশন-সংস্কারচূর্ণ প্রয়োগ করা উচিত।

পারদ সেবনে দন্তশিথিল হইলে, ফিরঙ্গরোগোক্ত আট-কষায়ের জলদ্বারা কুলির ব্যবস্থা করিবে।

দন্তরোগে-ঔষধ।

দন্তরোগাশনি চূর্ণ। ক্রিমিদন্ত ও দন্তশূলরোগে এই চূর্ণ প্রত্যহ প্রাতে মুখে ধারণ করিতে দিবে। অত্যান্ত দন্তরোগে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। ইহা দন্তরোগে স্থায়ী ফললাভের উৎকৃষ্ট ও ব্যবহার্য্য ঔষধ।

দন্তরোগাশনি চূর্ণ। জাতী বা মালতীপত্র, পুনর্নবা, তিল, পিপুল, কটিপত্র, মুখা, বচ, শুঠ, যমানী ও হরীতকী প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। সূত মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিবে।

দশনসংস্কারচূর্ণ। এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দাঁত নড়া, ক্রিমিদন্ত ও দন্তশূল বিনষ্ট হয়, পরন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যহ ব্যবহার করিলে দন্তরোগা-ক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

দশনসংস্কার চূর্ণ। শুঠ, হরীতকী, মুখা, খয়ের, কর্পূর, চিপিশুপারি-ভস্ম, মরিচ, লবঙ্গ ও দারুচিনি ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ ও সর্ব্বচূর্ণের সমান খড়ীচূর্ণ একত্র করিবে।

বকুলাদ্য তৈল। এই তৈল চলদন্ত দৃঢ় করিতে অত্যন্ত শক্তিশালী। তৈল মুখে ধারণ করিয়া কুলি করিতে হয়।

বকুলাদাতৈল । তিল তৈল ১৪ সের । যথারীতি মুছাইপাক করিবে । কঙ্করব্য—বকুলের কাঁচাফল, লোধ, হাড়োড়া, নীলমিষ্টি, সোন্দালগাতা, বাবুইতুলসী, শালবৃক্ষের ছাল, শুয়ে বাবলার ছাল ও পীতশাল সমভাগে মিলিত একসের । খাণ্ডজব্য—বকুলকলাদি নয়টিজব্য ঈষৎভাগে মিলিত সাড়ে বার সের, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের । যথারীতি তৈল পাক করিয়া ঈকিয়া লইবে ।

দন্ত-বেষ্টিরোগ-চিকিৎসা

শীতাদ রোগের লক্ষণ । যে রোগে আঘাতাদি কারণ ব্যতীত দাঁতের মাটী হইতে অকস্মাৎ রক্তস্রাব হয় এবং দাঁতের গোড়ার মাংস কৃষ্ণবর্ণ, ক্রেদযুক্ত ও কোমল হইয়া থসিয়া পড়িতে থাকে, তাহাকে শীতাদ কহে । কফ ও রক্ত দূষিত হইলে, এই রোগ উৎপন্ন হয় ।

দন্তপুঙ্গু টরোগের লক্ষণ । একসময়ে দুইটি দাঁতের গোড়ায় বৃহৎ শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে দন্তপুঙ্গু ট কহে । কফ ও রক্ত দূষিত হইলে এই রোগ উৎপন্ন হয় ।

দন্ত-বেষ্টি রোগের লক্ষণ । আঘাত ব্যতীত অকস্মাৎ দন্ত চালিত হইলে (নড়িলে) এবং দাঁতের গোড়া হইতে রক্ত ও পুষ্য স্রাব হইলে, তাহাকে দন্তবেষ্টি কহে । রক্ত দূষিত হইলে, এই রোগ জন্মে ।

শৈশিররোগের লক্ষণ । দন্তমূলে বেদনামুক্ত শোথ উৎপন্ন এবং তাহা হইতে লালী নিঃসৃত হইলে, তাহাকে শৈশির কহে ।

মহাশৈশিররোগের লক্ষণ । যে রোগে রোগীর দন্তসমূহ চালিত এবং তালু ও দন্তমূলে বিদীর্ণবৎ বেদনা হয়, পরন্তু দাঁতের মাটী ও মুখ পচে, তাহাকে মহাশৈশির কহে । এই রোগ বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষের প্রকোপে উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

পরিদররোগের লক্ষণ । যে রোগে রোগীর দাঁতের মাটী গলিত ও তাহা হইতে রক্তস্রাব হয়, তাহাকে পরিদর কহে । কফ, পিত্ত ও রক্ত দূষিত হইলে এই রোগ জন্মে ।

উপকুশরোগের লক্ষণ । যে রোগে দন্তমূল পাকে, দাঁত নড়ে, দন্ত-মূলে দাহ জন্মে এবং অঙ্গুলি বা দাঁতনকাটি দ্বারা দন্তমূল ঘর্ষণ করিলে রক্তস্রাব হয় বা রক্তস্রাব না হইলে, দন্তমূলে অল্পবেদনাবিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন ও মুখে দুর্গন্ধ হয়, তাহাকে উপকুশ কহে । পিত্ত ও রক্ত দূষিত হইলে এই রোগ উৎপন্ন হয় ।

বৈদর্ভরোগের লক্ষণ । যে রোগে দাঁতনাদি কারণবশতঃ ঘর্ষণ লাগিয়া দন্তমূলে শোথ জন্মে এবং দন্তসমূহ চালিত হয়, তাহাকে বৈদর্ভ কহে । দন্তমূলে আঘাত লাগিয়া এই রোগ জন্মে, এ কারণ ইহাকে অভিঘাতজ্বলা যায় ।

খলিবর্দ্ধনরোগের লক্ষণ । যে রোগে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ অত্যধিক বেদনার সহিত অতিরিক্ত দন্ত উৎপন্ন হয় এবং দন্ত সম্যক্ উত্থিত হইলে বেদনা প্রশমিত হয়, তাহাকে খলিবর্দ্ধন কহে ।

অধিমাংসরোগের লক্ষণ । কফের প্রকোপবশতঃ হস্তর পশ্চাৎভাগস্থ দন্তমূলে অত্যন্ত শোথ ও বেদনা হইলে এবং দন্তমূল হইতে লাল নিগত হইলে, তাহাকে অধিমাংস কহে ।

দন্তনালী । নাড়ীত্রয়ে যে প্রকার বাতিক, টৈপ্তিক, শৈথিলিক, সান্নিপাতিক এবং আগন্তুক এই পাঁচ প্রকার নাড়ীত্রণ (নালী বা) বর্ণিত হইয়াছে, দন্তমূলেও তদ্রূপ লক্ষণবিশিষ্ট পাঁচ প্রকার নালী হয় ।

দন্তবিদ্রুধি । দন্ত মাংসগতদোষ ও দূষিত রক্তদ্বারা দন্তমূলের বহির্ভাগে দাহ ও বেদনাবিশিষ্ট বৃহৎ শোথ উৎপন্ন হইলে এবং তাহা বিদীর্ণ হইয়া রক্ত ও পুথ নিগত হইলে, তাহাকে দন্ত-বিদ্রুধি কহে ।

অসাধ্য লক্ষণ । সান্নিপাতিক নালী ও শৈথিলিরোগ অসাধ্য ।

দন্তবেষ্টরোগ-চিকিৎসা-বিধি ।

দন্তমূলে বা দাঁতের মাড়ীতে যে রোগ জন্মে, তাহাকে দন্ত-বেষ্ট রোগ কহে। দন্ত-বেষ্টরোগও মুখগহ্বরে উৎপন্ন হয়, একারণ মুখরোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে । দন্তবেষ্টরোগ ১৬ প্রকার। শীতাদ, দন্তপুঞ্জুট, দন্ত-

বেষ্ট, শৈবির, মহাশৈবির, পরিদর, উপকুণ্ণ, বৈদর্ভ, খলিবর্জন, অধিমাংস, পাঁচপ্রকার দস্তনালী ও দস্তবিভ্রাধি। দস্তরোগও যে যে কারণে উৎপন্ন হয়, দস্তবেষ্টরোগও সেই সেই কারণে জন্মে। দধি দুগ্ধাদি নানাপ্রকার স্নেহবর্জক-দ্রব্য সেবনে কফ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বায়ু ও পিত্তকে দূষিত করিয়া দস্তবেষ্ট-রোগ উৎপাদন করে। পারদ ভক্ষণ করিলে দাঁতের গোড়া বা মাটী ক্ষীত ও সময় সময় তাহা হইতে রক্ত নির্গত হয়, সূচিকিৎসার অভাবে ফিরঙ্গরোগেও অল্পরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। মালতী বা চামেলী পাতা বাটিয়া লাগাইলে মাটীর ঘা অতি সত্তর নষ্ট হয়। পারদভক্ষণে মুখরোগ উপস্থিত হইলে, ফিরঙ্গরোগোক্ত আটকষায়ের জলদ্বারা কুলি করিতে দিবে এবং পারদের দোষনাশের জন্ত লৌহ ও স্বর্ণঘটিত ঔষধ সেবন করাইবে। প্রথম দস্তোদগমকালে শিশুদিগের মাটী ক্ষীত হয় ও তজ্জন্ত নানাবিধ উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে, পরন্তু দস্তোদগম না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সকল উপসর্গ প্রশমিত হয় না। একারণ অনেক বিজ্ঞচিকিৎসক বলেন, মাটী ক্ষয় চিরিয়া দিলে, সহজে দস্তোদগম হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল উপদ্রব হ্রাস পায়, কিন্তু আবার কোন কোন বিজ্ঞ চিকিৎসকও মাটীকর্তনের বিরোধী, অথচ মাটীকর্তন দ্বারা যে অসাধারণ উপকার হয়, তাহা সর্বদা প্রত্যক্ষ করা যায়। যদি দস্তোদগম-কালে মাটী সটান ও উচ্চ দৃষ্ট হয় এবং তন্নিম্নে দস্ত রহিয়াছে, অথচ মাটীর কাঠিন্যতা বশতঃ মাটী ভেদ করিয়া দস্ত উথিত হইতে পারিতেছে না, এরূপ অসুভব করা যায়, পরন্তু শিশুর প্রবল জ্বর ও তৎসঙ্গে দ্রুত আক্ষেপ জন্মিবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে মাটীকর্তন দ্বারা ঐ সকল উপসর্গ অবিলম্বে প্রশমিত হয়, স্নুতরাং মাটীকর্তনসম্বন্ধে সকল চিকিৎসক একমতাবলম্বী না হইলেও ঐ অবস্থায় মাটীকর্তন নিতান্ত আবশ্যক, বক্ষ্যমাণ শিশুরোগে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণিত হইবে। কোন কোন রোগের পরিণামে দস্ত-মূলে শোথ ও ক্ষত উৎপন্ন এবং দস্তমূল হইতে রক্তস্রাব হয়। পরন্তু এই অবস্থা হইতে দস্তমূলে নালী হইয়া হৃদদেশের অস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে, রোগীর মৃত্যু অনিবার্য্য। গ্ৰীহা যন্ত্র ও শোথসংযুক্ত জরের পরিণামে এইরূপ অবস্থা হইতে পারে।

স্কার্ভিরোগের লক্ষণ। আয়ুর্বেদে যাহাকে শীতাদ রোগ কহে, তাহার সহিত ইংরাজী স্কার্ভিরোগের অনেক সামঞ্জস্য আছে। স্কার্ভিরোগে

শরীরের বর্ণ-মালিন্য, সার্বাঙ্গিক ও মানসিক-দৌৰ্বল্য, শ্বাসকষ্ট, চর্মের শ্লেষ্মিক-ঝিল্লির নিম্নে রক্ত সঞ্চিত হওয়া, রক্তসঞ্চিত স্থানের নীলিমা, মাটীর ক্ষীততা ও তাহা হইতে রক্তস্রাব এবং সন্ধিস্থানের বিশেষতঃ উরুদেশের-ক্ষীততা ও নৃঢ়তা দৃষ্ট হয় ।" অধিকাংশস্থলে মাটী ক্ষীত ও কোমল হয় এবং মাটী হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে । মাটী ঘোর রক্তবর্ণ হয় ও যেন দস্ত হইতে ঠেলিয়া বাহির হয়, এক্রপ দৃষ্ট হয় । কখন কখন মাটী এত ক্ষীত হয় যে, দস্ত-পংক্তি এককালে আবৃত হয়, এমনকি সময় সময় ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্যদিয়া বাহির হইয়াও পড়ে । মুখে ও নিঃশ্বাসে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়, কোন কোন স্থলে দাঁত ঝসিয়া পড়ে । মাটী হইতে রক্তস্রাব ব্যতীত কখন কখন নাসারন্ধ্র ও অন্ত্রাশ্র শ্লেষ্মিক ঝিল্লি হইতে রক্তস্রাব হইতে পারে । ক্লার্কিরোগে রোগীকে লৌহঘটিত ঔষধ এবং নানাবিধ সুপকফল বিশেষতঃ লেবু ও উদ্ভিজ্জ-দ্রব্য আহারের ব্যবস্থা করা উচিত ।

ক্লার্কিরোগ যুবক নাবিকদিগের হয়, ইহাই ডাক্তারী মত, কিন্তু এতদ্রূপে বালকবালিকাদিগেরও হইতে দেখা গিয়াছে ।

শীতাদ, দস্তপুষ্টি, দস্তবেষ্ট, শৈথিল্য ও পরিদর রোগে রক্তমোক্ষণ করিলে প্রভূত উপকার দর্শে । দস্তমূলে শোধ ও ক্ষত থাকিলে এবং তাহা হইতে রক্তপুষ্টি নিঃসৃত হইলে হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পলতা ও নিমছালের প্রস্তুত কাথ দ্বারা কুলি করিতে দিবে । দস্তবিজ্রমি ও দস্তনাগী রোগে বট, অশ্বখ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও বেতসের ছালের কাথ করিয়া তদ্বারা কুলি করিতে দিবে । শিশু ও বালকের পক্ষে ঐ অবস্থায় জাতী-বা মালতীফুলের পাতা বাটিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া দস্তমূলে লাগাইবে কিম্বা মালতী-পাতার কাথ করিয়া তদ্বারা মাটী ধোত করিবে । এতদ্বিন্ন কালকচূর্ণ বা স্বল্প ঋদিরবাটিকা মুখে ধারণ করিলে মহোপকার সাধিত হয় ;—মাটীর ফুলা, বেদনা ও মাটী হইতে রক্ত বা পুষ্টি নির্গত হওয়া বন্ধ হয়, পরন্তু দস্তমূলে ক্ষত থাকিলে, তাহাও ক্রমশঃ শুষ্ক হয় । দস্তরোগোক্ত স্বল্পঋদিরবাটিকা মুখে রাখিলেও অল্পরূপ উপকার হয় । দস্তমূল পাকিবার উপক্রম হইলে বা পাকিলে অথবা তাহা হইতে রক্ত পুষ্টি নির্গত হইলে, সপ্তমুদাদি কাথ বা পটোলাদি কাথ এক বেলা পান করিতে দিবে এবং রসেশ্বরী একবেলা

সেবন করিতে দিবে । এই সকল ঔষধ শিশু ও বালকের পক্ষেও মহোপকারী । মুখে ধারণ করিবার ঔষধ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লইতে হয় । রসেন্দ্রবটী ত্রিফলার ক্ষুধা ও মধুর সহিত একবেলা সেবন করিতে দিবে ও অল্পবেলা পটোলাদি কাথ পান করিতে দিবে । হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া মাটীতে শোথ এবং বেদনা হইলে, আদার স গরম করিয়া তদ্বারা কুলি করিতে দিবে । ২৩ বার কুলি করিলেই বেদনা ও ফুলা কমে । সরিষার তৈল উষ্ণ করিয়া তদ্বারা কুলি করিলেও অল্পরূপ উপকার হয় । কাঁচা বকুল ফল চর্ষণ করিলে মাটী শক্ত হয় । সাধারণতঃ মাটীর ফুলা ও বেদনায় লক্ষ্মীবিলাস বা মহা লক্ষ্মী-বিলাস প্রয়োগ করিলেও চলে, কিন্তু শীতাদ প্রভৃতি রোগে রসেন্দ্রবটী প্রয়োগ একান্ত কর্তব্য ।

দস্ত-বেষ্টরোগে-ঔষধ ।

কালকচূর্ণ । দস্তনালী, জিহ্বরোগ, গলরোগ, সর্বপ্রকার মুখরোগেও প্রয়োগ করা যায় ।

কালকচূর্ণ । গৃহধূম (কুল), যবক্ষার, আকনাদি, শুঠ, পিপুল, মরিচ, রসায়ন, চৈ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, লৌহ ও চিতামূল প্রত্যেকের চূর্ণ একত্র করিয়া সধুসহ মুখে ধারণ করিতে দিবে ।

স্বল্প খদির বটিকা । ইহা সর্বপ্রকার মুখরোগের প্রসিদ্ধ ঔষধ । মুখে ধারণ করিলে, দাঁতের মাটী হইতে রক্তস্রাব, দস্তমূলের নালী এবং ওষ্ঠ, জিহ্বা, কণ্ঠ ও তালুরোগ বিনষ্ট হয় ।

স্বল্প খদির বটিকা । খয়ের ১২১০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের । এই কাথজল ছাকিয়া পুনর্বার পাক করিবে এবং পাড় হইলে, অয়িত্রী, কপূর, সুপারী, কাকলা ও জায়ফল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা করিয়া উহাতে প্রক্ষেপ দিয়া বটিকা করিবে

সপ্তচ্ছদাদিকাথ । দস্তমূল হইতে রক্তপূষাদি স্রাব হইলে এবং দস্ত-মূলে শোথ ও বেদনা থাকিলে কিম্বা দস্তবিদ্রুধি ও দস্ত-নালীরোগে এই কাথ প্রত্যহ সকালে পান করিতে দিবে ।

সপ্তচ্ছদাদিকাথ । ছাতিম ছাল, বেণের মূল, পলতা, মুখা, হরীতকী, কটকী, যষ্টিমধু, সোলাল-ছাল ও রক্তচন্দন সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

পটোলাদিকাথ । দন্তমূলে শোথ ও বেদনা থাকিলে কিম্বা দন্তমূল-
হইতে পুয়রক্ত প্রাব হইলে অথবা দন্তবিদ্রুধি ও দন্তনালীরোগে সপ্তচ্ছদাদি-
কাথের পরিবর্তে ইহা পান করিতে দেওয়া যায় ।

পটোলাদিকাথ । পলতা, শুঠ, হরীতকী, আলকী, বহেড়া, রাখালশর্পার মূল, বলা,
ডুমুরের ছাল, কটকী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গুলঞ্চ সমতাগে লিভ ২ তোলা, জল
৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

রসেন্দ্রবটী । শীতাদ, পরিদর, মহাশৈথির, দন্তনালী ও দন্তবিদ্রুধি-
রোগে এই ঔষধ প্রয়োগ একান্ত আবশ্যক । ইহা প্রয়োগে বায়ু, পিত্ত ও কফের
প্রবল প্রকোপ শীঘ্র হ্রাস হয় এবং রক্তপ্রাব, ক্ষত, নালীঘা ও বিদ্রুধি প্রশমিত
হইয়া থাকে । অমুপান—দন্তবিদ্রুধিতে শঙ্খিনার ছালের রস । শীতাদরোগে
ত্রিফলার কাথ ও অত্রাণ অবস্থায় আদার রস ।

রসেন্দ্রবটী । কজ্জলী ২ তোলা এবং শিলাজতু, প্রবাল ও লৌহ প্রত্যেকে ১ তোলা
ও স্বর্ণভঙ্গ । ৮ চারি আনা একত্র করিয়া নিমছাল, আসন বৃক্ষের ছাল ও চিতামূল ইহাদের
প্রত্যেকের রসে স্বধাক্রমে মর্দন করিবে । বটী ২ রতি ।

জিহ্বারোগ-চিকিৎসা ।

বাতিক জিহ্বারোগের লক্ষণ । বাতিক জিহ্বারোগে বায়ুর প্রকোপ-
বশতঃ জিহ্বা অল্প বিদীর্ণ, রসজ্ঞানশূন্য ও কণ্টকাকীর্ণ হয় ।

পৈতিক জিহ্বারোগের লক্ষণ । পৈতিক জিহ্বারোগে পিত্তের
প্রকোপবশতঃ জিহ্বা দাহবিশিষ্ট, দীর্ঘ ও রক্তবর্ণ হয় এবং জিহ্বাতে কণ্টকের
আয় মাংসাত্মক সঞ্চিত হয় ।

শ্লেষ্মিক জিহ্বারোগের লক্ষণ । শ্লেষ্মিকজিহ্বারোগে শ্লেষ্মার
প্রকোপবশতঃ জিহ্বা গুরু ও স্থূল হয় এবং জিহ্বার উপরে শিমূল বৃক্ষের
কাঁটার আয় মাংসাত্মক উদ্গত হয় ।

অলাসরোগের লক্ষণ । শ্লেষ্মা প্রকুপিত ও রক্ত দূষিত হইলে অলাস-
নামক জিহ্বারোগ উৎপন্ন হয় । এই রোগে জিহ্বার তলদেশে অত্যন্ত শোথ

জন্মে এবং জিহ্বা ক্ষতিত হয় ও পাকে । জিহ্বার ক্ষতিত ভাব বায়ুর কার্য্য এবং পাক পিত্তের কার্য্য, পরন্তু শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ এই রোগ জন্মে, সুতরাং অলাস ত্রিদোষজ ব্যাধি, একারণ অসাধ্য ।

উপজিহ্বিকা । উপজিহ্বিকারোগে শ্লেষ্মা ও রক্ত প্রচুট হইয়া জিহ্বা-
মূলে জিহ্বার অগ্রভাগের ত্রায় অথচ শ্রাব, কণ্ঠ ও দাহবিশিষ্ট যে শোথ উৎ-
পাদন করে, তাহাকে উপজিহ্বিকা কহে ।

অসাধ্য লক্ষণ । অলাসরোগ অসাধ্য ।

জিহ্বারোগ-চিকিৎসা-বিধি ।

জিহ্বারোগ মুখ-গহ্বরের রোগ, সুতরাং মুখ-রোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে । জিহ্বারোগ পাঁচ প্রকার, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, অলাস ও উপজিহ্বিকা । দধি, দুগ্ধ, অন্নদ্রব্য ও মাষকলায় প্রভৃতি শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য-
ভক্ষণে শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হইয়া বায়ু ও পিত্তকে দূষিত করিয়া জিহ্বারোগ উৎপাদন করে । এতদ্ব্যতীত জিহ্বা পরিষ্কার না করিলেও কণ্ঠ ও ক্ষত উৎপন্ন হইতে পারে । প্রত্যহ জিবছোলা দিয়া জিহ্বা পরিষ্কার করিবে । বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক ও অলাস নামক জিহ্বারোগে গুলঞ্চ, পিপুল, নিমছাল ও কটকীর কাথ করিয়া সেই জলদ্বারা কুলি করিতে দিবে । দিবসে ৩।৪ বার কুলি করা কর্তব্য । বলাড়ুমুর পাতা বা ডুমুরপাতা দ্বারা আন্তে আন্তে জিহ্বা ঘর্ষণ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে অধিকতর উপকার হয় । শিশু ও বালকগণের এই রোগ হইলে কেবলমাত্র জাতী বা চামেলীফুলের পাতা বা চামেলীফুল বাটিয়া মধুসহ পুনঃ পুনঃ লাগাইবে । শিশু ও বালকগণের পক্ষে কুলি করা সম্ভবপর নহে, তবে কাথজলে মধু মিশ্রিত করিয়া কাপড়ের পলিতা তাহাতে ভিজাইয়া পুনঃ পুনঃ জিহ্বায় লাগাইবে । তিক্ততা বশতঃ শিশু ও বালকগণ ঔষধ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ বা ক্রন্দন করিলে, বেশী মধু মিশাইয়া প্রয়োগ করিবে । শিশু ও বালকগণের পীড়ায় সর্বত্র এই নিয়মে ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য । উক্ত কাথ জলদ্বারা কুলি করিয়া দন্তবেষ্টরোগোক্ত স্বল্পখদিরবটিকা মুখে রাখিতে দিবে । রোগ প্রবল হইলে বা এই ঔষধ প্রয়োগে রোগ প্রশমিত না হইলে, দন্তবেষ্ট-রোগোক্ত রসেন্দ্রবটী প্রয়োগ নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু তদভাবে

মহালক্ষ্মীবিলাসও নিশিন্দাপাতা বা আদার রসসহ প্রয়োগ করা যায়। উপ-
জিহ্বিকারোগে আদার রস গরম করিয়া তদ্বারা কুলি করিতে দিবে এবং
কুলি করার পর যবক্ষার চূর্ণ কাপড়ের পুটলীতে মাখাইয়া তদ্বারা রোগস্থান
ঘর্ষণ করিবে। জিহ্বা ও দন্তবেষ্টনে হঠাৎ ফুলা ও বেদনা প্রকাশ পাইলে উষ্ণ
আদার রসের কুলি ও শুঁঠচূর্ণ রোগস্থানে ঘর্ষণ করিলে মহোপকার সাধন
হয়। জিহ্বাতে ঘা এবং তজ্জন্তু পচলা সঞ্চিত হইলে সোহাগারথৈ মধু ও ঘৃত
সহ মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পুনঃ লাগাইবে, অনন্তর মাগভী বা চামেলীপাতার
রসদ্বারা কুলি করিতে দিবে। চূণে জিহ্বা দৃঢ় হইলে, তৎক্ষণাৎ মাখন বা
তিল তৈল কিম্বা তদভাবে সরিষার তৈল দৃঢ়স্থানে লাগাইবে।

ডাক্তারীমতে নানাপ্রকার গ্যাসিড আছে, তন্মধ্যে কোন কোন গ্যাসিড
কোন অঙ্গে লাগিলে, তৎক্ষণাৎ সেই অঙ্গ দৃঢ় হয়, উহা অসাবধানে রাখিলে
সময় সময় শিশু ও বালকগণ অঙ্গুলিতে সিক্ত করিয়া সেই অঙ্গুলি নাকে,
মুখে এবং জিহ্বায় প্রদান করে ও তজ্জন্তু অঙ্গুলি, নাক, মুখ ও জিহ্বা
প্রভৃতি দৃঢ় হয়, এক্রপ দেখা গিয়াছে, এই অবস্থার মাখন অত্যন্ত উপকারী।
তৎক্ষণাৎ মাখন লাগাইবে; মাখন অভাবে তিলতৈল, সরিষার তৈল বা
নারিকেল তৈল লাগাইবে। জিহ্বার 'সাধারণ' ঘায়ে ভেড়ার দুগ্ধ অতি
উপকারী, ২৪ দিনের বেশী লাগাইতে হয় না। ভেড়ার দুগ্ধ অপেক্ষা
গাধার দুগ্ধ আরও অধিক উপকারী, গাধার দুগ্ধ উপযুক্ত ২৩ বার প্রয়োগ
করিলেই ঘা সারিয়া যায়। জিহ্বায় কণ্ডু উৎপন্ন হইলে বা তাহা পাকিলে
মাগভী বা চামেলী পাতা কিম্বা ফুল বাটিয়া লাগাইবে, অথবা ঐ পাতা সিদ্ধ
করিয়া তদ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিতে দিবে।

তালুরোগ-চিকিৎসা ।

গলশূলীর লক্ষণ। শ্লেষ্মার প্রকোপ ও রক্তদোষবশতঃ তালুরোগে
দীর্ঘাকৃতি অথচ বায়ুপূর্ণ চামড়ার পুটলীর আয় বৃহৎ শোথ উৎপন্ন হইলে,
তাহাকে গলশূলী কহে। এই রোগে পিপাসা, কাস ও শ্বাস প্রকাশ পায়।

ভুক্তিকেরীর লক্ষণ। শ্লেষ্মার প্রকোপ ও রক্তদোষবশতঃ বনকার্পাসের

ফলের ঞায় যে স্থূল শোথ জন্মে, তাহাকে তুণীকেরী কহে । এই রোগে শোথে স্থচিবিক্ৰবৎ বেদনা হয় ও শোথ পাকে ।

অব্রণ্ণ রোগের লক্ষণ । রক্তদোষ বশতঃ তালুস্থলে অত্যন্ত বেদনা-বিশিষ্ট রক্তবর্ণ অথচ স্তূর শোথ জন্মিলে, তাহাকে 'অব্রণ' কহে । এই রোগে রোগীর জ্বর হয় ।

কচ্ছপ রোগের লক্ষণ । শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ তালুস্থলে বেদনা-বিহীন, কচ্ছপের আকৃতিবিশিষ্ট অথচ মধ্যে উচ্চ ও প্রান্তে নত শোথ দীর্ঘ-কালে (আশ্তে আশ্তে) উৎপন্ন হইলে, তাহাকে কচ্ছপ রোগ কহে ।

তালুর্কুদ রোগের লক্ষণ । তালু-স্থলে পদ্মের কেশরের ঞায় এবং পূর্কোক্ত রক্তাৰ্কুদের লক্ষণ বিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে তালুর্কুদ কহে ।

মাংসসজ্জাতের লক্ষণ । শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ তালু-স্থলে বেদনা-বিহীন মাংস সঞ্চিত হইলে, তাহাকে মাংসসজ্জাত কহে ।

তালু পুপ্পুট রোগের লক্ষণ । শ্লেষ্মা এবং মেদ বর্দ্ধিত হইয়া তালু-স্থলে কুলের ঞায় আকৃতিবিশিষ্ট, বেদনাহীন অথচ স্থায়ী যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে তালুপুপ্পুট কহে ।

তালু-শোষের লক্ষণ । বায়ুর প্রকোপ বশতঃ তালু-স্থলে শোষ (শুষ্কতা) ও বিদীর্ণবৎ বেদনা এবং রোগীর শ্বাস উপস্থিত হইলে, তাহাকে তালু-শোষ কহে । *

তালু-পাক । পিত্তের প্রকোপ বশতঃ তালু পাকিলে, তাহাকে তালু-পাক কহে ।

অসাধ্য লক্ষণ । তালুর্কুদরোগ অসাধ্য ।

তালুরোগ-চিকিৎসা-বিধি ।

সর্বপ্রকার তালুরোগে বচ, আতাইষ, আকনাদি, রান্না, কটকী ও নিম-ছালেরদ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া সেই জল দ্বারা কুলি করিতে দিবে । কুলি-করার পর দস্তবেষ্টরোগোক্ত স্বল্পধিরবাটিকা মুখে রাখিতে দিবে এবং দস্তবেষ্ট-

রোগোক্ত পটোলাদি কাথ প্রত্যহ প্রাতে পান করিতে দিবে। ঐ সকল তালুরোগে কাথজলের কুলি ও স্বল্পখদিরবাটিকা প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে দস্তবেষ্ট রোগোক্ত সপ্তজ্বাদি কাথ পান এবং ৩-২ পৃষ্ঠোক্ত চিত্তাম্বিত্তুর্ধ্ব রস সেবন করিতে দিবে। তালুশোষরোগে দশমূলকাথ (৭৫ পৃষ্ঠায় উক্ত) এবং চতুর্ধ্ব (৫২ পৃষ্ঠোক্ত) সেবন করাইবে এবং ত্রিফলার জলদ্বারা রোগীকে কবল করিতে দিবে। রোগ প্রবল হইলে কিম্বা ঔষধ প্রয়োগে রোগের উপশমন হইলে, দস্তবেষ্টরোগোক্ত রসেন্দ্রবটী প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক। পিতা মাতার কিরঙ্গ-বিষ সন্তানে সংক্রামিত হইলে, গলগুঞ্জীর লক্ষণ প্রকাশ পায়; সন্তানের তালু অত্যন্ত কোমল হয়; তালু টিপিলে তুলু তুলু করে, এই অবস্থায় রসেন্দ্রবটী মহোপকারী। অবস্থাভেদে কিরঙ্গরোগোক্ত স্বর্ণলৌহাদি ষটি ঔষধ ব্যবহার্য্য।

গলরোগ-চিকিৎসা ।

বাতিকরোহিণীর লক্ষণ। অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট অথচ কঠনলী রোধকারী মাংসাস্তুর জিহ্বার চতুর্দিকে উৎপন্ন হইলে এবং তজ্জন্ত রোগীর বায়ুজনিত উপসর্গ (স্তব্ধতা প্রকৃতি) উপস্থিত হইলে, তাহাকে বাতিকরোহিণী কহে।

পৈত্তিকরোহিণীর লক্ষণ। পৈত্তিকরোহিণীরোগে জিহ্বামূলে শীঘ্র মাংসাস্তুর উৎপন্ন হয় ও পাকে এবং তাহাতে অত্যন্ত দাহ ও রোগীর তীব্র জ্বর হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মিকরোহিণীর লক্ষণ। শ্লেষ্মিক রোহিণীরোগে জিহ্বামূলে গুরু ও স্থির মাংসাস্তুর উৎপন্ন হয় এবং অল্প পাকে ও তদ্বারা কঠনলী অবরোধ হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিকরোহিণীর লক্ষণ। সান্নিপাতিক রোহিণীরোগে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক এই ত্রিবিধ রোহিণীরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং মাংসাস্তুরের মূলভাগ পাকে। ইহা অসাধ্য।

রক্তজরোহিণীর লক্ষণ । এই রোগে জিহ্বামূল ফোটক দ্বারা আবৃত হয় এবং পৈত্তিকরোহিণীর লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । ইহা সাধ্য ।

রোহিণীরোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ । রক্তজরোহিণী সাধ্য । শৈল্পিক-রোহিণীরোগে তিন দিনের মধ্যে, পৈত্তিক রোহিণীতে পাঁচ দিনের মধ্যে, বাতিক রোহিণীতে সাত দিনের মধ্যে এবং সাম্মিপাতিক রোহিণীরোগে রোগীর জীবন সত্তা বিনষ্ট হয় ।

কণ্ঠশালূকের লক্ষণ । কফের প্রকোপ বশতঃ গল-নলী-মধ্যে কুলের আঠার জায় আকারবিশিষ্ট এবং কাঁচা ও শূয়ার জায় খরস্পর্শ অথচ বেদনা-জনক অচল গ্রন্থি উৎপন্ন হইলে, তাহাকে কণ্ঠশালুক কহে, এই রোগ অন্ন-প্রয়োগ-ব্যতীত আরোগ্য হয় না ।

অধিজিহ্বকরোগের লক্ষণ । কফের প্রকোপ ও রক্তদোষবশতঃ জিহ্বার উপরে জিহ্বার অগ্রভাগের জায় আকারবিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অধিজিহ্ব কহে । ইহা পাকিলে আরোগ্য হয় না ।

বলয়রোগের লক্ষণ । বলয়রোগে কফের প্রকোপ বশতঃ কণ্ঠনলীতে বিস্তৃত ও উচ্চ শোথ উৎপন্ন হয় এবং তদ্বারা অন্নবহানলী অবরুদ্ধ হইয়া থাকে । এই রোগ অসাধ্য ।

বলাসরোগের লক্ষণ । বায়ু ও কফের প্রকোপবশতঃ গল-নলীতে বেদনাবিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন হইলে এবং রোগীর হৃদয়ে ছেদনবৎ বেদনা ও শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইলে, তাহাকে বলাস কহে । এইরোগ অসাধ্য ।

একবৃন্দরোগের লক্ষণ । কফের প্রকোপ ও রক্তদোষবশতঃ গল-নলীর অভ্যন্তরে উন্নত অথচ গোলাকার অথচ দাহ ও কণ্ঠবিশিষ্ট, অপাকী, গুরু এবং কঠিন শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে একবৃন্দ কহে ।

বৃন্দরোগের লক্ষণ । বৃন্দরোগে পিত্তের প্রকোপ ও রক্তদোষবশতঃ উন্নত, গোলাকার এবং অভ্যন্তর দাহবিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন হয় ও তজ্জন্ম রোগীর অন্ন প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

শতদ্বীপরোগের লক্ষণ । বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষের প্রকোপ-

বশতঃ গল-নলী-মধ্যে বাতির ত্রায় আকৃতিবিশিষ্ট, কঠিন অথচ কঠরোধকারী শোথ উৎপন্ন হইলে এবং তাহাতে বাতজ্বাদি নানাবিধ বেদনা থাকিলে ও ঐ শোথ মাংসাত্মক দ্বারা আবৃত হইলে, তাহাকে শতগ্রীরোগ কহে । এই শোথ কণ্টকারিত শতগ্রী নারী শিলার ত্রায় হয় বলিয়া উহা শতগ্রী নামে অভিহিত হয় । এই রোগ প্রাণ-নাশক ।

শিলায়ুরোগের লক্ষণ । এই রোগে কফের প্রকোপ ও রক্তদোষ-বশতঃ গল-নলী-মধ্যে আমলকীর আঠির ত্রায় আকৃতিবিশিষ্ট, অচল ও অল্প-বেদনাবিশিষ্ট গ্রন্থি উৎপন্ন হয় এবং ভক্ষিতদ্রব্য যেন কঠিনলীতে সংলগ্ন রহিয়াছে, এইরূপ বোধ হয় । এই রোগ, অল্প প্রয়োগ ব্যতীত আরোগ্য হয় না ।

গলবিদ্রুধির লক্ষণ । বাতাদি ত্রিদোষের প্রকোপবশতঃ সমস্ত গলদেশ-ব্যাপিয়া শোথ উৎপন্ন হইলে এবং তাহাতে বাতজ্বাদি নানাবিধ বেদনা থাকিলে, তাহাকে গলবিদ্রুধি কহে ।

গলৌঘরোগের লক্ষণ । শ্লেষ্মার প্রকোপ ও রক্তদোষবশতঃ গলদেশে কঠরোধকারী ও শ্বাস প্রবাসের বাধাদায়ক, বৃহৎ শোথ উৎপন্ন হইলে এবং তজ্জন্ত রোগীর জ্বর প্রকাশ পাইলে, তাহাকে গলৌঘ কহে ।

স্বরস্ররোগের লক্ষণ । বায়ুর প্রকোপ বশতঃ রোগীর অঙ্গকারে প্রবিষ্টের ত্রায় বোধ, সর্বদা শ্বাস ত্যাগ, কঠিন ও স্বরভঙ্গ হয় এবং আহাৰ্য্য গিলিবার ক্ষমতা থাকে না, পরন্তু বায়ুবহা শ্রোতঃসমূহ শ্লেষ্মা দ্বারা আবরুদ্ধ হয়, ইহাকে স্বরস্র কহে ।

মাংসতানরোগের লক্ষণ । বাতাদি ত্রিদোষের প্রকোপ বশতঃ গল-দেশে বিদ্রুত লক্ষমান ও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শোথ উৎপন্ন হইয়া কঠরোধ করিলে, তাহাকে মাংসতানরোগ কহে । এইরোগে রোগীর জীবন নষ্ট হয় ।

বিদারীরোগের লক্ষণ । পিত্তের প্রকোপবশতঃ গলায় ও মুখে তাম্র-বর্ণ এবং দাহ ও হৃদিবিদ্ধবৎ বেদনাবিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন হইলে ও তাহা হইতে দুর্গন্ধ পচা মাংস খসিয়া পড়িলে, তাহাকে বিদারী কহে । রোগী সর্বদা যে পার্শ্বে শয়ন করে, সেই পার্শ্বে এইরোগ জন্মে ।

অসাধ্য লক্ষণ । 'স্বরস, বলস, বৃন্দ, বলাস, বিদারী, গলৌষ, মাংস-
তান, শতগ্রী ও সান্নিপাতিক রোহিণী অসাধ্য ।

গলরোগ-চিকিৎসা-বিধি ।

গল-নলী বা কণ্ঠনলীর রোগ মুখ-গহ্বরে উৎপন্ন হয়, একারণ ঐ রোগ
মুখ-রোগ-মধ্যে পরিগণিত । গল-রোগ সর্বসমেত অষ্টাদশ প্রকার ; যথা—
পাঁচপ্রকার রোহিণী, কণ্ঠশালুক, অধিজিহ্ব, বলস, বলাস, একবৃন্দ, বৃন্দ, শতগ্রী,
শিলামু, গলবিদ্রুধি, গলৌষ, স্বরস, মাংসতান ও বিদারী । এই অষ্টাদশপ্রকার
কণ্ঠরোগের মধ্যে রোহিণীনামক পাঁচপ্রকার কণ্ঠরোগ প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত ও
কফ গলদেশস্থ রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া উৎপাদন করে । ওষ্ঠাদি মুখ-
রোগ যে কারণে উৎপন্ন হয়, অষ্টাদশপ্রকার গলরোগও সেই কারণে উৎপন্ন
হয় । তদ্রূপ পাঁচপ্রকার রোহিণী ও ত্রয়োদশ প্রকার অন্যান্য গলরোগের
উৎপত্তির নিদান একই, কিন্তু রোহিণী ও অন্যান্য কণ্ঠরোগের সম্প্রাপ্তি পৃথক ।
সম্ভলভূমিজাত প্রাণীর মাংস, দধি, দুগ্ধ ও মাষকলায় প্রভৃতি শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য-
সেবনে শ্লেষ্মা অতিশয় প্রকুপিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বায়ু ও পিত্তের সহযোগে
ত্রয়োদশ প্রকার কণ্ঠরোগ উৎপাদন করে । ত্রয়োদশ প্রকার কণ্ঠরোগে দোষ-
ত্রয় গলদেশস্থ রক্ত ও মাংসকে আশ্রয় ও দূষিত করিয়া রোগোৎপাদন করে-
না, কিন্তু পাঁচপ্রকার রোহিণীরোগে দোষত্রয় গলদেশস্থ রক্ত ও মাংসকে আশ্রয়
ও দূষিত করিয়া রোগোৎপাদন করে, একারণ পাঁচপ্রকার রোহিণীরোগ
অসাধ্য । রোহিণীরোগে দোষত্রয় রক্ত ও মাংসকে আশ্রয় করিয়া যে মাংসও
উৎপাদন করে শুদ্ধায়া কণ্ঠনালী অবরুদ্ধ হইলে, রোগীর মৃত্যু অনিবার্য ।
এতদ্ব্যতীত ত্রয়োদশপ্রকার কণ্ঠরোগের মধ্যে কয়েকপ্রকার অসাধ্য । অধি-
জিহ্বরোগ পাকিলে অসাধ্য হয়, বলসরোগে অন্নবহা নলী অবরুদ্ধ হয়, এজ্ঞ
উহা অসাধ্য, এইরূপ বলাস, শতগ্রী ও মাংসতান রোগ অসাধ্য । অপর
কয়েকটি রোগ শস্ত্রক্রিয়া-সাধ্য, অর্থাৎ অস্ত্রপ্রয়োগ ব্যতীত আরোগ্য হয় না ।
যেমন—কণ্ঠশালুক, শিলামু ও গলবিদ্রুধি । বিদ্রুধি অনেকপ্রকার, তাহার লক্ষণ
ও চিকিৎসা বিদ্রুধিরোগে উক্ত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত দন্তবিদ্রুধি দন্তরোগে
বর্ণিত হইয়াছে । পূর্বোক্ত সান্নিপাতিক বিদ্রুধির লক্ষণবিশিষ্ট রোগ গলায় উৎ-
পন্ন হইলে, তাহাকে গলবিদ্রুধি কহে । কণ্ঠরোগে গলনলী অবরুদ্ধ হইলে রোগী

আহার্য্য গিলিতে পারে না ও তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস অবরুদ্ধ হয়, স্নাতরাং শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয় ।

রোহিণীরোগ অসাধ্য হইলেও প্রথমাবস্থায় চিকিৎসা করিলে কোন কোনটি আরোগ্যও হয়, স্নাতরাং রোগ উৎপন্ন হইবামাত্রই চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে । সর্বপ্রকার রোহিণীরোগেই রক্তমোক্ষণ ও কবলগ্রহণ উপকারী । রক্তমোক্ষণের পর বাতিক রোহিণীরোগে সৈন্ধবচূর্ণ ঘর্ষণ করিবে ও ঈষৎ উষ্ণ তিলতৈলের দ্বারা কুলি করিতে দিবে । পৈত্তিক রোহিণীতে রক্তমোক্ষণের পর রোগস্থানে রক্তচন্দনচূর্ণ চিনি ও মধু সহযোগে ঘর্ষণ করিবে এবং কিসুমিস্ ও পঙ্কষকলদ্বারা কাথ করিয়া কুলি করিতে দিবে । শ্লেষ্মিক রোহিণীতে রক্তমোক্ষণের পর গৃহ্ম (বুল) এবং শুঠ, পিপূল ও মরিচচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা ঘর্ষণ করিবে এবং শ্বেত অপরাজিতার শোধিত মূল, বিড়ঙ্গ, দস্তীমূল ও সৈন্ধবলবণ দ্বারা কাথ করিয়া সেই কাথজলে কুলি করিতে দিবে । বাতিক, পৈত্তিক, রক্তজ ও সান্নিপাতিক রোহিণীরোগে কটুকাত্ত-কাথ, কটুকাত্তচূর্ণ ও রসেশ্রবটী সেবন করিতে দিবে । রোহিণীরোগে দশমূলকাথ ও মহালক্ষ্মীবিলাস প্রয়োগ করিলেও বেশ উপকার হয় ।

কণ্ঠশালুক রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া বচ, আতাইষ, আকনাতি, রান্না, কটুকী ও নিমছালের কাথ দ্বারা কবল এবং দশমূলকাথ, কটুকাদ্যকাথ, কটুকাদ্য চূর্ণ ও রসেশ্রবটী এই সকল ঔষধ বিবেচনা পূর্বক সেবন করিতে দিবে । অত্যাশ্র গলরোগেরও এইপ্রকার চিকিৎসা করিবে । গল-বিদ্রুপি প্রভৃতি পাকিলে পঙ্ক-ত্রণের জ্বায় ছেদভেদাদি করিবে ও এই সকল ঔষধ ব্যবস্থা করিবে । অবস্থাবিশেষে বসন্তরোগোক্ত অমৃতাদি, খদিরাদি বা নিম্বাদিকাথও প্রয়োগ করা যায় ।

কণ্ঠনলীর সাধারণ প্রদাহ উপস্থিত হইলে উষ্ণ আদার রসে কুলি প্রশস্ত । ক্ষত হইলে বসন্ত রোগোক্ত নিম্বাদিকাথ বা খদিরাষ্টককাথ দ্বারা কুলি ও ঐ কাথ পানের ব্যবস্থা করিবে । জাতী বা মালতীপাতা সিদ্ধ করিয়া সেই জলদ্বারা কুলি করিলেও উপকার হয় । যবক্ষার, চই, আকনাতি, রসাজ্জন, দাক্ষহরিদ্রা ও পিপূল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া জল বা গোমূত্র সহ-যোগে বটিকা করিয়া তাহা মুখে ধারণ করিলেও উপকার দর্শে ।

ফিরঙ্গ রোগে কণ্ঠনলীতে বা টাকরায় বা হইতে পারে । এই অবস্থায় উক্ত কবল ও কাথ প্রভৃতি প্রয়োগ দ্বারা সাময়িক উপকার হইলেও ফিরঙ্গ-বিষ এককালে বিনষ্ট হয় না, সুতরাং ঐ অবস্থায় ফিরঙ্গরোগোক্ত বশলার জল প্রয়োগ একান্ত আবশ্যক ।

গল-রোগে—ঔষধ ।

কটুকাদ্য কাথ । গল-রোগে বা কণ্ঠরোগের যে কোন অবস্থায় এই কাথ পান করিতে দিবে । এক বেলা এই কাথ ও অপর বেলা অমৃতাদি বা খদিরাষ্টক কাথ পান করাইবে ।

কটুকাদ্য কাথ । কটুকী, আতইষ, দেবদারু, আকনাদি, মুখা ও ইল্লযব সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । ছাকিয়া পান করিতে দিবে ।

কটুকাদি চূর্ণ । গলরোগ বা কণ্ঠরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ মধ্যাহ্নে প্রয়োগ করিবে । অল্পপান—নিমছালের রস বা কাথ ।

কটুকাদি চূর্ণ । কটুকী, কিসূমিস, শুঠ, পিপুল, মরিচ, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, হরীতকী, আললকী, বহেড়া, মুখা, আকনাদি, রসায়ন, দুর্লা ও চই প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে ।

রসেন্দ্র বটী । গলরোগের যে কোন অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায় ।

রসেন্দ্র বটী । প্রস্তুতবিধি ১১২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

সর্বসর-রোগ-চিকিৎসা ।

বাতিক সর্বসররোগের লক্ষণ । এই রোগে রোগীর মুখের সত্ত্ব অবয়ব ব্যাপিয়া হৃদিবিদ্ধবৎ বেদনায়ুক্ত স্ফোটক উৎপন্ন হয় ।

পৈত্তিক সর্বসররোগের লক্ষণ । এই রোগে মুখের সত্ত্বাবয়ব ব্যাপিয়া রক্ত বা পীতবর্ণ এবং দাহবিশিষ্ট অল্প স্ফোটক জন্মে ।

শ্লেষ্মিক সর্বসররোগের লক্ষণ । এই রোগে রোগীর মুখের সত্ত্বাবয়ব ব্যাপিয়া শরীরের সমস্ত বর্ণ ও অল্প বেদনাবিশিষ্ট অথচ কণ্ডুযুক্ত স্ফোটক জন্মে ।

সর্বসরোগ-চিকিৎসা-বিধি ।

অত্যাশ্রয় মুখরোগ যে যে কারণে জন্মে, সর্বসরোগও সেই সেই কারণে জন্মে । দধি, দুগ্ধ, অন্নদ্রব্যাদি সেবনে সর্বসরোগ উৎপন্ন হয় ।

ওষ্ঠদ্বয়, দন্ত, দন্তমূল, জিহ্বা, তালু ও গলনলী এই সপ্তাঙ্গের রোগকে মুখ-রোগ বলা যায় । ওষ্ঠাদি সপ্ত অবয়বের লক্ষণ ও চিকিৎসা পৃথক্ পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে । উক্ত ওষ্ঠাদি সপ্তাঙ্গ এক সময়ে রোগাক্রান্ত হইলে, তাহাকে সর্বসরোগ কহে । সর্বসরোগ তিন প্রকার, বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক ।

সর্বসরোগে দান্ত পরিকার রাখা অতীব প্রয়োজন । এই জন্ত নিম্নছালের কাথ সহ তেউড়ীচূর্ণ প্রয়োগ করা কর্তব্য । জিহ্বা ও গলদেশ ব্যাপিয়া স্ফোটক উৎপন্ন হইলে, কচি পলতা ও নিম, জাম, আম এবং মালতীর (চামেলীর) কচি পাতা সিদ্ধ করিয়া সেই জল দ্বারা মুখ ধোত করিতে দিবে । ইহাতে স্ফোটক পাকিবার আশঙ্কা থাকে না, পরন্তু পাকিলেও তাহা সংশোধিত হইয়া শুদ্ধ হয় । মুখাভ্যন্তরে নালী বা ক্ষত হইলে, দারুহরিদ্রার কাথ দ্বারা মুখপ্রক্ষা লন করিবে; এবং দন্তবেষ্টরোগোক্ত সপ্তচ্ছদাদিকাথ পান ও রসেদ্রবী সেবন করিতে দিবে । খদিরাষ্টককাথ প্রয়োগেও অসাধারণ উপকার দর্শে । জাতী বা মালতী পাতা বাটিয়া লাগাইলে বা চর্ষণ করিলে মুখের পাক বা দ্বা নষ্ট হয় ।

মুখরোগে—পথ্যাপথ্য ।

পথ্য । বার্লি, যবের ছাতু, মুগের ও কুরখি কলায়ের দাইল, জঙ্গলজাত-প্রাণীর মাংসের ঘূষ, পাঠার ও মূর্গীর মাংস, সরপুটিমাছ, মাগুরমাছ, করলা, উচ্ছে, বেতাগ্র, কচি নিমপাতা বা হিষ্কার শুক্ল, পটোল, আলু, ধোড়, মোচা, কাচকলা, ঝিঙ্গে, বরবটী, শিম, মূলা এবং অত্যাশ্রয় কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট দ্রব্যের ব্যঞ্জন এবং পুরাতন আমনধানের তণ্ডুলের অন্ন এইরোগে সুপথ্য । ব্যঞ্জন হতে সাঁতলান হইলেই ভাল হয় । মুখরোগে দুগ্ধ সুপথ্য নহে, কিন্তু সময় সময় মুখরোগ অর্থাৎ কণ্ঠনলীর ক্ষত এবং জিহ্বার ক্ষত প্রভৃতি এত প্রবল হয় যে, তজ্জন্ত রোগীর অন্নাহার করিবার বা আহাৰ্য্য চর্ষণ করিবার ও গিলিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত থাকে না, সুতরাং তখন নিরুপায় হইয়া একমাত্র দুগ্ধপানের ব্যবস্থা করিতে হয় । অন্নাহারের শক্তি লুপ্ত হইলে, দুধ বা দুধ-বার্লি ভক্ষণ

করিতে দিবে। অর থাকিলে নবজরের আয় পথ্য দিবে। দাঁত নড়িলে কিস্বা দন্তরোগ বা দন্তবেষ্টরোগে গরমজল পান করিতে দিবে, অত্যাগ মুখ-রোগে ঠাণ্ডা জলে কপূর মিশ্রিত করিয়া তাহা পানের ব্যবস্থা করিবে।

অপথ্য। অন্নদ্রব্য, মাংস ব্যতীত অগ্ন মৎস্য, সজলভূমিজাত প্রাণীর মাংস, দধি, দুগ্ধ, গুড়, মাষকলাই, রুক্ষ, কঠিন এবং শ্লেষ্ম-বর্জক দ্রব্য ভোজন ও দিবানিদ্রা প্রভৃতি কারণে মুখরোগ উৎপন্ন হয়, সুতরাং রোগোৎপাদক এই সকল কারণ পরিবর্জন করা অবশ্যই কর্তব্য, নচেৎ রোগোপশমের আশা করা বৃথা। মুখ-রোগে স্নান এবং দন্ত ও দন্তবেষ্টরোগে দাঁতনকাসী দ্বারা দন্ত-মার্জনা করা এবং মাংসের ঘৃষ ব্যতীত মাংসাহার ও কঠিন দ্রব্য চর্কণ কর্তব্য নহে।

স্ত্রীরোগ-চিকিৎসা।

(স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ।)

কামাদ্রি, ভগ, ভগদ্বার, ভগাঙ্গুর, ভগোষ্ঠ, যোনি, যোনিমুখ, মূত্র-নলী, জরায়ু ও ডিম্বাশয়, এই কয়েকটির সমষ্টিতে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের অবয়ব গঠিত। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের অবস্থান, আকৃতি ও ক্রিয়া প্রভৃতি বুঝাইবার নিমিত্ত উহাকে দুই অংশে বিভক্ত ও দুই নামে অভিহিত করা হয়;—বহির্ভাগ বাহুজননেন্দ্রিয় ও অন্তর্ভাগ অন্তর্জননেন্দ্রিয়।

বাহুজননেন্দ্রিয়। কামাদ্রি, ভগ, ভগাঙ্গুর, বৃহৎ ওষ্ঠদ্বয়, মূত্র-নলী, সতীক্ৰদ ও যোনি ইহারা বাহু-জননেন্দ্রিয় নামে অভিহিত।

অন্তর্জননেন্দ্রিয়। ডিম্বাশয়, জরায়ু এবং জরায়ুর উর্দ্ধাংশে অবস্থিত নালীদ্বয় অন্তর্জননেন্দ্রিয় নামে অভিহিত।

কামাদ্রি। ভগদ্বারের উর্দ্ধাংশ কামাদ্রি নামে অভিহিত। ইহা পঞ্চাৎ দিকে বিস্তৃত, এইস্থানে যৌবনকালে লোম উদ্গত হয়।

যোনি। বাহু স্ত্রী-চিহ্ন বা ভগ ইহাতে জরায়ু পর্য্যন্ত ক্রমপ্রসারণশীল-ছিন্ন যোনি নামে অভিহিত। এই ছিন্নের বহির্দ্বারকে ভগদ্বার বা যোনি-দ্বার কহে।

বৃহৎ ওষ্ঠদ্বয় । ইহা ভগদ্বারের দুই পার্শ্বে অবস্থিত । ভগের দুই ধার দিয়া যে দুইটি চন্দ্রের ভাজ গিয়াছে তাহাই বৃহৎ ওষ্ঠদ্বয় নামে অভিহিত । ইহার উপরে অন্ন লোম উঠে । শূঙ্খকায়া যুবতীদিগের বৃহৎ ওষ্ঠদ্বয় বৃঢ় কিন্তু বৃদ্ধা ও কীর্ণা স্ত্রীদিগের শিথিল ।

ক্ষুদ্র ওষ্ঠদ্বয় । ক্ষুদ্র ওষ্ঠদ্বয় শৈল্পিক কিল্লীর ভাজ দ্বারা নির্মিত ও বৃহৎ ওষ্ঠদ্বয়ের অভ্যন্তর ভাগে অবস্থিত । দুইদিকের ক্ষুদ্র ওষ্ঠদ্বয় বোনিলিঙ্গ অর্থাৎ ভগাক্ষরের সম্মুখে আসিয়া মিলিত হইয়াছে । বাল্যকালে ক্ষুদ্র ওষ্ঠদ্বয় বৃহৎ ওষ্ঠদ্বয় অতিক্রম করিয়া বাহির হইয়া পড়ে ।

ভগাক্ষুর । সম্মুখে বৃহৎ ওষ্ঠদ্বয় যেস্থলে মিলিত হইয়াছে, তাহার সম্মুখ-কটে ভগাক্ষুর বা বোনিলিঙ্গ অবস্থিত । ইহা দেখিতে কিয়দংশে পুংজননেন্দ্রিয়ের ন্যায় ।

মূত্র-নলী । বোনিমুখের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে একটি বৃজ্জুর ন্যায় মূত্রনালী অবস্থিত । মূত্রনালীর নিয়ে বোনিদ্বার বা বোনিমুখ ।

যোনিপটহ বা সতীচ্ছদ । বাল্যকালে বোনিমুখ একটি পাতলা আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে, ইহাকে যোনিপটহ বা সতীচ্ছদ কহে । সচরাচর পুরুষ-সংসর্গ দ্বারা ইহা ছিন্ন হয় এবং প্রসবের পর ধ্বংস হইয়া যায়, কিন্তু কাহারও কাহারও উহা কাটিয়া দিতে হয়, নচেৎ পুরুষ সহবাস করিতে পারে না ।

জরায়ু । ইহাই গর্ভাশয় । ইহা পেয়ারা বা পেপের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট এবং বস্তিদেহে মূত্রাশয় অর্থাৎ ব্লাডার ও সরলান্তের মধ্যস্থলে অবস্থিত । পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীলোকের আর্দ্রবসংযোগে এই বস্তুর মধ্যে জ্রণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয় ।

ভিগ্নাশয় বা অণ্ডাশয় । জরায়ুর দুই পার্শ্বে দুইটি অণ্ডাশয় অবস্থিত, ইহার দেখিতে ভিগ্নের ন্যায় । ঋতুকালে ইহার আকার বর্দ্ধিত হয়, পরন্তু গর্ভাবস্থায় প্রায় দৃশ্যণ বাড়ে ।

যোনি ও ভগ । যোনিপটহ বা 'সতীচ্ছদ' যে স্থানে অবস্থিত,

তাহাই যোনিমুখ, উহার উর্দ্ধাংশ যোনিদ্বার বা ভগদ্বার নামে অভিহিত। যোনিপটহ বা সতীচ্ছদ ছিন্ন হইলে, যোনিমুখ, ও ভগদ্বার বা যোনিদ্বার মিলিত হইয়া যায়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের রোগ।

উদাবর্তার লক্ষণ। যোনি হইতে ফেনাবিশিষ্ট রক্ত অতিশয় কণ্ঠের সহিত নির্গত হইলে, তাহাকে উদাবর্তা কহে। ১।

বক্ষ্যার লক্ষণ। আর্দ্রব নষ্ট হইলে, সন্তান উৎপন্ন হয় না, ইহার নাম বক্ষ্যা। ২।

বিপ্লুতার লক্ষণ। যোনিতে সর্বদা বেদনা থাকিলে, তাহাকে বিপ্লুতা কহে। ৩।

পরিপ্লুতার লক্ষণ। মৈথুন-কালে যোনিতে বেদনা হইলে, তাহাকে পরিপ্লুতা কহে। ৪।

বাতলার লক্ষণ। এই রোগে যোনি কর্কশ, শুষ্ক এবং যোনিতে শূল ও সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা হয়। উক্ত চারি প্রকার যোনিরোগেও যোনিতে বেদনা হয়, কিন্তু এই রোগে বেদনা বেশী হইয়া থাকে। ৫।

লোহিতক্ষয়ার লক্ষণ। এই রোগে যোনি হইতে জ্বালার সহিত রক্ত নির্গত হয়। ৬।

প্রস্রংসিনীর লক্ষণ। এই রোগে যোনি স্বস্থান ভ্রষ্ট হইয়া পতিত ও সঞ্চালিত হয় বলিয়া রোগিণী অতি কষ্টে সন্তান প্রসব করে। ৭।

বামিনীর লক্ষণ। এই রোগে যোনি হইতে বায়ুর সহিত রক্ত মিশ্রিত শুক্র নির্গত হয়। ৮।

পুত্রেন্নীর লক্ষণ। এই রোগে গর্ভসঞ্চার হয়, কিন্তু রক্তস্রাব হইয়া তাহা পাত হয়।

পিত্তলার লক্ষণ। এই যোনিতে অত্যন্ত দাহ হয় ও যোনি পাকে এবং রোগিণীর অত্যন্ত অরু হইয়া থাকে। উক্ত লোহিতক্ষয়াদি চারি প্রকার যোনিরোগও পৈত্তিক লক্ষণ যুক্ত।

অত্যানন্দার লক্ষণ । এই রোগে আক্রান্তা রমণী মৈথুনে সন্তোষ-লাভ করে না ।

কর্ণিনীর লক্ষণ । শ্লেষ্মার প্রকোপ ও রক্তদোষ বশতঃ যোনিতে মাংস-গ্রন্থি জন্মিলে, তাহাকে কর্ণিনী কহে ।

অচরণার লক্ষণ । মৈথুনের সময়ে পুরুষের শুক্র পতনের পূর্বে স্ত্রীর রজো নির্গত হইলে, তাহাকে অচরণা যোনি হহে । এই যোনি বীজ বা শুক্র গ্রহণে অসমর্থ ।

অতিচরণার লক্ষণ । এই রোগে যোনিতে শ্লেষ্মজনিত কণ্ডু উৎপন্ন হয় বলিয়া স্ত্রী অতিশয় মৈথুনপ্রিয়া হইয়া থাকে ।

শ্লেষ্মালার লক্ষণ । এই রোগে যোনি পিচ্ছিল, কণ্ডুযুক্ত ও শীতল হয় । অত্যানন্দা হইতে অতিচরণা পর্য্যন্ত চারি প্রকার যোনিরোগেও শ্লেষ্মার প্রকোপ বর্তমান থাকে ।

যণ্ডীর লক্ষণ । এই রোগে আক্রান্তা স্ত্রীর ঋতু হয় না, স্তন অল্প উদ্গত হয়, এবং মৈথুন-কালে যোনি কর্কশ বোধ হয় ।

অগ্নিনীর লক্ষণ । বালিকার স্বপ্নছিদ্র যোনির মধ্যে অপেক্ষাকৃত সুললিত প্রবিষ্ট করাইলে, এই রোগ জন্মে । এই রোগে যোনি অণ্ডের আয় লক্ষ্যমানা হয় বলিয়া ইহাকে অগ্নিনী কহে ।

বিবৃতার লক্ষণ । বৃহৎ ছিদ্রবিশিষ্ট যোনিকে বিবৃতা কহে ।

সূচিবক্ত্রার লক্ষণ । স্বপ্ন ছিদ্রবিশিষ্ট যোনিকে সূচিবক্ত্রা কহে ।

সান্নিপাতিক যোনিরোগের লক্ষণ । এই যোনিরোগ ত্রিদোষের প্রকোপ হইতে উদ্ভূত ও ত্রিদোষের লক্ষণ বিশিষ্ট হয় ।

যণ্ডী হইতে সূচিবক্ত্রা পর্য্যন্ত চারি প্রকার যোনিরোগেও ত্রিদোষের প্রকোপ-লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

যোনিরোগের অসাধ্য লক্ষণ । যণ্ডী হইতে সান্নিপাতিক পর্য্যন্ত পাঁচ প্রকার যোনিরোগ অসাধ্য ।

যোনিকন্দ ।

বাতিক যোনিকন্দের লক্ষণ । বাশিক যোনিকন্দ কৃষ্ণ, বিবর্ণ এবং কাটা ফটি দৃষ্ট হয় ।

পৈত্তিক যোনিকন্দের লক্ষণ । পৈত্তিক যোনিকন্দ রক্তবর্ণ ও দাহ-বিশিষ্ট হয় ও রোগিণীর জ্বর হইয়া থাকে ।

শ্লেষ্মিক যোনিকন্দের লক্ষণ । শ্লেষ্মিক যোনিকন্দ তিল বা অতসী-পুষ্পের ঝায় দৃষ্ট হয় এবং উহাতে কণ্ডু উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

সান্নিপাতিক যোনিকন্দের লক্ষণ । ত্রিদোষোৎপন্ন যোনিকন্দে ত্রিদোষের লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পায় ।

প্রদর ।

প্রদরের সামান্য লক্ষণ । সর্বপ্রকার প্রদররোগেই শরীরে ব্যথা হয় এবং বেদনার সহিত যোনি-দ্বার হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে ।

বাতিকপ্রদরের লক্ষণ । বাতিকপ্রদরে হৃদিবিক্রমণ বেদনার সহিত কৃষ্ণ, লোহিতবর্ণ এবং মাংসধৌত জলের ঝায় অথচ অল্প ফেণযুক্ত রক্ত-স্রাব হয় ।

পৈত্তিক প্রদরের লক্ষণ । পৈত্তিক প্রদরে পীতবর্ণ, নীলবর্ণ ও কৃষ্ণ-বর্ণবিশিষ্ট উষ্ণ রক্ত, দাহ প্রভৃতি উপসর্গ ও পৈত্তিক বেদনার সহিত পুনঃ পুনঃ স্রাব হয় ।

শ্লেষ্মিক প্রদরের লক্ষণ । শ্লেষ্মিক প্রদরে পিচ্ছিল, দীর্ঘ পাণ্ডুবর্ণ ও ধাতু-ধৌত জলের ঝায় অথচ অপকরসযুক্ত রক্ত স্রাব হয় ।

সান্নিপাতিক প্রদরের লক্ষণ । সান্নিপাতিক প্রদরে মধু, স্নেহ, হরি-তাল অথবা মজ্জার ঝায় বর্ণবিশিষ্ট অর্থাৎ নানাবর্ণের অথচ শবগন্ধি ও স্নেহ-যুক্ত রক্ত স্রাব হয় । এই রোগ অসাধ্য ।

প্রদরের অসাধ্য লক্ষণ । প্রদর রোগাক্রান্তা দ্বীরা সর্বদা রক্তস্রাব হইলে এবং তৎসঙ্গে পিপাসা, দাহ, মুচ্ছা, জ্বর, দুর্বলতা ও রক্ত-হীনতা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, তাহার রোগ অসাধ্য ।

শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিয়া ।

শ্বেতপ্রদর স্বতন্ত্র রোগ নহে, রক্তপ্রদর দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, ক্রীড়ন-শ্রমের যন্ত্র সকলের শৈথিল্যিক ঝিল্লী বা আবরণের কোন অংশ হইতে প্লেয়া, রস বা পুষ্যসংযুক্ত ক্লেদ যোনিদ্বার হইতে বহির্গত হয়, শ্বেত বা শুক্লবর্ণ স্রাব নির্গত হয় বলিয়া ইহাকে শ্বেতপ্রদর কহে । ইহা যোনিরোগমধ্যে পরিগণিত, অর্থাৎ ভগ, যোনি, জরায়ু ও ডিম্বাশয়ের পীড়ার লক্ষণরূপে প্রকাশ পায়, ঐ সকল যন্ত্রের শৈথিল্যিক ঝিল্লী বা আবরণ পর্দায় ক্ষত হইলে, তাহা হইতে এই রোগের উৎপত্তি হয় । নানা কারণে শ্বেতপ্রদর উৎপন্ন হইতে পারে ;—রজঃ দূষিত হইলে যেমন রক্তপ্রদর জন্মে, ইহাও তদ্রূপ রজোদ্রুটি হইতে উৎপন্ন হইতে পারে, আবার রজোদ্রুটির কারণ হইতে এই রোগ প্রকাশ পায়, তদ্ব্যতীত গর্ভপাত, জননেশ্রিয় ধোত বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না করা, ঋতুকালে সঙ্গম, সাধ্যাতীত সঙ্গম, রক্তদোষ, গনোরিয়া, বিরুদ্ধ আহার বিহার বা স্বাস্থ্যভঙ্গ প্রভৃতি নানাকারণে এই রোগ জন্মে । কাহারও বা প্রথমতঃ রক্তপ্রদর হইয়া ঐ সকল যন্ত্রে ক্ষত হয় এবং তাহা হইতে পুষের স্রাব হয়, আবার কাহারও বা স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হেতু ঐরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায় । কিন্তু রোগ নানা কারণে উৎপন্ন হইলেও দুইটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিলেই চিকিৎসা চলিতে পারে ; স্থানিক অর্থাৎ ক্ষতস্থানের চিকিৎসা ও রজোদ্রুটির চিকিৎসা । রজঃ দূষিত হইয়া ক্ষত হইলে, আর্দ্র-শুক্লিকর ঔষধ ও যোনিরন্ধে পিচ্কারী প্রয়োগ করিলেই রোগ প্রশমিত হয় । স্বাস্থ্যভঙ্গহেতু বা পিতামাতার গনোরিয়া সন্তানে সংক্রামিত হইলে, বালিকাদিগেরও কখন কখন এই রোগ জন্মিয়া থাকে । শৈথিল্যিক প্রদরও শ্বেতপ্রদর নামে অভিহিত হয়, কারণ শ্বেতবর্ণ স্রাব শৈথিল্যিকপ্রদরেও হইয়া থাকে ।

বাধক ।

রক্তমাদ্রী বাধকের লক্ষণ । এই রোগাক্রান্ত স্ত্রীর কোমরে, নাভির নিম্নে ও স্তনদ্বয়ে বেদনা হয় এবং একমাস বা দুইমাস অন্তর ঋতু হইয়া থাকে পরন্তু ঐ ঋমণীর গর্ভ-সঞ্চার হয় না ।

যষ্ঠী বাধকের লক্ষণ । এই রোগে আক্রান্তা রমণীর চক্ষু ও হাত পা বিশেষতঃ ষোনিতে জ্বালা উপস্থিত হয় এবং মাসে দুইবার করিয়া ঋতু হয়, পরন্তু ঐ ঋতু লালামিশ্রিত অথচ মলিন দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

অঙ্গুর বাধকের লক্ষণ । এই রোগে আক্রান্তা রমণীর দেহের গুরুতা অর্থাৎ ভারবোধ, অধিক রক্তশ্রাব ও তজ্জন্তু গ্লানি বোধ, নাভির নিম্নে বেদনা এবং হাতে পায়ে জ্বালা ও শরীর ক্লশ হয়, পরন্তু তিন চারি মাস পর্য্যন্ত ঋতু বন্ধ থাকে ।

জলকুমারক বাধকের লক্ষণ । এই রোগাক্রান্তা রমণীর গর্ভ সঞ্চার হয় কিন্তু গর্ভাবস্থায় উদরে বেদনা, দেহ শীর্ণ ও রক্তহীন হয় এবং গর্ভপাত হয়, পরন্তু রোগিণীর ক্লশ শরীর ও স্তনদ্বয় স্থূল, ভারবিশিষ্ট ও বহুকাল পরে ঋতু হয় এবং ঋতুকালে অল্প শ্রাব হইয়া থাকে ।

বাধকের কারণ ও সামান্য লক্ষণ । গর্ভপাত এবং ধাতুক্ৰিয়াদি নানাকারণে বাধক জন্মে, বাধক রোগাক্রান্তা রমণীর গর্ভসঞ্চার হয় না অথবা কচিং হইলেও গর্ভপাত হইয়া থাকে, বাধকের ইহাই প্রধান লক্ষণ ।

স্ত্রীরোগ-চিকিৎসা-বিধি ।

স্ত্রী পুরুষ উভয়জাতির আকারগত অনেক সৌসাদৃশ্য সত্ত্বেও কোন কোন বিষয়ে প্রভেদ বিद्यমান, তজ্জন্তু এমন কতকগুলি রোগ আছে, যাহা কেবল-মাত্র পুরুষেরই হয়, স্ত্রীলোকের হয় না এবং যাহা কেবল স্ত্রীলোকেরই হয়, পুরুষের হয় না । স্ত্রীজননেদ্রিয়ের রোগ স্ত্রীদিগেরই হয়, পুরুষের হয় না ; আবার পুংজননেদ্রিয়ের রোগ পুরুষেরই হয়, স্ত্রীদিগের হয় না । স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই স্তন আছে, কিন্তু পুরুষের স্তনরোগ হয় না । স্ত্রীদিগের প্রত্যেক মাসে ঋতুশ্রাব হয় বলিয়া মেহ হয় না, তৎসহধর্মী শ্বেতপ্রদর হয় কিন্তু বিবাক্তমেহ স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই হইয়া থাকে । স্ত্রী ও পুরুষের এই প্রকার প্রভেদ বশতঃ স্ত্রীরোগ ও তাহার চিকিৎসা স্বতন্ত্র ।

আর্ভব । শুক্র পুরুষের বীজ এবং আর্ভব স্ত্রীলোকের বীজ, এই উভয়-বীজ মিলিত হইলে, সন্তান জন্মে । পুরুষের শুক্রে যেমন জীবাণু দৃশ্যমান

ধাকে, জীলোকের আর্তবেও তদ্রূপ জীবাণু থাকে । ' শুক্র এবং আর্তব দূষিত না হইলে, তন্মধ্যস্থ জীবাণু স্বাভাবিক ও বলিষ্ঠ থাকে, স্ততরাং তদ্বারা বলবান ও সুস্থ সন্তান জন্মে, কিন্তু কোন একটি অসুস্থ, পীড়িত বা নিস্তেজ হইলে, তদ্বারা জাত সন্তানও পীড়িত বা নিস্তেজ হয়, এই জন্তই কুষ্ঠ, ফিরঙ্গ ও বিষাক্ত মেহ প্রভৃতি কতকগুলি রোগ পিতা মাতার বীজদোষ হইতে সন্তানে সংক্রামিত হইয়া থাকে । বীজের জন্ত যেমন ধাত্বাদি শস্ত্রসমূহ উৎকৃষ্ট ও সতেজ হওয়া আবশ্যক, অত্যাধিক ফসল পাওয়া যায় না, গর্ভধানের জন্তও তদ্রূপ সর্বোৎকৃষ্ট বীজের আবশ্যক, বীজ উৎকৃষ্ট ও সতেজ না হইলে, বলিষ্ঠ ও সুস্থ সন্তান জন্মে না, পরন্তু শুক্র ও আর্তব একবারে জীবনীশক্তিহীন হইলে, তদ্বারা গর্ভসঞ্চার পর্য্যন্তও হয় না, এই জন্ত শুক্র ও রজঃ দূষিত হইলে, তাহা সংশোধিত এবং তন্মধ্যস্থ জীবাণুগুলি অসুস্থ বা মৃত হইলে, তাহা সুস্থ বা পুন-জীবিত করা প্রয়োজন । বহু প্রভৃতি বিংশতি প্রকার যোনিরোগ, রক্তপ্রদর, খেতপ্রদর, রজোহ্রস্বতা, কষ্টরজঃ ও রজোহ্রস্বিকরোগ এবং বাধক প্রভৃতি জীজননেত্রিয়ের সমস্ত রোগ এই আর্তবদুষ্টিবশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে । জীজননেত্রিয়ের ঐ সকল রোগ, যে যে কারণে জন্মে, সেই সেই কারণেই আর্তব দূষিত হয় । প্রথমতঃ আর্তব দূষিত হইয়া পশ্চাৎ ঐ সকল রোগ জন্মে, স্ততরাং কেবলমাত্র আর্তবদুষ্টির চিকিৎসা দ্বারা ঐ সমস্ত রোগই আরোগ্য হইতে পারে । পক্ষান্তরে আর্তব দূষিত হইলেই যোনিরোগ, প্রদর অথবা বাধকের লক্ষণ প্রকাশ পায়, স্ততরাং ঐ সকল রোগের চিকিৎসা করিলে আর্তবদুষ্টির চিকিৎসা না করিলেও চলিতে পারে । আহার বিহারাদির অনিয়মে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলেও দোষ প্রকুপিত হইয়া আর্তব দূষিত করে এবং পিতামাতার বীজদোষ অর্থাৎ বিষাক্তমেহ ও ফিরঙ্গাদি নানা প্রকার রক্তদোষ-জনিত রোগ হইতেও আর্তব দূষিত হয় । প্রথমপ্রকারের আর্তবদোষ, আহার-বিহারাদির সুব্যবস্থাদ্বারা অনায়াসে আরোগ্য হইতে পারে, কিন্তু রক্তদোষ প্রভৃতি কারণে সঞ্চারিত আর্তবদুষ্টি সহজে আরোগ্য হয় না । ' আর্তব, পুষ্প, রজঃ ও ঋতু প্রভৃতি শব্দ একার্থবোধক ।

' যেমন বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া অগ্নি রোগ উৎপাদন করে, তদ্রূপ উহার প্রকুপিত হইয়া আবর্জ্যকে দূষিত করে ।

রক্তোদ্ধৃষ্টির লক্ষণ । বায়ুর প্রকোপে আর্তব দূষিত হইলে, তাহা পাকা জামের ঞায় নীলবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং আর্তবকালে যোনি ও কোমরে বেদনা হইয়া থাকে । পিত্তের প্রকোপবশতঃ পুষ্প দূষিত হইলে, তাহা জবাফুল বা কুসুম ফুলের ঞায় রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং আর্তব নির্গমনকালে জননেন্দ্রিয়ে দাহ ও পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । শ্লেষ্মার প্রকোপে আর্তব দূষিত হইলে, গাঢ় অথচ পিচ্ছিল স্রাব অধিক পরিমাণে নির্গত হয় এবং রোগিণীর দেহের জড়তা মূত্ররোধ, আলস্য, তন্দ্রা ও নিদ্রালুতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

শুদ্ধ রজঃ বা আর্তবের লক্ষণ । মাসান্তে একবার ঋতু বা রক্ত-স্রাব হইয়া ক্রমাগত পাঁচ দিন পর্য্যন্ত বর্তমান থাকিলে, রক্তস্রাবে আলা যন্ত্রণা না থাকিলে, রক্ত অত্যধিক বা অত্যল্প স্রাব না হইয়া যথাসম্ভব স্রাব হইলে এবং ঐ রক্ত পিচ্ছিল ও বিবর্ণ না হইয়া অপিচ্ছিল ও শশকের রক্ত বা লাক্ষার বর্ণের ঞায় দৃষ্ট হইলে, তাহাকে বিশুদ্ধাৰ্তব বলা যায় । পঞ্চ রাত্রি পর্য্যন্ত ঋতু-স্রাব হওয়া সাধারণ নিয়ম, কিন্তু কাহারও কাহারও বোলদিন যাবৎ অল্প অল্প স্রাব হয় । যে আর্তব ঐরূপ লক্ষণযুক্ত হয় এবং কাপড়ে লাগিলে, সেই কাপড় জলে ধৌত করিলে, সহজে দাগ উঠে ও জল নির্মল রক্তবর্ণ হয়, তাহাই বিশুদ্ধ আর্তব । আর্তবদৃষ্টির চিকিৎসা করিতে হইলে, বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা ইহাদের মধ্যে কোন্ দোষ প্রকুপিত হইয়া আর্তব দূষিত করিয়াছে, অগ্রে তাহাই নিরূপণ করিবে । আর্তব-পরীক্ষার বিধান শাস্ত্রে থাকিলেও পরীক্ষা করিবার নিয়ম আজ কাল প্রচলিত নাই, সুতরাং অধিকাংশস্থলেই অল্প উপায়ে বাতাদি-দোষ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করিতে হয় । বেদনা বায়ুর প্রকোপে হয় এবং পিত্তের প্রকোপেও হয়, কিন্তু উভয়ের লক্ষণ স্বতন্ত্র । বায়ুর প্রকোপে শূলানি, দণ্ডপানি, কনকনানি, অঙ্গ মোচড়ানি বা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার মত ব্যথা হয় । আর্তবদৃষ্টির প্রথম অবস্থায় ঐরূপ বেদনা যোনি ও কটিতে উপস্থিত হয়, কিন্তু রোগ যতই পুরাতন হইতে থাকে, ততই ক্রমশঃ সর্বদিকে বিস্তৃত হইতে থাকে, পরন্তু অতি পুরাতন হইলে, ঐ অবস্থাতে বাতজনিত নানাপ্রকার ব্যাধি অর্থাৎ বাতব্যাধি উপস্থিত হয় । এই জন্যই প্রদররোগ সাধারণতঃ বাতাদিক ও বাতব্যাধি পরিণামী । ফলতঃ বায়ুজন্য আর্তবদৃষ্টিতে ঐরূপ বেদনা এবং স্রাবের

অন্নতা ও রক্তবর্ণতা বা নীলবর্ণতা, এই সকল লক্ষণ প্রায়শঃ বর্তমান থাকে। আর্তব পিত্তদৃষ্ট হইলে, শোষ ও প্রদাহ এই দুইটি লক্ষণ থাকিবেই; ইহাতে বাতদৃষ্ট আর্তব অপেক্ষা শ্রাব কিঞ্চিৎ বেশী হয়, কিন্তু তাহা জ্বা-
 দুলের দ্বারা রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয়। প্রথম অবস্থায় প্রদাহ প্রায়ই যোনিতে থাকে, কিন্তু ক্রমশঃ সর্বাঙ্গে বিস্তৃত হয়। আবার প্লেয়দৃষ্ট আর্তবে শ্রাব সর্বাপেক্ষা বেশী হয় এবং ঐ শ্রাব গাঢ় ও পিচ্ছিল হয়, পরন্তু রোগি-
 নীর তন্দ্রা, দেহের গুরুতা ও নিদ্রাধিক্য প্রকাশ পায়। এই নিয়মে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই দোষত্রয়ের কোনটির প্রকোপে আর্তব দূষিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিয়া যোনিরোগ, প্রদর ও বাধকের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে।

আর্তবদৃষ্ট রোগে স্বতন্ত্র ঔষধ প্রয়োগ না করিলেও চলে, কারণ আর্তব-
 দূষিত হইলে যোনি ও প্রদরাদি রোগ উৎপন্ন হয়, সুতরাং আর্তব দূষিত হইলে, যোনি ও প্রদর রোগোক্ত ঔষধ অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক আর্তবদৃষ্ট রোগে নষ্টপুষ্ণাস্তক রস এবং বৃহৎ শতাবরী-
 যুত বা ফলকল্যাণযুত প্রয়োগ করিবে। উদরাময় না থাকিলে, ফলকল্যাণ-
 যুত, অশোকযুত বা কুমারকল্লঙ্গমযুত বাত, পিত্ত ও কফ যে কোন দোষ-
 জ্ঞাত আর্তবদৃষ্টিতে প্রয়োগ করা যায়। এতদ্ব্যতীত প্রদর ও যোনিরোগোক্ত
 নানাবিধ যোগ ব্যবস্থা করা বাইতে পারে। প্রদররোগে যে সকল যোগ
 ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা আর্তবদৃষ্টিতে প্রয়োগ করা যায়। রক্তশ্রাব বেশী
 হইলে, তাহা বন্ধ করিবার জ্ঞাত রক্তাভীসার, রক্তপ্রবাহিকা, রক্তার্শ ও অধো-
 গত রক্তপিত্তোক্ত যে কোন ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, ঐ সকল ঔষধ কেবল
 রক্তশ্রাবরোধক নহে, পরন্তু রক্তশোধক।

যোনিরোগ। জীজননেন্দ্রিয়ের রোগ বিংশতিপ্রকার। উদাবর্তা, বক্ষ্যা, বিপ্লুতা, পরিপ্লুতা, বাতলা, লোহিতক্ষয়া, প্রস্রাসিনী, বামিনী, পূত্রয়ী, পিত্তলা, অত্যানন্দা, কর্ণিনী, অচরণা, অতিচরণা, শ্লেষ্মলা, বন্তী, অণ্ডিনী, মহতী, স্থচিবক্তা ও ত্রিদোষিনী।

ইহাদের মধ্যে উদাবর্তা হইতে বাতলা পর্য্যন্ত পাঁচটি বাতজ্ঞা, লোহিতক্ষয়া হইতে পিত্তলা পর্য্যন্ত পাঁচটি পিত্তজ, অত্যানন্দা হইতে শ্লেষ্মলা পর্য্যন্ত পাঁচটি

কফজ এবং ষণ্ঠী-হইতে*ত্রিদোষী পর্য্যন্ত পাঁচটি ত্রিদোষজ । বাতাদিদোষ-ভেদে ইহাদের চিকিৎসা করিবে ।

আহার্য বিহারাদির অনিয়মে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া আর্দ্রবকে*দূষিত করিলে অথবা পিতামাতার বীজদোষ বা রক্তদোষ হইতে আর্দ্রব দূষিত হইলে, যোনিরোগ জন্মে । ফলতঃ যেকারণেই হউক, আর্দ্রব দূষিত হইলে, এই রোগ উৎপন্ন হয়, তবে আহারাদির অনিয়মে রোগ জন্মিলে, তাদৃশ কঠিন হয় না । পরন্তু নিয়মিত আহারবিহারাদির কল্পনা বা সুব্যবস্থা করিলে, অনায়াসে ঐ রোগ সারে । আহারাদির অনিয়মে রোগ জন্মিলে, কোন কোন-স্থলে আর্দ্রবদুষ্টির লক্ষণ সম্যক্ প্রকাশ না পাইতেও পারে ; কিন্তু পিতামাতার বীজদোষ বা রক্তদোষবশতঃ অথবা বিষাক্তমেহ ও ফিরঙ্গাদিরোগ হইতে যে যোনিরোগ জন্মে, তাহা অত্যন্ত কঠিন, যাবৎ রক্তদুষ্টি নিবারিত এবং আর্দ্রব সংশোধিত না হয়, তাবৎ রোগ সারে না ; পরন্তু পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করে । যোনিরোগে সাধারণতঃ সুপথ্যের ও রক্তসংশোধক ঔষধের ব্যবস্থা করিবে । আহারের অনিয়মে রোগ উৎপন্ন হইলে, পুষ্টি ও বলকারক আহারের ব্যবস্থা করিবে । বিষাক্তমেহ বা ফিরঙ্গরোগবশতঃ ঐ রোগ উৎপন্ন হইলে, এবং তাঁহাদের লক্ষণ সম্যক্ৰূপে প্রকাশ পাইলে, সেই সেই রোগনাশক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে, কিন্তু উহাদের বিষের লক্ষণ সম্যক্ প্রকাশ না পাইলে, অথচ পরীক্ষারদ্বারা আর্দ্রব-দোষ প্রমাণিত হইলে, যোনিরোগের ঔষধ প্রয়োগ করিবে । যোনিরোগ সাধারণতঃ বাতাদিক, স্তত্রাং বায়ু-নাশক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত । বায়ু-শাস্তিকারক ঔষধ অর্থাৎ ঘৃত, কাথ ও বটিকা-সেবন, যোনিতে প্রলেপ, কাথ সেচন ও তৈলসিক্ত বস্ত্রখণ্ড বা তুলাধারণ প্রভৃতি নানাপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা যায় ; কিন্তু আজকাল যোনিতে প্রলেপ, কাথ সেচন ও তৈলসিক্ত তুলা প্রভৃতি প্রয়োগ করা হয় না, কেবল-মাত্র সেবনের জন্ত কাথ, বটিকা ও ঘৃত ব্যবস্থা এবং ক্চিৎ বস্তি-প্রয়োগ করা হয় । মেহরোগগোক্ত বস্তিযোগের প্রণালীমত ত্রিফলার কাথদ্বারা বস্তি-প্রয়োগ করিবে । বাতব্যাদিরোগোক্ত ছাগাদিঘৃত, বৃহৎ ছাগাদিঘৃত, অমৃত-প্রাশ ঘৃত এবং বাতনাশক নানাবিধ বটিকা এই রোগে উপকারী । .এত-দ্রব্যতীত নষ্টপুশ্যাক্তকরস, কন্দমূল, ফলকল্যাণঘৃত বা কুমারকরজমঘৃত ব্যবস্থা ।

করা যাইতে পারে । প্রয়োজন হইলে, যোনিশূল শিবারণের জন্ত বাতশ্লেষ-নাশক দশমূলকাথ ও যোনিপ্রদাহ বিনাশের জন্ত দাহরোগোক্ত কোন কাথ দ্বারা যোনিপ্রক্ষালনের ব্যবস্থা এবং সেবনের জন্ত প্রদররোগের স্নিডকল্যাণ-ঘৃত বা বৃহৎ শতাবরীঘৃত ও বটিকা প্রভৃতি অবস্থাভেদে প্রয়োগ করা যায় । যোনি স্থানচ্যুত বা বহির্গত হইলে, করলারমূল বাটিয়া যোনিতে প্রলেপ দিবে অথবা ঘৃত, চর্কি কিম্বা ইন্দুরের বসা মর্দন করিয়া স্বস্থানে আশ্তে আশ্তে প্রবেশ করাইবে ।

বক্ষ্যা । গর্ভগ্রহণে অক্ষমতাকে বক্ষ্যা কহে ।

নানাকারণে জীলোকেরা বক্ষ্যা হইয়া থাকে পুরুষের শুক্র ও জীর আর্তব মিলিত হইলে, গর্ভসঞ্চার হয়, যে কোন কারণে তাহার ব্যাঘাত ঘটিলে, গর্ভসঞ্চার হয় না, পুরুষের শুক্রে জীবন্ত কীটগু বিস্ত্রমান না থাকিলে এবং পুংজননেঞ্জিয় যোনিমধ্যে সম্যক্ প্রবিষ্ট না হইলে অথবা জ্বাদিগের নানা-প্রকার পীড়াবশতঃ আর্তব দূষিত হইলে গর্ভসঞ্চার হয় না । ইদানীং বিলাস-বাসনা পরিতুগির জন্ত কেহ কেহ যোনিরন্ধ্রে তুলা বা বস্ত্রখণ্ড স্থাপন করিয়া মৈথুনে প্রযুক্ত হয়, সুতরাং তাহাও গর্ভসঞ্চার না হওয়ার একটি কারণ ।

চিকিৎসা । আর্তব দূষিত হইয়া বক্ষ্যা হইলে, আর্তবশোধক নষ্ট-পুশ্পান্তক রস, ফলঘৃত, ফলকল্যাণঘৃত বা কুমারকল্পদ্রুমঘৃত প্রয়োগ করিবে । খেতবেড়েলা, যষ্টিমধু, রক্তবেড়েলা, কাকড়াশৃঙ্গী ও নাগেশ্বর, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে, এই চূর্ণ দুগ্ধ, মধু ও ঘৃতসহ খাইলে, গর্ভ-সঞ্চার হয় । ধাতুকীর্ণা ও দুর্কলা জ্বাদিগের পক্ষে এই ঔষোগটি প্রশস্ত । আর্তবের জীবাণু দূষিত বা বিনষ্ট হইলে, ইহা দ্বারা পুনর্বার তাহারা সৃষ্ণ ও বলবান হয় ।

রজোহ্রস্বতা, রজোলোপ, কষ্টরজঃ ও রজোহধিকরোগ ।

মাসে মাসে জ্বাদিগের যে রজঃ প্রবর্তিত হয়, তাহা যথোপযুক্ত পরিমাণে স্রাব না হইয়া অল্পপরিমাণে স্রাব হইলে, তাহাকে অল্পরজঃ কহে এবং ঐ রজোজ্ঞাব বন্ধ হইলে, তাহাকে রজোলোপ কহে । ঋতুকালে বা ঋতুর পূর্বে বা পরে অত্যন্ত বেদনা বা কষ্টের সহিত রজঃ নির্গত হইলে তাহাকে কষ্টরজঃ

কহে । ঋতুকালে বা দুইটি ঋতুর মধ্যবর্তী সময়ে অধিক পরিমাণে রক্তশ্রাব হইলে, তাহাকে রজোহৃদিকরোগ কহে । রজোহ্রস্বতা বা রজোলোপ নানা- কারণে হয়, যোনিমার্গের ও জরায়ুর অবরোধ, জরায়ুর নানাবিধ পীড়া এবং নানারোগে জ্বীদিগের রক্তহীনতা বশতঃ অল্প রজঃ নির্গত বা রজোলোপ হয়, কিন্তু গর্তাবস্থায় যে রজঃ বিলুপ্ত হয়, তাহা রোগ নহে । অত্যধিক পরিশ্রম, তলপেটে আঘাত, মলত্যাগকালে সজোরে কুহন, শরীরে বা পদদ্বয়ে ঠাণ্ডা- লাগান বা অধিক শৈত্যক্রিয়া, শ্লেষ্মিক বিলম্বী ক্ষত এবং রক্তাধিক্য প্রভৃতি নানা-কারণে অধিক রক্তশ্রাব হয় । রক্তাধিক্যবশতঃ রজোশ্রাব হইবার পূর্বে মস্তকে ও কোমরে বেদনা, উত্তাপবোধ, তলপেট ভার, দপদপানি, দাহ, শোথ এবং মুখমণ্ডলের আরক্তিমভাব প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় । দুর্বলতা- বশতঃ অধিক রক্তশ্রাব হইলে, নাড়ীক্ষণ, মুখমণ্ডল রক্তহীন, শ্বাসপ্রশ্বাস ক্ষণস্থায়ী অথচ দ্রুতবেগে প্রবাহিত হয়, এবং পৃষ্ঠ ও কোমরে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । বাতপ্রকৃতি জ্বীদিগের রজঃকৃচ্ছতা হয়, অর্থাৎ বায়ু প্রতিলোম বা উন্মার্গগামী হইয়া আর্ন্তবকে আকর্ষণ করিয়া রাধিলে, যথোচিত শ্রাব হয় না, তদ্ব্যতীত সহসা মানসিক উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা, জরায়ু- মধ্যে রক্তসঞ্চয়, ঋতুর প্রাক্কালে পূর্ন-সহবাস, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, গাত্রে অধিক ঠাণ্ডালাগান ও অধিক শৈত্যক্রিয়া প্রভৃতি বিবিধ কারণে রজঃকৃচ্ছতা বা কষ্টরজঃ প্রকাশ পায় । রজঃ যথোচিত পরিমাণে নির্গত না হইলে, কটি ও বস্তিতে বেদনা ও গা-ব্যথা প্রভৃতি নানা প্রকার উপসর্গ উপস্থিত হয়, কিন্তু রজঃ নির্গত হইতে আরম্ভ করিলে ঐ সকল উপসর্গ কমিতে থাকে ।

রজোহ্রস্বতা, রজোলোপ, কষ্টরজঃ ও রজোহৃদিক রোগ চিকিৎসা ।

এই সকল পৃথক রোগ নহে । প্রদর, বাধক বা যোনিরোগেও এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায় । রজোহ্রস্বতা, রজোলোপ ও কষ্টরজঃ এই তিন অবস্থায় একই প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিলেই চলে । সাধারণতঃ যোনিরোগোক্ত নষ্টপুশ্পাক্তক রস কিম্বা বাতব্যাধি রোগোক্ত চিন্তামণি চতুর্শূধ, যোগেন্দ্ররস, রহৎ বাতচিন্তা- মণি ও মহাবাতচিন্তামণি প্রভৃতি বায়ুনাশক ঔষধ জবাকুলের কলি রগড়াইয়া তৎসহ কিম্বা কাঁজি সহ লতাকটকীর পাতা যুতে ভাজিয়া বা দুর্ধ্বাশ ও আতপ সমভাগে বাটিয়া খাইলে রজঃশ্রাব হয় । রজঃপ্রবর্তিনী বটী প্রয়োগেও

উদ্দেশ্যসিদ্ধ হইয়া থাকে । রক্তোহধিকরোগে প্রদররোগোক্ত পুষ্যাহুগচূর্ণ চন্দনাদিচূর্ণ, প্রদরারিলোহ, প্রদরাস্তকলোহ ও অশোকযুত প্রভৃতি অবস্থা-ভেদে ব্যবস্থা করিবে ।

যোনিকন্দ । দিবানিদ্রা, অত্যন্ত ক্রোধ, অতিশয় পরিশ্রম ও অধিক মৈথুন করিলে এবং নখ বা দন্তের আঘাতাদি লাগিয়া যোনিতে ক্ষত হইলে, বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে । ইহা দেখিতে ডহিয়া বা মাদার ফলের আকৃতি ও মিশ্রিত পুয়রক্তের বর্ণেরদ্বারা আভাবিশিষ্ট । এই রোগে গেরিমাটী, আমের আঠির শাস, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, রসাজন ও কটফল এই সকলের চূর্ণ সমভাগে মিলিত করিবে ; অনন্তর ত্রিফলা অর্থাৎ হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া সেই কাথজলের সহিত ঐ চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা যোনিপ্রক্ষালন করিবে । রক্ত বা আর্দ্রব-শোধক যোনিরোগোক্ত একটি স্নাত ব্যবস্থা করিলে আরও ভাল হয় ।

প্রদর । মিথ্যা আহার বিহার যেমন অনাচ্চ রোগের কারণ, প্রদর-রোগের কারণও তাহাই । বিরুদ্ধ আহার অর্থাৎ মৎস্য, মাংস ও দুগ্ধাদি একত্র ভোজন, আহার বিহারাদির অনিয়ম, যন্তপান, ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ, না হইতেই পুনর্বার ভোজন, অজীর্ণ, গর্ভপাত বা গর্ভশ্রাব, অতিরিক্ত পুরুষসংসর্গ-সাধ্যাতীত মৈথুন, অশ্বাদি যান বহনে বা পদব্রজে অধিক ভ্রমণ, শোক, উপবাস প্রভৃতি কারণে ধাতুক্কয় এবং ভারবহন, আঘাতপ্রাপ্তি ও দিবানিদ্রা, এই সকল কারণে প্রদর রোগ উৎপন্ন হয় । প্রদররোগ চারিপ্রকার, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক ও সান্নিপাতিক । সর্বপ্রকার প্রদররোগেই অঙ্গ-বেদনার সহিত স্রাব হইয়া থাকে ।

যেমন প্রমেহাদি কতকগুলি রোগ পুরুষের শরীরে উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ প্রদরাদি কতকগুলি রোগ কেবলমাত্র স্ত্রীদিগের শরীরেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । প্রদর স্ত্রীদিগের একটি কঠিন ও মারাত্মক ব্যাধি । প্রথমাবস্থায় অবশ্যই ঐ রোগ হৃষ্টিকিংশ বা মারাত্মক নহে, কিন্তু অধিকাংশস্থলে রমণীগণ প্রথম অবস্থায় লজ্জা বশতঃ বা ভুচ্ছতাচ্ছল্য করিয়া রোগের বিষয় গোপন করে সুতরাং রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া ক্রমশঃ বদ্ধমূল ও মারাত্মক হইয়া পড়ে ।

প্রদর রোগে অতিশয় রক্তস্রাব হইলে, রোগিণীর অত্যন্ত দুর্বলতা, ভ্রম,

মূর্ছা (ইন্দ্রিয়মোহ), মোহ (মনোমোহ), তন্দ্রা, প্রলাপ, পিণাসা, সর্কাসে দাহ, রক্তহীনতা ও শরীরের পাণ্ডতা এবং বাতব্যাধির লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় ।

যোনিরোগ, রক্তোহ্লতা ও কষ্টরজঃ প্রভৃতি রোগ যেমন আর্তব দূষিত হইলে, উৎপন্ন হয়, প্রদররোগও তদ্রূপ আর্তব দোষ হইতে জন্মে, সূত্ররাং যাবৎ প্রদররোগের লক্ষণ ও উপদ্রব সমূহ বিনষ্ট না হয় এবং শুদ্ধাৰ্ত্তবের লক্ষণ প্রকাশ না পায়, তাবৎ চিকিৎসা করা কর্তব্য । কারণ রোগ একবার শরীরে বদ্ধমূল হইতে পারিলে, অসাধ্য হইয়া পড়ে । প্রদররোগের সমস্ত ঔষধই আর্তব-শোধক, সূত্ররাং আর্তবশুদ্ধির জন্ত স্তন্য ঔষধ প্রয়োগ না করিলেও চলে, তবে নিতান্ত প্রয়োজন হইলে, বক্ষ্যমান আর্তবদুষ্টিরোগের ঔষধ প্রয়োগ করিবে । লাল গাঁদা ফুল ও অশোক ফুল একত্র বাটিয়া সেবন করাইলে কিম্বা অশোকছালের রস পান করাইলে, রক্তপ্রদর বিনষ্ট হয় । অত্যধিক রক্তশ্রাব হইলে, নিম্নের যোগগুলি অতি ফলপ্রদ । আমলকী, শোধিত-রসাজন ও হরীতকীচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে এবং আতপচাউলের জলসহ প্রয়োগ করিবে, তন্নিম্ন রসাজনচূর্ণ—লাল নটের মূলের রস বা আতপ চাউলের জল সহ, যষ্টিমধু ও রসাজনচূর্ণ—আতপ চাউলের জলসহ, যজ্ঞদুগ্মুরের রস মধুসহ, বাকছালের রস—মধুসহ এবং কুশমূল—আতপচাউলের জলসহ বা কেবল মাত্র কুড়চীর ছালের রস, ইহার যে কোন একটি বা দুইটি দুইবেলা সেবন করিতে দিবে । বেদনা ও রক্তশ্রাব বন্ধ করিবার জন্ত কাঠালগাছের শিকড় ভাতের জল বা কাঁজি দ্বারা বাটিয়া খাইতে দিবে । এতদ্ব্যতীত প্রদরের রক্তশ্রাব বন্ধ করিবার জন্ত রক্তাতীসার, রক্তার্শ, রক্তামাশয় ও অধোগত রক্তপিত্ত রোগের সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা যায় । কুটজাষ্টক ও কুটলাবলেহ রক্তপ্রদরে প্রয়োগ করিলে অতিশীঘ্র রক্তশ্রাব বন্ধ হয় । এই রোগে পুষ্যাঙ্গ-চূর্ণ ও চন্দ্রনাড়ীচূর্ণ উৎকৃষ্ট ঔষধ । ইহা রক্তপ্রদর, খেতপ্রদর, যোনি বা জী-জননেদ্রিয়ার ক্ষত এবং ক্লেদযুক্ত ও বেদনায়ুক্ত শ্রাব নিবারণে অত্যন্ত শক্তি-শালী এবং রক্তপিত্ত, রক্তামাশয়, রক্তাতীসার ও রক্তার্শে বিশেষ উপকারী । রক্তপ্রদরে বা ক্লেদযুক্তশ্রাবে কিম্বা যোনিতে জ্বালা ও শ্রাবকালীন অধিক বেদনা থাকিলে অথবা ঋতুকালে অধিক বেদনার সহিত বেশী রক্তশ্রাব

হইলে, দার্ক্যাদি কাণ, প্রদরাস্তকচূর্ণ, অশোককাণ, প্রদরাদির লৌহ এবং জ্বর না থাকিলে, অশোকস্বত ব্যবস্থা করিবে। বেশী রক্তশ্রাব না থাকিলে, প্রদরাস্তক লৌহ, প্রদরাস্তক রস, পুষ্করলেহ, সিতকল্যাণস্বত বা বৃহৎ শতাবরী-স্বত প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায়। যোনিরোগোক্ত নষ্টপুষ্ণাস্তক রস, ফলস্বত, ফলকল্যাণস্বত ও কুমারকল্যাণস্বত ঐ অবস্থায় মহোপকারী।

প্রদরের বর্ধিতাবস্থায় বাতব্যাধির লক্ষণ বা বাতরোগ অর্থাৎ মুচ্ছা ও আক্ষেপ প্রভৃতি উপস্থিত হইতে পারে, এই অবস্থায় বাতরোগোক্ত মুচ্ছা ও আক্ষেপের ঞায় চিকিৎসা করিবে। মুচ্ছাভঙ্গের জন্ত নস্ত, মর্দনের জন্ত তৈল এবং সেবনের জন্ত বৃহৎ বাতচিষ্টামণি প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। শ্লৈষিক-প্রদরে সাধারণতঃ অত্যধিক রক্তশ্রাব হয়, বেশী রক্তশ্রাব হইলে তাহা হইতে ক্রমশঃ রক্তহীনতা, পাণ্ডু এবং শোথ প্রকাশ পায়, তখন সাধারণ ঔষধে ক্রিয়া করে না, কাজেই লবণ জল বন্ধ করিয়া পূর্ণা বা স্বর্ণপূর্ণা অবস্থা ভেদে ব্যবস্থা করিবে। শোথ ব্যতীত কেবল পাণ্ডু বা কামলার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে পাণ্ডু ও কামলা রোগের ঞায় চিকিৎসা করিবে। দাহ প্রকাশ পাইলে, দাহ-রোগোক্ত নানাবিধ যোগ ও মুচ্ছা প্রকাশ পাইলে, মুচ্ছারোগোক্ত তৈল মর্দনের ব্যবস্থা করিবে।

গিলাবাটা চারি আনা ও গব্যস্বত চারি আনা একত্র ঝাওয়াইলে, বাধক-বেদনা ও রক্তশ্রাব কমে।

শ্বেতপ্রদর। এই রোগে আর্দ্রবস্ত্তিকর ঔষধ এবং জননেন্দ্রিয় ক্ষত থাকিলে অথবা পুষ্টিমিশ্রিত শ্রাব হইলে, মেহরোগোক্ত বস্ত্তিযোগ প্রয়োগ করিবে। ক্ষত থাকিলে, উক্ত বস্ত্তিযোগ প্রয়োগ নিতান্ত কর্তব্য। কিন্তু ক্ষত না থাকিলে অথচ যোনিতে প্রদাহ থাকিলে তল্লিবারণার্ঘ ত্রিফলার কাথের পিচকারী প্রয়োগ করিলে, প্রদাহ অতিশীঘ্র প্রশমিত হয়। নিম্নের কয়েকটি যোগ শ্বেতপ্রদরে অত্যন্ত উপকারী। রমনারস্কের মূলের ছাল চূর্ণ করিয়া বা জলে বাটিয়া মধুসহ, আমলকীবীজের শাসবাটা ও মধু, থাইফুলবাটা ও মধু, আমলকীবাটা ও মধু এবং কাপাসরস্কের মূলবাটা ও মধু; ইহাদের একটা বা দুইটি দুইবেলা সেবন করিতে দিলে, শ্বেতপ্রদর বিনষ্ট হয়। এক-

দ্ব্যতীত রক্তপ্রদরোক্ত দার্ক্যাদি কাথ, চন্দনাদিচূর্ণ, পুষ্করলেহ, মধুকাস্তবলেহ, প্রদরারি লৌহ, প্রদরাস্তক লৌহ, রত্নপ্রভা বটিকা, অশোকমৃত এবং যোনি-রোগোক্ত নষ্টপুষ্পাস্তক রস, ফলকল্যাণমৃত ও কুমারকল্লভমমৃত প্রভৃতি অবস্থাভেদে প্রয়োগ করা যায় ।

বাধক । বাধকরোগাক্রান্তা রমণীর গর্ভসঞ্চার বা সন্তানোৎপত্তি হয় না । বোনিরোগ, প্রদর ও বাধক প্রভৃতি রোগের কারণ আর্ন্তবহুষ্টি । আর্ন্তব সংশোধিত হইলেই রোগও সারে, শরীরও সুস্থ হয় । বাধক চারিপ্রকার, রক্তমাত্রী, ষষ্ঠী, অঙ্গুর ও জলকুমারক । যে সকল কারণে আর্ন্তব দূষিত হয় এবং প্রদরাদি আর্ন্তবহুষ্টিজনিত রোগ জন্মে, সেই সকল কারণেই আর্ন্তব দূষিত হইয়া বাধক জন্মে, সন্তানোৎপাদনে বাধা জন্মায় বলিয়া ইহাকে বাধক বলা যায় । আর্ন্তবহুষ্টির লক্ষণানুযায়ী চারিপ্রকার বাধকের মধ্যে কোন্টি কোন্ দোষোদ্ভূত, তাহা স্থির করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে । রক্তমাত্রী বাধক বাতিক লক্ষণাবিত, ষষ্ঠী বাধক পৈত্তিক লক্ষণযুক্ত, অঙ্গুরবাধক শ্লেষ্মিক লক্ষণ-বিশিষ্ট এবং জলকুমারক বাধক বাতশ্লেষ্মিক লক্ষণাবিত । এইরূপ বাতিক ও শ্লেষ্মিক বাধকে বোনিরোগোক্ত নষ্টপুষ্পাস্তক রস, পৈত্তিক বাধকে ও শ্লেষ্মিক বাধকে প্রদররোগোক্ত প্রদরারি লৌহ এবং বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক ত্রিবিধ দোষের প্রকোপ থাকিলে, প্রদররোগোক্ত রত্নপ্রভাবটিকা প্রয়োগ করিবে । অশোকমৃত ও কুমারকল্লভমমৃত, সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য । কল্যাণ-মৃত ও রহং শতাবরীমৃত পৈত্তিক বাধকে অতি উপকারী ।

স্তনরোগ ।

দূষিত বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা ছদ্ধহীন বা ছদ্ধবিশিষ্ট স্তনের মাংস ও রক্তকে আশ্রয় করিয়া যে রোগ উৎপাদন করে, তাহাকে স্তনরোগ কহে । স্তনরোগ কেবলমাত্র গর্ভিনী ও প্রসূতানারীরই হয়, বালিকাদিগের হয় না, কারণ গর্ভিনী ও প্রসূতানারীর স্তনাশ্রিত ধমনীসমূহের মুখ স্বভাবতই বিস্তৃত থাকে বলিয়া দোষসঞ্চরণ করিয়া রোগ উৎপাদন করে, কিন্তু বালিকাগণের স্তনা-শ্রিত ধমনীর মুখ সঙ্কুচিত থাকে বলিয়া দোষ সঞ্চরণ করিয়াও রোগ উৎপাদন

করিতে পারে না, সুতরাং দুগ্ধহীন স্তনশব্দে গর্ত্তিগীর স্তন এবং দুগ্ধবিশিষ্ট স্তনশব্দে প্রস্থতির স্তন বুঝায় ।

স্তনরোগ পাঁচ প্রকার, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক ও আগন্তুজ । এই স্তনরোগকে স্তন-বিদ্রুতি কহে । ইহাদের লক্ষণ বিদ্রুতি-রোগোক্ত বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক ও আগন্তুজ বিদ্রুতির আয় ।

স্তনরোগ-চিকিৎসা ।

স্তনে স্তন-বিদ্রুতি ও নানাবিধ অর্কুদ জন্মে, অর্কুদ জন্মিলে, অর্কুদ-রোগের আয় চিকিৎসা করিবে । স্তন-বিদ্রুতি নামক স্তনরোগ সচরাচর শিশুর স্তন্যপানহেতু প্রস্থতির জন্মিয়া থাকে, ইহার সংস্কৃত নাম স্তন-বিদ্রুতি এবং চলিতনাম ঠুনকো । এই রোগে স্তন ক্ষীত, আরক্তিম, বেদনাবিশিষ্ট, উত্তপ্ত ও কঠিন হয় । ইহাও ব্রণশোথমধ্যে পরিগণিত । ইংরাজিতে ইহাকে মিক্‌গ্যাভ্‌সেস্‌ বলা হয় । শোথ প্রকাশ পাইবামাত্র যবচূর্ণ, কাঁচামুগেরচূর্ণ ও ময়দা সমভাগে মিশ্রিত করিয়া শোথের উপরে প্রলেপ দিবে । দিবসে ২১০ বার প্রলেপ দিলেই ৩৪ দিবসের মধ্যে শোথ বসিয়া যায় । পাকিবার উপক্রম হইলে, পাকাইবে এবং পাকিলে ফাটিবার ঔষধ লাগাইবে, অনন্তর ক্ষত প্রকাশ পাইলে, ব্রণরোগের আয় চিকিৎসা করিবে । বিদ্রুতি-রোগোক্ত কজ্জলীবোগ, শঙ্কিনার ছালের রস ও মধুসহ এবং পুনর্গবাদি কাথ প্রয়োগ করা যায় । স্তনে বেদনা হইলে ধূতুরাপাতা ও আদা সমভাগে বাটিয়া প্রলেপ দিবে, কিম্বা রাখালশশার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিবে । স্তনরোগ হইলে, সময়ে সময়ে দুগ্ধ দোহন করিয়া ফেলিবে, নচেৎ রোগিণীর অত্যন্ত কষ্ট হয় ।

স্তনরোগে—পথ্যাপথ্য ।

স্তন-বিদ্রুতিতে বিদ্রুতিরোগের বা ব্রণশোথের আয় এবং স্তনার্কুদে অর্কুদ-রোগের আয় পথ্যাপথ্য কল্পনা করিবে ।

স্তন্য-দুষ্টি

স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে, তাহাকে স্তন্য-দুষ্টিরোগ কহে । গুরুপাকদ্রব্য ভক্ষণে বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রকৃপিত হইয়া স্তনদুগ্ধ দূষিত করে । ঐ দূষিত স্তনদুগ্ধ পান করিলে শিশুদিগের নানা প্রকার রোগ জন্মে ।

বায়ুদ্বারা স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে, ঐ দুগ্ধ কষায়রসবিশিষ্ট হয় এবং জলে নিঃক্ষেপ করিলে লগ্নপ্রযুক্ত ভাসমান থাকে । পিত্তদ্বারা স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে, উহা কটু ও অম্লরসবিশিষ্ট এবং পীতবর্ণ রেখাযুক্ত দৃষ্ট হয়, পরন্তু জলে নিঃক্ষেপ করিলেও পীতবর্ণ লক্ষিত হইয়া থাকে ।

শ্লেষাদ্বারা দূষিত স্তনদুগ্ধ গাঢ় ও পিচ্ছিল দৃষ্ট হয়, এবং জলে নিঃক্ষেপ করিলে, ডুবিয়া যায় ।

দ্বিদোষদ্বারা স্তন্য দূষিত হইলে, মিলিত দুইটি দোষের প্রকোপ-লক্ষণ এবং ত্রিদোষদ্বারা দূষিত হইলে, মিলিত তিনটিদোষের প্রকোপ-লক্ষণ মিলিত-ভাবে প্রকাশ পায় ।

স্তন্য-পরীক্ষা । স্তনদুগ্ধ বিশুদ্ধ কিনা তাহার পরীক্ষা করিতে হইলে, কিঞ্চিৎ দুধ স্তন হইতে গুলিয়া পরিকার জলে ফেলিয়া দিবে, যদি ঐ দুগ্ধ অবিলম্বে জলের সহিত মিশ্রিত হয় এবং তত্ত্বর মত না হইয়া শুক্লবর্ণ অথচ তরল দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উহা বিশুদ্ধ বলিয়া জানিতে পারিবে । এইরূপ বিশুদ্ধ স্তন্য-পানে শিশুদিগের কোন রোগ জন্মে না ; সুতরাং শিশুসন্তানের কোন রোগ হইলে এবং তাহা ঔষদাদি সেবনে আরোগ্য হইতে বিলম্ব ঘটিলে স্তন-দুগ্ধ পরীক্ষা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য ।

স্তন্যদুষ্টি-চিকিৎসা ।

স্তনদুগ্ধ শিশুর জীবন-স্বরূপ, সুতরাং তাহা দূষিত হইলে, পান করিয়া শিশু অবিলম্বে পীড়িত হয়, তজ্জন্ত স্তনদুগ্ধ শোধন করা প্রয়োজন । স্তনদুগ্ধ দূষিত হইয়াছে কিনা, মধ্যে মধ্যে তাহা পরীক্ষা করা কর্তব্য । কিন্তু এই-সকল অবগত করণীয় কার্যের প্রতি আজকাল কাহারও দৃষ্টি নাই, মানব সতত আশ্র-সুখে রত, তাই শিশুর মৃত্যুসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে । পূর্বোক্ত প্রণালী অনুসারে স্তনদুগ্ধ জলে ফেলিয়া পরীক্ষা করিবে । বায়ুর

প্রকোপে দূষিত হইলে, অররোগোক্ত দশমূলকাথ, পিত্তের প্রকোপে দূষিত হইলে, গুড়ুচ্যাতি কাথ এবং শ্লেষ্মার প্রকোপে দূষিত হইলে, ভার্গ্যাতিকাথ শিশুর মাতাকে বা স্তন্যদায়িনী ধাত্রীকে সেবন করিতে দিবে। এই অবস্থায় স্তন্যদায়িনীর পথ্যের প্রতি অক্ষতৃষ্টি রাখিবে, কারণ স্তন্যদায়িনী কুখ্যা সেবন করিলে, শিশুর রোগ কখনই আরোগ্য হয় না। দুর্বলতা ও ক্ষীণতা বশতঃ বা অথ কোন কারণে প্রসূতির স্তনদুগ্ধ হ্রাস পাইলে, শিশুও দিন দিন দুর্বল ও ক্ষীণ হইতে থাকে, ঐ অবস্থায় অবিলম্বে স্তন্য-বন্ধক নানাবিধ মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিবে।

স্তন্যদুষ্টিরোগে--ঔষধ।

দশমূলকাথ। বায়ুদ্বারা স্তনদুগ্ধ দূষিত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ প্রসূতিকে সেবন করাইবে। উহার কিঞ্চিৎ কাথ মধুসহ শিশুকেও পান করান যায়। কিছুকৈ করিয়া অথবা পরিষ্কার নেকড়ার পলিতা কাথে ভিজাইয়া শিশুকে পান করাইবে। বায়ু, পিত্ত বা শ্লেষ্মা কোন দোষের প্রকোপে স্তন-দুগ্ধ দূষিত হইয়াছে, তাহা স্থির করিতে না পারিলেও ক্ষতি নাই, কারণ দশমূল ত্রিদোষ-নাশক। পক্ষান্তরে স্বল্পপঞ্চমূল বায়ু ও পিত্তনাশক এবং বৃহৎ পঞ্চমূল বায়ু ও শ্লেষ্মানাশক; সুতরাং বায়ু ও পিত্তের প্রকোপে দূষিত হইলে, স্বল্প-পঞ্চমূলকাথ এবং বাতশ্লেষ্মার প্রকোপে দূষিত হইলে, বৃহৎ পঞ্চমূল কাথ প্রয়োগ করা যায়। বিদ্বাদি আশু পাঁচটি বৃহৎ ও শালপাণী হইতে পাঁচটি স্বল্প-পঞ্চমূল।

দশমূল কাথ। প্রস্তুতবিধি ৬৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গুড়ুচ্যাতি কাথ। পিত্তদ্বারা স্তনদুগ্ধ দূষিত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ প্রসূতি ও শিশুকে পান করিতে দিবে।

গুড়ুচ্যাতিকাথ। গুলঞ্চ, শতমূল, পলতা, নিম্বালা ও রক্তচন্দন; প্রত্যেক সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

ভার্গ্যাতিকাথ। শ্লেষ্মাদ্বারা স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে, এই কাথ শিশু ও তাহার স্তন্যদায়িনীকে পান করিতে দিবে।

ভার্গ্যাতি কাথ। বামনহাটী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুখা, চিরতা, কটুকী, দেব-

দারু, বচ, আকনাদি ও আভইন, প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ২২ তোলা।
শেষ ৮ তোলা ।

স্তন্যশর্দক যোগ । কার্পাসের মূল ও ইক্ষুমূল সমভাগে লইয়া কাঁজির দ্বারা বাটয়া ভক্ষণ করিলে, অথবা ভূঁইকুমড়ার চূর্ণ দ্রুত ও ইক্ষুচিনি সহ খাইলে, স্তন্যদায়িনীর স্তনদ্রুত বৃদ্ধি পায় । সহ্য হইলে কেবলমাত্র দ্রুত বেশী পরিমাণে পান করিলেও চলে । সাধারণতঃ ভূমিকুশ্মাণ্ডচূর্ণ ও দ্রুত এই যোগটি সর্বদা ব্যবহার্য্য ও অতি উপকারী । ইহা প্রয়োগ করিলে, অন্ত্র যোগ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না ।

আর্ন্তবহুষ্টি, যোনিরোগ, রক্তপ্রদর, শ্বেতপ্রদর ও
বাধকরোগে—ঔষধ ।

রজোরোধক যোগ । ইহা আর্ন্তবহুষ্টি, বাধক ও প্রদরে অত্যধিক রক্তশ্রাব হইলে, প্রয়োগ করিবে, কিন্তু রক্তবন্ধ হইলে ইহা আর প্রয়োগ করিবে না, যেহেতু ইহা বেশীদিন প্রয়োগ করিলে, রজোলোপ হয়, সূত্ররাং গর্ভসঞ্চার হইতে পারে না । অল্পপান—আতপ চাউলের জল ।

রজোরোধকযোগ । হরাতকী, আমলকী ও এসাঞ্জন, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিলিত করিবে । মাত্রা—এক আনা হইতে দুই আনা ।

রজঃপ্রবর্তিনী বটী । স্বল্পরজঃ, রজোলোপ, কষ্টরজঃ এবং বাতিক-আর্ন্তবহুষ্টি ও বাস্তিক রক্তপ্রদরে অল্প রক্তশ্রাব হইলে এবং তজ্জন্ম যোনিদেশে ও তলপেটে বেদনা থাকিলে, এই বটিকা সেবন করিতে দিবে । কিন্তু গর্ভাবস্থায় প্রয়োগ করিবে না । গর্ভাবস্থায়ও ঋতুবন্ধ হয়, সূত্ররাং রোগ কিম্বা গর্ভসঞ্চারহেতু রজোলোপ বন্ধ হইয়াছে, অগ্রে তাহা পরীক্ষা করিবে । ইহা জরায়ুর উপর ক্রিয়া করে, সূত্ররাং গর্ভাবস্থায় প্রয়োগ করিলে গর্ভশ্রাব হইতে পারে । প্রসববেদনা হইলে অথচ প্রসবে বিলম্ব হইলে, ইহা প্রয়োগে শীঘ্র সন্তান প্রসূত হয় । অল্পপান—লাল জবাবুলের কলিবাটা ও মধু । জলসহ গিলিয়াও খাওয়া যায় ।

রজঃপ্রবর্তিনী বটী । বিড়ক হিং, মুছকর ও গুঁঠচূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগ । বটী ১ রতি ।

বস্তিযোগ । ষ্বেতপ্রদরে জননেদ্রিয়ে ক্ষত ও জ্বালাবস্থণা থাকিলে এবং ঐ ক্ষত হইতে পু্যমিশ্রিত শ্রাব কিম্বা কেবলমাত্র পু্য নির্গত হইলে, এই বস্তিযোগদ্বারা জননেদ্রিয়ে পিচ্কারী দিবে । ইহাতে ক্ষত ও জ্বালাবস্থণা সত্ত্বঃ প্রশমিত হয় । ক্ষত ও পু্যশ্রাব না থাকিলে, যোনি ও প্রদররোগে প্রদাহ ও যোনিশোধনার্থ কেবলমাত্র ত্রিফলার কাথদ্বারা পিচ্কারী দিবে ।

বস্তিযোগ । প্রস্তুতবিধি ২২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

দার্ক্যাদি কাথ । প্লেগ্মিক আর্ন্তবহুষ্টি ও প্রদররোগে এবং অস্থুর-
বাধকে অধিক রক্তশ্রাব হইলে, এই কাথ রোগিণীকে প্রত্যহ প্রাতে সেবন
করিতে দিবে । ইহা অধিক রক্তরোধক, পরস্তু আর্ন্তবশোধক ও ষ্বেতপ্রদরের
ক্ষত বিনাশক । অগ্ন্যাগ্ন বাধক, আর্ন্তবহুষ্টি এবং প্রদররোগেও ইহা প্রয়োগ
করা যায় । এই ঔষধটি বহুপরীক্ষিত ও সর্বদা ব্যবহার্য্য । অধিক রক্তশ্রাব
হইলে, প্রথমতঃ অশোককাথ প্রয়োগ করিবে এবং তাহাতে রক্তবন্ধ না হইলে,
ইহা প্রয়োগ করিবে ।

দার্ক্যাদি কাথ । দারুহরিদ্রা, বিশুদ্ধ রসায়ন, বাসক, মুখা, চিরতা, বেলভুট ও রক্ত-
চন্দন, সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেণ ৮ তোলা । অগ্নে, অগ্ন্যাগ্ন দ্রব্যদ্বারা
কাথ করিয়া পশ্চাৎ রসায়নচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে ।

অশোককাথ । প্লেগ্মিক আর্ন্তবহুষ্টি ও রক্তপ্রদররোগে এবং অস্থুর-
বাধকে অত্যধিক রক্তশ্রাব হইলে, ইহা প্রয়োগ করা যায় । ইহা রক্তরোধক
সুতরাং ঐ সকল রোগে অধিক রক্তশ্রাব হইলে, সম্মাথে ইহা প্রয়োজ্য । ইহা
প্রয়োগে রক্তশ্রাব বন্ধ না হইলে, দার্ক্যাদি কাথ প্রয়োগ করিবে ।

অশোককাথ । অশোকছাল ২ তোলা, জল ৬৪ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা, একত্র জ্বাল দিয়া
দুগ্ধাংশেণ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে । অতাবিক রক্তশ্রাবে কেহ কেহ ছাগদুগ্ধদ্বারা
জ্বাল দিয়া রসায়নচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া থাকেন । আবার কেহ কেহ দুগ্ধ ৮ তোলা ও জল
২৪ তোলা দিয়া জ্বাল দেওয়ার ব্যবস্থাও দিয়া থাকেন । এই নিয়মে কাথ করিতে হইলে,
৮ তোলা থাকিতে নামাইতে হয় ।

অনন্তাদি কাথ । বাতিক ও পৈতিক আর্ন্তবহুষ্টি এবং প্রদররোগে
ও রক্তমাত্রী এবং বগীবাধকে অল্প শ্রাব হইলে, আর্ন্তবহুষ্টির জন্ম, বিশেষতঃ
বাতিক, পৈতিক ও প্লেগ্মিক যোনিরোগে যোনি ও রজোশুদ্ধির নিমিত্ত ইহা

প্রয়োগ করিবে।' বেশী রক্তশ্রাব না হইলে অথচ যোনিরোগ ও আর্ন্তবহুষ্টি থাকিলে, বিশেষতঃ ষ্ঠেতপ্রদরে ইহা অত্যন্ত উপকারী। স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন ঐ অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিতেন। আর্ন্তবহুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, কাথ সেবন বন্ধ করিবে।

অনন্তাদি কাথ। অনন্তমূল, স্ত্রীমালতা, দন্তিমধু ও বামনহাটী সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

চন্দনাদি চূর্ণ। বাতিক, পৈত্তিক ও সান্নিপাতিক প্রদরে বিশেষতঃ শৈল্পিকপ্রদরে, রজোহাধিকরোগে ও জলকুমারক বাধকে অত্যধিক শ্রাব নিবারণার্থ ইহা প্রয়োগ করিবে। ইহা যেমন শ্রাবরোধক, তেমনি গাত্রদাহ এবং যোনি-প্রদাহ নিবারক ও আর্ন্তবশোধক। ইহা ষ্ঠেতপ্রদরে ঞ্চৈনিক্ত এবং ক্রৈদ ও পৃথরক্ত শ্রাবে প্রয়োগ করা যায়। রক্তাভীসারে, রক্তপিত্তে ও রক্তার্শে অত্যধিক রক্তশ্রাবনিবারণে ইহার শক্তি অসাধারণ। অশোককাথ ও দার্ব্যাদিকাথে রক্তশ্রাব বন্ধ না হইলে, ইহা প্রয়োজ্য। অবস্থাভেদে অমুপান কল্পনা করিবে। রক্তশ্রাব নিবারণের জন্ত ডালিমপাতার রস, কুশ্মিন্দ বা কুসুর-শৌকার রস, কুড়চী ছালের রস বা রক্তনটের মূলের রসসহ প্রয়োজ্য। সাধারণ অমুপান—আতপতগুলের জল বা শীতল জল।

চন্দনাদিচূর্ণ। রক্তচন্দন, জটামাংসী, লোধ, বেণারমূল, পদ্মকেশর, নাগেশ্বর, বেলগুঁঠ, নাগরমুখা, চিনি, বালা, আকনাদি, ইন্দ্রযব, কুড়চীরছাল, গুঁঠ, আতইচ, ধাইফুল, রসাজন, আমের আঁঠির শাস, জামের আঁঠির শাস, মোচরস, নীলোৎপল, বরাহক্রান্তা, ছোটএলাচি ও দাড়িমের খোসা ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ। মাত্রা—চারি আনা।

পুষ্যানুগচূর্ণ। ইহাও চন্দনাদি চূর্ণের ঞ্চায় প্রবল রক্তরোধক। চন্দনাদি চূর্ণ যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োজ্য, বিশেষতঃ অত্যধিক রক্তশ্রাবহেতু হ্রদ্রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ইহা সমধিক উপকারী। ষ্ঠেতপ্রদরে যোনিতে ক্ষত হইলে এবং সেই ক্ষত হইতে পূথ বা ক্রৈদযুক্ত শ্রাব হইলে, প্রয়োগ করিবে। ইহা আর্ন্তবশোধক। অমুপান—চন্দনাদিচূর্ণের ঞ্চায়।

পুষ্যানুগচূর্ণ। আকনাদি, জামের আঁঠির শাস, আমের আঁঠির শাস, পাথরকুড়ি, রসাজন, অম্বষ্ঠা (ইহার অভাবে আকনাদি বা অশোকছাল প্রয়োগ করা যায়), নৈচেরস,

বরাহক্রান্তা, পদ্মকেশর, কুঙ্কুম, আতাইষ, মুখা, বেলশুঁঠ, লোধ, গেরিমাটী, কটুকল, মরিচ, শুঁঠ, কিস্মিস্, রক্তচন্দন, শোণাছাল, ইন্দ্রযব, অনন্তমূল, ধাইফুল, যষ্টিমধু ও অজুর্নছাল, প্রত্যেকে সমভাগ। মাত্রা—চারি আনা ।

পুষ্করলেহ । রক্তপ্রদর, বাধক ও আর্ন্তবহুষ্টিরোগে অশোক কাথ, দার্ক্যাদিকাথ, চন্দনাদিচূর্ণ বা পুষ্যাত্মগচূর্ণ প্রয়োগদ্বারা প্রবল রক্তশ্রাব বন্ধ হইলে এবং ঐ অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, বিশেষতঃ ধাতুকয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ইহা অমৃতের ত্রায় উপকারী। অত্যাণ্ড অবস্থায়ও আর্ন্তব-
হুষ্টির জন্য প্রয়োগ করা যায়। অমুপান—দুগ্ধ ও মধু।

পুষ্করলেহ । রসাগুন, বংশলোচন, কাকড়াশুঙ্গী, চিতামূল, যষ্টিমধু, ধনে, তালীশপত্র, খয়ের, জীরা, কৃষ্ণজীরা, তেউড়ী, বেড়েলা, দস্তীমূল ও শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা, উৎকৃষ্ট মধু ৩২ তোলা এবং যষ্টিত্রী, লবঙ্গ, কাকলা, কিস্মিস্, দারুচিনি, তেজ-
পত্র, এলাচি, নাগেশ্বর, পিওপেচুর, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা ; সমস্ত একত্র করিয়া মৃত-
ভাঙে রাখিবে। মধু উৎকৃষ্ট না হইলে, কিছুদিন পরে পড়িয়া যায়।

প্রদরাস্তক লৌহ । ইহা রক্তপ্রদর, শ্বেতপ্রদর, নীলবর্ণ শ্রাব, পীত-
বর্ণ শ্রাব, ক্লেদ বা পুষ্যরক্ত শ্রাব, ঘোনিপ্রদাহ, ঋতুকালীন বেদনা ও কৃষ্ণিশূল
প্রভৃতি থাকিলে, প্রয়োগ করা যায়। সাধারণতঃ বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক
সর্বাবস্থায়ই উপকারী। পরন্তু ইহা অত্যন্ত পুষ্টি ও বলকারক। অমুপান—
চন্দনাদি চূর্ণের ত্রায়।

প্রদরাস্তক লৌহ । লৌহ, তাম্রভষ্ম, বিশুদ্ধ হরিতাল, বঙ্গ, অন্ন, কড়িভষ্ম, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, বিট, দৈন্দব, করকচ, সাভার, সচললবণ, চৈ, পিপুল, শঙ্খভষ্ম, বচ, ধনে, কুড়, শর্ষপ, আকনাদি, দেবদারু, এলাচি ও বিস্তারক বীজ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, জলে বর্দন। বটী ৬ রতি।

প্রদরারি লৌহ । ইহার প্রয়োগপ্রণালী চন্দনাদি চূর্ণের ত্রায়। চন্দ-
নাদি চূর্ণ বা পুষ্যাত্মগ চূর্ণ প্রয়োগে উপকার না হইলে, ইহা প্রয়োজ্য। ইহাতে
লৌহ ও অন্ন আছে বলিয়া কাথ ও চূর্ণ অপেক্ষা সমধিক উপকারী।
প্রবল রক্তশ্রাব বন্ধ করিতে ইহার শক্তি অহুলনীয়। অমুপান—চন্দনাদি-
চূর্ণের ত্রায়।

প্রদরারি লৌহ । কুড়ীয়া ছাল ১২০০ সের, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে

নামাইবে। এই কাথ ছাকিয়া পাক করিতে থাকিবে এবং গাঢ় হইয়া আসিলে, পাত্র নামাইয়া উহাতে বরাংক্রান্তা, মোচরস, আকনাদি, বেলশুঠ, মুখা, ধাইফুল, আতাইব এবং অল্প লৌহ প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—অধতোলা ।

নষ্টপুষ্পান্তক রস । বাতিক ও শৈথিল্য আর্ন্তবৃষ্টি, বাধক ও প্রদর রোগে ইহা মহোপকারী। পৈত্তিক রজোবৃষ্টি, বাধক এবং প্রদরে বিশেষতঃ সান্নিপাতিক প্রদরে উপকারী। যে কোন কারণে আর্ন্তব দূষিত হইলে ইহা প্রয়োগ করা যায়। সর্বপ্রকার যোনিরোগে বিশেষতঃ যোনিশূল, ঋতুকালে-শূল এবং যোনি হইতে নানাবিধ ক্রন্দ নির্গত হইলে, ইহা প্রয়োগে শীঘ্র রোগ বিনষ্ট হয়। অহুপান—আতপচাউলের জল ।

নষ্টপুষ্পাণ্ডকরস । পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকের ৮ তোলা লইয়া কজ্জলী করিবে, অনন্তর লৌহ, বঙ্গ, সোহাগার খৈ, রোপা, অল্প ও ভাষ্যভষ্ম, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া গুলক, ত্রিফলা, দস্তীমূল, শেফালিকাপাতা, কটকারী, দেবদারু, মৈন্ধবলবণ, কুড়, ব্রহ্মী, কাকমাচী, তপসপাত্ৰকা, তালীশপত্র, বেতাগ্র, গোছুর, বাসক-ছাল ও বেড়োলা; ইহাদের রস বা কাথদ্বারা পৃথক পৃথক তিনবার করিয়া ভাবনা দিবে। তৎপর জীবন্তী, বৃষ্টিমধু, দস্তীমূল, লবঙ্গ, বংগলোচন, রাস্না ও গোছুর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ অধতোলা করিয়া উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া পুনর্বার জয়ন্তীপাতার রসদ্বারা মর্দন করিয়া লইবে। বটী ৩ রতি।

প্রদরান্তক রস । বাতিক, পৈত্তিক, শৈথিল্য ও সান্নিপাতিক প্রদরে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। প্রদরের সহিত যুগ্মযুগ্ম জ্বর ও দাহ প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, ইহাতে বেশ উপকার হয়। অহুপান—যজ্ঞদুগ্ধের রস মধু।

প্রদরান্তকরস । পারদ, গন্ধক, বঙ্গ, রোপা, খর্পর ও কড়িভষ্ম প্রত্যেকে অধতোলা এবং লৌহ ওিন তোলা, যুতকুমারীরসে একদিন মর্দন করিবে। বটী ২ রতি।

চন্দ্রাংশুরস । যে কোন প্রকার জ্বরায়ু দোষ, বাধক, যোনিরোগ, যোনিশূল, যোনিকণ্ডু, যোনিবিক্ষেপ, শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদরে ইহা প্রয়োগ করা যায়। ইহা লাল জ্বাফুল অহুপানের সহিত প্রয়োগ করিলে কষ্টরজঃ ও বল্লরজঃ প্রভৃতি রোগে রক্তশ্রাব হয়। সাধারণ অহুপান—জীরার কাথ। হৃতিকারোগেও ইহা প্রয়োগে উপকার হয়।

চন্দ্রাং শুরস । পারদ, গন্ধক, অত্র, লৌহ ও বঙ্গ প্রত্যেকে সমভাগ, দ্বুতকুমারীর রসে মর্দন । বটী ২ রতি ।

অশোকযুত । ইহা রক্তপ্রদরে সমধিক উপকারী । অত্যধিক রক্তশ্রাব হইলে, ইহা প্রয়োগে প্রবল রক্তশ্রাব বন্ধ হয়, তবে শ্রাবের প্রথম অবস্থায় অশোককাথ, পুষ্যাঙ্গুচূর্ণ বা প্রদরারিলৌহ প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া রোগ একটু পুরাতন হইলে, প্রয়োগ করা উচিত । যুত প্রথম অবস্থার ঔষধ নহে এবং জ্বর বা উদরাময়স্বৰ্ঘেও প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে । ইহাই যুত প্রয়োগের সাধারণ নিয়ম, তবে অশোকযুত মন্দায়িতোও প্রয়োগ করা চলে । রক্তশ্রাব বন্ধ করিয়া রোগিণীর দেহ সুস্থ করিতে ইহার শক্তি অসাধারণ । শ্বেত, নীল, কৃষ্ণ ও পীতবর্ণের শ্রাব হইলে, তাহাতেও উপকারী । শ্রাবকালীন বেদনা, কৃষ্ণিবেদনা, যোনিশূল, ক্লেশতা, পাণ্ডুতা, রক্তহীনতা, মন্দায়ি, অরুচি ও কামলা প্রভৃতি প্রদরের বিবিধ উপসর্গ ইহা প্রয়োগে বিনষ্ট হয় । ফলতঃ অতিশয় শ্রাব, দূষিত শ্রাব ও বেদনামুক্ত নানাপ্রকার শ্রাবে ইহা উপকারী । কেহ কেহ ঋতুবন্ধ হইলে ঋতুশ্রাবের জগ্ন ইহা ব্যবস্থা করেন, কিন্তু রজো-নিঃসারণ করিবার শক্তি অশোক যুতের নাই । ইহা পুষ্টি ও বলকর ।

অশোকযুত । গব্যযুত ৪ সের । দ্ব্যাবিধি মুচ্ছাপাক করিবে । কাথাজল-অশোক-মূলের ছাল ২ সের, জল ১৬ সের, শেন ৪ সের । জীরা ২ সের, জল ১৬ সের, শেন ৪ সের । ওতুল জল ৪ সের (একসের আতপচাউল কুটিয়া চারি সের জলে ভিজাইয়া রাখিলে ততুল জল প্রস্তুত হয়) ছাগদুগ্ধ ৪ সের ও কেশরোর রস ৪ সের । কঙ্কহব্য—জীরক, কুম্ভক, বেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঝকি, ব্রুকি, মুগাণী, মাষাণী, জীবন্তী, বট্টমধু, পিয়ালবীজ, পরুণফল, রসায়ন, বট্টমধু, অশোকমূলের ছাল, কিস্মিস্, শতমূলী ও লাল নটের শিকড়, ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা । পাকান্তে শীতল হইলে, ইচ্ছাচিনি এক সের মিশাইবে । চিনি মিশ্রিত না করিলেও কোন ক্ষতি নাই । ভক্ষণ করিবার সময় চিনি মিশ্রিত করিলেই চলে ।

ফলকল্যাণযুত । বক্ষা ও মৃতবৎসা, সন্দ্রপ্রকার জরাযুবিকৃতি, আঠব-দৃষ্টি, বাধক, প্রদর, গর্ভশ্রাব, গর্ভপাত ও যোনিরোগে ইহা প্রয়োগ করা যায় । যোনি হইতে অতি শ্রাব বা ক্লেদযুক্ত শ্রাব, যোনিশূল, কটিশূল ও রক্তহীনতা প্রভৃতি অবস্থায় ইহা মহোপকারী । যে সকল নারীর গর্ভশ্রাব বা গর্ভপাত হয় কিম্বা মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় বা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই প্রাণত্যাগ করে অথবা

বেশী দিন বাঁচে না । ক্ষিপ্রা ক্রম ও হ্রস্বল সন্তান জন্মে, তাহাদের পক্ষে এই ঘৃত অমৃতবৎ উপকারী । ইহা যথারীতি সেবন করিলে, কণ্ঠার পরিবর্তে পুত্রসন্তান জন্মে । অন্নপান—উষ্ণ দুগ্ধ ।

ফলকল্যাণঘৃত । গব্যঘৃত ৪ সের । যথাবিধি মুচ্ছা পাক করিবে । জীবিতবৎসা অথচ একবর্ণা গাভীর দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত ঘৃত লওয়ার বিধান । শতমূলীরস ১৬ সের, দুগ্ধ-১৬ সের । কঙ্কজবা—মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কুড়, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিনি, বেড়েলার মূল, মেদ, ক্ষীরবিদারী, ক্ষীরকাকোলী, অশ্বপুষ্কামূল, যমানী, হরিজা, দারুহরিজা, হিং, কটকী, নীলোৎপল, কুমুদ, জাশা, কাকোলী, চন্দন ও রক্তচন্দন ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা গ্রহণপূর্বক যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে ।—মাত্রা—অর্দ্ধতোলা হইতে এক তোলা ।

বৃহৎ শতাবরীঘৃত । বাতিক ও পৈশিক আর্ন্তবৃদ্ধি, প্রদর, বাধক ও যোনিরোগে ইহা প্রয়োগ করিবে । অন্নপান—গরমদুগ্ধ ।

বৃহৎ শতাবরীঘৃত । গব্যঘৃত ৪ সের । যথাবিধি মুচ্ছা পাক করিবে । শতমূলীরস ৪ সের, দুগ্ধ ৮ সের । কঙ্কজবা—জীবক, অগ্নভক, মেদ, মথমেদ, কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী, মুগাণী, মাষাণী, যষ্টিমধু, পদ্মকার্ঠ, রক্তচন্দন, গোক্ষুর, শূকশিখী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, শলপাণী, চাকুলে, ভুইকুমড়া, ধনন্তমূল, ঞ্জামালতা, চিনি ও গাভারীকল ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা । যথাবিধি পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা—অর্দ্ধতোলা হইতে ১ তোলা ।

সিতকল্যাণঘৃত । বৃহৎ শতাবরীঘৃত যে যে অবস্থায় প্রয়োজ্য, ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োজ্য । ইহা প্রয়োগে বক্ষ্য স্ত্রী গর্ভবতী হয় এবং যোনি-রোগ, প্রদর ও বাধক প্রভৃতি আরোগ্য হইয়া থাকে । অন্নপান—উষ্ণ দুগ্ধ ।

সিতকল্যাণঘৃত । গব্যঘৃত ৪ সের । মুচ্ছা পাক করিবে । গব্যদুগ্ধ ১৬ সের । কঙ্ক-জবা—কুমুদপুষ্প, পদ্মকার্ঠ, বেগারমূল, গম, শালিতুল, (দাদখানি বা আমন তুল) মুগাণী, মাষাণী, ক্ষীরকাকোলী, গাভারীকল, যষ্টিমধু, বেড়েলার মূল, গোরক্ষচাকুলে মূল, নীলোৎপল বা নীলভৃঙ্গি, তালের মাখী, ভুইকুমড়া, শতমূলী, শালপাণী, জীরা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কাঁকড়বীজ ও কাঁচাকলা, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা এবং পাকার্ঘ্য জল ১৬ সের । যথাবিধি ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা—অর্দ্ধতোলা, হইতে ১ এক তোলা ।

কুমারকল্পদ্রুমঘৃত । ইহা সর্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ । স্ত্রী-

রোগোক্ত য্বতের মধ্যে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ । আর্ন্তবৃষ্টিজনিত বক্ষা, জন্মবক্ষা, বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক প্রভৃতি সর্বপ্রকার আর্ন্তবৃষ্টি, যোনিরোগ, প্রদর ও বাধক একটু পুরাতন হইলে ইহা প্রয়োগ করা যায় । যে সকল স্ত্রীলোকের স্রাব-স্রাব বন্ধ থাকে বা অল্প পরিমাণে স্রাব হয়, কিম্বা বেদনা বা কষ্টের সহিত স্রাব হয়, তাহাদের পক্ষে মহোপকারী । বেশী স্রাব হইলে, সেখন অশোক য্বত প্রয়োজ্য, তদ্রূপ অল্প স্রাবে ইহা প্রয়োজ্য । বাহাদের গর্ভপাত বা স্রাব হয় অথবা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই মারা যায় কিম্বা দীর্ঘক্ষীবী হয় না অথবা অগ্নাশ্রু ঔষধ প্রয়োগেও বাহাদের ঐসকল অবস্থার প্রতীকার হয় না, তাহাদিগের পক্ষে ইহা অমৃতের ত্রায় উপকারী । ইহা গর্ভাবস্থায়ও প্রয়োগ করা যায় । অনুপান—উষ্ণ ছাগদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ ।

কুমারকল্পজম্বুত । গব্যদুগ্ধ ৮ সের । যথাবিধি মুচ্ছার্পক করিবে । কাথ্যহ্রব্য— ছাগমাংস ৬০ সের ও দশমূল সমভাগে মিলিত ৬০ সের, জল একশত সের, শ্বেদ-পঁচিশ সের । গোদুগ্ধ ৮ সের, শতমূলীরস ৮ সের । কঙ্কহ্রব্য—কুড় শটী, মেদ, মহা-মেদ, জীবক, শ্বশতক, প্রিয়দ্রু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দেবদারু, তেজপাতা, এলাচি, শতমূলী, গাভারীক্ষল, যষ্টিমধু, ক্ষারকাকোলী, মুখা, নীলশর্দি, জীবন্তী, রক্তচন্দন, কাকোলী, আমালতা, অনন্তমূল, ধেতবেড়োলা, শরপুষ্ণা, ভূমিকুখাণ্ড ও কৃষ্ণবর্ণ ভূমিকুখাণ্ড, মল্লিকা, চাকুলে, শালপাণী, নাগেশ্বর, দারুহরিদ্রা, রেণুক, লতাফটী, শঙ্খপুষ্পী, নীলগুকের মূল, বচ, অণ্ডক, দারুচিনি, লবঙ্গ ও কুড়ুম ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা ; পাকান্তে ছাকিবে এবং শীতল হইলে, কঙ্কজলী ৪ তোলা ও অভ্র ২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে । মাত্রা—অর্দ্ধতোলা হইতে এক তোলা ।

প্রদর, বাধক ও যোনিরোগে—পথ্যাপথ্য ।

প্রদরে বেশী রক্তস্রাব হইলে, পদত্বজে বা যানবাহনে ভ্রমণ একবারে পরিত্যাজ্য । রোগিণীকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিতে দিবে । পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, ময়ূর, মুগ, ছোলা ও অড়হর দাইল, মাগুর, ছোট্ট রুই, চেন্ন ও বেলে-মাছের ঝোল, য্বতে সাঁতলান পটোল, মান, কাচকলা, বেগুণ, খোড়, মোচা, চালুকুমড়া ও মলা প্রভৃতির ব্যঞ্জন, মেঘ, ছাগল ও কুকড়া প্রভৃতির মাংস, উচ্ছে, করলা, বেতাগ্র, হিঞ্জে ও পলতা প্রভৃতির শুক্ক উপকারী । দুগ্ধ সহ্যত দিবে । অন্ন থাকিলে খৈর মণ্ড ও দুগ্ধ বা দুধবার্লি পথ্য দিবে । স্নান সহ-

মত । ভ্রমণ, মৈথুন, রৌদ্র বা অগ্নির তাপ, এবং মাষকলাই, তিল, দধি, সর্ষপ, রসোন, অন্নদ্রব্য ও বেশী লবণ ভক্ষণ ; এই সকল সর্ব্বথা পরিত্যাগ্য ।

গর্ভিণীরোগ-চিকিৎসা ।

স্ত্রী-পুরুষের মিলনেই সৃষ্টি,—দ্বী-পুরুষ লইয়াই জীবজগৎ । স্ত্রীপুরুষ-বাতীত সৃষ্টিকার্য্য চলিতে বা বিধ্বস্তপ্রাপ্ত থাকিতে পারে না । জীবজন্তুর তো কথাই নাই, উদ্ভিদের উৎপত্তিও স্ত্রী-পুরুষ-মিলন সাপেক্ষ । সৃজন-কার্য্যে পুরুষ জনক ও স্ত্রী জননী ।

যৌবন । যৌবনে মানবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাধারণতঃ *কৃষ্টপুষ্ট, বর্দ্ধিত এবং মানসিক বৃত্তিসমৃদ্ধ ক্ষুদ্রিতপ্রাপ্ত ও তৎসঙ্গে কামেচ্ছা স্বভাবতই বলবতী হইয়া থাকে । পুরুষের নানাস্থানে লোম উদ্গত হয়, কিন্তু স্ত্রীলোকের স্তন্যদগম, যোনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং যোনি ও বস্তিদেশে লোম উদ্গত হয়, পরন্তু গুণন ক্রমশঃ পীনোন্নত হইতে থাকে । বালিকা যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, বালিকা-স্থূলভঙ্গ্য এবং পুরুষের সংস্রব ত্যাগ করে ও লজ্জাশীলা হয় ।

ঋতু বা স্ত্রীধর্ম্ম । প্রথম রজোশ্রাবকে, ঋতুদর্শন বা পুষ্পদর্শন কহে । রজঃ, আর্দ্রব, পুষ্প ও ঋতু একার্থবোধক । এই রজঃ জরায়ুকোষ হইতে নির্গত হয় ।

প্রথম ঋতুদর্শনের কাল । দেশ, কাল ও শরীরাবয়বের তারতম্য-বশতঃ ঋতুদর্শনের সময়ের তারতম্য ঘটিয়া থাকে । শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের স্ত্রীদিগের অল্প বয়সে প্রথম ঋতুদর্শন হয় । এতদেশের বালিকাগণের প্রায় ১১ হইতে ১৪ বৎসরের মধ্যে ঋতু প্রকাশ পায় । ভোগ-বিলাসিনী বালিকাদিগের কিম্বা বলিষ্ঠা ও স্থূলকায়গণের ইহা অপেক্ষাও অল্প বয়সে ঋতুপ্রকাশ পায় । এতদপেক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আরও অল্প বয়সে এবং শীতপ্রধান দেশে অধিক বিলম্বে ঋতুপ্রকাশ পাইয়া থাকে । প্রথম রজঃ প্রবর্ত্তিত হইবার পর প্রায় চন্দ্রিণ পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিমাসে একবার করিয়া শ্রাব হয় ও তাহার পর বন্ধ হইয়া যায় । মাসিক ঋতুর প্রারম্ভে

বস্ত্রিদেহে ভারবোধ ও রতিসন্তোগেচ্ছা বলবতী হয়।' কিন্তু কাহারও বা ঋতুর সময় কোন প্রকার অসুখই বোধ হয় না এবং কাহারও বা কমবেশী যন্ত্রণা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ২০।২১ দিন হইতে ২৭।২৮ দিন অন্তর ঋতুস্রাব হয়। এই আর্তব ও শুক্রদ্বারা গর্ভসঞ্চারণ হয়। গর্ভাবস্থায় স্রাব হয় না, কারণ আর্তববাহিনী নাড়ী গর্ভদ্বারা আবৃত থাকে। ঋতুদর্শনের দিন হইতে ক্রমাগত যোলদিল পর্য্যন্ত জরায়ু বা গর্ভাশয়ের মুখ বিস্তৃত থাকে এবং ঐ সময়ের মধ্যেই গর্ভসঞ্চারণ হয়, কিন্তু যোল দিন পরে জরায়ুর মুখ সম্বৃচিত হইয়া যায় বলিয়া তৎকালে মৈথুন করিলেও গর্ভসঞ্চারণ হয় না।

গর্ভসঞ্চারণ ও তত্ত্বনিত উপসর্গ। যেমন দিবাভাগে পদ্ম প্রফুল্লিত হয় এবং দিবা অবসানে অর্ধাং সন্ধ্যা হইলে, আবার মুদিত হয়, তদ্রূপ ঋতুদর্শনের প্রথম দিবস হইতে যোলদিবস পর্য্যন্ত জরায়ু অর্ধাং গর্ভাশয়ের মুখ বিস্তৃত থাকে ও তৎপরে আবার সম্বৃচিত হয়। সুতরাং ঐ যোলদিবস পর্য্যন্ত গর্ভাধানের সময়। পুরুষেরও শুক্র স্থলিত হইয়া গর্ভাশয়ের মুখে পতিত হইলে, আর্তবের সহিত মিলিত হইয়া গর্ভসঞ্চারণ হয়। গর্ভসঞ্চারণ হইলে ঋতুস্রাব বন্ধ, বিনাশ্রমে শান্তিবোধ, উরুদেশের অবসন্নতা, পিপাসা এবং শরীরের শ্লানি ও যোনিদ্রবিরূপ হওয়া, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। অনন্তর ক্রমশঃ স্তনাগ্রভাগের রক্তবর্ণতা, অক্ষিপল্লবদ্বয়ের নিম্নীলন, স্খাণ্ড ভকণেও বমনভাব বা বমন, স্নগন্ধগ্রহণে উদেগ, মুখ হইতে জল উঠা ও শরীরের অবসন্নতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের আকৃতি, শঙ্খনাভির আকৃতির তায়, তিনটি আবর্ভ (প্যাচ) বিশিষ্ট, ইহার শেষ অর্ধাং তৃতীয় আবর্ভে জরায়ু বা গর্ভাশয় অবস্থিত। গর্ভাশয়ের আকৃতি রোহিতমৎস্তের মুখের তায়। রোহিত মৎস্ত যেরূপ জলে অবস্থান করে, তদ্রূপ পিত্তাশয় ও পক্ষাশয়ের মধ্যে জরায়ু অর্ধাং গর্ভকোষ অবস্থিতি করে এবং রোহিতমৎস্তের মুখের বহির্ভাগ যেমন অল্প ছিদ্রবিশিষ্ট অথচ মুখের অভ্যন্তর অধিক বিস্তৃত, তদ্রূপ গর্ভাশয়ের মুখ ক্ষুদ্র, কিন্তু মধ্যের বিস্তৃতি অধিক।

শুক্র ও আর্তব গর্ভাশয়ে যেরূপ ভরলভাবে পতিত হয়, প্রথম মাসে সেই-রূপই থাকে কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না।

দ্বিতীয় মাসে সেই শুক্র ও শোণিত বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা দ্বারা পচ্যমান হইয়া গাঢ় অর্থাৎ ঘন হয় ।

তৃতীয় মাসে হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মস্তক এই পাঁচটি অবয়বে পাঁচটি স্থল পিণ্ড জন্মে এবং তাহাতে অঙ্গের অবয়বসকল স্বল্পভাবে অবস্থান করে ।

চতুর্থমাসে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিস্কৃত হয় এবং হৃদয় জন্মে ও চেতনা-সঞ্চার হয় ।

পঞ্চমমাসে মন ও ষষ্ঠমাসে বুদ্ধি জন্মে । সপ্তমমাসে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুহ স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পায় । অষ্টমমাসে জগৎ-দেহে ওজোধাতু জন্মে । অষ্টমমাসের পর অর্থাৎ নবমমাস হইতে প্রসবের কাল ।

গর্ভিণীর রসবাহিনী নাড়ী গর্ভস্থ সন্তানের নাভিনাড়ীর সহিত সংলগ্ন থাকে, একারণ গর্ভিণী মাতার আহারাদি অর্থাৎ ভোজন, নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস, ভ্রমণ ও নিদ্রা প্রভৃতি দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানের আহারাদি কার্য্য সম্পন্ন হয় ও তাহাতেই সন্তান জীবন ধারণ করে এবং দৃষ্টপুষ্টি, বলিষ্ঠ ও বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ।

সতর্কতা ।

গর্ভাবস্থায় সতর্কভাবে পরিশ্রম বা ভ্রমণাদি নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু অসতর্ক ভাবে ভ্রমণ এবং ভারবহন প্রভৃতি নিষিদ্ধ । ভ্রমণ, শয়ন বা উপবেশনকালে যাহাতে পদাঙ্গুলন প্রভৃতি না হয় এবং তজ্জন্ত গর্ভাশয়ে আঘাতাদি না লাগে, সে বিষয়ে খুব সতর্ক হওয়া উচিত । অরণ্য রাখা উচিত যে কি দ্রব্য, কি পুরুষ অঙ্গ-চালনা বা পরিশ্রম না করিলে, শারীরিক যত্নাদি ক্রমশঃ শিথিল ও অকস্মাৎ হইয়া পড়ে, ভুক্তদ্রব্য স্বচাকুরূপে জীর্ণ হয় না ও তজ্জন্ত নানাবিধ ব্যাধি উপস্থিত হয় ।

শরীর, মন ও পরিশ্রম । গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর শরীর সুস্থ এবং মন যাহাতে প্রফুল্ল থাকে, তৎপ্রতি এবং আহার বিহারাদির প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখা উচিত । মিষ্ট অথচ শিথিল প্রীতিপ্রদ, তরল, লঘুপাক ও অগ্নিবর্দ্ধক পানভোজন গর্ভিণীর পক্ষে উপকারী । অধিক শ্রমজনক কর্ম্ম করা, কিম্বা এককালে বসিয়া থাকা উভয়ই দোষের । একবারে পরিশ্রম না করিলে, মন প্রফুল্ল থাকে না, পরন্তু নানাপ্রকার কুচিন্তা উপস্থিত হয়, তবে যাহাতে

পদঞ্চলন না হয় এবং গর্তে আঘাত না লাগে, তদ্রূপভাবে গর্তিণীর কায়কর্ম ও ভ্রমণ করা কর্তব্য । যাঁহারা গর্তিণীকে একেবারে বসিয়া থাকিতে পরামর্শ দেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই মিত্ররূপী শত্রু । অলসভাবে বসিয়া থাকিলে, প্রসব-বেদনায় গর্তিণীকে অভিভূত হইতে হয় । ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণের জন্য বেশী প্রয়াস পাইতে হইবে না, যে সকল গর্তিণী যত অধিক বিলাসিতায় কালাহরণ করেন, তাঁহারাই প্রসবে তত অধিক কষ্ট পাইয়া থাকেন, পক্ষান্তরে শ্রম-জীবী-সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকেরা আসন্নপ্রসব অবস্থায়ও যথারীতি দৈনিক কর্মে লিপ্ত হইয়া থাকে । এমনও অনেক দেখা যায়, হয়ত দুই চারিক্রোশ ব্যবধানে কর্মস্থল, কর্মস্থলে যাওয়ার পূর্বে প্রসবের কোনও লক্ষণ উপস্থিত হয়-নাই, গর্তিণী যথারীতি কর্মস্থলে গিয়া স্বীয়কার্য্য পূর্ব্বং করিতেছে, কিন্তু দেখিতে দেখিতে প্রসব-বেদনা উপস্থিত ও সঙ্গে সঙ্গে প্রসব করিয়াছে । এই সকল ঘটনা দেখিয়া গর্ভাবস্থায় বসিয়া থাকা উচিত কিনা বেশ বুঝা যায় ।

অকরণীয় । গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত বা অসতর্কভাবে পরিশ্রম, উপবাস, পুরুষ-সহবাস, রাত্রি-জাগরণ, শোক, হস্তী ও অশ্বাদি যানে আরোহণ, মল-মূত্রাদির বেগ-ধারণ, বিপরীতভাবে শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ এবং উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা বা চীৎকার করা, অধিক তৈল মর্দন, কঠিন শয্যায় কিম্বা উচ্চস্থানে শয়ন প্রভৃতি পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য ।

পীড়া । গর্ভাবস্থায় নানা প্রকার রোগ উপস্থিত হয় । সময় সময় ঐ সকল রোগ এতই প্রবল হয় যে, গর্তিণীর জীবন-নাশের আশঙ্কা উপস্থিত বা মৃত্যু হইয়া থাকে । বমন, গর্ভাশূল, দণ্ডাশূল, দণ্ডাক্ত, লালানিঃসরণ, জ্বর, উদরাময়, শ্বাসকষ্ট, শিরঃপীড়া, গ্রন্থী, অতীসার, রক্তাতীসার, অগ্নিমান্দ্য, আলস্য, দুর্দলতা, আমাশয় ও রক্তামাশয়, শোথ, আক্ষেপ, দাহ, মূত্রকৃচ্ছ, কোষ্ঠকাঠিন্য, বোনিশূল, বোনিপ্রদাহ, বোনিকণ্ড, পিপাসা, গদ্যশ্রাব বা গর্ভপাত প্রভৃতি কতকগুলি রোগ আহারবিহারাদির অনিয়মে প্রকাশ পাইয়া থাকে ; স্বভাবতঃ বমনাদি যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা গর্ভসঞ্চার বশতঃ শরীর ও মনের অবশেষতাবী পরিবর্তনের ফল অর্থাৎ ঐসকল উপসর্গ গর্ভসঞ্চারের লক্ষণরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে । স্বভাবতঃ স্ত্রীলোকের মাসে মাসে ঋতু স্রাব হয়, কিন্তু গর্ভ-সঞ্চার হইলে, স্রাব বন্ধ হয় এবং স্রাব বন্ধ হইলে, বিনা পরি-

শ্রমে শ্রমবোধ, উষ্ণ ও শরীরের অবসন্নতা, পিপাসা, শরীরের গ্লানি, যোনি-
ক্ষরণ, মুখ হইতে জল বা লাল-নিঃসরণ, মুখাচ্ছ বা মুগন্ধ গ্রহণেও বমনভাব
বা বমন এবং অত্যধিক অলসতা প্রভৃতি লক্ষণগুলি ক্রমশঃ প্রকাশ পায়,
কিন্তু তাহা হইলেও এই সকল লক্ষণ প্রবলভাবে প্রকাশ পাইলে, যথারীতি
চিকিৎসা করিতে হয়, না করিলে, গর্ভস্রাব হইতে পারে। বমনের আধিক্য
বশতঃ গর্ভস্রাব হওয়া সম্ভবিক সম্ভাবনা। এতদ্ব্যতীত অতিরিক্ত মৈথুন ও
অধিক পরিশ্রম, অসতর্কভাবে বা দ্রুতবেগে ভ্রমণ এবং আহাৰাদির অনিয়মেও
নানাপ্রকার লক্ষণ উপস্থিত বা গর্ভস্রাব হইতে পারে।

গর্ভপাতের কারণ। গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত মৈথুন, ভ্রমণ, দ্রুতগামী-
যানে বিচরণ, পরিশ্রম, পীড়ন (টেপাটিপি), জ্বর, উপবাস, উচ্চস্থান হইতে
পতন, আঘাত, অজীর্ণ, দ্রুতবেগে গমন, বমন, বিরেচন, কুহন (কৌথ-
দেওয়া), যাহাতে গর্ভস্রাব হইতে পারে এরূপ দ্রব্য ভক্ষণ বা যোনিরদ্বা-
প্রবেশ করান, মল মূত্রাদির বেগ ধারণ, উৎকট বা বিষমভাবে উপবেশন বা
শয়ন এবং তীক্ষ্ণ ও রুদ্ধগুণবিশিষ্ট বা উষ্ণবীৰ্য্য এবং কটু ও তিক্তরসযুক্ত
দ্রব্য অধিক ভোজন; এই সকল কারণে গর্ভপাত বা গর্ভস্রাব হয়। এতদ্ব্য-
তীত কিরঙ্গ বা বিষাক্ত মেহ থাকিলেও গর্ভস্রাব হয়। পরন্তু আজকাল যেন
অধিকাংশ স্থলে ঐ দুই কারণেই গর্ভস্রাব হইয়া থাকে।

গর্ভপাতের পূর্বলক্ষণ। গর্ভপাত হইবার পূর্বে যোনিদ্বার হইতে
বেদনার সহিত রক্ত নির্গত হয়।

গর্ভস্রাবের কাল। গর্ভসঞ্চারের সময় হইতে চারি মাস অবধি
(পর্য্যন্ত) রক্ত তরল অবস্থায় থাকে, সুতরাং চারি মাসের মধ্যে স্রাব হইলে,
রক্তই স্রাব হয়, এদ্বারা উহাকে গর্ভস্রাব কহে, কিন্তু চতুর্থ মাসের পর গর্ভ
স্থিতিভাবাপন্ন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বিশিষ্ট হয় বলিয়া পঞ্চম, ষষ্ঠ বা তদধিক মাসে
পতিত হইলে, তাহাকে গর্ভপাত বলে।

গর্ভপাতের উদাহরণ। যেমন পাকা ফল আঘাতাদিপ্রাপ্ত হইলে,
বৃত্তচ্যুত হইয়া বৃক্ষ হইতে পতিত হয়, তদ্রূপ ভলপেটে কোন প্রকার আঘাত,
বিষমভাবে উপবেশন অথবা পীড়নাদি দ্বারা গর্ভপাত হইয়া থাকে।

গর্ভপাতের উপদ্রব । গর্ভপাত হইলে, রোগিণীর দাঁহ, পার্শ্বশূল, পৃষ্ঠ-বেদনা, প্রদর, আনাহ এবং মূত্র-রোধ প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায় । গর্ভ কোন কারণে স্থানান্তরিত হইয়া স্থানান্তরিত হইলে, আমাশয় ও প্ৰকাশয়ের ক্ষুধা এবং উক্ত পার্শ্বশূলাদি উপসর্গ প্রকাশ পায় ।

অকাল প্রসবের লক্ষণ । সপ্তম মাসে গর্ভস্থ জ্ঞান চেতনাশক্তি প্রাপ্ত হয়, তৎকালে গর্ভিণী কোন প্রকার আঘাত বা ভয়প্রাপ্ত হইয়া সন্তান প্রসব করিলে, তাহাকে অকাল প্রসব কহে ।

নাগোদর গর্ভের লক্ষণ । বায়ুর অত্যধিক প্রকোপবশতঃ গর্ভাশয়স্থ জ্ঞান ক্রমশঃ শুকাইয়া কঠিন হইলে, তাহাকে নাগোদর গর্ভ কহে । এই রোগে গর্ভিণীর আশ্রয় প্রকাশ পায় ।

গর্ভিণীরোগ-চিকিৎসা-বিধি ।

গর্ভিণীর বমনেচ্ছা বা বমন প্রকাশ পাইলে, প্রথমতঃ নানাবিধ মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করা কর্তব্য । প্রথম অবস্থায় প্রাণবল্লভরস অতি উপকারী । ইহা কেবল বমনের ঔষধ নহে, বাতপিভাদিক সমস্ত রোগে অল্পপানভেদে প্রয়োগ করা যায় । ইহাতে উপকার না হইলে জ্বররোগোক্ত চন্দ্রকান্তিরস প্রয়োগ করিবে । এই সকল ঔষধ গর্ভিণীর জ্বর সহ্যে বমন হইলেও প্রয়োগ করা যায় । তুষায় ধনে ও মৌরী ভিজান জলসহ দিবে । বমনের সহিত কোষ্ঠকাঠিন্য, জ্বর, কাস, শ্বাস ও হিকা থাকিলে, বাসাকাথ এক বেলা দিবে । এই দুই প্রকার ঔষধে বমনেচ্ছা বা বমন প্রশমিত না হইলে, বমনরোগোক্ত পিঙ্গল্যাঙ্ঘ-লৌহ ব্যবস্থা করিবে । জ্বর, শ্বাস, কাস, অরুচি, দাঁহ, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতিও ইহাতে বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

গর্ভিণীকে ঔষধ প্রয়োগ করিতে কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখা কর্তব্য । ঔষধটি উৎকট তিক্ত বা বিষাদ না হয়, কারণ ঐরূপ ঔষধ প্রয়োগে গর্ভপ্ৰসব হইতে পারে । গর্ভিণীর যে কোন রোগে শ্বাস ও হিকা প্রকাশ পাইলে, শূল্যাদিচূর্ণ ও অষ্টাঙ্গাবলেহ প্রয়োগ করিবে ।

উৎকট অর্গসিল্পের একরতি বা দুইরতি মাত্রায় অল্পপান-ভেদে প্রসূতির যে-কোনরোগের প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করা যায় । বমিতে পটোলের রস, বেদা-

নার রস কিম্বা ডালিমের রস ও মধু বা শশার বাচির শাস বাটা ও স্তনদুগ্ধসহ, বমি ও কোষ্ঠকাঠিন্যে ডাবের জলে ঠৈ ভিজাইয়া সেই জল সহ, তৃষ্ণায় বেদনার রস বা মনে মৌরীর জলসহ, মাথা ঘুরিলে, আমলকী ভিজান জলসহ বা শতমূলীর রস সহ, শ্বাশ্রুদাহ ও যোনিপ্রদাহে গুলঞ্চের রস বা নালিতা অথবা পাটপাতা ভিজান জলসহ কিম্বা পলতার রসসহ দিবে। কোষ্ঠকাঠিন্যে তীব্র বিরচন কদাপি প্রয়োজ্য নহে। প্রথমে গোলাপফুল ও কিসমিস বাটা প্রয়োগ করা উচিত, তদভাবে বা তাহাতে উপকার না হইলে, ক্যাণ্ডরঅয়েল প্রয়োগ করা যায়। জ্বরোগোক্ত বিরচনযোগ প্রয়োগ করিলেও চলে। মন্দাঘি বা বাতাজীর্ণে বৃহৎ অগ্নিকুমার বা ভূবনেশ্বর উষ্ণ জলসহ দিবে। অতীসার বা প্রবাহিকার অতীসারোক্ত লবঙ্গাদি বা বৃহৎ লবঙ্গাদি, জাতীফলরস অথবা জ্বরচিকিৎসোক্ত সর্কাদ্রনুন্দর বা মহাগন্ধক মুখার রস ও মধুসহ অথবা লবঙ্গাদিচূর্ণ প্রয়োগ করিবে। জ্বরাতীসারে জ্বরাতীসারোক্ত অমৃতার্ণব মুখার রস ও পিপুলচূর্ণসহ দিবে। রক্তাতীসার ও রক্তপ্রবাহিকার অতীসারোক্ত কুটজাবলেহ বা কুটজাষ্টক ছাগদুগ্ধ সহ দিবে। অতীসার বা আমাশয়ে অল্প রক্ত নির্গত হইলে, সর্কাদ্রনুন্দর বা মহাগন্ধক লালনটের মূল বা কুড়তীর ছালের রস সহ প্রয়োগ করিলেও চলে। প্রবল অতীসার বা গ্রহণীতে জীরকাদি মোদক, বৃহৎ জীরকাদি মোদক বা মৃণ্ডকাদিমোদক ব্যবহার করা যায়। এতদ্ব্যতীত অবস্থা-ভেদে ঐ সকল রোগোক্ত নানাবিধ কাথও প্রয়োগ করা যায়। প্রবল অরুচি হইলেও অত্যন্ত অল্প খাইতে দিবে না। অতি পুরাতন তেঁতুল ও আমরুল শাকের টক দিবে। জ্বরোগোক্ত আমলাদ্য-যোগ ব্যবস্থা করা যায়। অগ্নিপিত্তের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অন্নান্নি বা খেতচূর্ণ প্রয়োগ করিবে। জ্বর এবং তৎসঙ্গে কাস, শ্বাস ও বক্ষঃস্থলে বেদনা প্রকাশ পাইলে, জ্বরোগোক্ত দশমূলকাথ দিবে। জ্বরে বা ঠাণ্ডা লাগিয়া বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা আবদ্ধ অথবা বক্ষঃস্থল শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত হইলে, মধু ও সৈন্ধব লবণ একত্র করিয়া তাহা অঙ্গুলিতে মাখাইয়া সেই অঙ্গুলি দ্বারা রোগিণীর জিহ্বা আন্তে আন্তে ঘর্ষণ করিবে, ইহাতে শ্লেষ্মা বাহির হইবে এবং দশবৎসরের পুরাতন স্রুত পানে মাখাইয়া সেই পান গরম করিয়া বক্ষঃস্থলে পুনঃ পুনঃ স্বেদ দিবে ও তিসি বা মসিনার পুলটিস্ প্রয়োগ

করিবে কিন্তু কখনও বমন করাইবে না, গর্ভাবস্থায় বমনের ঔষধ প্রয়োগ করিলে, গর্ভশ্রাব হইতে পারে । শিরঃপীড়া, মুখ হইতে লাল নিঃসরণ বা সর্সদা থুথু ফেলা, দন্তশূল, দাঁতের মাটীর ক্ষীতি ও দন্তক্ষত প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, কফরোগোক্ত কঙ্কচিষ্টামণি, জরচিকিৎসোক্ত স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস বা বাতব্যাধিরোগোক্ত নারদীয় মহালক্ষ্মীবিলাস, বৃহৎ নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস বা লক্ষ্মীবিলাস ব্যবস্থা করিবে । শিরোরোগের সহিত জ্বর এবং অগ্নাত্ত বাত-শ্লৈশ্মিক উপসর্গ কিম্বা জ্বরের সহিত শিরঃপীড়া থাকিলে, তাহাও ঐ সকল ঔষধে দূরীভূত হয় । দন্তশূল ও দন্তক্ষীতিতে আদার রসের কুলি প্রশস্ত ।

গর্ভাবস্থায় শোথ একটি প্রধান উপসর্গ, শোথের জন্ত শোথরোগোক্ত পুনর্ব্যাষ্টক ক্কাথ ও পুনর্বাদিচূর্ণ ব্যবস্থা করিবে । শোথের সহিত জ্বর, পাণ্ডু, এবং কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, তাহাও উহাতে বিনষ্ট হয় । শোথের সহিত পাণ্ডু ও কামলার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, দার্ক্যাদিলোহ প্রয়োগ করিবে । এই অবস্থায় নবায়সলোহ অতি উপকারী, কিন্তু উহা রক্তচিতা সংযুক্ত বলিয়া সকলে ব্যবস্থা করেন না । রক্তচিতা জরায়ুর উপর ক্রিয়া করে, স্ততরাং উহা প্রয়োগে যদিই বা গর্ভশ্রাব হয়, ইহাই তাঁহাদের আশঙ্কা । আবার কেহ কেহ প্রয়োগও করেন, তাঁহারা বলেন কেবলমাত্র রক্তচিতার প্রয়োগই অনিষ্টকর, কিন্তু এতগুলি ঔষধসংযুক্ত রক্তচিতা কোনও অনিষ্ট করিতে পারেনা, বাস্তবিক প্রয়োগ করিয়া কুত্ৰাপি অনিষ্ট সংঘটিত হইতে দেখা যায় নাই । শোথ প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, পাণ্ডু, কামলা ও উদরাময় থাকিলে এবং অগ্নাত্ত ঔষধে উপকার না হইলে, পর্গটী প্রয়োগ করিবে । পাণ্ডু, কামলা, শোথ ও উদরাময়ে পাণ্ডু ও কামলারোগোক্ত লোহপর্গটী বা পঞ্চা-মৃত পর্গটী কিম্বা ঐ সকল লক্ষণের সহিত উদরী থাকিলে উদররোগোক্ত স্বর্ণ-পর্গটী প্রয়োজ্য । অরবিকারে জ্বররোগোক্ত কন্তুরীভূষণ, কন্তুরীভৈরব বা বৃহৎ কন্তুরীভৈরব প্রভৃতি অবস্থাভেদে ব্যবস্থা করিবে ।

যক্লং থাকিলে, যক্লদরিলোহ এবং প্রীহা থাকিলে শুড়পিপ্ললী ব্যবস্থা করিবে । রক্তপিত্তের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রক্তপিত্তরোগোক্ত এলাদিগুড়িকা ও অগ্নাত্ত যোগ প্রয়োগ করিবে ।

গর্ভশূল ও রক্তশ্রাব । গর্ভশূল গর্ভাবস্থায় একটি প্রধান উপসর্গ ।

গর্তাবস্থায় গর্তগূল প্রকাশ পায়, তাহা সকলেরই জানা আছে, কিন্তু প্রতিমাসে ঐরূপ বেদনা কেন হয়, তাহা অনেকেরই জানা না থাকিতেও পারে। জ্বরিগের মাঘে মাসে একবার করিয়া ঋতু স্রাব হয়, ইহা স্বাভাবিক। ঋতুস্রাবের সময় হইলে, জরায়ুর দ্বার প্রসারিত হয়, আবার ষোলদিন পরে সঙ্কুচিত হইয়া যায়। সুতরাং গর্তাবস্থায় ঋতুস্রাব বন্ধ এবং জরায়ুর দ্বার সঙ্কুচিত থাকিলেও যাহার যতদিন পরে ঋতুস্রাব হওয়ার নিয়ম, সেই সময় উপস্থিত হইলেই, জরায়ু বা গর্তাশয়ে বেদনা উপস্থিত হয়, পরন্তু গর্তসঞ্চারের পত্র ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া স্বাভাবিক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হইলেও, প্রকৃতিগত সঙ্কোচন ও প্রসারণের ভাব এককালে দূরীভূত হয় না, সুতরাং কাহারও কাহারও অল্প ঋতু স্রাব হইতে দেখা যায়, তবে উহা অবশ্যই শুভ লক্ষণ নহে, এবং তজ্জন্মই মাসে মাসে স্রাবের আশঙ্কা নিবারণের জন্য মাসে মাসে ঔষধ প্রয়োগের বিধি আছে। কারণ অল্প অল্প স্রাব কিছু দিন হইতে থাকিলে, অকস্মাৎ বেশী স্রাব হইয়া গর্ত নষ্ট হইতেও পারে; যেহেতু যোনিদ্বার হইতে রক্তস্রাব গর্তপাতের পূর্বলক্ষণ।

গর্তগূল উপস্থিত হইলে, তন্নিবারণের জন্য কুশমূল, কেশে মূল, ভেরেণ্ডার মূল ও গোক্ষুর ইহাদের কাথ অথবা গুঁঠ, যষ্টিমধু ও দেবদারুর কাথ পান করিতে দিবে। মূত্ররুদ্ধ বা মূত্ররোধ, দাহ, পিপাসা ও রক্তস্রাব হইলে, কিম্বা গর্ত স্থানচ্যুত হইলে, তৃণপঞ্চমূলক্ষীর পান করিতে দিবে। জরায়ু হইতে রক্তস্রাব পূর্বোক্ত কারণেও হয়, আবার সন্তান অপেক্ষাকৃত শীঘ্র বর্জিত হইলে কিম্বা ২। ৩টি সন্তান একবারে জন্মিলে, জরায়ুতে অধিক চাপ লাগিয়া তাহার গাত্রাবরণ বিদীর্ণ হইলেও হয়। রক্তস্রাব হইলে, উৎপলাদিকাথ সেবন করাইবে। গর্ত স্থানচ্যুত হইলে এবং তজ্জন্ম দাহ, রক্তস্রাব ও বেদনা প্রকাশ পাইলে, হ্রীবেবাদিকাথ বা বৃহৎ হ্রীবেবাদিকাথ ব্যবস্থা করিবে।

গর্তগীর জ্বর হইলে, এরণ্ডাদিকাথ অথবা জ্বররোগোক্ত স্নগপঞ্চমূলকাথ বা দশমূল কাথ প্রভৃতি বাতাদি দোষভেদে প্রয়োগ করিবে। জ্বরের প্রথম অবস্থায় কফরোগোক্ত কফচিন্তামণি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা সর্বদা ব্যবহার্য্য, সুতরাং নির্বিচারে প্রয়োগ করা যায়। তাহাতে উপকার না হইলে, গর্তবিনোদ রস বা গর্তচিন্তামণি প্রয়োগ করিবে। ঐ ঔষধে বিশেষ উপকার

না হইলে, অথচ জ্বর পুরাতন ও ধাতুগত হইলে, স্বল্প গর্ত্তচিন্তামণি, বৃহৎ গর্ত্তচিন্তামণি বা গর্ত্তপীষুবল্লী প্রভৃতি অথবা জ্বররোগোক্ত জয়মঙ্গল রস প্রভৃতি জ্বরনাশক ঔষধসকল অবস্থাভেদে ব্যবস্থা করিবে ।

গর্ত্ত সঞ্চার হইলে, অন্ততঃ একটি ঔষধ রীতিমত প্রত্যহ সেবন করান কর্তব্য, তাহা হইলে প্রায়শঃ কোন উপসর্গ উপস্থিত হয় না, তবে যাহারা নীরোগ ও সুস্থ, তাহারা সেবন না করিলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু যাহাদের গর্ত্ত সঞ্চার হইলেই নানা উপসর্গ উপস্থিত বা গর্ত্তপাত হয়, তাহাদের পক্ষে ঐরূপ একটি ঔষধ ব্যবহার নিতান্ত কর্তব্য । বিশেষতঃ গর্ত্তাবস্থায় বাতপ্রধান-শরীরে বায়ু, পিত্তপ্রধান শরীরে পিত্ত ও শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে শ্লেষ্মার প্রকোপ সমধিক প্রকাশ পায়, ইহাই স্বাভাবিক, সুতরাং তাহা নিবারণের জ্ঞাত ঔষধ-প্রয়োগ কর্তব্য । বাতপ্রধান শরীরে আক্ষেপ, পিত্তপ্রধান শরীরে দাহ, পাণ্ডুতা, শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে গাত্র-গুরুতা ও শোথ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইবেই ; সুতরাং ঔষধ প্রয়োগ ব্যতীত গর্ত্তিণীর সুস্থ শরীরে থাকা অসম্ভব । বায়ু, পিত্ত বা শ্লেষ্মার প্রকোপে সাধারণতঃ দশমূলকাথ প্রয়োগ করিলেই চলে । বাতশ্লেষ্মার প্রকোপে গাত্রবেদনা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে বাতব্যাধিরোগের বৃহৎ বাতগজাচ্ছুশ, পিত্তাশ্রিত বাতে অর্থাৎ বায়ুর ক্রমবস্থায় চিন্তামণিচতুর্মুখ, পিত্তাধিক শরীরে অল্পপিত্তরোগোক্ত গুড়চ্যাদিলোহ প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায় । বাতশ্লেষ্মার আধিক্যে শিরঃপীড়া হইলে কিম্বা শ্লেষ্মার আধিক্য বশতঃ মুখ-প্রসেক ও গাত্রগুরুতা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, বাতব্যাধিরোগোক্ত নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস বা কফচিন্তামণি প্রয়োজ্য ।

বায়ুপ্রধান শরীরে অথবা বায়ুবর্দ্ধক আহার দ্বারা গর্ত্ত শুদ্ধ না হয়, তৎ-প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা কর্তব্য । কোন কোন গর্ত্তিণীর গর্ত্ত এইরূপে অসা-বধানতাবশতঃ শুকাইয়া কঠিন হয় এবং তাহাতে জীব সঞ্চার হয় না, পরন্তু বায়ুর অত্যধিক প্রকোপ বশতঃ কখনও কখনও প্রবল আগ্নান উপস্থিত হয়, আবার কখনও কখনও বায়ুর প্রকোপ হ্রাস পাইলে, আগ্নান স্বতই হ্রাস পায় । ইহাকে নাগোদর গর্ত্ত কহে । এই অবস্থায় কোন কোন স্থলে জনরব প্রচারিত হয় যে, ভূতে সন্ধান অপহরণ করিয়াছে ! ইহাতে বাতব্যাধিরোগোক্ত বায়ুনাশক মাষবলাদি কাথ ও চিন্তামণিচতুর্মুখ এবং তৎসঙ্গে পুষ্টিকর খাদ্য

ব্যবস্থা করিবে। মুখ হইতে অধিক লাল নির্গত হইলে, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচের কাথের কুলি করিতে দিবে, এই অবস্থায় বৃহৎ গৰ্ভচিস্তামণি অসাধারণ উপকারী। নান্দোদর গৰ্ভের চিকিৎসা করিতে হইলে, অগ্রে পরীক্ষা করা আবশ্যিক। চতুর্থ মাসেই জন্মের চেষ্টনা জন্মে, সূতরাং জন্ম সচেতন কি অচেতন তাহা স্বাভাবিক অঙ্গ চালনা দ্বারা পঞ্চম মাস হইতেই বিলক্ষণ অনুভব করা যায়। যদি নিতান্তই সন্দেহ উপস্থিত হয়, শিক্ষিতা ধাত্রী দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া নিঃসন্দেহে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া যায়। নবম বা দশম মাস সাধারণতঃ প্রসবের কাল, সূতরাং ঐ সময়ের মধ্যে প্রসব না করিলে, পরীক্ষা করিবে। শুষ্ক গৰ্ভ নিষ্কাশনের জন্ত যোনিরোগোক্ত রজঃপ্রবর্তনীবাটী স্থানিক প্রয়োগ করিবে। এই সকল ঔষধ প্রয়োগে শুষ্ক গৰ্ভ কোমল হইলে, গৰ্ভ পাতকায়ক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

এই অবস্থায় বিশেষ বিবেচনার সহিত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। কতকগুলি ঔষধ সাধারণতঃ অত্যধিক উগ্র, সূতরাং তাহা প্রয়োগ করিলে রোগিণীর যন্ত্রণার সীমা থাকে না, পরন্তু অধিকাংশ স্থলে মারাত্মক বিষের লক্ষণ প্রকাশ পায়, রাগচিতা, করবীর বীজ প্রভৃতি ঐ শ্রেণীর। উহা প্রয়োগ নিতান্তই নির্যোদের কার্য। আর কতকগুলি ঔষধ তাদৃশ উগ্র নহে, সূতরাং তাহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। হিং জলে গুলিয়া লইবে, পরে একটি কাপড়ের দ্বারা বাতির ঠায়ে প্রস্তুত করিয়া তাহার অগ্রভাগে উপযুক্ত পরি কয়েকবার উহা মাখাইবে ও রৌদ্রে শুকাইবে। এই বাতি যোনিরন্ধ্রে প্রবিষ্ট করা-ইবে ও যাহাতে জিরায় দ্বার পর্য্যন্ত পৌছায় তদ্রূপভাবে স্থাপন করিবে। এই রূপে একদিন বা একদিন একরাত্রি স্থাপন করিয়া রাখিলে গৰ্ভ নিষ্কাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত নানা প্রকার প্রলেপ প্রয়োগ করা যায়। অগ্রে প্রলেপের ব্যবস্থা করাই ভাল। আকনাদি, আপাং, ঈশ্লামলিয়ার মূল কিম্বা বাসকমূলের ছাল, ইহাদের কোন একটি জলসহ বাটিয়া নাপোদর গৰ্ভিণীর নাভি ও বস্তিতে প্রলেপ দিবে। প্রলেপের ক্রিয়া মুহু সূতরাং প্রলেপ এবং হিংসের প্রয়োগই সর্বোৎকৃষ্ট। কোন প্রকার মূল যোনিতে প্রবেশ করান কর্তব্য নহে, কারণ তাহাতে যোনির অভ্যন্তর ক্ষতবিক্ষত হইতে পারে। ফলতঃ অশিক্ষিত লোকের পরামর্শ মত কখনই ঐ কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়, এ কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য।

গতিগী-রোগে—ঔষধ ।

অষ্টাঙ্গাবলেহ । গতিগীর যে কোন অবস্থায় শ্বাস ও হিকা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । শূণ্যাদিচূর্ণ ও এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে, আর কোন ঔষধের প্রয়োজন হয় না । কাস, অরুচি, বমি ও কঠ-রোগ প্রভৃতি থাকিলে, তাহাও এই ঔষধে বিনষ্ট হইয়া থাকে । অম্বুপান—আদার রস ও মধু

অষ্টাঙ্গাবলেহ । প্রস্তুতবিধি ১০২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

হ্রীবেরাদি কাথ । গর্ভাশয় স্বস্থানচ্যুত হইলে এবং তজ্জন্ম আমাশয় ও পকাশয়ের ক্ষুধা, দাহ, পার্শ্ববেদনা, পৃষ্ঠ-বেদনা ও প্রদর বা রক্তস্রাব এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । উদরান্ধান বা মলরোধ থাকিলে, এই কাথে সোন্দালের শাস অর্দ্ধ তোলা প্রক্ষেপ দিবে । গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত হইলেও এই কাথ ব্যবস্থা করা যায় ।

হ্রীবেরাদি কাথ । বালা, আতইষ, মুখা, মোচরস ও ইন্দ্রযব, ইহারা সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা । শেষ ৮ তোলা ।

বৃহৎ হ্রীবেরাদি কাথ । হ্রীবেরাদি কাথ যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োজ্য । হ্রীবেরাদি কাথ প্রয়োগ করিয়া কোন উপকার না হইলে, বিশেষতঃ অত্যধিক রক্তস্রাব হইলে ও অত্যন্ত প্রদাহ থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করিবে ।

বৃহৎ হ্রীবেরাদি কাথ । বালা, সোন্দালের ছাল, রক্তচন্দন, বেড়েলি, ধনে, গুলঞ্চ, মুখা, বেণারমূল, দুরাগড়া, ক্ষেতপাপড়া ও আতইষ ; প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

উৎপলাদি কাথ । গর্ভাবস্থায় মাসিক ঋতুর সময় উপস্থিত হইলে, ঋতুস্রাব হইলে এবং সন্তান অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিতায়তন বা একেবারে ২১০টি সন্তান হইলে, জরায়ুতে চাপ পড়ে বলিয়া জরায়ু বিদীর্ণ হইয়া রক্তস্রাব হয় । জরায়ু হইতে যে কোন কারণে পুনঃ পুনঃ রক্তস্রাব হইলে এবং ঐ কারণে ফেদনা এবং অত্যধিক দাহ ও পিপাসা প্রভৃতি, পৈত্তিক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই কাথ সেবন করিতে দিবে ।

উৎপলাদি কাথ । নীলোৎপল (লীলমুঁদি), কফ্ফার (খেতমুঁদি), কুমুদ, (রক্তপদ্ম), বেতপদ্ম এবং যষ্টিমধু প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

এরুণাদি কাথ । গর্ভিণীর বাতপিত্তাদি যে কোন প্রকার জরের প্রথম অবস্থায় জ্বরনাশের জন্য এই কাথ প্রয়োগ করা যায় । ইহা সাধারণ জরেই প্রয়োজ্য, জ্বরবিকারে প্রয়োজ্য নহে ।

এরুণাদি কাথ । ভেরেণ্ডারমূল, গুলঞ্চ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, দেবদারু ও পদ্মকাষ্ঠ প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

শৃঙ্গ্যাদি চূর্ণ । গর্ভিণীর যে কোন অবস্থায় শ্বাস ও হিকা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে ।

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বাসাকাথ । ঠাণ্ডা লাগিয়া বা শৈত্যক্রিয়া বশতঃ গর্ভিণীর বুকে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলে ও তজ্জন্ম শ্বাস-কষ্ট, হিকা বা উদরাগ্নান প্রকাশ পাইলে, এই কাথ পানের ব্যবস্থা করিবে, ইহাতে শ্লেষ্মা অতি শীঘ্র তরল হয় এবং শ্বাস-কষ্ট ও কাস প্রভৃতি উপসর্গ প্রশমিত হয় । হৃতিকারোগে ঐক্লপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও ইহা মহোপকারী ।

বাসাকাথ । প্রস্তুতবিধি ১১৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বৃহৎ অগ্নিকুমার । গর্ভাবস্থায় মন্দাগ্নি, কোষ্ঠকাঠিগ্ন বা অজীর্ণের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ইহা প্রয়োগে উপকার হয় । হৃতিকা এবং অন্ত্রাত্ম রোগেও ঐক্লপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে প্রয়োজ্য । অন্নপান—উষ্ণজল ।

বৃহৎ অগ্নিকুমার । হরীতকী ৪ তোলা, যমানী ২ তোলা, লবঙ্গ ১ তোলা ও সৈন্ধবলবণ ১০ তোলা, জলে মর্দন । বটী ৩ রতি ।

ভুবনেশ্বর । বৃহৎ অগ্নিকুমার যে অবস্থায় প্রয়োজ্য, ইহাও সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায় । অন্নপান—গরম জল ।

ভুবনেশ্বর । হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যমানী, সৈন্ধব ও গৃহধূম (ঝুল বা আন্দু), প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দন । বটী ৩ রতি ।

শ্বেতচূর্ণ । গর্ভাবস্থায় মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্ররোধ, কোষ্ঠকাঠিগ্ন, উদর-বৃদ্ধনা;

শোধ ও অন্নপিত্তের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ইহা মহোপকারী। নানাপ্রকার অবস্থায় বিবিধ অহুপানে ইহা প্রয়োগ করা যায়।

ঋতচূর্ণ। সোরা ৪ তোলা, ফিট্কারী ২ তোলা ও সৈন্ধব ১ তোলা চূর্ণ করিয়া লইবে। সৈন্ধবের পরিবর্তে বিট্‌লবণ প্রয়োগ করিলে, শূল ও অন্নপিত্তের বেদনা এবং আমাশয়ের বেদনা অচিরে দূরীভূত হয়।

অন্নারি (সাদা চটী)। ইহা সাধারণতঃ অজীর্ণে ও অন্নরোগে—প্রয়োজ্য। বিষ্টকাজীর্ণে (বাতাজীর্ণে), বিদগ্ধাজীর্ণে ও অন্নপিত্তের প্রথম অবস্থায় বেশ উপকারী, কিন্তু আমাজীর্ণে উপকারী নহে। প্রধানতঃ বায়ু ও পিত্তজনিত অনেক রোগে অহুপানভেদে প্রয়োগ করা যায় ও উপকার হয়। ঋতচূর্ণ যে যে রোগে যে যে অবস্থায় যে অহুপানে প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই সেই রোগে সেই সেই অবস্থায় সেই অহুপানে প্রয়োগ করা যায়। জ্বরে ঘর্ষকারক ও মূত্রকারক হইয়া উপকার করে। ইহা বহু পরীক্ষিত। স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ, অন্নদাপ্রসাদ, শ্রামিকিশোর, কালীপ্রসন্ন, কৈলাসচন্দ্র, দ্বারকানাথ ও পঞ্চানন কবিরাজ প্রভৃতি মহোদয়গণ প্রয়োগ করিতেন, এখনও তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যেরা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত গণোরিয়া বা বিষাক্ত মেহরোগের প্রথম অবস্থায়, বমি রোগে, কামলা রোগে, অকস্মাৎ কোন কারণে মূত্রবন্ধ বা অন্ন হইলে, ইহা প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। অহুপান—গণোরিয়ার প্রথম অবস্থায় জ্বালা ও পুষ্পপড়া থাকিলে মসিনা বা তিসি ভিজান জল অথবা গদ ভিজান জল, বমি হইলে ঐ ভিজান জল, কামলারোগে কাঁচা হরিদ্রার রস ও মধু, পিপাসায়—মৌরীভিজান জল, শূলরোগে ডাবের জল, ভেদে কপূরের জল, প্রীহা ও যকৃতে মনসা পাতা আশুণে গরম করিয়া মোচড়াইয়া তাহার রস এবং বালক ও শিশুর অজীর্ণ, অন্ন ও প্রীহা যকৃতে পেপের আঠা সহ প্রয়োগ করিবে।

অন্নারি (সাদাচটী)। সোরা ৪ তোলা, ফিট্কারী ১ তোলা ও নিশাদল অর্দ্ধতোলা উত্তমরূপে সূক্ষ্মচূর্ণ করিবে। পরে লৌহ-পাত্রে রাখিয়া অগ্নির উত্তাপ দিবে, যখন গলিয়া ফেণার দ্বারা হইবে, তখন ক্ষিপ্ৰহস্তে উহার উপরের মাং ফেলিয়া দিয়া কাঁসার পাত্রে ঢালিয়া কাঁসার বাটি বা থালাদ্বারা ঢাপিয়া ধরিবে। নিয়মিত পাক হইলে, চটীগুলি খুব শক্ত হয়। কেহ কেহ ফিট্কারী না দিয়া কেবল নিশাদল ও সোরাদ্বারা চটী প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

লবঙ্গাদি চূৰ্ণ ।* গৰ্ভিণীৰ প্ৰবল উদৰাময় বা তৰল ভেদ, ৰক্ত দাস্ত, আমাশয়, পেটে বেদনা, গ্ৰহণী, দাহ, প্ৰদৰ ও শোথ থাকিলে, এই ঔষধ প্ৰয়োগ কৰা যায় । স্তৃতিকারোগে ঐ সকল লক্ষণ থাকিলেও ইহা অতি উপকারী । *অম্বপান—ছাগ-দুগ্ধ ।

লবঙ্গদিচূৰ্ণ । লবঙ্গ, সোহাগাৰ থৈ, মুখা, ধাইফুল, বেলগুঠ, ধনে, জাভীকল, বেত-ধূনা, গুল্ফা, ডালিমের খোসা, জীৱা, সৈন্ধব, মোচরস, নীলমুন্দির মূল, রসালন, অভ্র, বঙ্গ, বরাহাকান্তা, মল্লচন্দন, গুঠ, আতাইব, কাকড়াশুকী, ধয়ের ও বালা ; প্ৰত্যেকের চূৰ্ণ সমভাগ একত্ৰ কৰিবে । মাত্ৰা—দুই আনা বা চাৰি আনা ।

প্ৰাণবল্লভ রস । গৰ্ভিণীৰ বমনেচ্ছা বা বমন প্ৰকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্ৰয়োগ কৰিবে । ইহা অম্বপানভেদে বাতপিত্ত জনিত সৰ্কৰোগে প্ৰয়োগ কৰা যায় । অম্বপান—ডালিমের রস, বেদানার রস বা পটোলের রস ও মধু ।

প্ৰাণবল্লভরস । উৎকৃষ্ট রসসিন্ধুৰ দৃতকুমারীৰ রসে বাটিয়া লইবে । বটী ২ রতি ।

গৰ্ভবিনোদ রস । গৰ্ভিণীৰ জ্বরের প্ৰথম অবস্থায় ইহা অতি উপকারী । যথাসময়ে প্ৰয়োগ কৰিলে, এই ঔষধেই জ্বর বিনষ্ট হয় । জ্বরের সহিত হাত পা ও গা-ব্যথা এবং পাতলা দাস্ত বা উদৰাময় থাকিলে, তাহাও বিনষ্ট হয় । অম্বপান—তুলসীপাতাৰ রস ও মধু ।

গৰ্ভবিনোদরস । গুঠ, শিপুল ও মরিচ প্ৰত্যেকে ২ তোলা, বিগুন্ধ হিঙ্গুল ৮ তোলা, যয়িত্ৰী ও লবঙ্গ প্ৰত্যেকে ১৬ তোলা এবং স্বৰ্ণমাক্ষিক ভষ্ম ৪ তোলা, জলে মৰ্দন । বটী—বুটপ্ৰমাণ ।

গৰ্ভচিন্তামণি । গৰ্ভবিনোদ যে যে অবস্থায় প্ৰয়োগ কৰা যায়, ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্ৰয়োজ্য । অম্বপান—তুলসীপাতাৰ রস ও মধু ।

গৰ্ভচিন্তামণি । জায়ফল, সোহাগাৰ থৈ, গুঠ, শিপুল, মরিচ ও বিগুন্ধ হিঙ্গুল প্ৰত্যেকে সমভাগ । জামীৰ বা গোড়ালেবুৰ রসে মৰ্দন । বটী ২ রতি ।

স্বল্পগৰ্ভচিন্তামণি । গৰ্ভবিনোদ বা গৰ্ভচিন্তামণি প্ৰয়োগে জ্বর হ্ৰাস না পাইলে অথচ গৰ্ভিণীৰ জ্বর পুৰাতন হইলে, ইহা প্ৰয়োগ কৰিবে ।* অম্বপান—তুলসীপাতাৰ রস ও মধু ।

বজ্রগর্ভচিন্তামণি । পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা কঁজলী বরিয়া তাহার সহিত স্বর্ণভঙ্গ ১ তোলা নিশাইবে । অনন্তর শুঁঠ, পিপুল ও মরিচের কাথদ্বারা তিনবার ভাবনা দিয়া লইবে । বটী ০ রতি ।

বৃহৎ গর্ভচিন্তামণি । গর্ভিণীর জ্বর পুরাতন ও ধাতুগত হইলে এবং তৎসঙ্গে দাহ, পিপাসা, রক্তশ্রাব, বমনেচ্ছা, বমি, অরুচি, গর্ভশূল, জরায়ুর বিকৃতি, দুর্বলতা, উদরাগ্নান, মলমূত্র রোধ এবং বাতপিত্তাধিক অত্যাশ্রয় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে কিম্বা বায়ুর আধিক্যে গর্ভ শুষ্ক হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে । জ্বর ব্যতীত ঐ সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলেও ইহা প্রয়োগ করা যায় । অমুপান—পটোলের রস ও মধু ।

বৃহৎ গর্ভচিন্তামণি । পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, লৌহ, রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিভাল, বজ্রভঙ্গ ও অন্ন ; প্রত্যেকে সমভাগ । ব্রাক্ষীশাকের রস, বাসকের কাথ, ক্ষেৎপাপড়া এবং দশমূল্যের কাথদ্বারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সাতটি করিয়া ভাবনা দিবে । বটী ১ রতি ।

মৃঢ়গর্ভ বা অস্বাভাবিক প্রসব ।

মৃঢ়গর্ভের কারণ ও লক্ষণ । বায়ু প্রকুপিত হইয়া গর্ভিণীর প্রস্রাব বন্ধ এবং তৎসঙ্গে যোনিতে ও উদরে শূলবেদনা উৎপাদন করিয়া সন্তানপ্রসবে বাধাপ্রদান করিলে, সন্তান যোনিমুখে অসিয়া যথারীতি বহির্গত হইতে পারে না, পরন্তু নানাপ্রকার বিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বহির্গমনে বাধা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আটকাইয়া যায়, ইহাকে মৃঢ়গর্ভ কহে ।

মৃঢ়গর্ভের সংখ্যা । মৃঢ়গর্ভ নানাপ্রকার ।

১। শিশু হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় সহ মস্তক উর্দ্ধদিকে রাখিয়া যোনিমুখে আসিয়া কীলক অর্থাৎ গোঁজের আয় যোনিমুখ অবরুদ্ধ করে, কিন্তু বহির্গত হইতে পারে না ।

২। শিশুর একটি হস্ত ও একটি পদ বহির্গত হয়, কিন্তু অত্যাশ্রয় অঙ্গ যোনিমুখে অবরুদ্ধ হইয়া থাকে ।

৩। গর্ভস্থ শিশু হস্তদ্বয়ের মধ্যে মস্তক রাখিয়া যোনিমুখে উপনীত হয়, কিন্তু বহির্গত হইতে না পারিয়া অবরুদ্ধ থাকে ।

৪। গর্ভস্থ শিশু ঘরের অর্গলবৎ যোনিমুখ আবৃত করিয়া থাকে, কিন্তু বহির্গত হইতে পারে না ।

৫ । কখনও কখনও গর্ভস্থ সন্তান বৃহৎ মন্তক বিশিষ্ট হইলে, এবং মন্তক সর্বাঙ্গে যোনিমুখে উপস্থিত হইলে, তদ্বারা যোনিদ্বার রুদ্ধ হয় ।

৬ । কখন কখন ভ্রূণ সরলভাবে না আসিয়া বিপরীতভাবে অর্থাৎ পাশা-পাশিভাবে আসিলে যোনিদ্বার অবরুদ্ধ হয় ।

৭ । কখন কখন ভ্রূণের শরীর পরিবর্তন হয় এবং তাহার কুজাকৃতি পৃষ্ঠদ্বারা যোনিদ্বার রুদ্ধ হয় ।

৮ । কখন কখন শিশু বক্রভাবে যোনিদ্বারে আইসে এবং তাহার এক-হস্ত বহির্গত হয় ও অগ্রাঙ্গ অঙ্গ যোনিতে সংলগ্ন হইয়া থাকে ।

৯ । কখন কখন শিশুর দুই হস্ত বহির্গত হয়, কিন্তু অগ্রাঙ্গ অবয়ব যোনিতে বক্রভাবে সংলগ্ন হইয়া থাকে ।

১০ । কখন কখন শিশু অগ্রাঙ্গকারে বক্রভাবে আসিয়া যোনিদ্বারে সংলগ্ন হয় ।

১১ । কখন কখন শিশুর গ্রীবা-ভঙ্গহেতু মুখ অগ্রসর হইয়া যোনিদ্বারে সংলগ্ন হয় ।

১২ । কখন কখন পার্শ্বভঙ্গহেতু ভ্রূণ বক্রভাবে আসিয়া যোনিতে সংলগ্ন হইয়া থাকে ।

১৩ । কখন কখন ভ্রূণ সন্ধিসহ অগ্রসর হইয়া যোনিদ্বারে সংলগ্ন ও রুদ্ধ হয় ।

১৪ । কখন কখন ভ্রূণ এক সন্ধি অথ সন্ধির সহিত বক্রভাবে আসিয়া যোনিতে সংলগ্ন ও রুদ্ধ হয় ।

১৫ । কখন কখন ভ্রূণ সন্ধি কুক্ষিত করিয়া বক্রভাবে যোনিতে সংলগ্ন হয় ।

১৬ । কখন কখন ভ্রূণের উদর, পার্শ্ব বা পৃষ্ঠ ইহার কোন একটি অগ্রসর হইয়া যোনিদ্বার রুদ্ধ করে ।

১৭ । কখন কখন ভ্রূণ একদিকে মন্তক নত করিয়া যোনিমুখে সংলগ্ন হইয়া থাকে ।

১৮ । কখন কখন মন্তক-ভ্রূণের সহিত দুই হস্ত অগ্রসর হয় ও যোনিদ্বার অবরুদ্ধ হইয়া থাকে ।

১৯। কখন কখন শরীরের মধ্যভাগ বক্রভাবাপন্ন হয় বলিয়া হস্ত, পদ ও মস্তক যোনিদ্বারে অবরুদ্ধ হয়।

২০। কখন কখন মলদ্বার অগ্রগামী হইয়া যোনিদ্বারে সংলগ্ন হয়।

মৃতগন্তের অসাধ্য লক্ষণ । গর্ত্তিণীর কুক্ষিদেবে নীলবর্ণের শিরা উদগত, মস্তক ভগ্নবৎ অবনত, শরীর শীতল এবং লজ্জাহীনতা দৃষ্ট হইলে, তাহার গর্ত্তস্থ শিশুর প্রাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

গর্ত্তিণীর অপর অসাধ্য লক্ষণ । গর্ত্তিণীর যোনিসম্মরণ নামক রোগ বা কুক্ষিদেবে (কোথে) গর্ত্ত সংলগ্ন হইলে কিম্বা হৃতিকারোগোক্ত মক্ল নামক রোগ উপস্থিত হইলে এবং তাহাতে কাস, শ্বাস ও আক্ষেপ প্রভৃতি উপসর্গ বর্ত্তমান থাকিলে, তাহার মৃত্যু হয়। মক্লরোগ কেবল প্রমত্তা স্ত্রীদিগেরই হয় এমন নহে, আসন্ন প্রসবা স্ত্রীদিগেরও হইয়া থাকে ।

গর্ত্তস্থ সন্তানবিনষ্টের কারণ । গর্ত্তিণীর মানসিক হুঃখ, উদরে আঘাত অথবা রোগের আক্রমণ বশতঃ গর্ত্তস্থ সন্তান বিনষ্ট হয় ।

মৃতগন্তের লক্ষণ । গর্ত্তাশয়ে শিশুর মৃত্যু হইলে, গর্ত্তের স্পন্দন ও প্রসবেদনা থাকে না এবং গর্ত্তিণীর শরীর শোণ্ডযুক্ত, পাণ্ডুবর্ণ, নিম্বাসে দুর্গন্ধ অন্ভব ও মৃত সন্তানের স্মৃতিতাহেতু বেদনা হয়, কিন্তু মূত্রত্যাগ ও প্লেয়াশ্রাব প্রভৃতি প্রসবের লক্ষণ প্রকাশ পায় না ।

যোনিসম্মরণ রোগের লক্ষণ । গর্ত্তিণী রমণী অত্যন্ত বায়ুবদ্ধক অন্ন ও পানীয় সেবন, অধিক পুরুষ সহবাস এবং অত্যন্ত রাত্রিঙ্গাগরণ করিলে, বায়ু প্রকুপিত হইয়া যোনিকে আশ্রয়পূর্বক যোনির দ্বারকে আবৃত করে এবং উর্দ্ধগামী হইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক গর্ত্তাশয়ের দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া গর্ত্তকে পীড়ন করে, এই অবস্থায় গর্ত্তিণীর বাক্শক্তি ও শ্বাসরোধ হয়, স্মৃতরাং শ্বাসরোধবশতঃ রোগিণী ও গর্ত্তস্থ সন্তান উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে । ইহার নাম যোনিসম্মরণ ।

মৃতগন্ত-চিকিৎসা ।

সাধারণতঃ নবম বা দশম মাস প্রসবের সময়, ঐ সময়ের পরে বা একাদশ দ্বাদশ মাসেও কেহ কেহ সন্তান প্রসব করিয়া থাকে । গর্ত্তসঞ্চার হইতে

আরম্ভ করিয়া যাবৎ গর্ত্তিনী সন্তান প্রসব না করে, তাবৎ নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। কোন্ সময়ে গর্ত্তিনীর কি অসুখ হয়, কোন্ সময়ে কোন্ রোগ উপস্থিত হয়, গর্ত্তরক্ষা হইবে কি না, এইরূপ বিবিধ চুশ্চিন্তায় কাল-যাপন করিতে হয়। আবার যদিও গর্ত্তপ্রাব বা গর্ত্তপাতের আতঙ্ক দূরীভূত হয়, তথাপি প্রসব-কাল উপস্থিত হইলে, প্রসবের আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কারণ প্রসবকালেও বাধা বিঘ্ন কম নহে। এই বাধা বিঘ্নের নাম মূঢ়গর্ত্ত। মূঢ়গর্ত্তে জরায়ু হইতে সন্তান যথারীতি বহির্গত হইতে পারে না, নানাপ্রকার বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জরায়ু ও যোনির মধ্যপ্রদেশে আবদ্ধ থাকে। ইহাকে অস্বাভাবিক প্রসব বলা যায়। সর্বাগ্রে মস্তক, পরে হস্তদ্বয় ও অগ্রাঙ্গ অঙ্গ এবং সর্বশেষে পদদ্বয় বহির্গত হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু মূঢ়গর্ত্তে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। কখনও একটি বা দুইটি হস্ত অগ্রে বহির্গত হয়, কখনও বা একটি বা দুইটি পদ, কখনও বা জাম্বু অগ্রে নির্গত হয়, এইরূপে মূঢ়গর্ত্ত অর্থাৎ অস্বাভাবিক প্রসবের লক্ষণ বহুবিধ। নানাপ্রকারে শিশুর হস্তপদ উন্টাইয়া যাঁহতে পারে এবং নানাপ্রকারে তাহার গতি বক্র হইতে পারে। প্রসববেদনার পরেই মূঢ়গর্ত্তের লক্ষণ প্রকাশ পায়, সুতরাং প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে, অবগত করণীয় যে সকল কার্য তাহা অগ্রে সম্পন্ন করিবে। ঐসকল কার্য সম্পন্ন হইলেও যদি প্রসবে বিলম্ব ঘটে, তাহা হইলে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবে। যদি বুঝিতে পারা যায় যে, সন্তান অস্বাভাবিকরূপে বহির্গত হইতেছে, তখন সম্ভব হইলে, গর্ত্তিনীকে হস্ত ধরিয়া তুলিবে ও দাঁড় করাইয়া একটু টলাইবে। এই প্রণালী উৎকৃষ্ট, ইহাতেই অধিকাংশস্থলে, স্বাভাবিক-রূপে সন্তান নির্গত হয়, কিন্তু যদি অত্যধিক দুর্বলতাবশতঃ গর্ত্তিনী উঠিতে বা দাঁড়াইতে না পারে অথবা মুচ্ছিতা হয় বা তাহার সংজ্ঞালোপের সম্ভাবনা বুঝা যায়, তাহা হইলে, উঠাইবার চেষ্টা করিবে না, মাটিতে দুইহস্ত ভর দিয়া হাটু গাড়িয়া বসাইবে, এই নিয়মেও বক্র হস্তাদি সোজা হয়, কিন্তু তাহাতে সোজা না হইলে, অবশ্যই হস্ত প্রবেশ করাইয়া সোজা করিবার চেষ্টা করিবে। এই কার্যে অভিজ্ঞ লোকেরই প্রয়োজন, অজ্ঞলোক নিযুক্ত করিলে, মাতা ও শিশু উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। এ অবস্থায় নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু হস্ত বা ঔষধ দ্বারা সন্তান বহির্গত না হইলে, সন্তানের মায়

পরিচ্যাগ করিয়া গর্ত্ত্বীণীৰ জীবন রক্ষার জন্ত অল্প-প্রয়োগ অনিবার্য্য হইয়া উঠে । ঐ অবস্থায় প্রসবে যতই বিলম্ব ঘটে, গর্ত্ত্বীণীৰ ততই সাংজাতিক লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে । সন্তান মৃত হইলে, মৃতগৰ্ভের লক্ষণ প্রকাশ পায়, স্মৃত্ত্বাং তখন হস্তদ্বারা পরীক্ষা করিবে এবং মৃত হইলে, হস্তদ্বারা হটক বা হস্ত দ্বারা বাহির করা অসম্ভব হইলে, অঙ্গদ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া বাহির করিবে । সন্তানকে ঐরূপ কুটিল বা বক্রভাবে পন্ন করা প্রকুপিত বায়ুর কার্য্য, স্মৃত্ত্বাং ক্রমশঃ বাতজ্ঞ লক্ষণ অর্থাৎ যোনিশূল, উদারাগ্রান, উদরশূল ও মলমূত্ররোধ প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায় । এই অবস্থায় নাগোদর বা শুকগৰ্ভের চিকিৎসাক্রম অবলম্বন করিবে । যোনিসম্মরণ, নাগোদর ও মৃতগৰ্ভের চিকিৎসা একই প্রকার ; বিভিন্নতা এই;—নাগোদরের চিকিৎসা ধীরে ধীরে করিলেও চলে, কিন্তু মৃতগৰ্ভের চিকিৎসা ক্ষিপ্রহস্তে করিতে হয় । যোনিসম্মরণের চিকিৎসা করিবার অবসরই অধিকাংশস্থলে পাওয়া যায় না, কারণ ঐ অবস্থায় গর্ত্ত্বীণীৰ শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া মৃত্যু হইয়া থাকে ।

স্বাভাবিক প্রসব ।

সূতিকাগৃহ । সূতিকাগৃহ অর্থাৎ যে ঘরে সন্তান প্রসূত হয়, সেই ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শুক হওয়া প্রয়োজন । অল্পখা ঠাণ্ডা লাগিয়া মাতা ও শিশু উভয়েই পীড়িত হইতে পারে । এতদ্ভিন্ন প্রসবান্তে সূতিকাগৃহে ধূমহীন জলস্ত অঙ্গার রাখিবে, ইহা দ্বারা সেক তাপের কার্য্য চলিবে অথচ ঘর গরম থাকিবে, পরন্তু জলস্ত অঙ্গার হইতে ধূম উথিত অথবা তাহা হইতে অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না । ধূম উথিত হইলে, প্রসূতি এবং শিশু উভয়ের শ্বাস-কষ্ট উপস্থিত বা মৃত্যু হইতে পারে ।

ভূমিষ্ঠ সন্তান পরীক্ষা । সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র রোদন করিলে, নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, কাঁদিয়া উঠা শুভলক্ষণ ; কিন্তু যদি নীরবে ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে, কেন কাঁদিতোছে না, মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছে কিম্বা জীবিত অবস্থায় অবসন্নভাবে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, অবিলম্বে পরীক্ষা করিবে । অনেকস্থলে শিশুর মুখ ও নাসাত্যন্তরে শ্লেষ্মা সঞ্চিত থাকে ও তজ্জন্ম শিশু রোদন করিতে পারে না, আবার অনেকস্থলে গর্ত্ত্বীণীৰ কোন রোগ থাকিলে, শিশু নিশ্বেজ

ও অবসন্ন অবস্থায় অথবা গ্তবৎ ভূমিষ্ঠ হয় । শীতকালে শীতের প্রাবল্য-বশতঃ কখন কখন ঐরূপভাবে ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে ।

প্রসবকাল । নবম হইতে দ্বাদশমাস পর্য্যন্ত প্রসবকাল, কিন্তু নবম বা দশমমাসেই অধিকাংশ গর্ভিণী সন্তান প্রসব করিয়া থাকে, সুতরাং নবম মাসের পূর্বেই প্রসবগৃহের বন্দোবস্ত করা কর্তব্য ।

আসন্নপ্রসব। স্ত্রীর লক্ষণ । গর্ভবতীর কৃষ্ণ-দেশ শিথিল ও ভার, হৃদয়ের বন্ধন বিযুক্ত, জঘনে অর্থাৎ নিতম্বের সম্মুখে বেদনা এবং কোমরে ও পৃষ্ঠে পুনঃ পুনঃ বেদনার সহিত মলমূত্রের বেগ উপস্থিত হইলে, বুঝিবে প্রসবের আর বিলম্ব নাই । তখন গরম ছদ্মসহ যত মিশাইয়া খাওয়াইবে এবং অবিলম্বে স্ত্রীকাগৃহে কোমল শয্যা রচনা করিয়া বাম্লিশ পাতিয়া গর্ভিণীকে তদুপরি শয়ন করাইবে । অনন্তর ঐসকল লক্ষণের সহিত যেমন কুহ্নের বেগ বেশী হইবে, তেমনি সজোরে কুহ্নন করিতে বলিবে । কিন্তু কুহ্ননের বেগ না থাকিলে, কুহ্নন করা নিতান্তই দোষাবহ । কারণ প্রসব-বেদনা অবর্ত্তমানে কুহ্নন করিলে, শিশু বোবা, বধির, কুজ এবং কাস, খাস বা ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইতে পারে । কুহ্ননের বেগ অতিশয় প্রবল হইলে কিম্বা যখন বুঝিবে প্রসবের আর বিলম্ব নাই, জরায়ুর মুখ বিস্তৃত হইয়া সন্তান প্রসব-পথে বহির্গত হইতেছে, তখন মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া গর্ভিণীকে চিৎ করিয়া তাহার উরুদ্বয় প্রসারিত করিবে এবং যোনিরন্ধ্রে তৈল মাখাইবে, তদনন্তর শিশুর মস্তক বহির্গত হইলে এবং হস্তদ্বারা প্রসব করান সম্ভবপর বিবেচিত হইলে হস্ত প্রবিষ্ট করাইয়া সন্তান বহির্গত করিবে ।

ইহাই হইল স্বাভাবিক প্রসব, কিন্তু স্বাভাবিক প্রসবেও কাহারও কাহারও কম কষ্ট হয় এবং কাহারও কাহারও বা বেশী কষ্ট হয়;—কেহ হই এক ঘণ্টা বেদনা ভোগ করিয়াই প্রসব করে, কেহবা ক্রমাগত বার, ষোল, কুড়ি বা চল্লিশ ঘণ্টা বেদনা ভোগ করিয়া প্রসব করে, সুতরাং ইহা স্বাভাবিক প্রসব মনে করিয়াও নিশ্চিন্ত থাকা যায় না;—প্রসূতির যন্ত্রণা-লাঘব ও সত্তর প্রসবের জ্ঞান নানাপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় । ঔষধ প্রয়োগকালে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক;—পরীক্ষিত ঔষধ ব্যতীত অপরীক্ষিত বা তীক্ষ্ণ ঔষধ অথবা উৎকট তিক্ত কিম্বা বিষাদ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে ।

কিন্তু ইহাও অরণ রাখা উচিত, অনেকস্থলে ঔষধ প্রয়োগব্যতীত কৌশলেই কার্য্যসিদ্ধি হয় ।

দ্রুতমিশ্রিত গরম দুগ্ধ যেমন পান করাইবে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বচ ও পিপুল জলসহ বাটিয়া রেড়ীর তৈলের সহিত মিশাইয়া নাভিতে মালিশ করিবে, ইহাতে বেদনা বাড়ে এবং প্রসবকার্য্যে বিশেষ সহায়তা করে । এই কার্য্যের পরেই যোনিরন্ধ্রে তিলতৈল, রেড়ীতৈল, অথবা দ্রুত মাখান কর্তব্য, সরিষার তৈল প্রয়োগ করিবে না । কেবল তৈল বা দ্রুত মাখাইলেও চলে ; কিন্তু পুইলতার মূল বাটিয়া তৎসহ তৈল বা দ্রুত মিশাইয়া মাখাইলে অধিক ফল হয় । ফলতঃ বায়ু প্রতিলোম বা উর্দ্ধগামী হইয়া গর্ভকে আকর্ষণ করে বলিয়া প্রসবে বিলম্ব ঘটে, কিন্তু ঐসমস্ত বায়ুনাশক ক্রিয়াদ্বারা বায়ু অহুলোম হয় ; সুতরাং সন্তান সহজেই নির্গত হইয়া থাকে । তবে ঐরূপ প্রক্রিয়াতেও উদ্দেশ্য-সিদ্ধি না হইলে, যোনিরোগোক্ত রক্তঃপ্রবর্ত্তিনী বটী কিম্বা হিং ২০ রতি ও সৈন্ধব ২০ রতি অথবা ঐ পরিমাণে ফল না হইলে, বেশী পরিমাণে সেবন করাইবে । এতদ্ব্যতীত আকনাদি লতা, বাসকের ছাল, ঈশলাঙ্গলিয়া এবং আপাঙ্গ এই চারিটির মধ্যে কোন একটি বাটিয়া গর্ত্তিণীর নাভি, বস্তি ও যোনিতে প্রলেপ দিবে । ইহাতেও যদি প্রসবে বিলম্ব ঘটে, তাহা হইলে, বিলম্বের কারণ অহুসন্ধানের জন্ম যোনিব মধ্যে হস্ত প্রবেশ করাইবে এবং শিশুর হস্তপদাদি স্বাভাবিক বহির্গত হইতেছে কিনা তাহা নির্ণয় করিবে, যদি কোন অঙ্গ বক্র বা কুটিল ভাবাপন্ন হইয়া থাকে তাহা অতি সতর্কভাবে সোজা করিয়া দিবে, কিন্তু সোজা করিতে গেলে জননেন্দ্রিয়ে অত্যধিক আঘাত লাগিবে ও তজ্জন্ম গর্ত্তিণীর বা শিশুর অনিষ্ট ঘটিবে, এরূপ আশঙ্কা হইলে, ঐরূপ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া হস্ত বাহির করিবে । ফলতঃ শিশুর অঙ্গ বক্রভাবাপন্ন হইলে, তাহা যতক্ষণে স্বাভাবিক বা সোজা না হইবে, ততক্ষণে হস্তদ্বারা প্রসব করাইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করাই কর্তব্য । অরণ রাখা উচিত যে প্রসব করান জোরের কার্য্য নহে । সাধারণতঃ দুই প্রকারে প্রসব করান হয় । গর্ত্তিণীকে শয়ন করাইয়া এবং বসাইয়া । তন্মধ্যে শয়ন করাইয়া প্রসব করান নিরুপষ্ট এবং বসাইয়া প্রসব করান উৎকৃষ্ট । চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া রহিলে, প্রসবে বিলম্ব ঘটে, কিন্তু

দুইহাতে মাটি ভর করিয়া হাটু গাড়িয়া বসিলে, স্বভাবতঃ সন্তানের বাহির্গমন সহজ হইয়া আইসে। এই প্রক্রিয়াতেও প্রসবে বিলম্ব ঘটিলে বা শিশুর হস্তপদাদি বক্রভাবে পন্ন হইলে, গর্ভিনীকে হাতধরিয়া দাঁড় করাইলে ও হাটাইলে প্রসব সহজ হইয়া আইসে। শয়ন করিয়া সন্তান প্রসব করা যাহাদের অভ্যাস, তাহাদিগকেও উক্ত প্রণালীতে বসাইয়া সহজে প্রসব করিতে দেখা গিয়াছে।

ধাত্মীর কর্তব্য। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র অঙ্গুলিদ্বারা শিশুর জিহ্বা ও মুখ-গহ্বরস্থ আঠাবৎ পদার্থ কাষিয়া বাহির করিবে, অনন্তর গোলমরিচের চূর্ণ ও মধু একত্র করিয়া অঙ্গুলিতে মাখাইয়া শিশুর জিহ্বায় লাগাইবে ও অঙ্গুলিদ্বারা সমগ্র শ্লেষ্মা টানিয়া আনিবে।

নাভিরজ্জু-ছেদন। এক কথায় বলিতেগেলে নাভিরজ্জুদ্বারাই শিশুর জীবন-রক্ষা হয়। নাভিরজ্জুর মধ্য দিয়া অনবরত রক্ত প্রবাহিত ও শ্বাস-প্রশ্বাস সঞ্চালিত হয় বলিয়াই ক্রম জীবিত থাকে ও বর্দ্ধিত হয় এবং মাতার আহার বিহারাদিতে ক্রমের আহার বিহারাদি কার্য সম্পন্ন হয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত নাভিরজ্জু হস্তের নাড়ীর আয় স্পন্দিত হয় অর্থাৎ দপ্‌দপ্‌ করে, এই স্পন্দন থামিলে নাভিরজ্জু কটন করিবে। অগ্রে নাভিকুণ্ড হইতে দেড় বা দুই ইঞ্চি দূরে একগাছি সূতা দ্বারা বান্ধিয়া গ্রহি দিবে এবং ঐ সূতার দুই মুখ কাটিয়া ফেলিবে। অনন্তর উক্ত বন্ধনীর এক ইঞ্চি দূরে আবার সূতা দ্বারা বান্ধিয়া ঐরূপ গ্রহি দিবে। পরে একখানি সূতীক্ষ্ম ছুরি বা কাঁচি দ্বারা উভয় বন্ধনীর মধ্যভাগ ছেদন করিবে এবং ছেদন করা হইলে, শিশুকে পৃথক্ করিয়া প্রসূতির নাড়ী হাত দিয়া ধরিয়া রাখিবে।

অমরা বা ফুল। প্রসূতির ফুল উক্ত নাভিরজ্জুর সহিত সংলগ্ন থাকে, ফুল কাহারও প্রসবান্তেই পতিত হয়, কাহারও বা কিছু বিলম্বে এবং কাহারও বা অনেক বিলম্বে পতিত হয়। যাবৎ ফুল না পড়ে, তাবৎ নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না এবং নাভিরজ্জু হাত দিয়া ধরিয়া রাখিতে হয়, উদেগ রজ্জু উদরে প্রবিষ্ট হইতে না পারে। আবার এরূপ কোমলভাবে ও সতর্কতার সহিত ধরা উচিত যেন ছিড়িয়া না যায়, কারণ ছিড়িয়া গেলে, রজ্জুসমেত ফুল স্বস্থান হইতে উর্দ্ধগামী হয় এবং প্রসূতির জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। ফুল পতিত

হইতে বিলম্ব হইলে, খাত্তী প্রস্থতির চুল স্বীয় হস্তে বেঠেন করিয়া তাহার কটি-দেশে বর্ষণ করিবে, কিম্বা মুখে প্রবিষ্ট করাইবে, ইহাতে বমির উদ্রেক হয় বলিয়া কুহনের বেগ বাড়ে ও শীঘ্র ফুল পড়িয়া যায়। ফুল পতিত না হইলে শূল ও উদরাগ্নান উপস্থিত হয়, সূত্রাং বেশী বিলম্ব হইলে, হস্তে দৃঢ় মাখাইয়া ঐ হস্ত যোনিতে প্রবিষ্ট করাইয়া ফুল বাহির করিবে।

গাত্র-ধাবন। নাভিরজ্জু ছেদনের পরে গরম জলে কাপড়ের টুকরা ভিজাইয়া শিশুর সর্বাঙ্গ ধৌত করা কর্তব্য। ক্ষিপ্ৰহস্তে গাত্র ধৌত করা কর্তব্য, কারণ বিলম্বে গায়ে জল বসিয়া শিশুর পীড়া জন্মিতে পারে। ঠাণ্ডা জলে কিম্বা সাবান বা তৈল মাখাইয়া স্নান করান কর্তব্য নহে। সাবান মাখাইলে, শিশুর চক্ষে উহা লাগিয়া চক্ষু অন্ধ হইতে পারে। কোন কোন দেশে তৈল মাখাইয়া স্নান করাইবার রীতি আছে, কিন্তু না করাইলেও ক্ষতি নাই, বরং তৈল মর্দনে শরীর নিক্ক হইয়া হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিবার আশঙ্কা থাকে।

সেকতাপ। অতঃপর শিশু ও প্রস্থতি উভয়ের সেকতাপ এবং হ্তিকা-গৃহ গরম রাখার প্রতি মনোযোগ করা কর্তব্য। পূর্বে এদেশে সেকতাপ বিশিষ্টরূপে প্রচলিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে কালের প্রভাবে তাহা বিনুগুপ্রায় হইয়াছে, সেকতাপের পরিবর্তে তলপেটে ব্যাণ্ডেজ বান্ধিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছে, ফলে সেকতাপ অভাবে ঠাণ্ডা লাগিয়া শিশু হঠাৎ পীড়িত হয় এবং প্রস্থতির দূষিত রক্ত বথোচিত নির্গত হইতে না পারিয়া শরীরে আবদ্ধ থাকিয়া যায় ও হ্তিকাগৃহেই অকেনক শিশু সন্তান এবং প্রস্থতি মানবলীলা সম্বরণ করে। শিশু মাতৃগর্ভে যেরূপ সন্তাপে রক্ষিত হয়, বহির্বাযু তদপেক্ষা শীতল, এই কারণে শিশুর তাপ রক্ষার্থ সেকতাপের বিশেষ প্রয়োজন। আর প্রস্থতির শরীর প্রসবাস্তে প্লেগ্মাধিক হয় বলিয়া তাহার তাপ রক্ষার্থ বিশেষতঃ দৃষ্ট রক্ত বহির্গত হইবার জন্য উদরে, তলপেটে এবং সর্বাঙ্গে সেকতাপ দেওয়া অত্যাवশ্যক। শিশুর নাভিতে সেক দিতে কখনও বিস্মৃত হইবে না, কারণ সেকতাপের অভাবে নাভি পাকিতে পারে। নাভি পাকের চিকিৎসা শিশু-রোগে দ্রষ্টব্য।

রক্তস্রাব। শিশুর নাভিমুখ হইতে, রক্ত নির্গত হইলে, নাভিকুণ্ডের নিকট আর একটি বান্ধন দিবে।

শিশু ও প্রসূতির পানাহার । প্রসবান্তে তিন চারি দিন গত না হইলে প্রায়ই প্রসূতির স্তনে দুগ্ধের সঞ্চয় হয় না অথবা হইলেও এত অল্প সঞ্চয় হয় যে, তদ্বারা শিশুর উদর পূর্ণ হয় না, সুতরাং অল্প দুগ্ধের প্রয়োজন, বিশেষতঃ অসময়ে প্রসূত হইলে, গাভীর দুগ্ধও পাওয়া যায় না, এ অবস্থায় অল্প নারীর স্তন্য পান করাইবে, আর যদি গোদুগ্ধ পাওয়া যায়, তাহা হইলে পরিকার কাপড়ের পলিতা দুগ্ধে ভিজাইয়া শিশুর জিহ্বার উপরে ধরিলে, শিশু দুগ্ধ চুষিয়া পান করিবে । প্রসবান্তে প্রসূতির জলসাপ্ত কিস্তি জলবার্ণি পথ্য করা কর্তব্য । দুইবেলা দুইবার কৃষ্ণজীরাবাটা সৈন্ধব ও ঘৃত সহযোগে খাইতে দিবে, ইহা প্রসূতির পক্ষে মহোষধ । ইহাতে গায়ের ব্যথা গ্লানি ও গায়ের ভার প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া অগ্নিপ্রদীপ্ত হয় । এই অবস্থায় পানের রস ও মধু সহ বাতগজাঙ্গুশ মহোপকারী । গ্লানি, গাত্রগুরুতা ও গাত্রবেদনা যাবৎ দূরীভূত না হইবে, তাবৎ অন্ন বা দুগ্ধ পথ্য দিবে না । অনেকে এই অবস্থায় অবসাদ লাঘবের জন্য ত্রাণ্ডি ব্যবস্থা করেন, এইরূপ ব্যবস্থা সুব্যবস্থা নহে, বরং উহাদ্বারা অপকার হয় । এই ব্যবস্থার পরিবর্তে বরং বাতগজাঙ্গুশ, কফচিন্তা-মণি বা লক্ষ্মীবিলাস প্রয়োগ করা কর্তব্য ।

স্তন্য-পান-বিধি । স্তন্যগ্রভাগ ধৌত করিয়া অগ্রে কিকিৎ দুধ গালিয়া ফেলিবে, পশ্চাৎ শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া ধীরে ধীরে স্তন্য-পান করাইবে । স্তন্য-পান করাইবার পূর্বে যদি কিকিৎ গালিয়া ফেলিয়া দেওয়া না হয়, তাহা হইলে, বালকের মুখের মধ্যে একেবারে অধিক দুগ্ধ পতিত হয় ও তজ্জন্ত শিশুর গল-ন্মূলী প্রাবিত হইয়া বমি, কাস ও শ্বাস উপস্থিত হইতে পারে ।

স্তন্যভাবে অন্য দুগ্ধের ব্যবস্থা । স্তন-দুগ্ধের অভাবে শিশুদিগকে ছাগদুগ্ধ বা গোদুগ্ধ পান করান যাইতে পারে । স্তন্যদুগ্ধ হইলে, স্তন্য শোধন করিয়া লইবে ।

মক্লশূল নামক রোগ কেবল প্রসূতা নারীর হয়, এমন নহে, অসন্নপ্রসবা নারীরও হইয়া থাকে । এক্ষণে প্রশ্ন এই ;— প্রসবের পর যথারীতি রক্তস্রাব না হইলে, নানা প্রকার বায়ুবর্জক দ্রব্য সেবন বা ক্রিয়া দ্বারা বায়ু অত্যন্ত বর্ধিত হইয়া ঐ রক্তকে শুষ্ক করিয়া গ্রন্থির জ্বার উৎপাদন করে, কিন্তু গর্ভা-বস্থায় যখন রক্তস্রাব বন্ধ হয়, তখন গ্রন্থি উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা কোথায় ?

তদন্তরে বক্তব্য এই—সর্বত্র রক্তাশ্রাব বন্ধ হয় না, কোম কোন গর্ভিণীর প্রতিমাসে অল্প অল্প রক্তাশ্রাব হইতে দেখা যায়, স্মৃতরাং গর্ভাবস্থায় রক্ত-
শ্রাব এবং বায়ু কুপিত হইলেও কোন কোন স্থলে মকল্লরোগে উৎপন্ন
হইতে পারে ।

প্রসবের পর প্রহতির গাত্রে সেকতাপ দেওয়া, যাহাতে ঠাণ্ডা লাগিতে না
পারে, তজ্জপ ব্যবস্থা করা, শৈত্যদ্রব্য ভোজন করিতে না দেওয়া এই সকল
বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখিলে, মকল্লশূল এবং হৃতিকারোগ উপস্থিত হইতে পারে-
না । প্রসবান্তে কালীজীরা বাটা গব্য ঘৃত ও সৈন্ধবসহ অবশ্যই ভক্ষণ
করিতে দিবে । প্রসবান্তে সেকতাপ ও আহাৰাদির বন্দোবস্ত করিতে বলা
হইয়াছে, তাহা করিবে ।

প্রসবান্তে, ঋতুশ্রাবান্তে, গর্ভশ্রাবের পর এবং প্রদররোগে যতদিন পর্য্যন্ত
রক্তাশ্রাব বন্ধ না হয়, ততদিন ভ্রমণ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ বিশ্রাম
করা কর্তব্য । রক্তাশ্রাব বন্ধ হইলেও শরীর সুস্থ এবং সবল না হওয়া পর্য্যন্ত
কদাপি বেশী ভ্রমণ করা কর্তব্য নহে । অশিক্ষিত লোকের কথা ধর্তব্য নহে,
যাহারা শিক্ষিত বলিয়া গর্ব করেন, তাহাদের মধ্যেও কেহহ রক্তাশ্রাব বর্তমানে
ভ্রমণ করিবার পরামর্শ দিয়া থাকেন, ইহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয় ।

গর্ভিণীরোগে—পথ্য ।

গর্ভিণীর পথ্য বিশেষ বিবেচনা পূর্বক ব্যবস্থা করিতে হয় । সর্বদা
একদ্রব্য ভক্ষণের ব্যবস্থা করা কর্তব্য নহে । কারণ বায়ুবর্দ্ধক, পিত্তবর্দ্ধক
বা শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য ক্রমাগত ভক্ষণ গর্ভের পক্ষে অনিষ্টকর, বিশেষতঃ
গর্ভাবস্থায় অকুচি একটি প্রধান উপসর্গ, স্মৃতরাং একদ্রব্য ভক্ষণে অকুচি
আরও বর্দ্ধিত হইতে পারে । এই সকল কারণে প্রত্যহ বা দুই চারি দিন
অন্তর পথ্য পরিবর্তন করা নিতান্ত কর্তব্য, অধিকন্তু যে সকল পথ্য
ব্যবস্থা করা হইবে, তাহা গর্ভিণীর অভিলষিত কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিবে,
তবে সকল সময়ই যে, তাহার মতামতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে,
এমন নহে, কারণ গর্ভিণী যদি অতিরিক্ত অল্পদ্রব্য ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ
করে, তাহা হইলে, তাহার ঐরূপ অসঙ্গত অভিলাষ পূরণ করা অসম্ভব, তবে

তৎস্থলে যথাসম্ভব অল্পপরিমাণে পুরাতন তৈতুল, লেবু, আমরুলশাকের টক বা শুক্ক কুল, আমসী বা আমসহ দেওয়া যাইতে পারে। ঐ অবস্থায় প্রায়ই মৎস্য ও মাংসে অরুচি হয়, তৎপরিবর্তে ডাইল, ডালনা, শুভ্র, ভাজা, ঝাল চচ্চড়ি প্রভৃতি পথ্য কল্পনা করিবে। রুই, মাগুর, কাংলা, শিঙ্গী, বেল, পাব্দা, ছিলিন্দা, বাইন, কই ও বলিশামাছ, মুগী, পাঠা ও ভেড়ার মাংস, মান, ওল, পটোল, আলু, ডুমুর, কুমড়া, কাচকলা, বেগুন, ধুন্দুল, কিলে, শশা, লাউ, শজিনার খাড়া ও ফুল, ডাঁটা, খোড়, মোচা, উচ্ছে, করলা, বেতাগ্র ও হিঞ্চে প্রভৃতি তিক্তদ্রব্য, মুগুরী, মুগ, অড়হর ও ছোলার দাইল, দুগ্ধ, ঘৃত ও মাখন, চিনি ও মিশ্রী প্রভৃতি অবস্থা-ভেদে ব্যবস্থা করিবে। গর্ভিণীর কোষ্ঠকাঠিন্য হইলে, দুগ্ধ ও কিস্মিস্ সিদ্ধ করিয়া খাইতে দিলে, দাঙ্গ পরিষ্কার হয়। কোনও অমুখ না থাকিলে, আমসহ, পুরাতন তৈতুল, আমসী, লেবু ও আমড়া ইহার কোনও একটি দ্বারা পুদিনাসংযোগে চাট্টনী করিয়া খাইতে দিবে। অরুচি প্রভৃতি রোগসহেও অত্যন্ত অরুচি হইলে, আমরুল শাক ও পুদিনা বাটিয়া খাইতে দেওয়া যায়। উপর্যুপরি বমন হইলে, অল্পপথ্য বন্ধ করিয়া ঠৈ-দুধ ব্যবস্থা করিবে।

কিস্মিস্ ও মিশ্রীসহ হজির পায়স দেওয়া যায়। ডালিম, বেদানা, আম্র, পেঁপা, বাদাম, সুপক আম, কাঁটাল, নারিকেল, পিণ্ড খেজুর, আতা, পেপে এবং অগ্নাত ফল খাইতে দেওয়া যায়।

অপথ্য। বায়ুবর্ধক দ্রব্য, পিত্তবর্ধক দ্রব্য, কিস্বা তিক্ত, অন্ন, লবণ ও কষায়রসবিশিষ্ট দ্রব্য অধিক পরিমাণে বা প্রত্যহ সেবন করা কর্তব্য নহে। বায়ুবর্ধক দ্রব্য অধিক সেবনে সন্তান কুজ, অন্ধ, জড় কিস্বা বামন হয়, পিত্তবর্ধক দ্রব্য অধিক সেবনে সন্তান ইন্দ্রলুপ্ত বা টাক রোগগ্রস্ত ও কপিলবর্ণ-বিশিষ্ট হয় এবং শ্লেষ্মবর্ধক দ্রব্য অধিক সেবনে সন্তান শ্বিত্র ও পাণ্ডুরোগগ্রস্ত হইতে পারে।

মৈথুন। গর্ভাবস্থায় সাধারণতঃ মৈথুন পরিত্যাগ করাই কর্তব্য। আয়ুর্বেদে যদিও সপ্তম মাস পর্য্যন্ত মৈথুনের ব্যবস্থা আছে, তথাপি উহা সকলের পক্ষে বা সর্বাবস্থায় উপযোগী নহে। গর্ভিণীর গর্ভস্থ ভ্রূণ শীঘ্র বর্ধিত হইলে এবং পুরুষের জননেঞ্জিয় বৃহৎ হইলে, তদবস্থায় মৈথুন পরিত্যাগ

করিবে, অথবা গর্ভাশয়ে আঘাত লাগিয়া গর্ভশ্রাব বা গর্ভিণীর জীবন বিনষ্ট হইতে পারে। এরূপভাবে গর্ভপাত আচকাল দৈনন্দিন ঘটনা। এতদ্ব্যতীত সন্তান অন্ধ, বোবা, বধির অথবা কুজ হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা।

সূতিকারোগ-চিকিৎসা ।

সূতিকারোগের লক্ষণ । সর্কান্নে ব্যথা ও ভার, জ্বর, কাস, পিপাসা, শোথ, বেদনা ও অতীসার এই সকল সূতিকারোগের লক্ষণ। সূতিকারোগে প্রায়শঃ এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়।

সূতিকারোগের অসাধ্য লক্ষণ । প্রসবের পর জ্বর, অতীসার, শোথ, আনাহ, বলক্ষয়, তন্দ্রা, অরুচি, কফশ্রাব প্রভৃতি রোগ বাতশ্লেষ্মার প্রকোপে উৎপন্ন হয়। ঐ সকল রোগ মাংস ও বলক্ষীণা নারীর হইলে, অতিশয় কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। উক্ত রোগ সমূহের মধ্যে আশ্রয় আশ্রিত ও প্রধান অপ্রধানরূপে কোন কোনটি মূলরোগ এবং কোন কোনটি বা উপসর্গ-রূপে উপস্থিত হইয়া থাকে।

মকল্লশূলের নিদান ও লক্ষণ । প্রসবের পর রুদ্ধক্রিয়া বা রুদ্ধ-দ্রব্যাদি সেবনে প্রসূতা নারীর বায়ু প্রকুপিত ও বর্ধিত এবং তীক্ষ্ণগুণবিশিষ্ট ও উষ্ণবীৰ্য্যদ্রব্য সেবনে রক্ত শোষিত হইয়া অবরুদ্ধ হইলে, নাভির অধোদেশে, দুইপার্শ্বে, মূত্রাশয়ে কিম্বা বস্তির উপরে গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, পরন্তু শুষ্ক নাভিতে, বস্তিতে ও উদরে বেদনা জন্মে এবং পকাশয় স্ফীত ও মূত্ররোধ হইয়া থাকে ; এই ভয়ঙ্কর প্রাণনাশক রোগের নাম মকল্লশূল। গ্রন্থি সর্বত্র উৎপন্ন নাও হইতে পারে, কিন্তু শূলবেদনা প্রায় সর্বত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সূতিকা-চিকিৎসা-বিধি ।

প্রসবের পর প্রসূতির যে রোগ হয়, তাহাকে সূতিকারোগ কহে। প্রসূতিনারীর জ্বর হইলে, সূতিকাজ্বর, অতীসার হইলে, সূতীকাতীসার, এবং শোথ হইলে সূতিকাশোথ বলা যায়। কঠিনবস অবধি সূতিকা বর্তমান থাকিলে, তাহার নির্দারিত নিয়ম নাই, তবে সাধারণতঃ পুনর্বার রক্তো

নিঃসরণ বা ঋতুস্রাব হইলেই হৃতিকারোগ আরোগ্য হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। এক্ষণ বলিবার কারণ এই—প্রস্থতির শরীর নীরোগ না হইলে, সবল হইয়া এবং সবল না হইলেও রজোদর্শন অসম্ভব। প্রস্থতি যথোচিত আহার বিহারের নিয়ম পালন করিলে, হৃতিকারোগে আক্রমণ করিবার আশঙ্কা থাকে না।

নামাকারণে হৃতিকারোগ জন্মে। হিতকর সুপথ্যের ও সেবাশুশ্রূষার অভাব বা তুচ্ছ তাক্ষিল্য, ঠাণ্ডা লাগান, সেকতাপ না দেওয়া, শ্রমজনক কর্ম, মৈথুন, ক্রোধ প্রভৃতি কারণে এবং ঠাণ্ডা বা শীতল অন্ন ও পানীয় সেবন করাতে, হৃতিকারোগ জন্মে।

প্রসবান্তে অবিলম্বে প্রসুতানারীকে সেকতাপ দিবে। প্রত্যহ দুইবেলা কাপড়ের পুটলী গরম করিয়া তদ্বারা বহুক্ষণ সেকতাপ দিবে। ইহাতে গাত্রবেদনা দূরীভূত হয় ও দুষ্টরক্ত স্রাব হইয়া যায়। যারং গাত্রবেদনা দূরীভূত ও রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া প্রস্থতির শরীর সুস্থ না হয়, তাবৎ সেকতাপ দেওয়া কর্তব্য। অন্ততঃ ১৫ দিবস সেকতাপ দিবে। গাত্র-বেদনা ও গ্লানি নষ্ট হইলে, প্রস্থতি সরিষার তৈল সর্বাঙ্গে মর্দন করিয়া গরমজলে কাপড় ভিজাইয়া তদ্বারা গা মুছিয়া অবিলম্বে শুষ্ক কশপড় দিয়া জল মুছিয়া ফেলিবে। এইরূপ মধ্যে মধ্যে করিয়া অসুখবোধ না হইলে ক্রমশঃ গরমজলে ও গরমজল স্নান হইলে, ঠাণ্ডাজলে স্নানের ব্যবস্থা করিবে।

হৃতিকার প্রথম অবস্থায় বাতরোগোক্ত বাতগজাকুশ পানেররস ও মধুসহ এবং দশমূলকণ্ঠ প্রয়োগ করিলেই চলে। ইহাতেই সাধারণতঃ গাত্রবেদনা, মস্তক-বেদনা, গ্লানি, গাত্র-গুরুতা ও জ্বরভাব প্রভৃতি উপসর্গ দূরীভূত হয়, পরন্তু অধিকাংশস্থলেই অল্প ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় না। এই ঔষধে উপকার না হইলে, অথচ বাতশ্লেষ্মার অত্যধিক প্রকোপবশতঃ গাত্র-বেদনা ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রকাশ পাইলে, জ্বররোগোক্ত রসোনাদি কাথ মহোপকারী। শিরঃশূল উপস্থিত হইলে, জ্বররোগোক্ত লক্ষ্মীবিলাস বা স্বপ্নলক্ষ্মীবিলাস এবং অধিক শোথ থাকিলে, শোধরোগোক্ত পুনর্বর্বাষ্টক কাথ ও পুনর্বর্বাদি-চূর্ণ প্রয়োজ্য। অজীর্ণ বা অগ্নিমান্দ্য হইলে, গর্ত্ত্বীরোগোক্ত রহং অগ্নিকুমার বা ভুবনেশ্বর এবং তরল দান্ত হইলে, জ্বররোগোক্ত সর্বাঙ্গ-সুন্দর বা মহাগন্ধক.

সেবন করাইবে, তাহাতে উপকার না হইলে, অঁতীসারোক্ত অমৃতার্ঘ বা সিদ্ধপ্রাণেশ্বর এবং বৃহৎ জীরকাদিমোদক বা মুস্তকাদিমোদক কিম্বা গর্ভিণীরোগোক্ত লবঙ্গাদিচূর্ণ ব্যবস্থা করিবে । অত্যধিক অরুচি হইলে, আম-রুলশাকের টক বা অরুচিরোগোক্ত আমলাদ্যযোগ প্রয়োগ করিবে । কাস প্রবল হইলে, কাসরোগোক্ত চন্দ্রামৃতরস বা তালীশাদিচূর্ণ ব্যবস্থা করিবে । অত্যধিক রক্তস্রাব হইলে, প্রদররোগোক্ত দার্ব্যাদিকাথ, চন্দ্রনাদিচূর্ণ, পুষ্যান্নুগচূর্ণ বা পুষ্করলেহ ব্যবস্থা করিবে ।

প্রস্রুতির বাতশ্লেষ্মজ্বর প্রকাশ পাইলে জ্বররোগোক্ত পিপ্পল্যাди বা বৃহৎ পিপ্পল্যাদিকাথ পান করাইবে । পিত্তশ্লেষ্মিকজ্বরে বিকারের লক্ষণ পরিস্ফুট হইলে জ্বর-রোগোক্ত অষ্টাদশাঙ্গকাথ ব্যবস্থা করিবে । বাতশ্লেষ্মপ্রধান সন্নিপাত জ্বরে জ্বররোগোক্ত কটুফলাদিকাথ প্রয়োগ করিবে । বিকার হইলে, কন্তুরী-ভূষণ ও কন্তুরীভৈরব বা বৃহৎ কন্তুরীভৈরব ব্যবস্থা করিবে । জীর্ণ বা বিষম-জ্বরে জীর্ণ বা বিষমজ্বরের ত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিবে । ধাতুগতজ্বরে বিষম-জ্বরাস্তকচূর্ণ, জ্বরের পর্যায় ভেদের জ্ঞান জ্বরসংহারচূর্ণ প্রবলতাপসংযুক্ত ধাতু-গত জ্বরে কোষ্ঠকাঠিগ্ধ থাকিলে এবং ঐ জ্বর পর্যায়ক্রমে উপস্থিত হইলে, কিরাতাদিচূর্ণ এবং ধাতুগত জ্বরে অধিক স্ফীতপদাহ, প্রীহা ও যকৃত বিশেষতঃ-ক্রিমিদোষ থাকিলে, শুভ্রচ্যাদিচূর্ণ প্রয়োগ করিবে । অন্নপিত্তের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, অন্নপিত্তোক্ত সৌভাগ্যগুঞ্জী মোদক প্রয়োগ করিবে । হস্তপদে অত্যন্ত দাহ প্রকাশ পাইলে, শুভ্রচ্যাদিলৌহ ব্যবস্থা করিবে । সৌভাগ্য-গুঞ্জী মোদক ও বৃহজ্জীরকাদিমোদক হৃতিকারোগে সর্বদা ব্যবহার্য ঔষধ । যকৃতের দোষ প্রবল হইলে, যকৃদরিলৌহ, প্রীহা বৃদ্ধি হইলে, বৃহৎ লোকনাথ-রস অথবা বৃহৎ শুভ্রপিপ্পলী প্রয়োগ করিবে । পাণ্ডুরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, নবায়সলৌহ ব্যবস্থা করিবে । বাতিক, বাতপৈতিক ও বাতশ্লেষ্মিক গ্রহণীর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এবং তৎসঙ্গে উদরাগ্নান বা কোষ্ঠকাঠিগ্ধ থাকিলে, ভাস্করলবণ ব্যবস্থা করিবে । জ্বরে বা স্বভাবত অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণ-বশতঃ উদরাগ্নান হইলে, হিঙ্গুচূর্ণ বা অগ্নিমুখ চূর্ণ প্রয়োগ করিবে । স্তন-রোগ বা স্তন্যদুষ্টি হইলে, তত্ত্বরোগানুযায়ী চিকিৎসা করিবে । হৃতিকারোগে বা তৎসহ জ্বর থাকিলে, রোগের একটু পুরাতন অবস্থায় দশমূলতৈল বা

বৃহৎ দশমূলতৈল সর্বদা ব্যবহার্য্য । অত্যধিক শোথ, গ্রহণী বা আমাশয় ও অর প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এবং অজ্ঞাত ঔষধে উপকার না হইলে, পর্পটী প্রয়োজ্য ।* স্ত্রীকোরোগে এইরূপ কোন রোগের লক্ষণ প্রবল হইলে, সেই রোগোক্ত ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করা যায় এবং তদ্বারা রোগের শান্তি হয়, তথাপি অবস্থ্যভেদে স্ত্রীকোরোগের ঔষধই সমধিক উপযোগী ।

স্ত্রীকোর প্রথম অবস্থ্যয় বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ প্রায়শঃ প্রকাশ পায় ও তজ্জন্ম দশমূলকাথ সমধিক উপযোগী ; তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে অমৃতাদি কাথের ব্যবস্থা করিলেও চলে । বাতপিত্তের প্রকোপ-বশতঃ অর ও হস্তপদাদিতে দাহ অথচ তরলদান্ত হইলে, স্ত্রীকাদশমূল কাথ ব্যবস্থা করিবে । অত্যধিক জ্বালায়ন্ত্রণার সহিত রক্তশ্রাব ও অতীসার থাকিলে অমৃতাদি কাথ ব্যবস্থা করিবে । ঐ অবস্থ্যয় গর্ভ্বীণীরোগোক্ত বৃহৎ হ্রীবেরাদি কাথ প্রয়োগ করিলেও চলে । স্ত্রীকোরোগে বাত, পিত্ত ও কফ এই তিন দোষের প্রবল প্রকোপ বশতঃ শূল, কাস, অর, শ্বাস, মুচ্ছা, কম্প, শিরঃপীড়া, প্রলাপ, তৃষ্ণা, দাহ, তন্দ্রা, অতীসার ও বমন প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, দেবদার্ব্বাদিকাথ সেবন করিতে দিবে । যে কোন অবস্থ্যয় শ্বাস বা হিক্কা প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে কাস, অকুচি, বমি বা কঠরোগ থাকিলে, শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ বা অষ্টাঙ্গাবলেহ সেবন করিতে দেওয়া যায় ।

এইপ্রকার অবস্থ্যভেদে অমুপান বিশেষে স্ত্রীকারি রস, দ্বিতীয় স্ত্রীকারি রস, স্ত্রীকায় রস, স্ত্রীকাস্তক রস, স্ত্রীকাবিনোদ, বৃহৎ স্ত্রীকাবিনোদ, মহাহ্রবটী, দ্বিতীয় মহাহ্রবটী, রসশাদ্দূল, বৃহৎ রসশাদ্দূল প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ প্রণালীদৃষ্টে ব্যবস্থা করিবে ।

মকুলরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, জ্বররোগোক্ত দশমূল কাথে সৈন্ধব-লবণ ২।৩ রতি ও ঘৃতভাজা হিং ২।৩ রতি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে ; তাহাতে উপকার না হইলে অথচ জ্বরের বেগ ও তদানুযজিক উপ-সর্গাদি প্রবল হইলে, জ্বরোক্ত পিপ্পল্যাди বা বৃহৎ পিপ্পল্যাди কাথে হিং ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে । এই রোগে অজ্ঞাত বটিকাও প্রয়োগ করা যায় ।

সূতিকারোগে—ঔষধ ।

দশমূলকাথ । প্রসবের পর প্রসূতির গা ব্যথা, শরীরের গুরুতা, শ্রানি, অবসাদ ও জ্বরভাব প্রকাশ পাইলে কিম্বা সূতিকারোগে প্রসূতিকে আক্রমণ করিতে না পারে, তজ্জন্ত প্রসবাস্তে অবিলম্বে এই কাথ এবং বাতগজাদুশ প্রয়োগ করিবে ।

দশমূল কাথ । প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

অমৃতাদিকাথ । প্রসবাস্তে দশমূলকাথের পরিবর্তে এই কাথে স্বল্প-পঞ্চমূলের পরিবর্তে বৃহৎ পঞ্চমূল দিয়া ব্যবস্থা করা যায় । ইহা সেবনে সূতিকা-রোগে আক্রমণ করিতে পারে না, বিশেষতঃ তরলভেদ থাকিলে, তাহা বন্ধ হইয়া অগ্নি প্রদীপ্ত হয় ।

অমৃতাদি কাথ । গুলঞ্চ, শুঠ, ঝিটিমূল, গাঙ্গাইল, ইকড়ের মূল, বেলছাল, শোণাছাল, গাভারীছাল, পারুলছাল, পণিরারীছাল ও মুখা, এতোক্রে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । বাতপিত্তাধিক অথবা পিত্তশ্লেষ্মাধিক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বিষাদি বৃহৎ পঞ্চমূলের পরিবর্তে স্বল্পপঞ্চমূল অর্থাৎ শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ও অগ্ন্যাত্ত্র ব্যবহার্য্য কাথ করিবে ।

সূতিকাদশমূলকাথ । বাতপিত্তের প্রকোপ বশতঃ প্রসূতির জ্বর, হস্ত-পদাদিতে দাহ ও তৎসঙ্গে মূত্ররোধ অথচ তরল দান্ত প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে পান করিতে দিবে ।

সূতিকাদশমূলকাথ । শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, ঝিটি, গাঙ্গাইল, শুঠ, গুলঞ্চ ও মুখা, ইহাদের এতোক্রে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

দেবদার্বাদি কাথ । সূতিকারোগে বাত, পিত্ত ও কফ এই তিন-দোষের প্রকোপ বশতঃ জ্বর, শূল, কাস, শ্বাস, মূর্ছা, কম্প, শিরঃপীড়া, প্রলাপ, ভ্রূষণ, দাহ, তন্দ্রা, অতীসার ও বমন প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ পান করিতে দিবে ।

দেবদার্বাদি কাথ । দেবদারু, বচ, কুড়, পিপুল, শুঠ, চিরতা, কটুকল, মুখা, কটকী, বনে, হরীতকী, গজপিপুল, কণ্টকারী, গোক্ষুর, হরালভা, বৃহতী, আতাইষ, গুলঞ্চ, কাকড়া-

শৃঙ্গী ও কৃষ্ণজীরা, ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । প্রক্ষেপ ঘূতে ভর্জিত হিং ২ রতি ও সৈন্ধব ২ রতি ।

পিপ্পল্যাদি ও বৃহৎ পিপ্পল্যাদিকাথ । বায়ুর ক্লান্তাবশতঃ প্রহৃতির মরুন্ন নামক শুলের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথবা এইরোগে গ্রন্থি উৎপন্ন হইলে, এই কাথ সেবন করিতে দিবে । ইহা প্রয়োগে মলমূত্ররোধ, উদরাগ্নান, বস্তি, নাভি ও উদরের বেদনা এবং জ্বর প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া থাকে । ইহা সর্বদা ব্যবহার্য্য । পিপ্পল্যাদি কাথে উপকার না হইলে, বৃহৎ পিপ্পল্যাদি কাথ ব্যবস্থা করিবে ।

পিপ্পল্যাদি ও বৃহৎ পিপ্পল্যাদি কাথ । প্রস্তুতবিধি যথাক্রমে ৭৪ ও ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

সূতিকারি রস । হৃতিকারোগের প্রথম অবস্থায় রোগিণীর শ্লৈষ্মিক-জ্বর, অকুচি, অন্নশোথ ও সর্দিজ্ঞান নাসাত্রাব প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । কিন্তু পুরাতন হৃতিকারোগে ঐ সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধে তাদৃশ উপকার হয় না । অম্বপান—গুঁঠ, পিপুল ও মরিচচূর্ণ এবং দুগ্ধ ।

সূতিকারি রস । পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা (কঙ্কলী ২ তোলা), অত্র এক তোলা এবং অমৃতীকরণ নিয়মানুসারে তাম্রভস্ম অঙ্কতোলা ; একত্র করিয়া থানকুনী পাতার রসদ্বারা মর্দন করিয়া ২ রতি বটিকা করিবে ।

সূতিকাবিনোদ রস । হৃতিকার প্রথম অবস্থায় বাতিক বা শ্লৈষ্মিক জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে বিষ্টকাজীর্ণ, উদরে বেদনা, মাথা ও মুখমণ্ডলে ভার থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । অম্বপান—উষ্ণজল ।

সূতিকাবিনোদ রস । কঙ্কলী ২ তোলা ও শোধিত তুতিয়া একতোলা জখীর বা গোড়ালেবুর রসে তিনদিন মর্দনপূর্ব্বক গুঁঠ, পিপুল ও মরিচের কাথে তিনবার ভাবনা দিবে । বটী ৩ রতি ।

বৃহৎ সূতিকাবিনোদ রস । হৃতিকার প্রথম অবস্থায় পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক জ্বর এবং তৎসঙ্গে আমাজীর্ণ বা বিদগ্ধাজীর্ণ, সময় সময় হাত পা জালা বা গাত্রবেদনা কিম্বা মাথাভার ও সর্দির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রযুক্তিকে সেবন করাইবে । অম্বপান—তুলসীপাতার রস ও মধু ।

রুহং সূতিকাবিনোদ রস । শুঠ ১ তোলা, পিপ্পল ৩ তোলা, অভ্র অর্দ্ধ তোলা, যয়িত্রী ২ তোলা এবং শোধিত তুতিয়া দুইতোলা এই সকল চূর্ণ একত্র করিয়া নিশিন্দাপাতার রসদ্বারা মর্দন করিবে । বীট ৩ রতি

অষ্টাঙ্গাবলেহ । প্রসূতির যে কোন রোগে শ্বাস বা হিকা কিম্বা উভয়ই প্রকাশ পাইলে, তন্নিবারণার্থ এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । অহুপান—অবস্থানুযায়ী কল্পনা করিবে ।

অষ্টাঙ্গাবলেহ । প্রস্তুতবিধি ১০৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

শৃঙ্গাদিচূর্ণ । অষ্টাঙ্গাবলেহে যে যে অবস্থায় প্রয়োজ্য, ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায় । অহুপান—অবস্থাভেদে কল্পনা করিবে ।

শৃঙ্গাদি চূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

সূতিকান্তকরস । সূতিকার প্রথম অবস্থায় রোগিণীর বাতিক, শৈল্পিক কিম্বা বাতশৈল্পিক জ্বর, তৎসঙ্গে শোথ, অবসাদ, সর্দি, কাস, গা-ব্যথা, বাতিক বা শৈল্পিক গ্রহণী এবং অগ্নিমান্দ্য ও তরল দান্ত প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করাইবে । অহুপান—জ্বর প্রবল হইলে, তুলসী পাতার রস ও মধু, তরল ভেদে ভাজা জীরা চূর্ণ ও মধু বা মুখার রস ও পিপ্পলীচূর্ণ ।

সূতিকান্তকরস । কজ্জলী ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা, শুঠ ১ তোলা, পিপ্পল ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিকভস্ম ১ তোলা ও বিশুদ্ধ বিষ ১ তোলা একত্র করিয়া পানের রসে মর্দন করিবে । বীট ৩ রতি ।

দ্বিতীয় সূতিকারিরস । সূতিকার মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় পৈত্তিক বা পিত্তশৈল্পিক জ্বর, শোথ, গ্রহণী, অতীসার, জ্বরাতীসার ও কাস থাকিলে, বিশেষতঃ রক্তপ্রবাহিকা, রক্তামাশয় বা রক্তাতীসারের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । অহুপান—জ্বরে—তুলসীপাতার রস, ভেদে মুখার রস, আমাশয়ে—গান্ধাইলের রস, শোথে—পুনর্ব্বার রস ।

দ্বিতীয় সূতিকারিরস । সোহাগার থৈ ১ তোলা, কজ্জলী ২ তোলা এবং সোণা, রূপা, জাতিফল, যয়িত্রী, লবঙ্গ, ছোট এলাচ, ধাইফুল, কুড়চীছাল, ইন্দ্রযব, আকান্দীলতা, কাকড়াশূলী, আতৈব ও যমানী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা ; সমস্ত একত্র করিয়া গান্ধাইলের রসে মর্দন করিবে । বীট ৩ রতি ।

সূতিকাগ্নরস। দ্বিতীয় সূতিকারি রস যে যে অবস্থায় যে যে অমুপানে
প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই সেই অবস্থায় সেই সেই অমুপানে প্রয়োজ্য,
তবে উল্লেখ্য যত ধারক, ইহা তদ্রূপ ধারক নহে। ঐ সকল অবস্থায় অতীসার
উপস্থিতি হইলে এবং অত্যধিক ধারক গুণ বিশিষ্ট ঔষধের আবশ্যক হইলে,
উহা প্রয়োজ্য, বেশী ধারকের আবশ্যক না হইলে, ইহাই প্রয়োগ করিবে।

সূতিকাস্থ রস। কঙ্কলী ২ তোলা এবং লৌহ, অভ্র, ষয়িত্রী ও সোণা-ভস্ম প্রত্যেকে
একতোলা, সমস্তচূর্ণ একত্র করিয়া ছাগীদুগ্ধদ্বারা মর্দন করিবে। বটী ২ রতি।

সূতিকাহররস। সূতিকারোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় রোগিণীর
বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লেষ্মিক জ্বর এবং অতীসার, গ্রহণী, শোথ, পাণ্ডু ও শূল-
বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই মর্হোষধ রোগিণীকে সেবন করিতে দিবে।
দুর্কলতা ও অবসাদ প্রভৃতিও ইহাতে দূরীভূত হইয়া থাকে। অমুপান—গন্ধা-
ইলের রস ও মধু।

সূতিকাহররস। কঙ্কলী ২ তোলা, লবঙ্গ, যবক্ষার, অভ্র, লৌহ, তামা ও সীসা
প্রত্যেকে ১ তোলা, এবং জাতীফল, কেণ্ডুযো, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ভীমরাজ,
ছোট ঐলাচি, মুখা, ধাইফুল, ইন্দ্রযব, আকান্দী, কাকড়াশৃঙ্গী ও বেলগুঠ প্রত্যেকের
চূর্ণ অর্দ্ধতোলা। সমস্তচূর্ণ একত্র করিয়া গন্ধভাদালিয়ার রসে মর্দন করিবে। বটী-
কুলের ছায়।

মহাভ্রবটী। সূতিকার মধ্য অবস্থায় বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক
জ্বর, অতীসার, গ্রহণী ও শূলবেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগিণীকে
সেবন করিতে দিবে। অমুপান—গন্ধভাদালিয়ার রস ও মধু।

মহাভ্রবটী। কঙ্কলী ২ তোলা এবং অভ্র, লৌহ, তাম্র, মনঃশিলা, মোহাগার ঐ, যবক্ষার, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেকে একতোলা ও বিগুণ্ড বিব ছই আনা।
সমস্ত একত্র করিয়া গিমাশাক, বাসকছাল ও পান ইহাদের প্রত্যেকের রসদ্বারা
সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া কিঞ্চিৎ আর্দ্র থাকিতে মরিচচূর্ণ ১ তোলা মিশ্রিত করিবে।
বটী ৩ রতি।

দ্বিতীয় মহাভ্রবটী। মহাভ্রবটী যে যে অবস্থায় যে যে অমুপানে
প্রয়োজ্য, ইহাও সেই সেই অবস্থায় সেই সেই অমুপানে প্রয়োগ করিবে।

দ্বিতীয় মহাভ্রবটী। কঙ্কলী ২ তোলা, অভ্র, লৌহ, মনঃশিলা, তামা, মোহাগার ঐ,

যবক্ষার, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেকে এক তোলা এবং শুঠ, পিপুল ও মরিচ সমভাগে মিলিত পাঁচ তোলা; এই সকল মিশ্রিত করিয়া গিমা, বাসকছাল ও পানেররসদ্বারা যথাক্রমে সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে । বটী ৩ রতি ।

রসশার্দূল । স্মৃতিকার কিঞ্চিৎ পুরাতন বা মধ্যাবস্থার রোগিণীর বাতিক বা শ্লেষ্মিক জ্বর, কাস, অঙ্গব্যথা, মাথাভার ও অবসাদ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । ইহার প্রয়োগ পূর্ব বঙ্গে সমধিক প্রচলিত । অহুপান—পানের রস ও মধু ।

রসশার্দূল । কঙ্কলী ২ তোলা, অত্র, তাম্র, লৌহ, রাজপট্ট (অভাবে পীতবর্ণ কড়িতম্ব), সোহাগার থৈ, মরিচ, যবক্ষার, হরিতাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও শোধিত বিষ প্রত্যেকে ১ তোলা । সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া গিমা ও পানের রসদ্বারা সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে । বটী ৩ রতি ।

মহারসশার্দূল । স্মৃতিকার পুরাতন অবস্থায় যখন অগ্নাশ্র ঔষধে উপকার না হয়, তখন ইহা প্রয়োগ করা যায় । বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লেষ্মিক-জীর্ণ জ্বর, জ্বরাতীসার, কাস, গা ব্যাথা, অতীসার, রক্তাতীসার, গ্রহণী, আমা-শয়, রক্তামাশয়, সময় সময় গাত্রদাহ বা হস্তপদে জ্বালা, মাথা ঘোরা, মাথা ধরা, অনিদ্রা, আলস্য, বৈকালে ঘৃষ্ণুযে জ্বর, দুর্বলতা, ক্ষীণতা, বিশেষতঃ প্রৈদর বা অধিক রক্তস্রাব, ভ্রমি, বমি ও অরুচি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই মহৌষধ ব্যবস্থা করিবে । অহুপান—পানের রস ও মধু ।

মহারসশার্দূল । কঙ্কলী ২ তোলা, অত্র, তাম্র, স্বর্ণভঙ্গ, মনঃশিলা, সোহাগার থৈ, যবক্ষার, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া প্রত্যেকে ১ তোলা, বিষ এক আনা এবং দারুচিনি, তেজপাতা, এলাচি, ময়িজী, লবঙ্গ, জটামাংসী, ভালীশপত্র, স্বর্ণমাস্কিক ও রসপঙ্খন প্রত্যেকে চারি আনা । সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া গিমা ও পানের রসদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে । পরে কিঞ্চিৎ আর্দ্র থাকিতে মরিচচূর্ণ ১ তোলা মিশ্রিত করিবে । বটী ৩ রতি ।

বৃহৎ রসশার্দূল । স্মৃতিকার পুরাতন অবস্থায় বাতপিত্তাধিক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে কিম্বা বাতপিত্তাধিক শরীরে ইহা সমধিক উপকারী । শ্লেষ্মা-ধিক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বা শ্লেষ্মাধিক শরীরে ইহা প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয় না । ইহা শোষণ গুণবিশিষ্ট নহে, ব্লিঙ্ক গুণবিশিষ্ট । ঘৃষ্ণুযে জ্বর, গাত্র ও হস্ত পদে দাহ, অতিশয় দুর্বলতা ও ক্লান্ততা, বাক্তিক, পৈত্তিক অথবা ধাতু-

পৈত্তিক কাস, কোষ্ঠ কাঠি, উদরে জ্বালা, শিরঃপীড়া, তালুগ্রদাহ, মাথা ঘোরা, নাসারন্ধ্র হইতে উত্তাপ নির্গত হওয়া, বিশেষতঃ প্রসবান্তে অধিক রক্তস্রাব বৈশিষ্ট্যঃ শরীর রক্তশূন্য, পাণ্ডুবর্ণ, দুর্বল ও ক্লান্ত হইলে এবং তৎসঙ্গে অরুচি, বমি বা বমির ভাব ও ভ্রমি প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা অতিশয় বল ও পুষ্টিকর। অমুপান—পানের রস ও মধু।

বৃহৎ রসশার্দূল। পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা কজলী করিবে। পরে তাহার সহিত সোণা, রূপা, কাঁসা, পিতল, তামা, সীসা, বঙ্গ ও লৌহভঙ্গ্য প্রত্যেকে এক তোলা করিয়া মিশ্রিত করিয়া ব্রাহ্মীশাক, জয়ন্তীপাতা, নিশিন্দাপাতা, ষষ্টিমধু, পুনর্নবা, নালুকা, অপরাঞ্জিতার মূল, আকন্দমূল, ধূতুরাপাতা, ছুরালভা, বাসকছাল ও কাকমাটী ইহাদের প্রত্যেকের রস বা ঘাহার রস নির্গত হয় না, তাহার কাথদ্বারা যথাক্রমে মর্দন করিবে। বটী ২ রতি।

স্বর্ণসিন্দূর ও মকরধ্বজের প্রয়োগ-প্রণালী।

ইহা সাধারণতঃ পরিবর্তক ও স্নায়বিক-দুর্বলতা নাশক, কিন্তু যে অমুপানের সহিত প্রয়োগ করা যায়, সেই অমুপান-দ্রব্যের গুণানুযায়িনী ক্রিয়া করে, তজ্জন্ত অমুপানভেদে সর্বরোগে প্রয়োগ করা যায় ও সর্বরোগ বিনষ্ট করে। স্বর্ণসিন্দূর বা রসসিন্দূর সর্বরোগে অমুপান-ভেদে প্রয়োগ করা যায়, ইহা আয়ুর্বেদাচার্য্যগণের মত, শাস্ত্রকারগণও এই মতেরই পোষকতা করেন এবং আয়ুর্বেদের উৎপত্তিকাল হইতে অনন্তকাল যাবৎ চিকিৎসকেরাও সর্বরোগে প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন; তবে উহা প্রয়োগ করিবার পূর্বে রোগীর ধাতু, অগ্নি, বল ও বয়স বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা উচিত অর্থাৎ রোগীর ধাতু রুদ্ধ কি স্নিগ্ধ, গরম কি নরম বা তাহার পাচকশক্তি সবল কি দুর্বল ও বয়স প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া তদনুযায়ী মাত্রা ও অমুপান কল্পনা করা কর্তব্য। চিকিৎসকেরা সাধারণতঃ শুভ্র-পায়ী শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া অশীতিপর বৃদ্ধব্যক্তিকেও ইহা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমিও শিশু, বালক, যুবা, বৃদ্ধ অনেক রোগীকে ইহা ব্যবস্থা করিয়াছি, কৃত্রাপি কুফল প্রত্যক্ষ করি নাই, কিন্তু শুভ্রপায়ী শিশুদিগকে প্রয়োগ করিতে গিয়া কয়েকস্থলে দেখিয়াছিঃ—স্বর্ণসিন্দূর বা রসসিন্দূর কিম্বা তৎসংযুক্ত.

ঔষধ আমাশয় বা অরাসীসারগ্রস্ত শিশুর পরিপাক না হইয়া আমসংযুক্ত মলের সহিত অবিকৃত অবস্থায় নির্গত হইয়াছে, একারণে আমার বিশ্বাস যে সকল স্তম্ভপায়ী শিশু আমাশয় বা অরাসীসারে নিত্য পীড়িত, তাহাদের পক্ষে উহা দুষ্পাচ্য, স্মৃতরাং অতি অল্প মাত্রায় ব্যবহৃত হয় । কারণ রসসিন্দুর বা স্বর্ণসিন্দুর বা তৎসংযুক্ত ঔষধ ঐ অবস্থায়ও বন্ধ না করিয়া অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিতে করিতে রোগ আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে ; স্মৃতরাং আমার বিশ্বাস অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে যদিও মলের সহিত কিয়দংশ বহির্গত হয়, তথাপি কিয়দংশ শরীরে অবস্থান করিয়া রোগ আরোগ্যের সহায়তা করে । ফলতঃ ঐ অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা কর্তব্য কি না তাহার মীমাংসা করিতে পারি নাই, তবে মাত্রা-হ্রাস করিয়া প্রয়োগ করাতে মলের সহিত নির্গত হওয়া সত্ত্বেও রোগ আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি । অনেকের বিশ্বাস উহা গরম, কিন্তু তাহা নহে, গরম অনুপানসহ ভক্ষণ করিলে গরম ক্রিয়া করে এবং ঠাণ্ডা অনুপানসহ প্রয়োগ করিলে ঠাণ্ডা ক্রিয়া করে, এই জ্ঞাত সন্নিপাত বা বাতশ্লেষ্মবিকারেও ব্যবহৃত হয়, আবার উন্মাদরোগেও প্রয়োগ করা যায় এবং ঐ উভয় অবস্থায়ই সন্ধান ফল প্রদান করে । জনসমাঞ্জে স্বর্ণসিন্দুর বা মকরধ্বজের এতাদৃশী খ্যাতি কেন, তাহা এই সকল কারণে সহজেই বুঝা যায় । রোগ-নির্ণয়ে বৈলম্ব ঘটিলে অথচ তৎক্ষণাতঃ ঔষধ প্রয়োগ অনিবার্য হইলে অগ্রে একটু স্বর্ণসিন্দুর বা তদভাবে উৎকৃষ্ট রসসিন্দুর মধুসহ প্রয়োগ করা যায় ।

রসসিন্দুর, স্বর্ণসিন্দুর ও মকরধ্বজের অনুপান ।

সামজুরে—আদা, বেলপাতা, ওকড়া, পান, নিশিন্দাপাতা, পলতা কিম্বা উচ্ছে বা করলাপাতা, ইহাদের কোনও একটি দ্রব্যের রস এবং পিপুল বা তুঁটচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপসহ ব্যবস্থা করিবে । বালক ও শিশুর পক্ষে অনুপান-তুলসীপাতার রস ও মধু । স্তম্ভপায়ী শিশুর পক্ষে স্তন-দুগ্ধ ও মধু । সামজুরের লক্ষণ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা ৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

জ্বরবিকারে—আদার রস, রুদ্রাক্ষ-ঘষা বা তাল-শাখার রসসহ প্রয়োজ্য, বিকারের যে অবস্থায় মৃগনাভি প্রয়োগ করা যায়, সেই অবস্থায় প্রয়োগ

করিতে হইলে, কঁসুরী মিশ্রিত করিয়া উহার কোন একটি অল্পপানসহ প্রয়োগ করিবে । বালক ও শিশুর পক্ষেও ঐ সকল অল্পপান প্রশস্ত ।

নিরীম্বজ্বরে ও পুরাতনজ্বরে—গুলকের রস, পল্লতার রস, সেফালিকা পাতার রস, চিরতার জল, ক্ষেপাপড়ার রস কিম্বা কালমেঘের রস ও মধু ।
২ । ৩ টি দ্রব্যের ঘুণ্ডাসহ বা কোন একটি পাচনসহ প্রয়োগে সমধিক ফল-প্রদ হয় ; ঘুণ্ডা মৎপ্রণীত অল্পপান-দৰ্পণ ৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । বালক ও শিশুর পক্ষে কালমেঘের রস অতি উপকারী ।

প্লীহাজ্বরে—অল্প পোড়া রসুন, তালের জটা-ভষ, পুরাতন গুড়, রক্ত চিতাচূর্ণ, রয়না-ছাল-চূর্ণ, হিং, পিপুলের কাথ, আদাররস বা মনশাসীজপাতা আগুণে গরম করিয়া তাহার রস ।

যক্ষ্ম-সংযুক্ত-জ্বরে—কোষ্ঠবন্ধ থাকিলে তেউড়ীচূর্ণ বা কটুকীচূর্ণ, কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিলে, কালমেঘের রস, আমলকীচূর্ণ বা চিরতার জল ।

শোথসংযুক্ত-জ্বরে—শ্বেত বা রক্তপুর্ণবার রস, আদার রস, বেল পাতার রস, ইহার কোন একটি রসসহ পিপুলচূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে ।

কাসে বা কাসসংযুক্ত-জ্বরে—বাসক ছালের রস, পিপুলচূর্ণ ও মধু-সহ কিম্বা বাসক ছাল, কিস্মিস্, খট্টমধু ও পিপুল এই চারি দ্রব্যের কাথসহ অথবা কেবল পিপুলচূর্ণ ও মধুসহ ।

শ্বাসে বা শ্বাসসংযুক্ত জ্বরে—বহেড়া ঘসা ও স্তন-দুগ্ধ, বহেড়ার শাস-বাটা ও স্তন দুগ্ধ, তুলসীপাতার রস ও পিপুলচূর্ণ, ময়ূরপুচ্ছ-ভষ কিম্বা বামন-হাটীর ছালের রস ও মধুসহ ।

হিকারোগে বা হিকাসংযুক্ত জ্বরে—কুলের আটীর শাসবাটা বহেড়ার শাসবাটা, বড় এলাচচূর্ণ, শমার বীজের মধ্যস্থ শাসবাটা, স্তন-দুগ্ধ কিম্বা দান্ত পরিষ্কার না থাকিলে কটুকীচূর্ণ ।

মন্দাম্বিতে—যমানী-বাটা ও সৈন্ধবলবণ কিম্বা লবঙ্গচূর্ণ ।

আমাজীর্ণে—উষ্ণজল, আদাররস কিম্বা পানের রস ও মধুসহ ।

বিদ্যাজীর্ণে—লেবুর রস, চুণের জল, ধনে ভিজান জল কিম্বা নালিতা বা পাটপাতা ভিজান জলসহ ।

বিষ্টকাজীর্ণে—হিং ও সৈন্ধবলবণ কিম্বা চাউলের জল বা মৌরী-ভিজান জল ।

জ্বরাতীসারে—মুখার রস ও মধু বা আঠৈষচূর্ণ ও মধুসহ ।

অতীসারে—মুখার রস ও মধু বা বেলগুঁঠচূর্ণ ও মধুসহ । বালক ও শিশুর পক্ষে জায়ফলঘষা ও স্তন দুগ্ধ উৎকৃষ্ট অনুপান ।

গ্রহণীরোগে—কাঁচা বেলপোড়া ও ইক্ষুগুড়, মুখার রস ও মধু বা জীরা-ভাজা চূর্ণ ও মধুসহ ।

প্রবাহিকারোগে (আমাশয়ে)—খান্‌কুনী বা থুলকুড়ী পাতার রস, গান্ধাইলের বা গন্ধভাদালের রস কিম্বা খেতকাঁটানোটের মূলের রস ও মধু ।

রক্তাতীসার ও রক্তপ্রবাহিকা বা রক্তামাশয়রোগে—রক্তকাঁটা-নোটের মূলের রস ও মধু, কুড়চীর ছালের রস ও মধু, কুক্ষিম বা কুকুর-শোকার রস, ডালিমের পাতার রস কিম্বা বিশল্যকরণী বা আয়্যাপানের রস ও মধুসহ ।

বিসূচিকারোগে—আপাঙ্গের মূলের রস ও মধু ।

পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকরোগে—কোষ্ঠ-কাঠিগু থাকিলে তেউড়ী-চূর্ণ, কটকীচূর্ণ বা উচ্ছেপাতার রস । কোষ্ঠ খোলসা থাকিলে গুলঞ্চের রস ও ত্রিফলা চূর্ণ বা হরিদ্রা-চূর্ণসহ অথবা হিষ্কাশাকের রস, কুলেখাড়ার রস বা চিরতার জলসহ ।

রক্তপিত্তে বা রক্তপিত্তসংযুক্ত জ্বরে—রক্তপিত্ত দুই প্রকার, উর্দ্ধগত ও অধোগত । নাসারন্ধ্র, কর্ণরন্ধ্র, মুখগহ্বর প্রভৃতি হইতে যে রক্ত পড়ে, তাহাকে উর্দ্ধগত এবং মলদ্বার, লিঙ্গ ও যোনিরন্ধ্র হইতে রক্ত নির্গত হইলে, তাহাকে অধোগত রক্তপিত্ত কহে । উর্দ্ধগত রক্তপিত্তে-বিশল্যকরণী অর্থাৎ আয়্যাপানের রস, কুক্ষিম বা কুকুরশোকার রস, বাসকছালের রস, কুড়চী-ছালের রস, কচি দুর্বীর রস বা আলতাভিজান জলসহ ।

রক্তপিত্তে—রক্ততিলের শাস-বাটা ও ইক্ষুচিনি । কুড়চী-ছালের রস ও বাবলার আঠা প্রবল রক্ত-রোধক ।

যক্ষ্মারোগে—কচি দূর্লার রস, যজ্ঞডুমুরের রস, আলতা ভিজান জল, বিশল্যকরণী বা আয়াপানের রস রক্ত-রোধক । এতদ্ব্যতীত উৰ্দ্ধগত রক্তপিত্তে যে সকল রক্ত-রোধক অল্পপান বর্ণিত হইয়াছে, যক্ষ্মারোগে রক্ত-রোধের জন্য তাহাও প্রয়োগ করা যায় । কাস থাকিলে বাসক ছালের রস ও পিপুলচূর্ণ কিম্বা বাসকছাল, যষ্টিমধু, কিস্মিস্ ও পিপুল এই চারি দ্রব্যের কাথসহ প্রয়োজ্য ।

অর্শরোগে—নাগেশ্বর ফুলের রেণুবাটা চারি আনা, মাখন ৯০ তোলা ও মিশ্রীচূর্ণ ১ তোলাসহ । রক্তার্শে রক্ততিলের শাসবাটা ও ইক্ষুচিনি প্রশস্ত অল্পপান । এতদ্ব্যতীত কুড়চী ছালের রস, আয়াপানের রস বা কুকুশোকার রস প্রয়োগ করা যায় । আম ও রক্ত নির্গত হইলে, কুড়চীছালের রস অতি উপকারী । কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে, জঙ্গীহরীতকীচূর্ণ বা তেউড়ীচূর্ণ সহ প্রয়োজ্য ।

স্বরভঙ্গে—ব্রাহ্মীশাকের রস বা কণ্টকারীর রস, পিপুলচূর্ণ বা বচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া প্রয়োগ করিবে ।

অরুচিরোগে—আমরুল শাকের রস, অতি পুরাতন তেঁতুল, ছোলঙ্গ-লেবুর রস, অন্নবেতস বা ধৈকলচূর্ণ, আদাররস ও সৈন্ধবলবণ ।

ক্রিমিরোগে—আশ শেওড়ার পাতাররস, দাতনগাছ বা আইঠলীগাছের পাতার রস, আনারসের কচিপাতাররস, ডালিমগাছের শিকড়ের কাথ, আত-ইষচূর্ণ, সুপারি বৃক্ষের কচিশিকড়ের রস, শগীররস, টাপাগাছের ছালের রস, খেজুর পাতার রস, চারা খেজুর বৃক্ষের মাধীর রস, বিড়ঙ্গচূর্ণ বা পলাশবীজ-চূর্ণ । শিশুর পক্ষে চূর্ণের জল বা বিড়ঙ্গচূর্ণ প্রশস্ত ।

বমনরোগে—ডাঘের জলে ঠৈ বা মুড়ি ভিজাইয়া সেই জল, পটোলের রস, দাড়িমের রস, শশার বীজবাটা ও স্তন দুগ্ধ, বেদানার রস, চাউলের জল বা অখথ গাছের গুড় ছাল দগ্ধ করিয়া জলে ভিজাইয়া সেই জল সহ ।

তৃষ্ণরোগে—ডালিমের রস, বেদানার রস, ধনে ভিজান জল অথবা মৌরীভিজান জল ।

দাহরোগে—কদলী-মূলের রস, কেঙরের রস, পোলতার রস, ডালিমের রস, বেদানার রস, গুলফের রস, ক্ষেৎপাপড়ার রস বা শতমূলীর রস ।

মূচ্ছারোগে—চাউলের জল, ডালিমের রস, বেদানার রস বা শতমূলীর রস ।

উন্মাদরোগে—চাউলের জল, শতমূলীর রস ও ইক্ষুচিনি, বেদানার রস, পটোলের রস, ডালিমের রস, পুরাতন চালকুমড়ার রস বা ত্রিফলাভিজান জল ।

অপস্মার বা হিষ্টিরিয়া রোগে—শতমূলীর রস, পুরাতন চালকুমড়ার রস, চাউলের জল, ত্রিফলাভিজান জল, ডালিমের রস, বেদানার রস বা পটোলের রস ও ইক্ষুচিনি ।

বাতব্যাদিরোগে—শায়ুগত বাতে অধগন্ধার চূর্ণ বা কাথ । বাত-ব্যাদিতে ফুলা ও বেদনা থাকিলে, ভেরেঙার মূলের রস, আদার রস ও সৈন্ধবলবণ সহ । গ্রন্থিগত বাতে অর্থাৎ গ্রন্থিতে ফুলা ও বেদনা থাকিলে শঙ্কিনার ছালের রস ও মধু সহ । কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে এরণ্ডবীজ বাটা বা রসুন-বাটা সহ ।

উরুস্তম্বরোগে—আদার রস ও পিপুল-চূর্ণ বা শঙ্কিনার ছালের রস, পিপুল চূর্ণ ও মধু ।

আমবাতে—ভেরেঙার মূলের রস ও সৈন্ধবলবণ কিম্বা আদার রস বা রসুনবাটা সহ ।

শীতপিত্ত, উদর্দ ও কোষ্ঠরোগে—দান্ত খোলসা থাকিলে—কাঁচা হলুদের রস, কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে, কলাপাতা বা উচ্ছেপাতার রস ও হরিদ্রা-চূর্ণ এক্কেপ দিবে ।

অগ্নিপিত্তে—অগ্নিপিত্ত সাধারণতঃ দুই প্রকার—অধোগত ও উর্দ্ধগত । অধোগত অগ্নিপিত্তে অগ্নগন্ধবিশিষ্ট পাতলা দান্ত ও উর্দ্ধগত অগ্নিপিত্তে কোষ্ঠবদ্ধ,

গলাবুকজ্বালা, 'অম্লরস ও অম্লগন্ধবিশিষ্ট বমন হয়। হাত পা জ্বালা অথচ দান্ত পরিকার থাকিলে, পোল্‌তার রস, হিষ্কার রস, পটোলের রস বা গুলঞ্চের রস।' ঈশান্ত বেশী অথচ পাতলা হইলে, যবের কাথ, চুণের জল বা মুখার রস। শ্লেষপ্রধান অবস্থায় অগ্নিমান্দ্য থাকিলে—লবঙ্গচূর্ণ, কোষ্ঠ-কাঠিফ—উষ্ণ-পাতা বা করলাপাতার রস, তেউড়ীচূর্ণ বা ধনে, মৌরী ও জাঙ্গীহরীতকী-ভিজানজল, অত্যন্ত পিত্তপ্রধান শরীরে—ত্রিফলার জল, আমলকীর জল, শতমূলীররস, পুরাতন চালকুমড়ার রস, চিরতারজল, ধনে পোল্‌তা ভিজানজল, গরম ধাতুতে অর্থাৎ বায়ু-পিত্ত-প্রধান শরীরে ডাবের জল বা নালিতা অর্থাৎ পাটপাতা ভিজান জল।

শূলরোগে—কোষ্ঠ-কাঠিফ থাকিলে—তেউড়ীচূর্ণ কিম্বা জাঙ্গীহরীতকী, ধনে ও মৌরীভিজানজল। দান্ত পরিকার থাকিলে—ধনে—পোল্‌তার জল, শতমূলীর রস, অত্যন্ত গরম ধাতুতে অর্থাৎ বায়ু-পিত্ত-প্রধান শরীরে—ত্রিফলার জল বা ডাবের জল।

উদাবর্ত ও অনোহরোগে—উদাবর্ত ও অনোহরোগে বায়ু অত্যন্ত প্রকুপিত হয়, এজন্ত ঐ উভয়রোগে বায়ু-নাশক অমুপান ব্যবস্থা করিবে। ঐ উভয়রোগে কোষ্ঠ-কাঠিফ থাকিলে, তেউড়ীচূর্ণ ব্যবস্থা। দান্ত পরিকার থাকিলে—ত্রিফলার জল, ধনে-পোল্‌তার জল বা শতমূলীর রস।

গুল্মরোগে—কোষ্ঠ-কাঠিফ থাকিলে, গোমূত্র বা তেউড়ীচূর্ণ। দান্ত পরিকার থাকিলে, পিপুল-চূর্ণ ও আদার রস।

হৃদ্রোগে—অৰ্জুন-ছালের রস, কাথ বা চূর্ণ।

মূত্রকৃচ্ছ ও মূত্রাধাতে—মূত্রকৃচ্ছ ও মূত্রাধাতে প্রভেদ এই যে, মূত্র-কৃচ্ছে মূত্রগকালে যন্ত্রণা অত্যধিক, কিন্তু মূত্র যথোচিত পরিমাণে নির্গত হয় এবং মূত্রাধাতে মূত্রনিঃসরণকালে যন্ত্রণা কম, কিন্তু মূত্র যথোচিত পরিমাণে নির্গত হয় না,—অল্পে অল্পে কম পরিমাণে নির্গত হয়। এই উভয়রোগে—গোক্ষুরের কাথ, হিমশাগর বা পাথর কুচির পাতার রস, যবক্ষার কদলীমূলের রস অথবা শতমূলীর রস।

অশ্মরীরোগে—বরুণছালের রসে বা কাথে বরুণ-ছাল চূর্ণ প্রক্ষেপ সহ,

পাথরকুচির পাতার রস, কদলীমূলের রস, তৃণ পঞ্চমূলের কাথ (কুশ, কাশ, শর, উলুখড় ও ইকড় সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা ; শেষ ৮ তোলা) বা কাকুড়-বীজ-চূর্ণ ।

মেহরোগে—স্রাবযুক্ত মেহরোগে বা গণোরিয়ায়—কচি শিমূল বৃক্ষের মূলের রস, বাবলার আঠা বা গঁদভিজ্ঞান জল বা কাঁচা আমলকীর রস । জ্বালাযুক্ত মেহরোগে বা গণোরিয়ায়—অড়হর পাতার রস, কাঁচা হরিজ্ঞাররস, তিসি বা মসিনা ভিজ্ঞান জল । মেহ বা গণোরিয়ায় রক্তস্রাব হইলে, বিশল্য-করণী বা আয়্যাপানের রস, কচি দুর্বার রস অথবা গান্ধাকুলের পাতার-রস । মেহ আরোগ্য হইলে, বল ও পুষ্টির জন্য অশ্বগন্ধা-চূর্ণ বা বেড়েলার ছালের চূর্ণ অম্বুপান ব্যবস্থা করিবে ।

সোমরোগে অর্থাৎ বহুমূত্রে—কদলীপুষ্প বা মোচার রস, যজ্ঞ-ডুমুরের বীজ-চূর্ণ, জামের বীজ চূর্ণ বা যজ্ঞডুমুর চূর্ণ ।

কৃশতারোগে—অশ্বগন্ধার মূলচূর্ণ ও হৃদ্র ।

উদীরোগে—তেউড়ী-চূর্ণ ।

বৃদ্ধি অর্থাৎ কুরণুরোগে—শোধিত গুগ্গুলু-চূর্ণ ও ত্রিফলার কাথ ।

শ্লীপদ অর্থাৎ গোদরোগে—শোধিত গুগ্গুলু-চূর্ণ ও ত্রিফলার কাথ ।

বিদ্রধিরোগে—শজিনার ছালের রস । কোষ্ঠ কাঁঠি থাকিলে,—শজিনার ছালের রসে তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া প্রয়োগ করিবে ।

ত্রণ-শোথ ও ত্রণরোগে—করলাপাতা বা উচ্ছেপাতার রস, শোধিত গুগ্গুলুচূর্ণ বা কটকী চূর্ণ । এই সমস্ত অম্বুপানই বিরেচক ।

ভগন্দররোগে—যদির কাষ্ঠের কাথ ।

ফিরঙ্গ বা গর্শ্মিরোগে—অনন্তমূলের কাথ বা গুলঞ্চের রস ও তোপ-চিনি চূর্ণ ।

কুষ্ঠরোগে—চাউলমুগরার বীজ বাটা হই আনাসহ অথবা নিমের ফুল, ফল, পাতা, ছাল ও মূল চূর্ণ করিয়া তৎসহ ।

বসন্তরোগে—করলাপাতা বা উচ্ছেপাতার রসসহ ।

নাসারোগে—তুলসীপাতার রস বা পানের রস ।

নেত্র বা চক্ষুরোগে—ত্রিফলার কাথ বা ভৃঙ্গরাজের রস ।

শিরোরোগে—পানের রস, আদার রস বা নিশিন্দাপাতার রসসহ ।

প্রদররোগে—খেতপ্রদরে আমলকীবীজের শাসবাটা ও ইক্ষুচিনি, চাউলের জল ও কুশমূল বাটা কিম্বা গান্ধাকুলের পাতার রস । রক্তপ্রদরে-
অশোকের ছালের রস বা কাথ ।

বাধকে—ওলটুকম্বলের মূলের শিকড় চারি আনা ও গোলমরিচ ৩৪টি
একত্র বাটিয়া তৎসহ ।

গর্ত্তিণীরোগে—গর্ত্তিণীর জ্বরাদি যে কোন রোগ প্রবল হইবে, সেই
রোগনাশক অম্বপান কল্পনা করিবে ।

সূতিকারোগে—সূতিকারোগে অম্বপানের স্থিরতা নাই । প্রসবের
পর স্ত্রীদিগের নানাপ্রকার রোগ হয় । সূতিকাক্ষেত্রে যে সকল রোগ হয়,
তাহাদিগকে সূতিকা-জ্বর, সূতিকা-গ্রহণী প্রভৃতি কহে, সূত্রাং জ্বর হইলে,
জ্বরোক্ত অম্বপান বা গ্রহণীরোগ হইলে, গ্রহণীরোগোক্ত অম্বপান দিবে ।

বালরোগে—বালকের যে কোন রোগ হইলে, অম্বপান কল্পনা করা
একটু কঠিন । এস্থলে কয়েকটি অম্বপানমাত্র লিখিত হইল, বিস্তারিত
বালরোগাধিকারে 'পৃথক্' বর্ণিত হইবে । অন্নভোজী বা দুগ্ধান্ন-ভোজী
বালকের নবজ্বরে বা সামজ্বরে—তুলসীপাতার রস ও মধু । পুরাতন
বা নিরামজ্বরে—অন্নভোজী শিশু ও বালকের পক্ষে কালমেঘের রস ও মধু,
গুলঞ্চের রস ও মধু বা সেফালিকা পাতার রস ও মধু । প্লীহাজ্বরে—পিপুল-
চূর্ণ ও মধু বা পিপুলচূর্ণ ও পুরাতন গুড় । জ্বরাতীসারে ও অতীসারে—
মুখার রস ও মধু, বেলুষ্ঠচূর্ণ বা বেলুষ্ঠের কাথ ও মধু, আতৈষচূর্ণ ও মধু বা
ধাইফুলচূর্ণ ও মধু । রক্তাতীসারে—কুড়ীর ছালের রস, আয়্যাপানের রস
বা কুক্রশোকার রস ও মধু । আমাশয়ে—সাদা নোটের শিকড় বাটা ও
মধু । রক্তামাশয়ে—রক্ত কাঁটা নোটের মূল বাটা ও মধু কিম্বা রক্তাতী-
সারোক্ত অম্বপান দিবে । কাসে কিম্বা জ্বর ও কাসে পিপুলচূর্ণ ও মধু বা
বচচূর্ণ ও মধু, কাকড়াশুচূর্ণ ও মধু বা তুলসীপাতার রস ও মধু । কাস

তরল করিবার আবশ্যক হইলে পানের বোটা ও পিপুলমূলের পাচনসহ দিবে ।
বমনে—শশার বীজবাটা ও স্তনহৃৎ । গ্রহণীরোগে—মুখার রস ও মধু বা
জীরাভাজা চূর্ণ ও মধু । বলপুষ্টির জন্ত অশ্বগন্ধা চূর্ণ ও মধু ।

বিষাধিকারে—বিশুদ্ধ অপরাজিতা মূলের চূর্ণ ও মধু ।

রসায়নে—দুধের সর ও মধু, মাখন ও মিশ্রী, অশ্বগন্ধা চূর্ণ ও মধু,
বেড়োলা চূর্ণ ও মধু, শতমূলীর সর বা চূর্ণ ও মধু, ভৃঙ্গরাজের রস বা চূর্ণ ও মধু,
ভূই আমলার রস ও মধু, ভূমিকুয়াণ্ডের রস বা চূর্ণ ও মধু ।

বাজীকরণে—দুধে শোধিত সিদ্ধিবীজচূর্ণ, স্নাতভিজিত মাষকলাই চূর্ণ,
পুরাতন শিমুল গাছের ছালচূর্ণ, ভূমিকুয়াণ্ডচূর্ণ, শতমূলীচূর্ণ, কুলেখাড়ার বীজ-
চূর্ণ, কুঙ্কম বা কস্তুরী ।

স্বর্ণসিন্দূর ও রসসিন্দূর । প্রস্তুতবিধি পরিভাষা প্রকরণের ৩ পৃষ্ঠায়
দ্রষ্টব্য ।

মকরধ্বজ । প্রস্তুতবিধি প্রথম খণ্ডের ভূমিকার ৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

সূতিকারোগে-পথ্যোপথ্য ।

সূতিকারোগে উৎকট তিক্ত কিস্বা বিবাদ কোন পথ্য ব্যবস্থাকরিতে না ।
নবজরের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, নবজরের গায় জলসাগু, জলবার্ণি বা ঐষের
মণ্ড মিশ্রী মিশাইয়া খাইতে দিবে । কিসমিস্, ডালিম ও বেদানা, পানিফল
ও কেশুর অল্প পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে । ঐষ ও মিশ্রী ব্যবস্থা করা
জায় । নবজর বা জরবিকার এবং প্রবল অতীসার বা তরলভেদ ব্যতীত
প্রসূতির অজ্ঞ কোন অবস্থাতেই অল্পপথ্য বন্ধ করিবার আবশ্যক নাই ।
প্রসবের পরে কোষ্ঠকাঠি থাকিলে, জলসাগু ব্যবস্থা করিবে । তরল দান্ত
হইলে, জলবার্ণি দিবে এবং গাত্রবেদনা বা শরীরের ভার লাঘব ও আমরস
পরিপাকের জন্য কৃষ্ণজীরা বা কালজীরা বাটা সৈন্ধব লবণসহ অবশ্য দিবে ।
অনন্তর ক্রমশঃ যেমন গাত্রবেদনা লাঘব ও শরীর অপেক্ষাকৃত লঘু অর্থাৎ
হাল্কা বোধ হইবে, তদ্রূপ পথ্য পরিবর্তন করিবে । উদরাময় না থাকিলে
অথচ ক্ষুধা বৃদ্ধি হইলে, আটার রুটি বা ময়দার রুটি ব্যবস্থা করিবে । প্রথম

দুই এক দিন শুক্কা কুটি দিবে, ঘৃত মাখাইয়া বা দুগ্ধ মিশাইয়া দিবে না, পরে শরীর অধিকতর সুস্থ অথচ শ্লানি রহিত হইলে, ভাতের ব্যবস্থা করিবে । অন্ততঃ ঐক্ছুদিন পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন দেওয়া কর্তব্য । মুগ্ধরী বা মুগ দাইল, মোচার ফল, মুলার ঘট, পটোল, কুমড়া, বেগুণ, মান, কাচকলা, ওল, শজিনা, পেপে ও কপি এই সকল দ্রব্যের তরকারী বা ব্যঞ্জন, দ্বত সাঁতলান গাফাইলের কোল, উচ্ছে, করলা ও নালিতাপাতার শুভ্র এবং পাঠা ও মুগ্ধা প্রভৃতির মাংস ঘূষ, কই, মাগুর, ছোট রুই, খলিসা, বেলে, চেং, শিঙ্গী, পাবদা ও মোরলামাছের কোল, সহ মত বন্ধা দুগ্ধ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে । অরুচি প্রবল হইলে পুরাতন আমসব্ব, আমসী বা তেঁতুলসহযোগে কিসকিস্ বাটিয়া চাটনী করিয়া দিবে, কিন্তু তাহাও অল্প দিবে এবং জ্বরসত্ত্বে দিবে না, জ্বরসত্ত্বে অরুচি হইলে, আমরুলশাক, পুদিনা ও কিস্মিস্ দ্বারা চাটনী করিয়া খাইতে দিবে । প্রবল বমন অথচ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে দুগ্ধসহ কিস্মিস্ সিদ্ধ করিয়া ঠৈর মণ্ডের সহিত মিশাইয়া খাইতে দিবে । প্রসবাস্তে শরীর সুস্থ হইলেও অন্ততঃ ৫৭ দিন রাত্রিকালে অন্ন দিবে না, দুগ্ধসাণ্ড বা দুগ্ধবার্লির ব্যবস্থা করিবে ।

শিশু-চিকিৎসা ।

(শিশু ও বালকের পীড়া ।)

১। বাতদুষ্কন্তন্যপায়ী শিশুরোগের লক্ষণ । বায়ুদ্বারা দূষিত স্তন-দুগ্ধ পান করিলে, শিশুর মলমূত্র ও অধোবায়ু-নিঃসরণ রোধ হয় এবং শরীরের ক্লেশতা, কষ্টস্বরের ক্ষীণতা ও আরও নানাবিধ বাতরোগ জন্মে ।

পিত্তদুষ্কন্তন্যপায়ী শিশুরোগের লক্ষণ । পিত্তদূষিত স্তন-দুগ্ধ পান করিলে, শিশুর শরীরের উষ্ণতা, অধিক ঘর্ম্ম, মলভেদ, তৃষ্ণা, কামলা এবং অজ্ঞাত পিত্তরোগ জন্মে ।

শ্লেষ্মদুষ্কন্তন্যপায়ী শিশুরোগের লক্ষণ । শ্লেষ্মদূষিত স্তন-দুগ্ধ পান করিলে, শিশুর মুখ হইতে শ্লান-নিঃসরণ, অধিক নিদ্রা, শরীরের জড়তা,

শোথ, বমি ও চক্ষু রক্তবর্ণ হয় এবং শ্লেষজনিত 'আরুও' বিবিধ প্রকার রোগ জন্মে ।

ত্রিদোষদুষ্ট স্তন্যপায়ী শিশুরোগের লক্ষণ । বাতপিত্ত দূষিত স্তন্যপানে উক্ত বাত ও পিত্তের, বাতশ্লেষদূষিত স্তন্যপানে বাত ও শ্লেষ্মার এবং পিত্তশ্লেষদূষিত স্তন্যপানে পিত্ত ও শ্লেষ্মার মিলিত প্রকোপ লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

ত্রিদোষদুষ্ট স্তন্যপায়ী শিশুরোগের লক্ষণ । ত্রিদোষদূষিত স্তন্যপানে শিশুর বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার মিলিত প্রকোপ-লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

২ । কুস্থনকরোগের লক্ষণ । দূষিত স্তন-দুগ্ধ পান করিলে, শিশু-দিগের অক্ষিপন্নবে অর্থাৎ চক্ষুর পাতায় কণ্ডু জন্মে এবং পাকে ও তাহাহইতে স্রাব নির্গত হয়, পরন্তু তজ্জন্ত শিশু পুনঃ পুনঃ ললাট, নাসিকা ও চক্ষু স্পর্ষণ করে এবং সূর্য্যের উত্তাপ দর্শন করিতে বা চক্ষু মেলিতে পারে না ।

৩ । পারিগর্ভিকরোগের লক্ষণ । গর্ভসঞ্চারহেতু আদৌ স্তন-দুগ্ধ না পাইলে কিম্বা গর্ভবতী মাতার স্তন-দুগ্ধ পান করিলে, শিশুর এই রোগ জন্মে । ইহাতে কাস, অগ্নিমান্দ্য, বমি, তন্দ্রা, ক্লেশতা, অরুচি, ভ্রম ও পেটের পীড়া হয়, পরন্তু পেটটি বড় হয় ও পশ্চাৎ দিক শুকাইয়া যায় । শিশু ধায়দায় কিস্ত গায়ে লাগে না । ইহাকে বাঙ্গালায় এঁড়ে লাগা কহে ।

৪ । তালুকটক । প্রকৃপিত শ্লেষ্মা বালকের তালুকটকে আশ্রয় করিয়া তালুকটকরোগ জন্মায় । এই রোগে তালু মস্তক অপেক্ষা নিম্ন হয় অর্থাৎ বসিয়া যায় ও তজ্জন্ত শিশু স্তন্যপান করিতে চাহে না বা কখন কখন অনিচ্ছার সহিত পান করে, পরন্তু ঐ অবস্থায় শিশুর মলভেদ, পিপাসা, বমি এবং তালু, কণ্ঠ ও মুখে বেদনা হয় ও গ্রীবার দুর্বলতা প্রকাশ পায় অর্থাৎ গ্রীবা শিথিল হইয়া পড়ে ।

৫ । মহাপদ্মরোগের লক্ষণ । বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই ত্রিদোষের প্রকোপবশতঃ বালকের মস্তকে মা বস্তিতে লোহিতবর্ণ বিসর্প জন্মে, ইহা মস্তকে হইলে, শঙ্খদেশ হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত এবং বস্তিতে হইলে, বস্তি হইতে মলদ্বার, মলদ্বার হইতে হৃদয় ও হৃদয় হইতে মস্তকে প্রসর্পিত হয় অর্থাৎ গমন করে । শিশুর এই রোগ প্রাণ-নাশক ।

৬। তুণ্ডি বা নাভিশোথের লক্ষণ । প্রকুপিত বায়ুর প্রভাবে শিশুর নাভি বেদনার সহিত ক্ষীত হইলে, তাহাকে তুণ্ডিরোগ কহে ।

৭। নাভিপাক । শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সর্কাসে বিশেষতঃ নাভিতে সুন্দররূপে সেকতাপ দেওয়া এবং নাভি অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া দেওয়া উচিত । সময় সময় সেকতাপ বা দর্শনের অভাবে বিষম অনিষ্ট সত্ত্বটিত হইয়া থাকে । কোন কোন শিশুর ঐ অবস্থায় নাভি পাকিয়া উঠে এবং চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু হইয়া থাকে ।

৮। গুহপাকের লক্ষণ । প্রকুপিত পিত্তের অভাবে মলদ্বার পাকিলে, তাহাকে গুহপাক কহে ।

৯। অহিপ্তনরোগের লক্ষণ । বালককে স্নান না করাইলে কিম্বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখিলে মলদ্বারে মলমূত্র ও ঘর্ম্ম সঞ্চিত হইয়া প্রকুপিত শ্লেষ্মা ও রক্তদোষের প্রভাবে কণ্ডু উৎপন্ন হয় এবং চুলকাইতে চুলকাইতে তাহা হইতে অনবরত শ্রাব নির্গত হয়, পরন্তু ক্রমশঃ ঐ স্ফোটকগুলি একত্র মিলিত হইয়া ভয়ঙ্কর বা বীভৎ দর্শন বৃহৎ ক্ষততে পরিণত হইয়া থাকে ।

১০। অঙ্গগল্লী । প্রকুপিত শ্লেষ্মা ও বায়ুর প্রকোপবশতঃ শিশু-দিগের শরীরে যুগের ঞ্চায় আকৃতি বিশিষ্ট, চক্চকে, শরীরের সমানবর্ণ ও গ্রন্থি-যুক্ত অথচ বেদনাহীন পিড়কা উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অঙ্গগল্লী কহে ।

১১। আক্ষেপ অর্থাৎ পেঁচোয় বা ভূতে পাওয়া । নাভিসংলগ্ন নাড়ী কাটিবার দোষ, মস্তকে রক্ত সঞ্চিত হওয়া, শরীরে অধিক ঠাণ্ডা বায়ু লাগা অথবা কোন রোগ বা স্বাভাবিক দুর্বলতাবশতঃ বায়ু প্রকুপিত হইয়া শিশুদিগের সর্কাসীন আক্ষেপ উৎপাদন করে । ইহাকে চলিত কথায় পেঁচোয় পাওয়া বা ভূতে পাওয়া কহে । ইহা পৃথক রোগ নহে,—বায়ুদ্বারা দূষিত স্তন্যদুগ্ধের লক্ষণ এই রোগে প্রকাশ পায়, স্তন্যরাং বায়ুদ্বারা দূষিত স্তন্যপান করিলে, এই রোগ উপস্থিত হয়, ইহাতে শিশু হাত পা ছুড়িয়া, চক্ষু উন্টাইয়া, মুখ বাকাইয়া গোঙানীসুরে কাদিতে কাদিতে এক্রপভাবে নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী করিতে থাকে যে, তাহা দেখিয়া ভূতাবিষ্ট মনে না করিয়া পারা যায় না, পরন্তু শিশুর ঐ সময়ে বর্ণবিপর্যায় ঘটে, শরীর কখনও নীলবর্ণ কখনও বালুকাবর্ণ হয়,

পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী নরনারীর ভূতাবেশে অবিশ্বাস, কিন্তু তাহাদিগকেও এইরূপ ভূতাবিষ্ট দর্শনে বিশ্বাসবিষ্ট ও নির্বাক হইতে দেখা গিয়াছে। নাস্তিকের নাস্তিকতা কতক্ষণ, যতক্ষণ বিশ্ববিধাতার মহামহীয়সৌন্দর্য, অদ্ভুত ক্রীড়া তাহার জ্ঞান-নেত্রে প্রতিফলিত না হয়, কিন্তু অবিশ্বাসীরা জ্ঞান-নেত্রে সহজে উদ্ভাসিত হইবার নহে, সে যতক্ষণ না এরূপ বিপদের সম্মুখীন হয়, যাহা হইতে সেই পরম কারুণিকের দয়া ব্যতীত উদ্ধারের কোন উপায় নাই, ততক্ষণ তাহার জ্ঞান-নেত্রে উদ্ভাসিত বা দিব্য জ্ঞান লাভ হয় না এবং জ্ঞান-নেত্রের গোচরীভূত কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিবার সামর্থও জন্মে না। কোনও নাস্তিক সমুদ্র গমন করিলে, যে পর্যন্ত বাত্যাধিক্ষুদ্র তরঙ্গাঘাতে অর্ণবপোত তরঙ্গায়িত না হয়, তাবৎ একঘূহুর্ভের জ্ঞানও সে ব্যাকুলিত বা কণ্ঠিত হয়না, কিন্তু যখন বাত্যাঘাতিত তরঙ্গের প্রবল আঘাতে অর্ণবপোত চূর্ণবিচূর্ণ বা মগ্ন হইবার উপক্রম হয়, তখন বিশ্ববিধাতা রক্ষা কর বলিয়া যুক্তকরে ক্ষীণকণ্ঠে কম্পিতস্বরে প্রার্থনা করিতে থাকে।

ভূতাবেশের কথা শাস্ত্রে যাহা আছে, তাহা অবগ্নই সত্য, কিন্তু তথাপি স্বরণ রাখা উচিত যে দোষ বা প্রকৃতির বিকৃতিব্যতীত কোন রোগই উৎপন্ন হইতে পারে না ; সুতরাং ঔষধ-প্রয়োগ অবগ্নই কর্তব্য।

১২। দন্তোদগমজনিতরোগ। শিশুর দন্তোদগম কালে সর্বপ্রকার রোগই উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু জ্বর, নানাবর্ণযুক্ত মলভেদ, কাস, বমি, শিরঃপীড়া, অভিঘ্রাদ ও পোথকী নামক নেত্ররোগ এবং বিসর্প, এই সকল রোগের লক্ষণ বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পায়। শিশুদিগের সচরাচর ষষ্ঠমাসে দাঁত উঠে। সকলের এই সময়ে দন্তোদগম হয় না। জলবায়ু ও প্রকৃতির বিভিন্নতাবশতঃ সময়ের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। সর্বাগ্রে সম্মুখের নীচের পাটীর দুইটি দাঁত উল্লগত হয় ; পরে সম্মুখের উপরের দুইটি উঠে।

শিশুরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

শিশু কিম্বা বালকের যে রোগ হয়, তাহাকে শিশুরোগ কিম্বা বালরোগ কহে। শিশু বা স্তনদুগ্ধই শিশুর জীবন। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বেই তাহার মাতৃস্বনে দুগ্ধের সঞ্চার হয় এবং ভূমিষ্ঠহইয়াই সে ঐ স্তনদুগ্ধ পান করে, এইজন্ম

বাহাতে স্তনদুগ্ধদূষিত না হয় বা সেই দূষিত স্তন্য পান করিয়া শিশু পীড়িত হইতে না পারে, সর্বতোভাবে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য । বয়ঃস্থ বা বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের যে যে রোগ জন্মে, শিশুরও সেই সেই রোগ জন্মে, কিন্তু শিশুর যে সকল রোগ জন্মে, বয়ঃস্থ ব্যক্তিগণের তাহা জন্মে না, তজ্জন্ত বালরোগ ও তাহার চিকিৎসা স্বতন্ত্র কথিত হইয়াছে । শিশু পীড়িত হইলে, স্বভাবতঃ রোদন করে । যে পর্য্যন্ত শিশু কথা কহিতে বা পীড়ার বিবরণ ব্যক্ত করিতে অসমর্থ, তাবৎ তাহাদের আভ্যন্তরিক পীড়া হইলে, রোদন শুনিয়া রোগোৎপত্তি হইয়াছে, বুঝিতে পারা যায় এবং রোদনের তারতম্যানুসারে পীড়ার ন্যূনাধিক্যতা স্থির করা যায় । শিশুর কোন অঙ্গে বেদনা হইলে, সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইলে, যে স্থানে বেদনা, সেই স্থানে পুনঃ পুনঃ হাত লাগিলেই বালক কান্দিয়া উঠে । মস্তকে রোগ হইলে, বালক চক্ষু বুজিয়া থাকে,—চক্ষু মেলিতে পারে না এবং মস্তক হেলিয়া পড়ে । বন্তি বা মূত্রাশয়ে রোগ হইলে বালকের প্রস্রাব বন্ধ এবং ক্ষুধামান্দ্য ও তৃষ্ণা হয় । কোষ্ঠে বা আশয়ে রোগ হইলে, মলমূত্র রোধ, ব্যাকুলতা, বমি, উদরাগ্নান এবং উদরে গুড়্ গুড়্ শব্দ হয় । এই সকল লক্ষণদ্বারা অল্পেণে বালকের রোগ নির্ণয় করা যায় । রোদনদ্বারা সাধারণতঃ সর্ব্বাঙ্গের রোগই অশগত হওয়া যায় ।

পনের বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মানুষ বালক নামে অভিহিত হয় । আহারভেদে-বালক ত্রিবিধ, স্তন্যপায়ী, দুগ্ধান্নভোজী ও অন্নভোজী । চলিত কথায় স্তন্যপায়ী ও দুগ্ধান্নভোজীদিগকে শিশু বলা হয় । কোন শিশুকেই নির্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত স্তন্যপান করান হয় না, কোন কোন শিশুকে এক বৎসর এবং কোন শিশুকে দেড় বা দুই বৎসর পর্য্যন্তও স্তনদুগ্ধ পান করান হইয়া থাকে । শাস্ত্রকারেরা সাধারণতঃ শুধু স্তন্যপানের কাল একবৎসর পর্য্যন্ত নির্দ্ধারণ করিয়াছেন । ঐরূপ স্তন্য ও অন্নভোজনকাল দুই বৎসর এবং দুইবৎসরের পর কেবল অন্ন ভোজনদ্বারাই জীবন-রক্ষা হইতে পারে বলিয়া ঐ সময় অন্নভোজনের কাল নির্দেশ করিয়াছেন । সুতরাং ঐ হিসাবে এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্তন্যপায়ী, এক বৎসরের পর দুই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দুগ্ধান্নভোজী এবং দুই বৎসরের পর অন্নভোজী বলা যায় । যদিও এই উপদেশ অল্পযায়ী কেহু কার্য্য করে না, তথাপি শাস্ত্রকারগণের ঐ উপদেশ মধ্যে যে নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত

আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বেশী দিন বা গর্ভবতী মাতার স্তন্য পান করাইলে পারিগর্ভিক রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগ সকলেরই পরিচিত। ইহাকে চলিত কথায় এঁড়োলাগা বা এঁড়েপাওয়া কহে। শিশুর বয়স ৬ মাসের পূর্ণ হইলেই স্তনদুগ্ধ প্রদান বন্ধ করা উচিত। একেবারে বন্ধ করিলে, শিশুর অত্যন্ত কষ্ট হয়, স্তন্যরাং ক্রমশঃ কমাইয়া আনিবে। বিশেষতঃ গর্ভবতী মাতার স্তনদুগ্ধ অত্যন্ত অনিষ্টকর, স্তন্যরাং শিশুকে কখনই তাহা পান করিতে দেওয়া উচিত নহে। ঐ দুগ্ধ বিষভূল্য। দুই একটি কোশল অবলম্বন করিলেই শিশু দুগ্ধপানে বিরত হয়। নিম্নের কচি পাতা বাটিয়া স্তনের অগ্রভাগে মাখাইলে কিম্বা দুই এক রতি কুইনাইন জলে গুলিয়া স্তনাগ্রে লেপন করিলে, তিজ্ঞাস্বাদ বশতঃ বিরক্তিসহকারে শিশু স্তনদুগ্ধপানে স্বয়ংই বিরত হয়।

প্রসূতির পক্ষে কোন্ কোন্ দ্রব্য সুপথ্য অর্থাৎ ভক্ষণ করা উচিত, তাহা স্তন্যকারোগে নির্দেশ করা হইয়াছে, ঐ নির্দেশ মত আহার বিহার করিলে, স্তনদুগ্ধ দূষিত হইবার আদৌ সম্ভাবনা থাকে না। যথেষ্ট আহার বিহার করিলে, সন্তান পীড়িত বা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে, একথা প্রসূতি বা স্তন্যদায়িনীর সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। কিন্তু বড়ই ক্ষোভের বিষয়, এই সাধারণ কথাটা মনে রাখিয়া কার্য্য করিবার শক্তি অনেকেরই নাই, যাহাদের নাই, তাঁহারা নিশ্চিতই সন্তানের শত্রু, আর আজকাল এরূপ শত্রুর সংখ্যা অল্প নহে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, স্তন্যরাং কথাটা অপ্রিয় হইলেও অতি সত্য। গর্ভপূর্ণমন্ডের জন্মমৃত্যুর রিপোর্টে শিশুর মৃত্যুসংখ্যা দিন দিন যে বাড়িয়া যাইতেছে, প্রসূতির এইরূপ আহার বিহারের অনিয়মও তাহার অত্যন্ত কারণ, একথা অস্বীকার করা যায় না। আহার বিহারের নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতে খুব কম প্রসূতিকেই দেখা যায়। কারণ, তাঁহারা স্বভাবতই শাকসবজি, শাক বা অল্পদ্রব্য পাইলে, সন্দেহ রসগোল্লা ভক্ষণেও তাহাদের রুচি থাকে না, পীড়িতাবস্থায় নিষেধবাক্য অগ্রাহ করিয়াও গোপনে শাকসবজি ভক্ষণ করিয়া থাকেন, অবশ্য এস্থলে শিক্ষিতা জ্ঞানিগের কথাই বলা হইতেছে, অশিক্ষিতা জ্ঞানীলোকেরা যে কতদূর নিয়মবহির্ভূত আহার বিহার করেন, তাহা কল্পনা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। প্রসূতি বা স্তন্যদায়িনীর জ্ঞান উচিত যে, তাঁহাদের ভুক্তদ্রব্যের সারাংশ হইতেই স্তনদুগ্ধ উৎপন্ন

হয়, স্তন্যদান যে স্তন্য শিশুর জীবন বা জীবনরক্ষার একমাত্র অবলম্বন, তাহা যদি কুপথ্য ভক্ষণে দূষিত হয়, তাহা হইলে, সেই দূষ পান করিয়া শিশু নিশ্চিতই পীড়িত হইবে।

কেবল আহার দ্বারাই যে স্তন্য দূষিত হয় এমন নহে, বাহ্য কারণেও স্তন্য দূষিত হয়। প্রসূতি বা ধাত্রীর শরীরে রৌদ্রের অধিক উত্তাপ, বৃষ্টিরজল শীতল বায়ু, পূর্নদিক হইতে আগত বায়ু, অগ্নির অধিক উত্তাপ প্রভৃতি লাগিলে কিম্বা মেঘ, কুয়াসা ইত্যাদি কারণে অথবা গ্রীষ্ম বর্ষাদি ঋতুর পরিবর্তনে স্তন্যদায়িনী পীড়িত হইলে, স্তন্য দূষিত হয়। এতদ্ব্যতীত ঋতু বিপর্যয় অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে অধিক বর্ষা ও বর্ষাকালে অধিক গ্রীষ্ম প্রভৃতি কারণেও স্তন্যদায়িনী পীড়িত হইতে পারে। ফলতঃ শিশু পীড়িত হওয়ার মুখ্য বা প্রধান কারণ দুইটি। স্তন্যদায়িনীর স্তন্য দূষিত হইলে, সেই দুই স্তন্য পান করিয়া শিশু পীড়িত হয় এবং রোদ্র, মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াসা, ঋতুবিপর্যয় বা ঋতু পরিবর্তনবশতঃ শিশু পীড়িত হইয়া থাকে। বাহ্যিক বেসকল কারণে স্তন্যদায়িনী পীড়িত হইতে পারে, সেই সকল কারণেই শিশু পীড়িত হইতে পারে। বরং স্তন্যদায়িনী অপেক্ষা বাহ্য কারণে শিশু অতি শীঘ্র অধিকতর পীড়িত হয়, কারণ শিশুর শরীর অতিশয় কোমল, স্তন্যদান সে শীতবাত সহ করিতে অসমর্থ। গর্ভাশয়ে ভ্রূণের উৎপত্তি ও অবস্থান প্রভৃতির পর্যালোচনা করিলে, শিশুরা কেন শীতবাত সহ করিতে অসমর্থ, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। প্রথম মাসে গর্ভ তরল ভাবে থাকে, অনন্তর ক্রমশঃ উহা কঠিন রক্ত-পিণ্ডাকারে পরিণত হয় এবং তৎপর তাহা হইতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে; বিশেষতঃ শিশু গর্ভকোষে যে তরল পদার্থের মধ্যে অবস্থান করে, তাহার তাপ বাহ্য তাপ অপেক্ষা অধিক অথবা বাহ্য তাপ তদপেক্ষা মৃদু, এক্ষণে বক্তব্য এই—যে রক্তপিণ্ড কয়েক মাস যাবৎ একটি জীবে পরিণত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সে কি কখনও পরিণত বয়স্ক ব্যক্তির ন্যায় শীতবাত সহ করিতে পারে? কখনই পারে না; বরং রোদ্র বা অগ্নির তাপ সহ করিতে পারে। এই জন্যই শিশুর কোমল শরীরকে শীতবাতাদি সহন ক্ষম করিবার অভিপ্রায়ে সর্বাঙ্গে তৈল মর্দন করিয়া রোদ্রে রাখার প্রথা রক্তকাল হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছে। এ প্রথাটি ভাল। টাটকা নিভাঁজ

সন্নিবার তৈল শ্লেষ্মাশক, উহা মর্দনে শ্লেষ্মা বিনষ্ট ও শরীর দৃঢ় অথচ স্নিগ্ধ হয় ।

শীত, বাত ও ঠাণ্ডা প্রভৃতি বাহ্যকারণে শিশু পীড়িত হইতে পারে, তৎপ্রতীকারার্থ তাহার সর্বাঙ্গ বন্ধদ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে । আবধান-তার অভাবে ঠাণ্ডা লাগিয়া আজকাল অধিকাংশ শিশু পীড়িত হয়, পরন্তু কোন কোন স্থলে বা নিউমোনিয়া অর্থাৎ ফুস্ফুস-বিকৃতিরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে । ফলতঃ শিশুর অধিকাংশ রোগই ঠাণ্ডা লাগিয়া উৎপন্ন হয় । চিকিৎসাকালে বাহ্যকারণে কিম্বা প্রসূতির স্তন্য পানে শিশু পীড়িত হইয়াছে, তাহা সর্বাগ্রে অবগত হওয়া আবশ্যিক । যেহেতু রোগোৎপত্তির কারণ-বর্জন চিকিৎসার আদ্যক্রম, সূত্রাং বাহ্যকারণে রোগ জন্মিলে এবং রোগ তাদৃশ প্রবল না হইলে, কেবল নিদান পরিবর্জনের ব্যবস্থা করিলেই চলিতে পারে । কিন্তু সর্বত্র পীড়ার কারণ ঐরূপ নিরূপণ করা সুসাধ্য বা সম্ভবপর নহে । এইরূপ স্থলে স্তন্য পরীক্ষা করা কর্তব্য, পরীক্ষা করিলে, স্তন্য দূষিত হইয়াছে কি না তাহা বুঝিতে পারা যায়, তবে স্তন্য পরীক্ষার দ্বারা ই যে সর্বত্র কৃতকার্য হওয়া যায়, তাহাও নহে ; যেহেতু প্রবল কারণ ব্যতীত স্তন্যদূষিত্ব লক্ষণ প্রকাশ নাও পাইতে পারে । এই সকল কারণে রোগ যথাসাধ্য নির্ণয় করিয়া স্তন্যদায়িনী ও শিশু উভয়কে ঔষধ সেবন করান প্রকৃষ্ট পন্থা । ইহাতে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় । বাহ্যকারণে শিশু পীড়িত হইলে, তাহাকে যে ঔষধ সেবন করান যায়, তাহাতেই সে আরোগ্য-লাভ করিতে পারে । পক্ষান্তরে যদি স্তন্য দূষিত হওয়াতেই শিশুর পীড়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে, স্তন্য-দায়িনীর ঔষধ সেবন দ্বারা স্তন্য বিশুদ্ধ হইতে পারে । কিন্তু ইদানীং অধিকাংশ স্থলেই সর্বাগ্রে শিশুর চিকিৎসা করা হয়, যদি তাহাতে বিশেষ উপকার না হয়, তবে স্তন্যদায়িনীকে চিকিৎসা করা হয় । ইহা চিকিৎসকের দোষ নহে, অনেকস্থলে শিশুর মাতা ঔষধ সেবনেই অনিচ্ছাপ্রকাশ করেন, আবার কেহ কেহ ঔষধ সেবন করা ও সুনিয়েম থাকা মহাপাপের ভোগ বলিয়াই মনে করেন, এই সকল বিভ্রাটে আজকাল প্রসূতির চিকিৎসা হয়ই না । এইরূপ স্থলে স্তন্যদাত্রীকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, তাহার অমনো-যোগিতার ফলে সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে । বুঝাইয়া বলিলে

কোন কোন স্থানে সফল ফলে দেখা গিয়াছে । গর্ভসঞ্চারের পর হইতে যাবৎ শিশু স্তন্যপান ভ্যাগ না করে, তাবৎ নিজের ইচ্ছামত প্রসূতির আহার বিহারাদি করা উচিত নহে, করিলে তদ্বারা সন্তানের কিরূপ অমঙ্গল ঘটিতে পারে, তাহা গর্ভবতীকে বুঝাইয়া বলা উচিত । পরন্তু সন্তান পীড়িত হইলে যেন নিজের রোগ হইয়াছে এবং তদ্রূপ ঔষধ পথ্যাদি করিতে হইবে, এ কথাটাও বলা উচিত । সন্তানকে যতই ঔষধ সেবন করান হউক, যদি স্তন্যদুষ্টিবশতঃ রোগ জন্মে, তবে স্তন্যদায়িনীর ঔষধ ও সুপথ্য সেবন ব্যতীত কিছুতেই রোগের উপশম হইতে পারে না ।

বয়স্ক ব্যক্তির জ্বরাদি যে সকল রোগ জন্মে, বালকেরও সেই সকল রোগ জন্মে, কিন্তু এরূপ কতকগুলি রোগ আছে যে, তাহা কেবল বালকেরই জন্মে, বয়স্ক ব্যক্তির জন্মে না । কিন্তু বালকের যে কোন রোগই হউক, তাহাকে বালরোগ বলা যায় । জ্বরাদিরোগ ব্যতীত স্তন্যদুষ্টিজনিত রোগ, কুহনক, তালুকটক, নাভিপাক, তুণ্ডী বা নাভিশোথ, পারিগর্ভিক বা এন্ডো-লাগা, গুহপাক, মহাপদ্ম, অহিপূতন ও অঙ্গগল্লী এই সকল রোগ কেবলমাত্র শিশু ও বালকেরই জন্মে ।

বয়স্কদিগের জ্বরাদিরোগে যে সকল ঔষধ প্রয়োজ্য, বিবেচনাপূর্বক তন্মধ্য হইতে তীব্র বিষাক্ত ঔষধগুলি বাদ দিয়া এবং মাত্রা কমানিয়া অস্বাভাব্য সমস্ত ঔষধই বালকদিগকে প্রয়োগ করা যায় এবং অনেক চিকিৎসকই তদ্রূপ প্রয়োগ করিয়া থাকেন ও তদ্বারা রোগও আরোগ্য হয় । তবে জ্বরবিকার প্রভৃতি কঠিন কঠিন ব্যাধি ব্যতীত ঐরূপ ঔষধ প্রায়শঃ প্রয়োগ করিতে হয় না । সাধারণ রোগে বালরোগের ঔষধ প্রয়োগ করিলেই চলে, পরন্তু ঐ সকল ঔষধই শিশুর পক্ষে সমধিক উপযোগী অথচ প্রয়োগ করাও সহজ, লক্ষণদৃষ্টে প্রয়োগ করিলেই চলে ।

শিশুর উপযোগী ঔষধ । শিশুকে যে কোনও ঔষধ প্রয়োগ করিবার সময়ে অরণ রাখা উচিত যে, ঔষধটি যেন উৎকট তিক্ত, বেশী অম্ল, বেশী কটু বা ঝাল এবং অধিক লবণরস অথবা তীক্ষ্ণগুণবিশিষ্ট বা তীব্র না হয় । কারণ বয়স্ক ব্যক্তির অপেক্ষা শিশুর মুখে তিক্ত ও কটু প্রভৃতি দ্রব্যের তিক্ততা ও ঝাল বেশী লাগে, বিশেষতঃ ভাহারা বেশী ঝাল সহ করিতেও অসমর্থ ।

আদার রস খাওয়াইলে অনেক শিশু যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বিকট মুখভঙ্গী ও চীৎকার করে, তজ্জন্ত অতিশিশুকে আদার রস জল বা মধু সহযোগে খাওয়াইতে হয়। এই সকল কারণে শিশুদিগের পক্ষে মৃদুগুণবিশিষ্ট অল্প অধিক তিক্ত বা কাল নহে, এইরূপ ঔষধই সমধিক উপযোগী।

ঔষধ খাওয়াইবার প্রণালী। অল্প তিক্ত বা কাল ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইলে, ঔষধ অপেক্ষা বেশী মধু ও স্তন-দুগ্ধ মিশাইয়া মিষ্ট ও তরল করিয়া লইতে হয়, পরে স্তনাগ্রভাগে মাখাইয়া কিম্বা শিশুর জিহ্বায় লাগাইয়া দিতে হয়। বটিকা, চূর্ণ ও অবলেহ ঐ নিয়মে খাওয়াইতে হয়। পাচন মধু সহযোগে কিছুকৈ করিয়া খাওয়াইবে। যে কোন ঔষধ তরল না করিয়া খাওয়াইতে নাই। গলায় বাধিয়া বিষম লাগিতে পারে।

মাত্রার নিয়ম। মাত্রার কুত্রাপি বান্ধাবাদি নিয়ম নাই, কারণ দোষ, অগ্নি, বল, বয়স, রোগ, ঔষধ-দ্রব্য ও কোষ্ঠ বিবেচনা করিয়া মাত্রা স্থির করিতে হয়, কিন্তু শিশুর পক্ষে মাত্রা স্থির করিতে বয়স কত, অগ্নি এবং বল কিরূপ, ঔষধ মৃদু কি তিক্ত এই কয়েকটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখিলেই চলে। বয়স, যেমন এক বৎসর বয়স্ক শিশুর মাত্রা অপেক্ষা দুই বৎসরের শিশুর মাত্রা কিছু বাড়াইয়া দেওয়া। অগ্নি, যথোচিত মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিলেও যদি তাহা সূক্ষীর্ণ না হয়, তবে মাত্রা কমাইয়া দেওয়া এবং সূক্ষীর্ণ হইলে, কিছু বাড়াইয়া দেওয়া। ঔষধ,—শিশুর ব্যবস্থিত ঔষধ মৃদু হইলে, যথোচিত মাত্রায় প্রয়োগ করা বা মাত্রা একটু বাড়াইয়া দেওয়া অথবা তীক্ষ্ণ হইলে, মাত্রা কিছু কমাইয়া দেওয়া। আদার রস বা পিপুল প্রভৃতি তীক্ষ্ণ-দ্রব্যের মাত্রা কিছু কম করা উচিত। এই প্রকার পাচন স্বভাবতঃ সহজে জীর্ণ হয় বলিয়া কিছু বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু পাচন অপেক্ষা চূর্ণ বা অবলেহ জীর্ণ হইতে বেশী সময় লাগে বলিয়া চূর্ণ বা অবলেহ কম মাত্রায় দিতে হয়, আবার সাধারণ চূর্ণ অপেক্ষা ধাতুমিশ্রিত চূর্ণ বা ধাতুঘটিত বটিকা জীর্ণ হইতে আরও বেশী সময় লাগে বলিয়া তাহা আরও কম প্রয়োগ করা উচিত। রসসিন্দূর, স্বর্ণসিন্দূর বা সাধারণ মকরন্ধ্বজ এবং ষড়গুণবলি-জ্ঞাপিত ও সিদ্ধমকরন্ধ্বজ প্রভৃতি ধাতুঘটিত বটিকা অপেক্ষা কিছু কম মাত্রায়

দেবে। কোন ঔষধ কি মাত্রায় প্রয়োগ করা উচিত, তাহার একটি সাধারণ নিয়মাবলী নিয়ে দেওয়া গেল।

বয়স অনুসারে মাত্রার সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী।

ঔষধ	জন্ম হইতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত পরিমাণ।	দুই বৎসরের উর্দ্ধ পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত পরিমাণ	৫ বৎসরের উর্দ্ধ দশ বৎসর পর্য্যন্ত পরিমাণ	১০ বৎসরের উর্দ্ধ ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত পরিমাণ	পূর্ণমাত্রার পরিমাণ
পাচন বা কাথ	অর্দ্ধতোলা	১ তোলা	২ তোলা	৪ তোলা	৮ তোলা
চূর্ণ ও অবলেহ	১ রতি	২ রতি	অর্দ্ধ আনা বা ৩ রতি	এক আনা বা ৬ রতি	২ আনা বা ১২ রতি
বটিকা	সিকি রতি	অর্দ্ধ রতি	১ রতি	২ রতি	৩ রতি
রসসিন্দূর ও স্বর্ণসিন্দূর	সিকি রতি বা ১ রতি	অর্দ্ধ ১ রতি	১ রতি	১১ রতি	২ রতি
তেউড়ী চূর্ণ কটকী চূর্ণ	৩ রতি	৬ রতি	৯ রতি	১২ রতি	২ হইতে ৪ আনা
বিষাক্ত বটিকা	০	পূর্ণ মাত্রা ১ রতি হইলে ১	১	২ অর্দ্ধ বটী	১ রতি
ক্যাষ্টর অয়েল	১৫ হইতে ৩০ ফোটা	৩০ হইতে ৬০ ফোটা	এক হইতে দুই ড্রাম	দুই হইতে ৪ ড্রাম	২ তোলা
রস (অম্লপানের)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
মধু	৫ ফোটা	১০ ফোটা	১৫ ফোটা	২০ ফোটা	৩০ ফোটা

সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা । পাচন, চূর্ণ ও অবলেহ প্রভৃতি ঔষধের সাধারণ মাত্রা প্রদর্শিত হইল । এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব । কারণ অবস্থা-ভেদে ঐ সকল মাত্রা পরিবর্তন করিয়া যায় । কেহ কেহ শিশুদিগকে ঐ মাত্রা অপেক্ষা বেশী মাত্রায় পাচন ২ । ৩ বা ৪ প্রয়োগ করেন । আর কেহ কেহ চূর্ণ ও অবলেহ উহা অপেক্ষা বেশী মাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । পাচন, চূর্ণ ও অবলেহ কিছু বেশী মাত্রায় দিলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু অগ্নাচ্ছ ঔষধ বেশী দিতে নাই । রসসিন্দূর, স্বর্ণ-সিন্দূর ও মকরধ্বজ বেশী মাত্রায় দেওয়া উচিত নয় । ১ বা ২ । ৩ বৎসরের শিশুদিগকে বিষাক্ত ঔষধ দিতে নাই । ২ । ৩ বৎসরের উর্দ্ধ ৫ । ৬ বৎসর বয়স্ক শিশুদিগকে তীব্র বিষাক্ত ঔষধ দিবে না । তদূর্দ্ধ বয়স্ক বালকদিগকে কেহ কেহ হৃদিকাভরণ প্রভৃতি প্রয়োগ করেন, আবার কেহ কেহ প্রয়োগ করেন না ; কিন্তু ২ । ৩ বৎসরের বেশী বয়স্কদিগকে সাধারণ বিষাক্ত ঔষধ সচরাচর সকলেই ব্যবস্থা করেন ।

কোন কোন স্থলে রসসিন্দূর, স্বর্ণসিন্দূর বা মকরধ্বজ শিশুদিগকে সেবন করাইয়া দেখা গিয়াছে, উহা জীর্ণ না হইয়া মলের সহিত অবিকৃত অবস্থায়ই বহির্গত হইয়া থাকে । বোধ হয় রসসিন্দূর, স্বর্ণসিন্দূর বা মকরধ্বজ বাহারা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা এ তত্ত্ব অবগত আছেন । ঐ অবস্থায় ঔষধ-প্রয়োগ বন্ধ না করিয়া মাত্রা কমাইয়া দিবে ।

বিরেচনের জন্ম ক্যাষ্টর অয়েল সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, দুই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত উহাই প্রয়োগ করা উচিত । তৎপর তেউড়ী চূর্ণ, ইহা দুই বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্কদিগকে প্রয়োগ করা যায় । কটকী তেউড়ী অপেক্ষা কিছু হীন । যাহা হউক, অনেকেই ঐ দুইটি প্রয়োগ করেন । বিরেচনের যে মাত্রা লিখিত হইল, তাহাতে দান্ত না হইলে, মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দিবে । অমুপানের জন্ম যে সকল রসের প্রয়োজন হইবে, তাহা যদি বিরেচনের জন্ম প্রয়োগ করা যায়, তবে উক্ত মাত্রা অপেক্ষা কিছু বেশী লওয়া যাইতে পারে । যেমন-তুলসী পাতার রস বা মধু অবস্থা-ভেদে কিছু বেশী কম লইলেও দোষ নাই ।

শিশুর কাথ প্রস্তুতের নিয়ম । শিশুর জন্ম কাথ প্রস্তুত করিতে হইলেও পূর্ণমাত্রায়ই করা কর্তব্য, অর্থাৎ কাথ্যদ্রব্য আটটি হইলে, তাহার

প্রত্যেকটি চারি আনা, মোট সমস্ত মিলিত ২ তোলা, ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। পরে যতটুকু প্রয়োজন, তাহা স্ৰাবিয়া অবশিষ্ট ফেলিয়া দিবে। কিন্তু কেহ কেহ অর্দ্ধ বা সিকি-মাত্রায় ঔষধ ও তদনুরূপ ১৬ বা আট তোলা জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া চারিভাগের এক ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে প্রয়োগ করেন। ইহাতে ঔষধ নিশ্চয়ই হীনবীর্য্য হয়, বরং অর্দ্ধ মাত্রায় ঔষধ লইয়া ১৬ তোলা জলে সিদ্ধ করার ব্যবস্থা দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু অর্দ্ধ তোলা ঔষধ ৮ তোলা জলে সিদ্ধ করা কদাপি সম্ভব নহে।

অল্পপান সহ ঔষধ ভক্ষণ করিলে, ঔষধের গুণ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, এমন কি সময় সময় সামান্য সামান্য ঔষধে আশ্চর্য্য উপকার পাওয়া যায়। সামঞ্জরে—তুলসীপাতার রস ও মধু। জ্বরবিকারে—আদার রস, কুট্রাক্ষষসা বা তালশাখার রস ও মধুসহ। নিরামজরে এবং জীর্ণ বা পুরাতনজরে—শেফালিকাপাতার রস, ক্ষেৎপাপড়ার রস বা কালমেঘের রস। প্রীহাজরে ও যকৃৎসংযুক্ত জরে অল্প পোড়া রসুন বাটা, কালমেঘের পাতার রস, তালের জটাজ্বর, হিং, পিপুলচূর্ণ বা মনসাসীজের পাতা আগুনে গরম করিয়া নিম্নড়াইয়া তাহার রস। শৌথে শ্বেত বা লালপুনর্ব্বার রস ও পিপুলচূর্ণ। কাসে বা তৎসংযুক্ত জরে বাসকছালের রস ও মধু বা পিপুলচূর্ণ ও মধু কিম্বা বাসকছাল, কিস্টিস, যষ্টিমধু ও পিপুল এই চারিটির কাথ। শ্বাসে বা শ্বাসসংযুক্ত জরে ময়ূরপৃচ্ছ ভক্ষ্য ও স্তনদুগ্ধ কিম্বা বহেড়াঘসা ও স্তন-দুগ্ধ। হিকায় কুলের আঙ্গির শাস বাটা কিম্বা শশার বীচির শাস বাটা ও স্তন-দুগ্ধ; কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, কটুকীচূর্ণ। মন্দায়িতে গরম জল বা যমানী ও মেথী ইহার কোন একটি ভিজান জল। আমাজীর্ণে উষ্ণজল। বিদ্যাজীর্ণে চূর্ণের স্বচ্ছজল। বিষ্টকাজীর্ণে হিং ও সৈন্ধব লবণ। তরল দান্ত, অতীসার এবং জরাতীসারে মুখার রস ও মধু, আতৈষচূর্ণ ও মধু কিম্বা বেলভৃষ্টচূর্ণ ও মধু। স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে জায়ফলঘসা, মুখাঘসা বা বেলভৃষ্টঘসা ও স্তনদুগ্ধ প্রশস্ত। দুগ্ধারভোজী শিশুর গ্রহণীতে কাঁচা বেল পোড়া ও মধু বা জীরা ভাজা চূর্ণ ও মধু। শ্বেত প্রবাহিকা অর্থাৎ শ্বেত আমাশয়ে ধান-কুনী পাতা, গান্ধাইলের পাতা বা শ্বেত কাঁটানোটের মূলের রস। রক্তাতীসার

ও রক্তমাশয়রোগে রক্ত কাঁটানটের মূলের রস, কুড়চী ছালের রস, কু-
শিম বা কুকুরশোঁকার রস, ডালিমের পাতার রস, বিশল্যকরণী বা আয়া-
পানের রস ও মধু । বিষচিকারোগে আপাঙ্গের মূলের রস ও সৈন্ধব-কিষা
কপূর ভিজান জল । পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকরোগে কোষ্ঠকাঠিখ থাকিলে
তেউড়ীচূর্ণ, কটকীচূর্ণ, উচ্ছে অথবা করলা পাতার রস । কোষ্ঠ পরিকার
থাকিলে, হরিদ্রাচূর্ণ, ত্রিফলাচূর্ণ বা হিষ্ণাশাকের রস । উর্দ্ধগত রক্তপিতে
অর্থাৎ নাসা, কর্ণ বা মুখ-গহ্বর হইতে রক্তস্রাব হইলে, বিশল্যকরণী বা আয়া-
পানের রস, যজ্ঞডুমুরের রস, কুশিম বা কুকুরশোঁকার রস, বাসকছালের বা
পাতার রস, কচি দুর্ধার রস বা আলতা ভিজান জল । অধোগত রক্তপিতে
অর্থাৎ মলদ্বার ও মূত্রদ্বার হইতে রক্তস্রাব হইলে, কুড়চীছালের রস বা
কুশিম অর্থাৎ কুকুরশোঁকার রস বা লালনোটের মূলের রস ।

যক্ষ্মারোগে বেশী রক্তস্রাব হইলে, তাহা বন্ধ করিবার জন্ত কচি দুর্ধার রস,
যজ্ঞডুমুরের রস, আলতা ভিজান জল, বিশল্যকরণী বা আয়াপানের রস ।
যক্ষ্মার সহিত কাস থাকিলে, পিপুলচূর্ণ ও মধু বা বাসকছাল, কিস্মিস,
যষ্টিমধু ও পিপুলের কাথ । অর্শোরোগে নাগেশ্বর ফুলের রেণুবাটা, স্বাধ্বন ও
মিশ্রীচূর্ণসহ । রক্তার্শে কৃষ্ণতিলের শাস বাটা ও ইক্ষুচিনি । এতদ্ব্যতীত কুড়চী-
ছালের রস বা অধোগত রক্তপিত্তের অনুপান প্রয়োগ করা যায় । স্মৃগভঞ্জন ব্রাহ্ম
শাকের রস বা পিপুলচূর্ণ ও মধু । অরুচিরোগে আমরুল শাকের বা আদার
রস । ক্রিমিরোগে আঁশশেওড়ার পাতার রস, আনারসের কচি পাতার রস,
দাঁতন গাছের পাতার রস, ডালিমগাছের শিকড়ের রস, শর্শীর-রস, ভাঁট-
গাছের পাতার রস, চাঁপা ফুলগাছের পাতা বা ছালের রস, সুপারীগাছের
শিকড়ের রস, খেজুর পাতার বা মাথীর রস স্তম্ভপায়ী শিশুর পক্ষে । বিড়ঙ্গচূর্ণ,
পলাশবীজচূর্ণ বা চূণের স্বচ্ছ জল প্রশস্ত । বমনে শশার বীজ বাটা ও স্তনদুগ্ধ,
ডালিম বা বেদানার রস বা অণ্ডগাছের শুক ছাল দক্ষ করিয়া জলে ভিজাইয়া
সেই জল । তৃষ্ণারোগে মৌরীভিজান জল প্রশস্ত । দাহরোগে ডালিম বা
বেদানার রস কিষা গুলকের রস । মূর্ছারোগে চাউলের জল, বেদানার বা
ডালিমের রস । উন্মাদ ও অপস্মাররোগে চাউলের জল, ত্রিফলার জল, শত-
মূলীর রস, বা আমলা ভিজান জল । বাতব্যাদিতে কোন অঙ্গ শুকাইয়া

যাইলে, অশ্বগন্ধার চূর্ণ, কিন্তু ফুলা ও বেদনা থাকিলে কিম্বা আম্বাতে ভেরেণ্ডার মূলের রস ও আদার রস । শীতপিত্ত, উদৰ্দ ও কোঠরোগে কোঠ-কাঠিগ্রা থাকিলে, উচ্ছে বা করলা পাতার রস, দান্ত পরিকার থাকিলে হরিজা ও নিম্বপাতার চূর্ণ । অম্লপিত্তে গলা বুক জ্বালা থাকিলে এবং দমকা দান্ত হইলে চূর্ণের স্বচ্ছ জল দিবে । হৃদ্রোগে অৰ্জুনছালের রস । মূত্রকৃচ্ছ্রে ও মূত্রাঘাতে অথবা অগ্নাত্ত রোগে প্রস্রাব বন্ধ হইলে, পাথরকুচির পাতার রস বা তদভাবে গোক্ষুর ভিজান জল বা যবক্ষার অর্বাং সোরার জল দিবে । মেহরোগ বালকদিগের স্বভাবতঃ হয় না, তবে পিতা মাতার থাকিলে, সংক্রামিত হয় ; তাহাতে বাবলার আঠা বা গঁদভিজান জল, কচি শিমূল মূলের বা আমলকীর রস । • বহুমূত্রে কলার ফুলের রস, যজ্ঞডুমুর চূর্ণ বা জামের বীচি চূর্ণ । কৃশতায় অশ্বগন্ধা চূর্ণ । উদরীরোগে কটুকী বা তেউড়ী চূর্ণ । ব্রণশোথ ও ব্রণরোগে করলা বা উচ্ছে পাতার রস । বিদ্রবিতে শজিনা ছালের রস । ভগন্দরে খয়ের ভিজান জল । ফিরঙ্গ বা গম্বিতে অনন্তমূলের কাথ । বাতরক্তে বা কুঠে গুলঞ্চের রস বা সোমরাজী চূর্ণ । বসন্ত, হাম ও জলবসন্তে করলা বা উচ্ছে পাতার রস । নাসারোগে তুলসী-পাতার রস । নেত্ররোগে ভীমরাজের রস বা চূর্ণ । শিরঃপীড়ায় আদার বা নিশিন্দা পাতার রস । শ্বেতপ্রদরে-আমলকীবীজের শাস বাটা বা গাঁদা ফুলের পাতার রস এবং শরীর স বল ও পুষ্টির জন্য অশ্বগন্ধার চূর্ণ অল্পপান দিবে ।

বালক বালিকাদিগের যে সকল রোগ জন্মে, এস্থলে তাহার অল্পপান লিপিবদ্ধ হইল । কোন্ কোন্ রোগ কি কি কারণে উৎপন্ন হয়, তাহা প্রত্যেক রোগে দ্রষ্টব্য । রক্তপ্রদর ও বাধক ঋতুর পরে হয়, সূত্রাং বয়স্থা বালিকাদিগেরই এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে । গণোরিয়া ও শ্বেত প্রদর বালক বালিকাদিগেরও হয় ; কারণ পিতা মাতা কর্তৃকই উহা সংক্রামিত হইয়া থাকে ।

স্তন্যপান-বিধি । ১২৫৯ পৃষ্ঠায় স্তন্য-পান করাইবার যে প্রণালী বলা হইয়াছে, তদনুযায়ী শিশুকে স্তন্যপান করাইবে, কিন্তু শিশু যদি কোন কারণে স্তন্যপান না করে, তবে হরীতকী ও আমলকী চূর্ণ সমভাগে লইয়া একটু মধু মিশাইয়া শিশুর জিহ্বায়, দুই: ২ ঘর্ষণ করিবে ।

শিশুর লঙ্ঘন। শুন-দুগ্ধই স্তন্যপায়ী শিশুর জীবন, স্তন্যরাং স্তন্যপায়ী-শিশুর স্তন্যপান ক্রটিপূর্ণ বন্ধ করা কর্তব্য নহে। স্তন্যপায়ী শিশুর যে কোন রোগ চিকিৎসাকালে প্রত্যেক চিকিৎসকের “সর্বং নিবার্য্যতে বালে, স্তন্যং নৈব নিবার্য্যতে” এই বাক্যটি স্মরণ রাখা উচিত। স্তন্য অত্যধিক দূষিত হইলে, অথবা প্রস্থতির স্তন্যপান করাইবে, তথাপি শিশুকে লঙ্ঘন দিবে না। জ্বরাদি নানা রোগে লঙ্ঘনের অবশ্যক, কিন্তু শিশু লঙ্ঘন অর্থাৎ উপবাস সহ করিতে অসমর্থ। এইজন্য লঙ্ঘনের প্রয়োজন হইলে, স্তন্যদায়িনীকে লঙ্ঘন দিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এস্থলে লঙ্ঘন শব্দে স্তন্যদায়িনীর লঘু ভোজন বুঝিতে হইবে।

১। স্তন্যদুষ্টিজনিত রোগ-চিকিৎসা। স্তন্যদুষ্টিজনিত রোগ সাত-প্রকার, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লেষ্মিক, পিত্তশ্লেষ্মিক ও সান্নিপাতিক। সর্বপ্রথমে স্তন্য পরীক্ষা করা উচিত, পরীক্ষায় স্তন্য দূষিত বলিয়া প্রমাণিত হইলে, স্তন্যদুষ্টির চিকিৎসা-পদ্ধতি অবলম্বন করিবে। বায়ুদ্বারা স্তন্য দূষিত হইলে, দশমূল কাথ, পিত্তদ্বারা স্তন্য দূষিত হইলে গুড়চ্যাদিকাথ, শ্লেষ্মা-দ্বারা স্তন্য দূষিত হইলে ভার্গ্যাদি কাথ এবং সর্বপ্রকার স্তন্যদোষে দশমূলকাথ প্রয়োগ করিবে। স্তন্যদুষ্টিজনিত রোগের প্রবল আক্রমণ ব্যতীত কদাপি শিশুর স্তন্য পান বন্ধ করিবে না। প্রবল স্তন্যদুষ্টিতে ষজাতীয়া অথচ সুস্থকায়া অথবা প্রস্থতির শুন দুগ্ধ পান করাইবে। তদভাবে ছাগলের বা গোত্রর দুধ দিবে। গোত্রর দুধ বেশী গাঢ় হইলে, জল মিশাইয়া দেওয়া উচিত, ছাগলের দুধ স্বভাবতঃ অত্যন্ত গাঢ়, স্তন্যরাং উহা জল মিশ্রিত করিয়াই প্রয়োগ করিবে। শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর সহ দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করাইলে, আরও অধিক উপকার হয়।

২। কুশ্বনক রোগ। এই রোগ উর্দ্ধগত শ্লেষ্মার প্রকোপে উৎপন্ন হয়। অধিকাংশ স্থলে কজ্জল প্রয়োগেই ইহা সারে। মনঃশিলাস্তম্ভন অতি উপকারী, তদভাবে মনসাসীজের পাতায় ঘৃত মাধাইয়া প্রদীপের শীর্ষে ধরিলে, তাহাতে যে কালী পড়ে, তদ্বারা কজ্জল প্রয়োগ করিবে। কফ-রোগোক্ত কফচিহ্নামণি প্রয়োগে এই রোগ প্রশমিত হয়। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে, ত্রিফলাদি কাথও প্রয়োগ করা যায়।

৩। **প্যারিগর্ভিক রোগ** । এই রোগে অগ্নিবর্দ্ধক হিন্দুটক প্রথমে প্রয়োগ করিবে কিম্বা তাহাতে উপকার না হইলে, স্বল্প অগ্নিমূখ চূর্ণ ব্যবস্থা করিবে । ইহাতেই বালকের অগ্নি-বৃদ্ধি, শরীর সবল এবং পুষ্ট হয়, কিন্তু যদি উপকার না হয় বা রোগ কঠিন হয়, তবে কুমারকল্যাণরস ব্যবস্থা করিবে ।

৪। **তালুকণ্টক** । ইহাও কফের প্রকোপে উৎপন্ন হয় । এই রোগে হরীতক্যাদি চূর্ণ ও কফরোগোক্ত কফচিহ্নামণি প্রয়োগ করিবে । রোগ কঠিন হইলে, বালকরস প্রয়োগ করা যায় ।

৫। **মহাপদ্ম** । এই রোগে বিসর্পের চিকিৎসা করিবে । পটোলাদি-কাথ এবং কুমারকল্যাণ রস উভয়ই অথবা উহার কোন একটি ব্যবস্থা করিবে । বিসর্পের সহিত প্রায়শঃ জ্বর থাকে, পটোলাদি কাথে এই জ্বরও বিনষ্ট হয় । এই রোগ মারাত্মক, স্ততরাং মারাত্মক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, উভয় ঔষধই প্রয়োজ্য ।

৬। **তুণ্ডী বা নাভিশোথ** । নাভিসংলগ্ন নাড়ী-কাটার দোষে অথবা নাভিতে রীতিমত সেকতাপ না দিলে, কখনও কখনও শিশুর নাভি ফুলিয়া উঠে । নাভিশোথ কদাচ উপেক্ষা করিবে না, করিলে, পাকিয়া ক্ষত হইতে পরিণত ও তাহা হইতে নালী হইতে পারে এবং নালী হইতে শিশুর জীবন নষ্ট হইবারও সম্ভাবনা । শোথ প্রকাশ পাইলে, মাটির একটি টেলা আগুনে পোড়াইবে এবং লালবর্ণ হইলে দুই ডুবাওয়া তৎক্ষণাতঃ উঠাইয়া তাহাতে একপয়ল কাপড় জড়াইয়া নাভিতে উহার উত্তাপ লাগাইবে । তাহাতে শোথ না কমিলে জয়ন্তী পাতা ছেচিয়া আগুনে উষ্ণ করিয়া তাহার স্বেদ দিবে, পরন্তু জয়ন্তী পাতা বাটিয়া তদ্বারা কুটির তায় প্রস্তুত করিয়া নাভিশোথে লাগাইয়া বান্ধিয়া রাখিলেও ফুলা কমে । শুঁঠ চূর্ণ পোটলায় বান্ধিয়া গরম করিয়া তদ্বারা স্বেদ দিলেও উপকার হয় ।

৭। **নাভিপাক** । শিশুর নাভিতে শোথ হইলে তাহার প্রতীকার করা উচিত, নচেৎ তাহা পাকিতে পারে, পাকিলে, ক্ষত এবং ক্ষত হইতে নালী হইলে, শিশুর জীবন সংশয় বা মৃত্যু হইতেও পারে । নাভি পাকিয়া উঠিলে, রক্তচন্দন ঘসিয়া পুনঃ পুনঃ লেপ দিবে এবং যষ্টিমধু, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও

হলুদ ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া নেকড়ায় করিয়া পোটলা বন্ধিবে ও তাহা আশুগে গরম করিয়া পুনঃ পুনঃ ষেদ দিবে। পাকিয়া ক্ষত প্রকাশ পাইলে পটোলাদি কাথ পান করাইবে এবং উক্ত যষ্টিমধু, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও হলুদদ্বারা কাথ করিয়া সেই কাথজল দ্বারা ক্ষত প্রত্যহ ধৌত করিবে। বেশী পচলা সঞ্চিত হইলে, কচি নিমপাতাসিদ্ধ জল দ্বারা ক্ষত ধৌত করিবে। ধৌত করা হইলে, পৈঁজা তুলা দ্বারা আশু আশু জল মুছিয়া যায়ে ১২৬ পৃষ্ঠায় যে নিষ-
দ্রুত প্রস্তুতের বিধি লিখিত হইয়াছে, তাহাই প্রয়োগ করিবে। নিমপাতার রস দ্বারা খয়ের ঘসিয়া লাগাইলেও ক্ষত শুদ্ধ হয়। কচি নিমপাতা অথবা জাতী অর্থাৎ মালতী ফুলের পাতা তিলতৈল বা ঘূতে ভাজিয়া সেই তৈল বা ঘূত প্রয়োগ করিলেও চলে। ক্ষতস্থানে উক্ত তৈল বা ঘূতে পরিষ্কার মিহি কাপড়ের টুকরা ভিজাইয়া লাগাইবে ও তত্পরি পান বা কলার নরম পাতা রাখিয়া কাপড়ের পটী স্থাপন করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে।

৮। গুহপাক । শিশুর মলদ্বার পাকিলে, দৃক্ষদ্বারা রসাজন ও যষ্টি-
মধু পৃথক্ ঘষিয়া সমভাগে একত্র করিয়া লাগাইবে এবং প্রয়োজন হইলে, উহা শিশুকে মধুসহ অল্প অল্প খাওয়াইবে। ইহাতেই পাক নিবারণ হয়, কিন্তু পাকিয়া ক্ষত হইলে, ব্রণরোগোক্ত অহিপুতন রোগের দ্বায় তাহার চিকিৎসা করিবে। গুহপাক ও অহিপুতনের চিকিৎসা একই।

৯। অহিপুতন । অহিপুতনরোগের চিকিৎসা ব্রণরোগে দ্রষ্টব্য। অহিপুতন রোগে গুহ-পাকের চিকিৎসা করিলেও রোগ সারে। রসাজন ও যষ্টিমধু ঘষার প্রলেপ দিবে এবং উহা মধুসহ শিশুকে খাওয়াইবে।

১০। অজগল্লী । বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপে শিশুর এই রোগ উৎপন্ন হয়, ইহা বিশেষ যত্নগাদায়ক নহে। পটোলাদি কাথ পান করাইলে সারে। কচি নিমপাতা ও কাঁচা হরিদ্রা বাটিয়া সর্বাস্থে মাখাইবে। ১০৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১১। আক্ষেপ । বায়ুর প্রবল প্রকোপে এই রোগ উৎপন্ন হয়, স্নাতরাং বায়ুনাশক-চিকিৎসা এই রোগে প্রশস্ত। মস্তকে তালপাখার বাতাস করিবে এবং মাষতৈল বা মহা মাষতৈল ১০।১৫ ফোটা ঘসিয়া দিবে। পরিষ্কার মিহি কাপড়ের টুকরা ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া তত্পরি পুনঃ পুনঃ শিশুর চক্ষু ও

মুখ মুছাইবে। আক্ষেপ বন্ধিত হইলে, দশমূল কাথ পান করাইবে। এ অবস্থায় প্রবল উদরাগ্নান থাকে, তন্নিবারণার্থ স্বল্প অগ্নিমুখ চূর্ণ বা বাতব্যাদি রোগেৰু বৃঢ়াদ্যচূর্ণ (মতান্তরে) দিবে। প্রয়োজন হইলে কুমারকল্যাণ রস প্রয়োগ করিবে। ফলতঃ এইরূপ ২।০ টি ঔষধ প্রয়োগ করিলে, ভূত ছাড়াইবার জন্য বাজেখরচ করিতে হয় না। দূষিত স্তন্যপান করিলে, যে আক্ষেপ হয়, তাহাতে শিশুর শরীরের পুনঃ পুনঃ বর্ণবিপর্যায় ঘটে, কখনও শরীর নীলবর্ণ, কখনও কৃষ্ণবর্ণ এবং কখনও বা নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহা বীভৎস দর্শন। উহা দর্শনে ভীত না হইয়া রীতিমত চিকিৎসা করাইবে। এই রোগে আগ্নান বা কোষ্ঠকাঠিন্য প্রায়ই থাকে। আগ্নান নিবারণের জন্য রেড়ীর তৈল পানের বোটায়া মাখাইয়া মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে অথবা মধু ও ক্যাষ্টর অইল একত্র করিয়া খাওয়াইবে। শিশুর বয়স অনুযায়ী মাত্রা স্থির করিয়া লইবে।

১২। দন্তোদগমজনিত রোগ। দন্ত উঠিবার প্রারম্ভে শিশুদিগের নানাপ্রকার কঠিন রোগ উৎপন্ন হয়। ঐ সকল রোগে মারাত্মক উপসর্গের অবগ্রহচিকিৎসা করা উচিত, কিন্তু তথাপি যাহা শিশুর অসহ্য, এরূপ তীব্র ঔষধাদি প্রয়োগ কর্তব্য নহে। *স্তন্য প্রদান অবশ্যই কর্তব্য। জল সহযোগে সিদ্ধ বালি বা শঠার পালো মিশ্রীর সহিত দেওয়া যায়। জ্বর প্রশমিত ও উদরের অবস্থার পরিবর্তন হইলে, বালি বা শঠার পালোর সহিত গোহৃৎস বা ছাগহৃৎস মিশাইয়া দিবে। দাত উঠিতে অত্যধিক বিলম্ব হইলে, শিশু অত্যধিক কষ্ট পায়, এমনতাবস্থায় দাঁতের মাটী একটু চিরিয়া দিবে। এ কার্যে অভিজ্ঞ চিকিৎসক নিযুক্ত করিবে। দন্তোদগদরোগান্তক প্রয়োগ করিলেই সমস্ত উপসর্গ প্রশমিত হয়।

শিশু পীড়িত হইলেই সর্বাগ্রে তাহার দাত উঠিয়াছে কি না কিম্বা উঠিবার সময় বা উপক্রম হইয়াছে কি না, শিশুর মাটী টিপিয়া তাহা পরীক্ষা করিবে। এইরূপ পরীক্ষার পর যদি দাত উঠিবার উপক্রম বোধ হয়, তাহা হইলে, বুঝিতে হইবে যে দাত উঠিতেছে বলিয়াই শিশু পীড়িত হইয়াছে। দন্তোদগমের সময় না হইতে পারে, এমন রোগই নাই, কিন্তু তন্মধ্যে সচরাচর জ্বর ও মল ভেদ প্রকৃতি হইয়া থাকে। মল প্রায়শঃ সবুজবর্ণ অথচ ভাঙ্গা বা ছাকড়া :

মত দেখায়। অনবরত এইরূপ তরল ভেদ হয়, তৎসঙ্গে বমি প্রবল থাকে, এবং বমিও ঐরূপ ভাঙ্গা বা নষ্ট হৃৎকের মত দৃষ্ট হয়। ঐ অবস্থায় কখনও ২ মুর্ছা বা আক্ষেপ উপস্থিত হয়, এবং তাহা এরূপ সাজ্জাতিক হয় যে, শিশুর জীবনের আশা থাকে না। অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকও বলেন শিশুর দস্তোদগমকালে ঔষধ প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই, দাঁত উঠিলে, রোগ আপনাই প্রশমিত হইবে, কথাটা খুব ঠিক, দাঁত উঠিলেই রোগ সারে, কিন্তু বেরূপ মারাত্মক উপসর্গ উপস্থিত হয় তদ্বৃষ্টে ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া কেহ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিয়াছেন, এরূপ কখনও দেখা যায় নাই, সুতরাং উহা কেবল উপদেশ মাত্র, ঐ উপদেশমত কার্য্য করা অসম্ভব। দস্তোদগমকালে যে উপসর্গ প্রবল হইবে, তাহা প্রশমনের জন্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। দস্তোদগমে অতিশয় বিলম্ব হইলে ও তজ্জন্ত শিশুর অত্যধিক যন্ত্রণা হইলে, দাঁতের মাটী একটু চিরিয়া দিবে।

রোদন। কখনও কখনও শিশু অত্যধিক রোদন করে, পরন্তু রোদনের কারণ নির্ণয় করা যায় না। তখন রোদন নিবারণের জন্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। পিপুল, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র করিবে। মধুর সহিত উহার ২। ৩ রতি জিহ্বায় দিলে রোদন প্রশমিত হয়।

মুখপাক ও মুখজিহ্বাদির ক্ষত। শিশুর মুখ পাকিলে কিম্বা ওষ্ঠ ও জিহ্বায় ঘা হইলে, জাতীপাতা অর্থাৎ মালতী পাতা বা তুল বাটিয়া মধু মিলাইয়া লাগাইবে। ওষ্ঠ বা জিহ্বায় ঘায়ে ভেড়ার দুধ অতি উপকারী, উহা দিবসে ২০ বার লাগাইলে ক্ষত শুক হয়, গাধার দুধ আরও উপকারী, ইহা ২০ বারের বেশী লাগাইতে হয় না। কফরোগের কফচিন্তামণি প্রয়োগ করা যায়।

স্রাব। শিশুর মুখ হইতে অবিরল লাল নিঃসরণ হইলে, কফচিন্তামণি তুলসীপাতার রসসহ দিবে। বচ চূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ একত্র করিয়া মধুর সহিত একটু ২ দিবে। অনন্তমূল, তিল, লোধ ও যষ্টিমধু ইহাদের দ্বারা কাথ করিয়া সেই জলে শিশুর মুখ প্রক্ষালন করাইবে।

দুহতোলা। শিশুর বাতাজীর্নবশতঃ ক্রোষ্ঠকাঠিন্য হইলে দুগ্ধ হজম

না হইয়া নষ্ট বা ছেঁড়া ছুঁকের আয় ঢলকে ঢলকে মুখ দিয়া উঠিতে থাকে পরন্তু উহা হইতে অগ্নগন্ধ নির্গত হয়। গোহুঁড়ে চুণের স্বচ্ছ জল মিশাইয়া খাওয়াইবে। টাটকা চণ কয়েক ঘণ্টা ভিজাইয়া তাহার উপরের স্বচ্ছ জল পরিষ্কার কাপড়ের দ্বারা আন্তে আন্তে ছাকিয়া লইবে। ৭।৮ ঝিনুক ছুঁড়ে এক ঝিনুক জল দিবে।

প্রস্রাববন্ধ । বালক ও শিশুদিগের যে কোন কারণে প্রস্রাব বন্ধ হইলে, লেবুর রস ও চিনি একত্র করিয়া নাভিতে মালিশ করিবে কিম্বা পাথর-কুচির বা পাথরচুনীর পাতার রসসহ মকরধ্বজ বা স্বর্ণসিন্দূর প্রয়োগ করিলেও অতীষ্ট ফললাভ হইতে পারে। নাভিতে নীললেপ প্রয়োগ করিলে কিম্বা অন্নারি বা সাদা চটী খাওয়াইলে প্রস্রাব নির্গত হয়। পাথরকুচির পাতা বাটিয়া নাভিতে প্রলেপ দিলেও প্রস্রাব হয়।

উদরাগ্ধান । যে কোন কারণে উদরাগ্ধান উপস্থিত হইলে বকুলবর্ষি বালকের মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবে। ইহাতে উদরাগ্ধান অতি শীঘ্র প্রশমিত ও কোষ্ঠ খোলসা হয়। বকুলফলের বীচির মধ্যস্থ শাস গ্রহণ করিবে ও তাহা বাটিয়া বাতির আয় প্রস্তুত করিয়া মলদ্বারে প্রবেশ করাইবে। ইহা শিশুদিগকে প্রয়োগ করিবে না।

বমনযোগ । শিশু বা বালকদিগকে বমন করাইবার আবশ্যকতা হইলে, মধু ও সৈন্ধব লবণ অথবা মুক্তাবর্ষীর পাতার রস খাওয়াইবে।

কোষ্ঠকাঠিন্য । বিলম্বে বা অসম্পূর্ণ মলত্যাগকে চলিত কথায় কোষ্ঠ-কাঠিন্য বা কোষ্ঠবদ্ধতা কহে। কি শিশু, কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কোষ্ঠ-বদ্ধতা সকলের পক্ষেই নানাবিধ রোগের কারণ। নানাপ্রকার রোগে কোষ্ঠ-কাঠিন্য উপসর্গরূপে প্রকাশ পায়। মল একেবারে বন্ধ থাকিলে, তাহাকে কোষ্ঠবদ্ধতা, কঠিন হইলে কোষ্ঠকাঠিন্য এবং যথোচিত বহির্গত না হইয়া উদরে কতক রহিয়াগেলে, তাহাকে কোষ্ঠস্বল্পতা বলা যায়। কোষ্ঠবদ্ধতার ইংরাজী নাম কন্সটিপেশন্ এবং কোষ্ঠালতার ইংরাজী নাম কন্সটিভেনেস্। সূক্ষ্মব্যক্তির মল কোমল অথচ অপিচ্ছিল অর্থাৎ আমবিহীন এবং নলের আকারে বহির্গত হইয়া থাকে। কেহ কেহ সূক্ষ্মাবস্থায় দিবসে একবার বা

দুইবার মলত্যাগ করে, কেহ কেহ বা আরও বিলম্বে মলত্যাগ করিয়া থাকে এবং তাহাতে কোন অসুখবোধ করে না, কিন্তু স্তন্যপায়ী শিশু স্বভাবতই পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ করে, পরন্তু শৈশবে পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ শিশুর পক্ষে বর্তমানে ও পরিণামে নিত্যন্ত শুভকর, কারণ অধিক দান্ত হওয়াতে উদরে মল সঞ্চিত থাকিয়া অজ্ঞাত রোগ উৎপাদনের অবসর পায় না, তজ্জন্ত বর্ধমাণেও শিশুর শরীর সুস্থ থাকে এবং বয়স্ক হইলেও সহসা রোগাক্রান্ত হয় না। এ তত্ত্ব এতদেশীয় প্রাচীনা স্ত্রীলোকেরা অনেকে অবগত আছেন, কিন্তু তথাপি অতিশয় মলভেদ বা তরল দান্ত না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

মল। নবপ্রসূতার স্তনদুগ্ধ স্বভাবতঃ কিঞ্চিৎ বিরচনগুণবিশিষ্ট ও শীতবীৰ্য্য বলিয়া ঐ স্তন্যপানে শিশুর দান্ত বেশী হয়। বাল্যে শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত থাকে, বিশেষতঃ শিশু শীতলগুণযুক্ত স্তন্য পান করে, এজ্জন্ত শিশুর মল কিঞ্চিৎ পিচ্ছিল ও পিত্তসংযুক্ত এবং পীতবর্ণ।

কোষ্ঠকাঠিন্য-চিকিৎসা। স্তন্যপায়ী শিশুর দান্ত বন্ধ হইলে পানের বোটার ক্যাষ্টরঅয়েল মাখাইয়া মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে। মুক্তারুরি বা মুক্তাববীর পাতাঘারা নল পাকাইয়া বা বর্দ্ধিত প্রস্তুত করিয়া মলদ্বারে প্রয়োগ করিলে, দান্ত হয়। স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে বিরচনের ইহা অপেক্ষা সহজ ঔষধ আর নাই। ইহা বালকদিগকেও প্রয়োগ করা যায়। বালকদিগের হঠাৎ উদরাগ্নান বা তজ্জন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য উপস্থিত হইলে, কালকান্দুদে পাতার রস ও সরিষার তৈল একত্র ফেনাইয়া তলপেটে মালিশ করিবে, কিন্তু জ্বর থাকিলে প্রয়োগ নিষেধ। এতদ্ব্যতীত পানের বোটার ক্যাষ্টর অয়েল মাখাইয়া মলদ্বারে প্রয়োগ করিলে, কোষ্ঠ খোলসা হয়। এই প্রক্রিয়া জরে বিজরে সর্কীবস্থায় করা যায়। ক্যাষ্টর অয়েল ও মধু সমভাগে মিশাইয়া বালক ও শিশুর জিহ্বায় লাগাইয়া দিলে মিষ্টভাপ্রযুক্ত তাহারা আনন্দসহকারে খায়, এইরূপে বিনাক্লেশে শিশু ও বালকের বিরচন কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। এই প্রক্রিয়া অমুখ্যায়ী জরে বিজরে সর্কীবস্থায় ক্যাষ্টর অয়েল প্রয়োগ করা যায়, তবে জ্বরসঙ্গে প্রয়োগ করিতে হইলে, জ্বরের প্রশমন অবস্থায় অর্থাৎ জ্বর কমিয়া আসিলে প্রয়োগ করা কর্তব্য।

(জ্বরাদিরোগ-চিকিৎসা ।)

স্তন্যপায়ী শিশু কঠিন রোগের আক্রমণ সহ্য করিতেই পারে না, এই জন্য বয়স্ক বালক অপেক্ষা স্তন্যপায়ী শিশুর চিকিৎসা অতি কঠিন। এস্থলে স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইবে, তাহা বিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের সর্বদা ব্যবহার্য্য।

জ্বর। জ্বর নানাপ্রকার, তাহার চিকিৎসাও বহুবিধ। বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় বালক এবং শিশুরাও ঐ সকল জ্বরে পীড়িত হইতে পারে। ডাক্তারীয়তে জ্বরকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, সবিরাম এবং অবিরাম। যে জ্বর কয়েক ঘণ্টা শরীরে অবস্থান করিয়া সম্পূর্ণ বিরাম অর্থাৎ বিচ্ছেদ হয়, তাহাকে সবিরাম জ্বর কহে। যে জ্বর এককালে বিরাম বা বিচ্ছেদ হয় না, শরীরে অল্পই হউক বা অধিকই হউক অবস্থান করে, তাহাকে অবিরাম জ্বর বলা যায়। অবিরাম জ্বরকে চলিত কথায় স্বল্পবিরাম, অবিচ্ছেদী বা একজ্বর বলা যায়। আয়ুর্বেদ মতে কোন রোগই বাতাদিপৌষের আশ্রয় ব্যতীত উৎপন্ন হয় না, সুতরাং আয়ুর্বেদ মতে বাতাদি-দোষভেদে যে সকল জ্বরের লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তাহার সহিত ডাক্তারী-মতে সম্মিলন করিতে গেলে সবিরাম বা অবিরাম জ্বরে বাতের, পিত্তের বা শ্লেষ্মার প্রকোপ-লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, যথাক্রমে বাতিক, পৈতিক ও শ্লেষ্মিক-জ্বর বলা যায়। স্বল্পবিরাম জ্বরকে ইংরাজিতে রেমিটেন্টিকিভার কহে। এই জ্বর এককালো বিচ্ছেদ হয় না, অল্প বিচ্ছেদ হইয়া পুনর্বার বৃদ্ধি পায় এবং ৭। ১৪ বা ১৫ দিনের পরে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হয়। একজ্বর বা অবিচ্ছেদীজ্বর ;— এই জ্বর বাড়েও না, কমেও না, প্রায়ই একভাবে শরীরে অবস্থান করে। স্বল্প-বিরাম জ্বরের ঋায় অবিচ্ছেদী বা একজ্বরের ভোগকাল অনিশ্চিত। স্বল্পবিরাম বা অবিরামজ্বরকে আয়ুর্বেদমতে সন্ততজ্বর বলা যায়। সন্ততজ্বরের সাধারণ অবস্থান কাল ৭। ১০। ১২ দিন, কিন্তু দোষের প্রবলতাবশতঃ ঐনিয়মের ব্যতিক্রম হয়, কখনও কখনও ১৪। ২০। বা ২৪ দিন পর্য্যন্ত ঐ জ্বর সমভাবে শরীরে অবস্থান করে।

সততক বা বৈকালীনজ্বর। যে জ্বর দিনে একবার ও রাত্রিতে একবার

প্রকাশ পায় অথবা দিনে দুইবার হয়, রাত্রিতে হয় না, কিম্বা রাত্রিতেই দুইবার হয়, তাহাকে স্তত বা দৈকালীন জ্বর কহে । স্তত জ্বরকে বিষম জ্বরের অন্তর্ভুক্ত না করিলেই ভাল হয়, কারণ প্রারম্ভ হইতেই ঐ জ্বর অবিচ্ছেদে বা অল্পবিচ্ছেদে নিয়ত শরীরে অবস্থান করে । স্ততজ্বরও কখনও কখনও প্রারম্ভ হইতেই স্বীয় লক্ষণ প্রকাশ করে ।

বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণেরও যে সকল রোগ জন্মে, বালকগণেরও সেই সকল রোগ জন্মে । বালক ও শিশুদিগের সমস্ত রোগের বিবরণ লিখিতে গেলে, অতি বিস্তৃত হয়, সুতরাং সাধারণ ব্যবহার্য্য ঔষধগুলিরই কেবল প্রয়োগ-প্রণালী লিপিবদ্ধ হইবে ॥

নবজ্বর-চিকিৎসা । জ্বরের প্রথম অবস্থায় তুলসীপাতার রস ও মধুসহ বালকরস দিবে । ঐ অল্পপানে কফচিন্তামণি প্রয়োগ করিলেও চলে, তাহাতে উপকার না হইলে দ্বিতীয় বালকরস ঐ অল্পপানে দিবে । মুস্তকাদিকাথ যে কোন প্রকার জ্বরে প্রয়োগ করা যায় । স্তম্ভপায়ী শিশুর পক্ষে এই সকল ঔষধ প্রশস্ত ; অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বালকদিগকে অত্যাচ্ছ ঔষধও প্রয়োগ করা যায় । জ্বরবিকারে কস্তুরীভূষণ ও কস্তুরীভৈরব অবস্থা-ভেদে প্রয়োজ্য । জ্বর বা বিষমজ্বরে পুনঃ পুনঃ নবজ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বৃহৎ কস্তুরীভৈরব প্রয়োগ করিবে । এতদ্ব্যতীত অবস্থাভেদে বিষমজ্বরাস্তক চূর্ণ, অধঃসংহারচূর্ণ, কিরাতাদিচূর্ণ, গুড়চ্যাদিচূর্ণ, স্বল্পসুদর্শনচূর্ণ, সুদর্শনচূর্ণ ও জ্বরভৈরবচূর্ণ প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায় । বিষমজ্বরে কুমারকল্যাণ রস, ভার্গ্যাঙ্গী কাথ, বৃহৎ ভার্গ্যাঙ্গী কাথ ও দান্তাদি কাথ এবং বিষম জ্বরাস্তকলৌহ অথবা পুটপাক বিষমজ্বরাস্তক লৌহ, বৃহৎ বিষমজ্বরাস্তক রস, সর্ষপজ্বর লৌহ, বৃহৎ সর্ষপজ্বর-লৌহ ও জয়মঙ্গল রস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে ব্যবস্থা করা যায় ।

প্লীহা, যকৃৎ ও অগ্র্যমাস । প্লীহা, যকৃৎ ও অগ্র্যমাস বৃদ্ধি পাইলে, প্লীহারোগোক্ত লগুনাদ্যযোগ, যকৃদরি লৌহ, বৃহৎ যকৃদরিলৌহ, যকৃৎমর্দনচূর্ণ, লোকনাথ রস, বৃহৎ লোকনাথ রস, বৃহৎ গুড়পিপ্পলী, অভয়ালবণ ও চিত্রক-পিপ্পলী যুত প্রভৃতি অবস্থাভেদে বালক দিগকে প্রয়োগ করিবে । স্তম্ভ-পায়ী শিশুর যকৃতে যকৃৎমর্দন চূর্ণ, যকৃদরি লৌহ, বৃহৎ যকৃদরি লৌহ, প্লীহা বৃদ্ধিতে বৃহৎগুড়পিপ্পলী ব্যবহৃত হয় । এই সকল ঔষধে অগ্র্যমাসেরও উপকার হয় ।

যকৃদরি লৌহ তাম্রবর্তিত, তামা অমৃতীকরণ নিয়মে ভস্ম করিয়া প্রয়োগ করিলে অরুচি হইবার আশঙ্কা থাকে না । শিশুর প্লীহা, যকৃৎ ও কোষ্ঠকাঠিন্য-স্বল্প অগ্নিযুগ্মচূর্ণ অতি উপকারী । ১৫ পৃষ্ঠায় প্রস্তুতবিধি দ্রষ্টব্য । যকৃৎ ও প্লীহা বৃদ্ধির সহিত শোথ থাকিলে, পুনর্নবাষ্টক কাথ এবং পাণ্ডুর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, নবায়সলৌহ ব্যবস্থা করিবে । এতদ্ব্যতীত প্লীহা, যকৃৎ ও অগ্রমাসে নানাবিধ স্বেদ ও প্রলেপ ব্যবস্থা করা যায় ।

শোথ । শোথে পুনর্নবাষ্টক কাথ প্রয়োগ করা যায়, ইহাতে কোষ্ঠও পরিষ্কার থাকে ।

পাণ্ডু । পাণ্ডুর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, নবায়সলৌহ প্রয়োজ্য ।

জ্বরাতীসার । শিশুর জ্বরের সহিত মলভেদ (তরলদান্ত) হইলে, শিশুচাতুর্ভদ্রিকা, বিশ্বপঞ্চককাথ, লবঙ্গচতুঃসম, দাড়িম্বচতুঃসম অথবা মহাগন্ধক ব্যবস্থা করিবে ।

জ্বর, অতিসার ও বমন । জ্বর, অতিসার ও বমন একসঙ্গে প্রকাশ পাইলে, ধাতক্যাদি ও মহাগন্ধক ব্যবস্থা করা যায় ।

প্রবল অতিসার । প্রবল অতিসার হইলে, নাগরাদিকাথ, লবঙ্গচতুঃসম, দাড়িম্বচতুঃসম, মহাগন্ধক ও অতিসারোক্ত বৃহৎ লবঙ্গাদিবটী প্রয়োগ করিবে ।

আমাতীসার ও আমাশয় । এই উভয় রোগে বিড়ঙ্গাদিচূর্ণ, মহাগন্ধক, বিশ্বপঞ্চক, লবঙ্গচতুঃসম ও অতিসারোক্ত লবঙ্গাদিবটী প্রয়োগ করিবে ।

রক্তাতীসার ও রক্তামাশয় । ইহাতে শিশুকুটজাবলেহ, দাড়িম্বচতুঃসম, মহাগন্ধক ও বিশ্বপঞ্চক প্রয়োগ করিবে ।

গ্রহণী । এই রোগে বিশ্বপঞ্চক, মহাগন্ধক, দাড়িম্বচতুঃসম বা অতিসারোক্ত বৃহৎ লবঙ্গাদিবটী প্রয়োগ করিবে । এই সকল ঔষধে উপকার না হইলে, গ্রহণীরোরোক্ত মূল্যকাদিমোদক বা বৃহজ্জীরকাদিমোদক প্রয়োজ্য ।

অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ । অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণে ভুবনেশ্বর, হিঙ্গষ্টকচূর্ণ, লবঙ্গাদি, বা বৃহৎ লবঙ্গাদি বা ১৫ পৃষ্ঠোক্ত স্বল্প অগ্নিযুগ্মচূর্ণ প্রয়োগ করিবে ।

কাস । কাসরোগে তালীশাদিচূর্ণ অথবা চন্দ্রামৃতরস প্রয়োজ্য । বচচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ একত্র করিয়া মধুর সহিত দিবে অথবা বচাদিচূর্ণ কিম্বা কণ্ট-কার্যাদিচূর্ণ দিবে । কাস একটু পুরাতন হইলে এবং শিশুর পেটের পীড়া না থাকিলে, চ্যবনপ্রাশ প্রয়োগে অসাধারণ উপকার হয় । শিশুর মুস্তপিত এবং যক্ষ্মারোগে বা কৃশতায় ইহা মহোপকারী ।

কাস ও শ্বাস । কাস ও শ্বাস একত্র প্রকাশ পাইলে, ধান্যাদিপানক ও শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ প্রয়োগ করিবে ।

হিকা ও শ্বাস । শিশু ও বালকের যে কোন অবস্থায় শ্বাস ও হিকা প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে কাস থাকিলে অষ্টাঙ্গাবলেহ অথবা শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ প্রয়োজ্য ।

কাস ও তমক শ্বাস । কাস ও তমক শ্বাস একসঙ্গে প্রকাশ পাইলে, জ্বাকাদিচূর্ণ অথবা শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ ব্যবস্থা করিবে ।

হিকা ও বমি । হিকা ও বমি প্রকাশ পাইলে, প্রাণবল্লভরস, কটকীচূর্ণ সহ বা হিঙ্গাদিচূর্ণ দিবে ।

বমি । বমিতে প্রাণবল্লভরস বা আমাশ্বিযোগ দিবে । কোনরোগে বমন হইলে ছর্দিহরযোগ দিবে । ছর্দিহরযোগ ১০ পঠায় দ্রষ্টব্য ।

ভৃক্ষবমন । স্তনভৃক্ষ বা গোভৃক্ষ হজম না হইয়া বমন হইলে, পঞ্চকোল-চূর্ণ দিবে । গোভৃক্ষে চূর্ণের স্বচ্ছজল মিশাইয়া দিবে ।

ক্রিমি । ক্রিমি শিশুদিগের মারাত্মক ব্যাধি । ক্রিমিরোগে নানাবিধ উপসর্গ উপস্থিত হয় । ক্রিমিরোগের লক্ষণ-দৃষ্টে চিকিৎসা করিবে । ক্রিমি-রোগে বিষাক্ত ঔষধ নাই বলিলেই হয়, সুতরাং অবস্থাভেদে ঔষধ নির্বাচন কঠিন নহে । ক্রিমিঘ্নরস সহজ অথচ সর্কীবস্থায় ব্যবহার্য্য উৎকৃষ্ট ঔষধ । ক্রিমিনাশক নানাবিধ যোগও অতি উপকারী ।

রক্তবমন । অর, কাস বা যক্ষ্মারোগে শিশুর মুখ হইতে রক্ত নিগত হইলে, চন্দ্রামৃত রস ও এলাদিগুড়িকা প্রয়োগ করিবে । এলাদিগুড়িকা ৫০ পঠায় দ্রষ্টব্য ।

মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত । শিশুর মূত্রকৃচ্ছ্র বা মূত্রাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, প্রাণবল্লভরস বা স্নগ্ধসিন্দুর পাথর কুচির পাতার রস বা গোক্ষুর-ভিজার জলসহ প্রয়োগ করিবে ।

তৃষ্ণা । অগ্নি নানারোগে শিশুর তৃষ্ণা হয়, তৃষ্ণা বলবতী হইলে, শিশুর জিহ্বা প্রায়শঃ ভিতরের দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে এবং শিশু প্রায়শঃ জিহ্বা সজোরে আকর্ষণ করিয়া স্বস্থানে রাখিতে চেষ্টা করে ও জিহ্বাঘারা ওষ্ঠদ্বয় লেহন করিতে থাকে । মৌরি ছেচিয়া পোটলায় করিয়া ভিজাইয়া শিশুর জিহ্বায় পুনঃ পুনঃ লাগাইবে অথবা মৌরী ভিজান জলসহ স্নগ্ধসিন্দুর বা তদভাবে উৎকৃষ্ট রসসিন্দুর বা প্রাণবল্লভরস দিবে ।

আমাশয় । আমাশয় অতি কঠিন রোগ, একবার আক্রমণ করিলে, সহজে প্রশমিত হইতে চায় না, বিশেষতঃ বালক ও শিশুদিগকে অত্যধিক যত্নগা প্রদান করে । আমাশয় দুই প্রকার, ষ্ঠে ও রক্তামাশয় । আমাশয়ের প্রধান উপসর্গগুলি মরণাধিক যত্নগা-দায়ক । পেটের ব্যথা, বর্ষ, অরুচি ও অনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গগুলি এই শ্রেণীর । প্রথম অবস্থায় আমপাচক ঔষধ প্রয়োগ করা কঠব্য, রেহেতু আফিং সংযুক্ত ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া সঞ্চিত ও বহির্গমনোন্মুখ আমের বহির্গমন রোধ করিলে, অর ও শোথাদি নানাবিধ কঠিন ব্যাধি উপস্থিত হইতে পারে । অধিকাংশস্থলে রোগীর আত্মীয় স্বজন অল্পসময়ে আরোগ্য লাভের অহুচিৎ অকোজ্জায় এবং কোনস্থলে বা চিকিৎসক স্বীয় যশঃবস্তারের অভিলাষে ঐ প্রকার বিভ্রাট ঘটাইয়া থাকেন, স্ততরাং তখন রোগও জটিল হইয়া পড়ে । আমের পক্যপক লক্ষণ অতিসাররোগে দ্রষ্টব্য । আম উদরে সঞ্চিত থাকিলে, আম বা আমসংযুক্ত মল পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প নির্গত হয়, উদরে অত্যধিক বেদনা থাকে, এই অবস্থায় প্রথমতঃ একটি মুদ্রবিরেচন প্রয়োগ করা উচিত । ক্যাষ্টর অয়েল সর্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী । তদভাবে হরিতকী ও পিপুল একত্র বাটিয়া গরমজলসহ খাওয়ান যাইতে পারে, কিন্তু ইহা রক্তামাশয়ে প্রয়োজ্য নহে । যাহারা আমাশয়ের উপর বিরেচন প্রয়োগের কথা শুনিলেই শিহরিয়া উঠেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, সঞ্চিত আম নির্গত না হইলে, কোনরূপেই রোগ প্রশমিত হইতে পারে না । এতদ্ব্যতীত মহাগুরু আমাশয়ের অহুর্গানে প্রয়োগ অবশ্যই কঠব্য । থানকুনীপাতা

বা গান্ধাইলপাতার রস, সাদা কাঁটানোটের শিকড়ের রস প্রভৃতি অল্পপান দিবে। রক্তাশয় হইলে, লাল কাঁটানোটের শিকড়ের রস বা অগ্ন্যন্ত অল্পপান দিবে। এই রোগে বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাভিস্থলে শ্বেদ প্রয়োগ মহোপকারী। ধানকুনী বা খুলকুড়ী পাতা অথবা গান্ধাইল পাতা, ছেচিয়া আঙুণে গরম করিয়া তাহা উদরে নাভির নীচে স্থাপন করিবে এবং শীতল হইলে লোহার হাতা আঙুণে গরম করিয়া পুনঃ পুনঃ তদুপরি চাপিয়া ধরিবে, যতটুকু উত্তাপ সহ করা যায়, তদপেক্ষা বেশী উত্তাপ লাগান উচিত নহে। স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে ঐ পাতা ছেচিয়া পোটলার মধ্যে ভরিয়া গরম করিয়া নাভির নীচে পুনঃ পুনঃ লাগাইবে। পোটলা বেশী গরম হইলে, শিশু তাহার উত্তাপ সহ করিতে পারে না, সুতরাং শ্বেদ-প্রয়োগের পূর্বে উত্তপ্ত পোটলা বেশী গরম কি না, তাহা পরীক্ষার দ্বারা নিজেই কোমল অঙ্গে দুই একবার লাগান উচিত।

সর্দি। শিশুদিগের শরীর শ্লেষ্মা প্রধান, সুতরাং সর্দি কাসি নিরন্তর লাগিয়া থাকে। দূষিত স্তন্য-পান এবং ঠাণ্ডা লাগান প্রভৃতি ইহার কারণ। সর্দির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে প্রায়শঃ তৎসঙ্গে জ্বর বর্তমান থাকে। শিশুদিগের সর্দি বা কাস প্রকাশ পাইলেই কফচিন্তামণি ও বাসাকাথ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে সর্দি তরল রাখে, সুতরাং ভয়ের কারণ থাকে না।

নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস্ ও প্লুরিসি।

শিশুদিগের সর্দি বা কাস কদাচ উপেক্ষণীয় নহে, উপেক্ষা করিলে মহান্ অনর্থ সম্ভব হয়। অধিকাংশস্থলে, এইরূপ উপেক্ষা বা হুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ফলে নিউমোনিয়া, প্লুরিসি ও ব্রঙ্কাইটিস্ প্রভৃতি ফুস্ফুস্ বিকৃতিজন্য বিবিধরোগ উৎপন্ন হইতে পারে এবং তাহা হইতে শিশুর জীবন সঙ্কটাপন্ন বা মৃত্যুও হইতে পারে। বাঙ্গালায় নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস্ ও প্লুরিসি এই তিনটিকে ফুস্ফুস্-প্রদাহ বলা যাইতে পারে, এই তিনটির মধ্যে লক্ষণের প্রভেদ এই— নিউমোনিয়ায় সমগ্র ফুস্ফুস্ বিশেষতঃ ফুস্ফুস্‌কোষে, ব্রঙ্কাইটিসে ফুস্ফুসের বায়ুনলীতে এবং প্লুরিসিতে ফুস্ফুসের আবরক ঝিল্লীতে প্রদাহ হয়।

এককালে বক্ষোগহ্বরের দক্ষিণ ও বাম দুইদিকের দুইটি ফুস্ফুস্

আক্রান্ত হইলে, কিম্বা তৎসঙ্গে প্রবলজ্বর যদি অবিলম্বে ক্রমাগত ১২ । ১৮ বা ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সমভাবে থাকে, তবে বড়ই ভয়ের কথা । ব্রুসাইটিস ও নিউমোনিয়া আয়ুর্বেদমতে বাতশ্লেষ্মিকজ্বর বা বাতশ্লেষ্মোদ্বন সন্নিপাতজ্বর-ব্যতীত আর কিছুই নহে । প্রথমে বাতশ্লেষ্মিক বা বাতশ্লেষ্মোদ্বন সন্নিপাত জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায় ; অনন্তর ফুসফুস আক্রান্ত হয় ; ফুসফুস সমধিক আক্রান্ত হইলে, যাম্যসন্নিপাতের লক্ষণও প্রকাশ পাইতে পারে । যদিও উক্ত দ্বিবিধ জ্বরের সহিত নিউমোনিয়ার সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না, তথাপি আয়ুর্বেদমতে ঐ উভয়ের সামঞ্জস্য নিতান্ত কঠিন নহে । পরন্তু কোনও রোগের লক্ষণের সহিত ডাক্তারী ও কবিরাজীর সম্বয় করিতে গেলে যদি কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ প্রভেদ থাকিয়া যায় বা সর্বাংশে মিল নাও হয়, তাহাতে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই । কেবল কোন্ দোষের প্রকোপে রোগটি সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং কোন্ দোষনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে, এই গূঢ় তত্ত্বটুকু নির্ণয় করা আবশ্যিক, এই তত্ত্বটুকু নির্ণয় করিতে পারিলেই চিকিৎসা সুন্দররূপে চলিতে পারে । আরও একটি কথা এই ; -আয়ুর্বেদীয় ঔষধ যৌগবাহী বা মিশ্র, ডাক্তারী ঔষধের ন্যায় অবিমিশ্ররূপে অর্থাৎ এক একটি ঔষধ মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিতে হয় না, সুতরাং বাতশ্লেষ্ম-জ্বরের বা বাতশ্লেষ্মপ্রধান সন্নিপাত জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, সেই সেই জ্বরনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিলেই চলে । ঐ দ্বিবিধ রোগের চিকিৎসাকালে বায়ু দ্বারা শ্লেষ্মা শুষ্ক হইতে না পারে এবং যাহাতে বায়ুর শমতা রক্ষা ও শ্লেষ্মা তরল করা যাইতে পারে, তথাবিধ চিকিৎসাক্রমে ডাক্তারেরাও যেমন অবলম্বন করেন, আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকেরাও তদ্রূপ অবলম্বন করেন, সুতরাং চিকিৎসাবিষয়ে মতদ্বৈধ নাই । বাতশ্লেষ্মিক জ্বরে শরীর আর্দ্রবস্ত্রাবৃতবোধ, সন্ধিস্থানে বেদনা, নিদ্রাধিক্য, মস্তক-বেদনা, সর্দি, কাস, ঘর্ম্মাধিক্য, শরীরে অত্যধিক উত্তাপ ও জ্বরের মধ্যবেগ এবং বাতশ্লেষ্মপ্রধান সন্নিপাত জ্বরে শীতপ্রাধান জ্বর, ঘূর্ছা, হাঁচি, পিপাসা, পার্শ্ব-বেদনা, ঘর্ম্মভাব, শূল, তন্দ্রা ও শ্বাস এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু ঐ দ্বিবিধ জ্বরে বায়ুর কিঞ্চিৎ আধিক্য থাকিলে, গাত্র-চর্ম্ম রুক্ষভাবাপন্ন ও কাস শুষ্ক হইতে পারে এবং শ্লেষ্মার জ্বাধিক্য থাকিলে, গাত্র-চর্ম্ম আর্দ্র ও কাস তরল হইতে পারে ।

প্রথম অবস্থা নিউমোনিয়াতে হয় এবং দ্বিতীয় অবস্থা ব্রঙ্কাইটিসে হয়। আবার নিউমোনিয়াতে গাত্রের উত্তাপ ১০৩ হইতে ১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে, কিন্তু ব্রঙ্কাইটিসে গাত্রোত্তাপ সচরাচর ১০২ ডিগ্রী, কচিং বা উহার উল্লেখ "উঠে"। এইরূপে নিউমোনিয়াতে কষ্টের সহিত দ্রুতবেগে শ্বাসপ্রশ্বাস কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং শ্বাসপ্রশ্বাসকালে ঘড়্ ঘড়্ বা শঁ শঁ শব্দ হয় না, কিন্তু ব্রঙ্কাইটিসে শ্বাসপ্রশ্বাস অপেক্ষাকৃত আন্তে আন্তে সুসম্পন্ন হয় এবং শ্বাসপ্রশ্বাসকালে ঘড়্ ঘড়্ বা শঁ শঁ শব্দ হয়। লক্ষণের এইরূপ পার্থক্য দ্বারা রোগটি নিউমোনিয়া কি ব্রঙ্কাইটিস তাহা নিরূপণ করা যায়। নিউমোনিয়ার লাল আভাযুক্ত অথবা লোহচূর্ণের আভাবিশিষ্ট প্লেগ্মা নির্গত হয় এবং তাহা আঠার মায় চট্‌চটে কিন্তু ব্রঙ্কাইটিসে স্বাভাবিক বা সাদা প্লেগ্মা নির্গত হয়। ঐ উভয় রোগে এই সকল লক্ষণদ্বারা বক্ষোগহ্বর আক্রান্ত হইয়াছে কি না তাহা যত্নদ্বারা নির্ণয় করিতে হয়। বক্ষোগহ্বর আক্রান্ত হইলে, বড়ই ভয়ের কথা, বিশেষতঃ দুইদিক আক্রান্ত হইলে, রোগীর জীবনের আশা আর থাকে না।

নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কাইটিসের লক্ষণ প্রকাশ পাইবামাত্র অবিলম্বে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা উচিত। বক্ষঃস্থলে প্লেগ্মা আবদ্ধ হইয়াছে এবং ঐ প্লেগ্মা তরলভাবাপন্ন ও বমন দ্বারা সহজে নির্গত হইবে জানিতে পারিলে, বমন কারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অত্যধিক দুর্বলতা বিজ্ঞমানে বমন করান উচিত নয়, কিন্তু বমন দ্বারা যেসকল উপকার হয়, অল্প কিছুতেই তদ্রূপ উপকার হয় না, সুতরাং রোগী অত্যধিক দুর্বলতা বশতঃ বমনের বেগ সহ্য করিতে না পারিলে, চিকিৎসককে নিরুদ্ভম হইতে হয়।

শিশুদিগের পক্ষে বমনের অল্প মধুমিশ্রিত সৈন্ধব অতি উপকারী, নির্ভয়ে প্রয়োগ করা যায়। মধু ও সৈন্ধব একত্র করিয়া অল্পলিতে মাখাইয়া শিশুর জিহ্বা পুনঃ পুনঃ মার্জনা করিলেই প্লেগ্মা বাহির হয়। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বালক ও যুবকদিগের পক্ষে ১১৬ পৃষ্ঠার বমনযোগ প্রশস্ত।

বক্ষোগহ্বর আক্রান্ত হইয়াছে বুঝিতে পারিলে একথণ্ড ক্ল্যানেল দ্বারা সমগ্র বক্ষঃস্থল আবৃত করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে এবং অবিলম্বে সমস্ত বক্ষঃস্থলজুড়িয়া তিসি বা ভূসির পোল্‌টিস দিবে। বক্ষঃস্থল, পৃষ্ঠ বা পার্শ্বদেশে বেদনা থাকিলে,

সেই সেই স্থান জুড়িয়া পোল্টিস্ দিবে । যাবৎ শ্লেষ্মা পরিপাক না হয়, অথবা শ্লেষ্মা হরিদ্রাবর্ণ না হয়, তাবৎ পোল্টিস্ দেওয়া উচিত । উপর্যুপরি কয়েকবার পোল্টিস্ দিলে, প্রায়শঃ খাসকষ্ট কমে, খাস-কষ্ট কমিলেই রোগীর জীবনের আশা করা যায় । ইদানীং কেহ কেহ পোল্টিসের পরিবর্তে পৈজা কার্পাস তুলার গদী প্রস্তুত করিয়া বুক, পিঠ ও পার্শ্বদেশে বিছাইয়া বান্ধিয়া রাখেন, এই প্রক্রিয়া মন্দ নহে, পোল্টিস্ জুড়াইয়া গেলে তাহার শৈত্য লাগিয়া অপকার হইবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু উহাতে সে আশঙ্কা থাকে না । বায়ুর অত্যধিক প্রকোপ বশতঃ উদরাগ্নান এবং মলমূত্র রোধ হইলে, যবপ্রলেপ, দারুণটক প্রলেপ, বটপত্রী প্রলেপ, বিম্বিকান্তপ্রলেপ এবং হিঙ্গুত্বাবর্তি ও ত্রিকটুকাত্তাবর্তি অবস্থাভেদে-প্রয়োগ করা যায় । দারুণটক প্রলেপ ও যবপ্রলেপ ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । বিম্বিকান্তপ্রলেপ ও বটপত্রী প্রলেপ ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । হিঙ্গুত্বাবর্তি ও ত্রিকটুকাত্তাবর্তি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

শুভপায়ী শিশুর পক্ষে শ্লেষ্মা তরল করিবার জন্য পৰ্ণরস্বেদ্যোগ এবং বালকের পুষ্কে বাসাকাথ পরম উপকারী । প্রথম অবস্থায় শুভপায়ীদিগকে কফ-চিষ্টামণি প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু তাহাতে উপকার না হইলে, অবিলম্বে জরোক্ত কস্তুরীভূষণ প্রয়োগ করিবে । বালক ও বয়ঃস্থদিগকে কস্তুরীভূষণ (মতান্তরে), জরকস্তুরী বা কস্তুরীভৈরব প্রয়োগ করিবে । বন্ধস্থলে শ্লেষ্মা আবদ্ধ ও তজ্জন্ত খাসকষ্ট উপস্থিত হইলে বমন করাইবে, কিন্তু বমন করান সম্ভব বিবেচিত না হইলে অথবা বমনে শ্লেষ্মা নির্গত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলে বা শ্লেষ্মা গাঢ় আঠার গায় হইলে আদা, পান ও পেঁয়াজ একত্র ছেচিয়া তাহার রস গরম করিয়া বন্ধস্থলে মালিশ করা ও খাওয়ান যায় । বালক ও বয়ঃস্থগণের বন্ধস্থলে পুরাতন স্নাত মাখান গরম পান দ্বারা স্বেদ দিবে । যাবৎ খাসকষ্ট নিবারিত ও শ্লেষ্মা তরল না হয়, তাবৎ পুনঃ পুনঃ স্বেদ দেওয়া উচিত ।

প্লুরিসি । ফুস্ফুস আবরক বিল্লীর প্রদাহকে প্লুরিসি কহে । এই রোগের প্রথম অবস্থায় বন্ধস্থল, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে তীব্র বেদনা অনুভূত হয় । নিউমোনিয়া ও ব্রঙ্কাইটিসে এইরূপ তীব্র বেদনা হয় না, বেদনার তীব্রতা

প্লুরিসির প্রধান লক্ষণ এবং ঐ লক্ষণ দ্বারা ই সহজে রোগ নির্ণয় করা যায় । নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস ও প্লুরিসি একই জাতীয় রোগ । নিউমোনিয়ায় যে কাস নির্গত হয়, তাহা লৌহ-মলের দ্বারা বর্ণবিশিষ্ট অথচ আঠার দ্বারা 'চটচটে' এবং ব্রঙ্কাইটিসে স্বাভাবিক সাদা কাস নির্গত হয় । প্লুরিসিতেও কাস এবং শ্বাসকষ্ট বর্তমান থাকে কিন্তু শ্লেষ্মা অল্প নির্গত হয় ও কম্পপূর্বক জ্বর হয় । রোগের প্রারম্ভে ফুসফুসের আবরণ বিলীতে এক প্রকার রস সঞ্চিত হয় এবং বেদনা, জ্বর ও কাসের সঙ্গে সঙ্গেই ফুসফুসে ক্ষত হইতে আরম্ভ হয়, অনন্তর ক্রমশঃ তাহাতে পুষ্ণোৎপত্তি হয় ও তাহা সঞ্চিত হইয়া ক্ষত বর্দ্ধিতায়তন হয় এবং বন্ধঃপ্রাচীর উচ্চ হইয়া উঠে । এই রোগের চিকিৎসাও নিউমোনিয়া ও ব্রঙ্কাইটিসের দ্বারা, কিন্তু পুষ্ণ উৎপন্ন ও সঞ্চয় হইলে, অস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা তাহা বহির্গত করিয়া দেওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর থাকে না । আয়ুর্বেদ মতে ইহাকে শ্মিতা সন্নিপাত বলা যাইতে পারে ।

সন্নিপাত জ্বর । ইহাকে ইংরাজীতে টাইফয়েড্ ফিভার কহে । শিশু ও বালকদিগের সন্নিপাত জ্বরের সাধারণ চিকিৎসা বাতশ্লেষ্মজ্বরের দ্বারা ।

বাতিক কাস বা হুপিং কফ । বাতিক কাসকে ইংরাজীতে হুপিং-কফ কহে । ইহা শ্বাস-নালীর প্রদাহবিশিষ্ট রোগ, পরন্তু সংক্রামক ও জনপদ-ব্যাপক, এক জনের হইলে, ক্রমশঃ অল্প শরীরে সংক্রামিত হয় । এ রোগ বাল্যকালে অর্থাৎ শিশুদিগেরই প্রায়শঃ হয়, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এই রোগে কদাচিৎ আক্রান্ত হইয়া থাকে ! পঞ্চম বৎসর বয়সের পূর্বে ইহার প্রবল আক্রমণের সময় ; পঞ্চম বর্ষ অতীত হইলে, এই রোগে শিশুরা আক্রান্ত নাও হইতে পারে ।

লক্ষণ । প্রথমে সর্দি হয়, নাক ও চক্ষু দিয়া জলের দ্বারা নির্গত হইতে থাকে এবং শিশু অনবরত হাঁচিতে থাকে, চক্ষুদ্বয় সতত ছলছল এবং মুখ 'রসে টল্ টল্ করিতে থাকে । এই অবস্থার পরই গলা শুষ্ক ২ করা, উৎকাসি এবং জ্বর দেখা দেয় । ক্রমশঃ জ্বর ও অন্তঃ উপসর্গ অন্তর্হিত হয়, কিন্তু কাস অন্তান্ত বৃদ্ধি পায়, আবার প্রায়ই কাসের সহিত আক্ষেপ দেখা দেয়, তখন শিশু কাসিতে কাসিতে হাপাইয়া পড়ে, দম্ব বা নিঃশ্বাস ছাড়িতে পারে

না, শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়, আঠার ত্রায় শ্লেষ্মা বমন হয়, রাত্রিতে কাস অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, নিদ্রা হয় না, যদিও সময় ২ শিশু নিদ্রিত হয়, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই গলা শুড়্ শুড়্ করে, কাসের বেগ প্রবল হয় ও শিশু জাগরিত হয়। প্রথম অবস্থায় কাসের বেগ ২৩ বার প্রকাশ পায়, কিন্তু শেষ অবস্থায় দিবা রাত্রির মধ্যে ৬০।৭০ বা তদধিক বারও প্রকাশ পাইয়া থাকে ; কাসের সময় কুকুটধ্বনির ত্রায় শব্দ হয়। কাস অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে, কাসিতে কাসিতে চক্ষুবর্ষ রক্তবর্ণ হয়, মুখমণ্ডল আরক্তিম হয় এবং নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ও মস্তকে প্রদাহ হইয়া থাকে।

এই রোগ নিতান্ত সহজ নহে, সময় সময় ইহার সহিত নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কাইটিস পর্য্যন্ত দেখা দেয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ অপেক্ষা শীতপ্রধান দেশে আরও অধিক উপসর্গ প্রকাশ পায় এবং রোগ প্রারম্ভঃ মারাত্মক হইয়া পড়ে। আয়ুর্বেদমতে ইহাকে বাতশ্লেষ্মিক কাস বলা বাইতে পারে।

রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র ক্যাষ্টর অইল সেবন করাইবে, ইহাতে দান্ত হইলে, প্রবল আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। অনন্তর লক্ষণভেদে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শুষ্ক শ্লেষ্মাকে তরল করা নিতান্ত প্রয়োজন। ক্ষুদ্রে চোৎরা গাছের মূল এবং মরিচ ও মিশ্রী দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইবে। স্তন্যপায়ী শিশুদিগকে পর্ণবৃন্তকাথোক্ত পানের বোটা ও পিপুলমূলের সহিত কিসূমিস্ ও যষ্টিমধু মিশ্রিত করিয়া কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত ২ রতি পিপুলচূর্ণ মিশাইয়া পান করাইবে। বালকদিগেরপক্ষে বাসাকাথ অতি উপকারী।

কাস, শ্বাস ও বমন নিবারণের জন্ত অষ্টাঙ্গাবলেহ ও শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ এ রোগে মহৌষধ। তালীশাদি চূর্ণ ও চন্দ্রামৃত রস ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু তাদৃশ ফললাভ হয় না। ঐ চূর্ণ, যষ্টিমধু চূর্ণ ও পিপুল চূর্ণ একত্র করিয়া খাওয়াইবে। ইহাতে বমন ও কাস উভয়ই প্রশমিত হয়। অন্নভোজী বালকদিগের এই রোগ প্রবল হইলে, অন্ন পথ্য বন্ধ করিয়া দুগ্ধমিশ্রিত ঐষ মণ্ড পথ্য দিবে। দিবাভাগে বরং অন্ন-পথ্য দেওয়া যায়, কিন্তু রোগ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত রাত্রিকালে অন্ন পথ্য দেওয়া উচিত নয়। ঠাণ্ডা জলে স্নান না করাইয়া গরম জলে স্নান করান উচিত।

ঘুংরি বা ক্রুপ । ঘুংরি, হপিংকফ ও ক্রুপ প্রায় একই জাতীয় ব্যাধি, আয়ুর্বেদ মতে ইহাদিগকে বাতিক কাস বলা যাইতে পারে । এই তিনটি রোগেই প্রথমে সর্দির লক্ষণ প্রকাশ পায়, পরে বায়ু রুদ্ধতাবাপন্ন হইয়া শ্লেষ্মাকে শোষণ বা শুষ্ক করিতে থাকে, সূতরাং শ্লেষ্মা নির্গত হয় না, অথচ অবিরাম কাসের উদ্বোধন, বমন এবং কাসিতে চক্ষু মুখ রক্তবর্ণ ও শ্বাসকষ্ট হয় ।

এই রোগত্রয়ের মধ্যে পার্থক্য এই—হপিংকফে ও ঘুংরিতে কঠনলীতে প্রদাহ হয় না, কিন্তু ক্রুপকাসে কঠনলীর প্রদাহ একরূপ ভাবে বৃদ্ধি পায় যে, দাহসংযুক্ত শোথে কঠনলীর ছিদ্র অবরুদ্ধ করিয়া ফেলে, তজ্জন্ম রোগী ঢোক গিলিতে, কথা কহিতে বা পথ্য গলাধঃ করিতে পারে না, শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয় এবং অবশেষে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে । এই রোগ অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ও মারাত্মক, কিন্তু ঘুংরি ও হপিংকফ যন্ত্রণাদায়ক হইলেও মারাত্মক নহে ।

হপিংকফ এতদ্দেশে প্রায়শঃ মারাত্মক হইতে দেখা যায় না, কিন্তু শীত-প্রধান দেশে এই রোগ সাত্ত্বাতিকরূপে শিশু ও বালকদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে ।

ঘুংরি কাসে কঠনলীর প্রদাহ হয় না, কিন্তু ক্রুপকাসে কঠনলীর প্রদাহ হইয়া থাকে । চলিত কথায় ক্রুপকেই অনেকে ঘুংরি কহে । ক্রুপকাসে বমন করান দরকার, বমন না হইলে মধু ও সৈন্ধব অথবা মুক্তাবর্ষীর রস খাওয়াইয়া বমন করাইবে । বিরেচনের জন্ম ক্যাষ্টরইল মাখান পানের বোটা বা মুক্তাবর্ষীর পাতাধারা নল পাকাইয়া বা বর্জি প্রস্তুত করিয়া মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে । ক্রুপকাসে কঠনলীর প্রদাহিত স্থানে পেঁপের আঠা লাগাইবে এবং ক্ষুদ্র চোৎরা গাছের শিকড় ও মরিচ দ্বারা ক্ৰাথ করিয়া মিশ্রী মিশাইয়া খাওয়াইবে । ক্রুপকাসের একরূপ মহৌষধ আর নাই বলিলেই হয় । বহুদর্শী বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরিত্যক্ত বহুসংখ্যক রোগী এই ঔষধের শুণে আরোগ্য-লাভ করিয়াছে । ঘুংরি, হপিংকফ ও ক্রুপকাসে রুদ্ধকাস, শ্বাস ও হিকা নিবারণের জন্ম সচরাচর শৃঙ্গাদিচূর্ণ ও অষ্টাঙ্গাবলেহ প্রয়োগ করা যায় ।

মাসীপিসী । শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর এক মাসের মধ্যে এই রোগে আক্রান্ত হয় । ইহাতে ভয়ের কোনই কারণ নাই । হামে শিশুর যেক্রপ গাত্র-

দাহ প্রকৃতি উপস্থিত হয়, ইহাতেও ঐ সকল উপসর্গ প্রকাশ পায়, কিন্তু হামের ঞায় উপসর্গগুলি প্রবল হয় না এবং হামের ঞায় কণ্ডুগুলি বৃহৎ নহে, কিন্তু হামের ঞায় সর্বদা দলে দলে উদ্গত হয়। মুষ্টিবোগ প্রয়োগেই এই রোগ আরোগ্য হয়। মেথী ভাজিয়া জলে ভিজাইয়া সেই জল অল্প ২ পরিমাণে পান করাইবে এবং নোয়াইলের পাতা শিশুর গায়ে বুলাইবে, এই দুইটি প্রক্রিয়া দ্বারা কণ্ডুগুলি নিঃশেষে বাহির হইয়া যায়। নিমপাতা গায়ে বুলাইলে জ্বালা নিবৃতি হয়। রোগ প্রশমিত হইলে কচি নিমপাতা ও হলুদ বাটিয়া গায়ে মাখাইয়া গরম জলে স্নান করাইবে।

হাম। ইহা স্পর্শাক্রামক ব্যাধি। বাল্যকালেই এ রোগের আক্রমণ অধিক, কিন্তু একবার আক্রমণ করিলে প্রায়শঃ দ্বিতীয়বার আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। বয়ঃস্থ ব্যক্তিরা এই রোগে কদাচিত্ আক্রান্ত হয়।

হামের লক্ষণ ও চিকিৎসা মসুরিকা রোগে দ্রষ্টব্য। এই রোগে আক্রান্ত শিশু দিগকে সাবধানে রক্ষা করা কর্তব্য, যে হেতু হাম শৈত্যক্রিয়া প্রভৃতির সহায়তা প্রাপ্ত হইলেই নিউমোনিয়া ও ব্রঙ্কাইটিস্ প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধি উৎপাদন করে। এই রোগে হাম নিঃশেষে বহির্গত হওয়ার জন্য মেথী ভাজিয়া জলে ভিজাইয়া সেই জল পান করিতে দিবে। জ্বর বিকার হইলে এবং হিকা ও শ্বাস প্রকাশ পাইলে অষ্টাঙ্গাবলেহ ও শৃঙ্গাদিচূর্ণ প্রয়োগ করিবে।

পানিবসন্ত। ইহাও হামের ঞায় স্পর্শাক্রামক। চারি বৎসর বয়সের মধ্যেই ইহার আক্রমণ অধিক, তৎপর দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত আক্রমণ কম এবং তাহার পর অতি বিরল। লক্ষণ ও চিকিৎসা মসুরিকারোগে দ্রষ্টব্য।

বসন্ত। বসন্ত একপ্রকার বিশিষ্ট বীজপ্রভ দেশব্যাপী ও জনপদ ধ্বংসকারী সংক্রামক রোগ। ইহার লক্ষণ ও চিকিৎসা মসুরিকারোগে দ্রষ্টব্য।

নেত্রাভিষ্যন্দ। শিশু ও বালকেরা প্রায় প্রতি বৎসর গ্রীষ্মের সময় এই রোগে আক্রান্ত হয়। ইহা মারাত্মক না হইলেও অতীব যন্ত্রণাদায়ক। রক্তচন্দনের প্রলেপ, স্নত মাখান গরম ভাতের পোল্টিস্ ও নানাপ্রকার প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। এই রোগে অত্যধিক সন্দির লক্ষণ প্রকাশ

পায়, স্তূতরাং শীতল জলে স্নানের ব্যবস্থা করিবে না। ইহার লক্ষণ ও চিকিৎসা নেত্ররোগে দ্রষ্টব্য ।

ব্রণশোথ । শিশু ও বালকদিগের প্রায়ই ছোট ২ ব্রণশোথ প্রকাশ পায়। ব্রণ-শোথ বসাইবার জন্য তোক্তমারীর পোল্টিস্ সর্কাপেক্ষ শ্রেষ্ঠ, পাকিবার উপক্রমে গন্ধবিরজা নেকড়ায় মাখাইয়া লাগাইলে, পাকাইয়া ফাটাইয়া দেয় ।

ব্রণ । ব্রণ ফাটিলে, চাপিয়া টিপিয়া পুষ্করক্তাদি নিঃসারণ করিবে । মুখ বন্ধ হইতে না পারে, তজ্জন্ত ব্রণমুখে ধি মাখন পলিতা আন্তে গুজিয়া দিবে। অনন্তর নিম্নরূত নেকড়ায় মাখাইয়া তদুপরি বিছাইয়া বান্ধিয়া রাখিবে। ব্রণের চতুর্দিকে তুলসী পাতা ও সৈন্ধব লবণ বাটিয়া গরম করিয়া লাগাইবে। ব্রণের মধ্যস্থ র্ত্তেদ যথোচিত নিঃসৃত হইতেছে না, একরূপ বোধ হইলে, তিসির পোল্টিস্ পুনঃ পুনঃ দিবে এবং কচি নিমপাতা বাটিয়া ঘৃত সহ-যোগে বা মুখে লাগাইবে। কচি নিমপাতা ঘৃতে বা তিল তৈলে ভাজিয়া সেই ধি বা গুজ হইবার জন্য লাগাইবে ।

পোড়া নারাক্ষী । ইহা বিসর্পরোগেরই প্রকার ভেদ। 'শিশু ও বালকের এই রোগ জন্মে। ইহার চিকিৎসা বিসর্প রোগে দ্রষ্টব্য ।

ঘামাচি ও চুলকনা । ঘামাচি বা চুলকনা হইলে, কচি 'নিমপাতা সমভাগে বাটিয়া দ্রব্য গরম করিয়া লাগাইবে ও কিছুক্ষণ পরে স্নান করাইবে ।

কৃশতা । শিশু ও বালকদিগের কৃশ ও দুর্বল শরীর পুষ্ট ও সবল করিবার জন্য অশ্বগন্ধা ঘৃত প্রয়োগ করিবে। অশ্বগন্ধার চূর্ণ দুগ্ধসহ প্রয়োগ করিলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় ।

পক্ষাঘাত । কোন ২ শিশু ও বালক পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়া থাকে। এ রোগের কারণ অনেক, কিন্তু তথাপি পিতামাতার ফিরঙ্গ বা বিষাক্ত মেহ-জনিত রক্তচূড়িই সর্কাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কারণ, ইদানীং অধিকাংশ স্থলেই উহার কোন একটি কারণ প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে। রক্তচূড়ি থাকিলে অবশ্যই রক্ত-

পরিষ্কারের ঔষধ দিবে। এতদ্ব্যতীত গর্ভাবস্থায় বা প্রসবের পর মাতার বায়ু-বর্জক পানাহার দ্বারাও শিশুর এই রোগ হইতে পারে। রক্তদোষ থাকিলে রক্তপরিষ্কারক গুড়ুচ্যাতি লৌহ ও পঞ্চতিক্তঘৃত প্রভৃতি অবশ্যই প্রয়োগ করিবে। রক্তদোষ না থাকিলে ও অগ্নি সবল থাকিলে, বাতব্যাধি রোগোক্ত অশ্বগন্ধাঘৃত ও রসরাজ সেবন এবং হংসাদি ঘৃত মর্দনে অসীম উপকার হয়, রক্তদোষ না থাকিলে, এই সকল ঔষধ প্রয়োগে প্রায়ই বাত বিনষ্ট হয়।

বালকরোগে—ঔষধ ।

দশমূলকাথ । বাতিক স্তম্ভদৃষ্টিজন্ম রোগে এই কাথ প্রয়োগ করিবে। কোন্দোষে স্তম্ভ দূষিত হইয়াছে, বালকের স্তম্ভদোষজনিতরোগের লক্ষণ দৃষ্টে তাহা স্থির করিতে না পারিলে, ইহাই প্রয়োগ করিবে। কারণ দশমূল ত্রিদোষনাশক, স্তত্রাং যেকোন প্রকার স্তম্ভদৃষ্টিজন্মরোগের যেকোন অবস্থায় ইহা প্রয়োগে উপকার হয়। পারিগর্ভিক বা অত্বেকোন রোগে বালকের আক্ষেপ উপস্থিত হইলেও, ইহা প্রয়োগে আক্ষেপ বিনষ্ট হয়। ১২২৫ পৃষ্ঠায় স্তম্ভদৃষ্টি রোগ দ্রষ্টব্য। পূর্ণমাত্রায় কাথ করিয়া শিশুকে কিঞ্চিৎ ও তাহার মাতাকে সমস্ত দিবে।

দশমূল কাথ । প্রস্তুতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গুড়ুচ্যাতি কাথ । পৈত্তিক স্তম্ভদৃষ্টিজন্য রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ শিশুকে ও তাহার স্তম্ভদায়িনীকে প্রয়োগ করিবে।

গুড়ুচ্যাতি কাথ । প্রস্তুতবিধি ১২২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভার্গ্যাতি কাথ । শৈশবিক স্তম্ভদৃষ্টিজন্ম রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ শিশুকে ও তাহার মাতাকে দিবে।

ভার্গ্যাতি কাথ । প্রস্তুতবিধি ১২২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিফলাদি কাথ । কুহনকরোগে এই কাথ প্রয়োগ করিবে।

প্রক্ষেপ মধু ।

ত্রিফলাদি কাথ । হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, লোধ, পূর্ণবা, শুঠ, বৃহতী ও কটকারী :
প্রত্যেকে সন্মভাগ, সমস্ত মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পটোলাদি কাথ । শিশুর অঙ্গগল্লী বা তালুকটকরোগে অথবা যে কোন প্রকার ত্রণশোথ, শীতপিত্ত, বিসর্প, বিস্ফোট বা তজ্জনিত ক্ষত ও তদানুযজিক জ্বর উপস্থিত হইলে, এই কাথ তাহাকে পান করিতে দিবে । ইহাতে উপকার না হইলে, অমৃতাদি, নিম্বাদি বা খদিরাদি কাথ প্রয়োজ্য ।

পটোলাদি কাথ । পলতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিমছাল ও হরিজা, প্রত্যেকে সমভাগ সমস্ত মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

মুস্তকাদি কাথ । শিশুর যেকোন প্রকার জ্বরে এই কাথ প্রয়োগ করা যায় ।

মুস্তকাদি কাথ । মুখা, হরীতকী, নিমছাল, পলতা, এবং যষ্টিমধু, প্রত্যেকে সমভাগ, সর্বসমেত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

কন্তুরীভূষণ । শ্লেষ্মিকজ্বর, বাতশ্লেষ্মিকজ্বর এবং ঐসকল জ্বরে বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে । অনুপান—রুদ্রাক-বসা ও স্তনহৃৎ ।

কন্তুরীভূষণ । প্রস্তুতবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ । শিশুদিগের স্বভাবতঃ কিম্বা অত্যকোন রোগের সহিত অঙ্গীর্ণ বা অগ্নিমান্দ্য থাকিলে অথচ তৎসঙ্গে উদরাগ্নান বা ক্লেষ্ঠকাঠিন্য প্রকাশ পাইলে, এই মহৌষধ সেবন করাইবে । জ্বরসত্ত্বে বা স্বভাবতঃ প্রীহা, যকৃৎ ও অগ্রমাংস বৃদ্ধি পাইলে, শিশুদিগের পক্ষে ইহা অমৃতের তায় উপকারী । অনুপান—উষ্ণজল ।

স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

হিঙ্গুষ্ণকচূর্ণ । জ্বরে বা স্বভাবতঃ শিশুদিগের অগ্নিমান্দ্য অথবা উদরাগ্নান হইলে এবং তজ্জন্ম ক্ষুধা হ্রাস পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । অনুপান—উষ্ণজল ।

হিঙ্গুষ্ণকচূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

মন্ডঃশিলাদ্রব্জন । শিশুর কুহনরোগে এবং অত্যন্ত যেকোন প্রকার নেত্ররোগে ইহার অঙ্গন প্রয়োগ করিবে ।

মনঃশিলাভঞ্জন । বিষুদ্ধ মনঃশিলা, শখনাভিত্তম, পিপুল ও বিষুদ্ধ রসাজ্ঞান ঐত্যোকে সমভাগে লইয়া জলদ্বারা বাটিয়া বটী প্রস্তুত করিবে । ইহা মধুসহ ঘষিয়া নেত্রে অঞ্জন প্রয়োগ করিতে হয় । নেত্ররোগে অঞ্জন প্রয়োগের প্রণালী জটব্য ।

হরীতক্যাদি চূর্ণ । শিশুর তালুকণ্টকরোগে এই চূর্ণ প্রয়োগ করিবে । অম্বুপান স্তনদুগ্ধ ও মধু ।

হরীতক্যাদিচূর্ণ । হরীতকী, বচ ও কুড় ঐত্যোকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে । যাক্রাণ নিয়মাবলী দেখ ।

বালকরস । বালকদিগের বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক যেকোন-প্রকার নবজ্বর ও পুরাতন জ্বর, এবং জ্বরের সহিত কাশ বা বেদনা থাকিলে, প্রথমে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায় । ইহাতে উপকার না হইলে, দ্বিতীয় বালকরস প্রয়োগ্য, তাহাতেও উপকার না হইলে, অত্যাশ্রু ঔষধ প্রয়োগ করা যায় । অম্বুপান—তুলসীপাতার রস ও মধু ।

বালকরস । বিষুদ্ধ পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা কঞ্জলী করিবে । অনন্তর তাহার সহিত উৎকৃষ্ট স্বর্ণমাক্ষিকভস্ম অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিয়া লৌহপাত্রে বা প্রস্তরথলে কেশুযো, ভূঙ্গরাজ ও নিশিন্দাপাতার রসদ্বারা যথাক্রমে মর্দন করিবে । বটী সর্বপের জ্বায় ।

দ্বিতীয় বালকরস । বালকরসে উপকার না হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে । কেহ ২ এইটাই প্রয়োগ করেন । অম্বুপান—তুলসীপাতাররস ও মধু ।

দ্বিতীয়বালকরস । বিষুদ্ধ পারদ এক তোলা ও গন্ধক এক তোলা কঞ্জলী করিবে । অনন্তর স্বর্ণমাক্ষিকভস্ম অর্দ্ধতোলা তৎসঙ্গে মিশাইয়া কেশুযো, ভীষ্মরাজ, নিশিন্দাপাতা, পান, কাকমাটী, গিখা, হড়হড় (গুণ্টে), পুনর্নবা, ধানকুনী (ধূলকুনী) এবং যেত আপরাজিতার মূলের রসে, যথাক্রমে মর্দন করিবে, কিঞ্চিৎ আত্ম থাকিতে অর্দ্ধতোলা মরিচচূর্ণ উহার সহিত মিশাইয়া সর্বপ্রমাণ বটী করিবে ।

কফচিন্তামণি । শিশুর আক্ষেপ এবং বাতজনিত ও শ্লেষ্মজনিত জ্বরাদি যে কোন রোগে ইহা সর্বদা প্রয়োগ করা যায় । আক্ষেপে অম্বুপান—, জটামাংসী ভিজান জল বা বেড়েলার মূলের রস । কফজনিত রোগে তুলসীপাতার রস ও মধু ।

কফচিন্তামণি । প্রস্তুতবিধি ১৩১১ পৃষ্ঠায় জটব্য ।

কুম্ভারকল্যাণ রস । শিশুর আক্ষেপ এবং পারিগর্ভিকরোগে অথবা বায়ু বা পিত্তপ্রধান অথবা বাতপিত্তপ্রধান শ্বাস, বমন ও গ্রহণী প্রভৃতি যে কোন রোগের পুরাতন অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিবে । শুষ্কহৃষ্টির অল্প খাতিক ও পৈতিক রোগ এবং তালুফুর্টকরোগে ইহা প্রয়োগ করা যায় ।

কুম্ভারকল্যাণরস । স্বর্ণসিন্দূর, মুক্তা, স্বর্ণ, লৌহ, অত্র ও স্বর্ণমাক্ষিকভস্ম ; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ, ঘৃতকুমারীর রসে মর্দন । বটী সর্ষপপ্রমাণ ।

হিঙ্গুলেপ । প্রীহা অভ্যস্ত কঠিন, বেদনামুক্ত ও বৃহদাকার হইলে, এই প্রলেপ দিবাভাগে লাগাইবে । এইটী স্বর্ণীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন, অন্নদাপ্রসাদ সেন ও কালীপ্রসন্ন সেন প্রয়োগ করিতেন, এখনও তাঁহাদের শিষ্যাহুশিষ্যগণ প্রয়োগ করেন । ইহা শিশুর পক্ষে ব্যবহার্য্য নহে ।

হিঙ্গুলেপ । হিং ৮০, পুরাতন দালানের চূণা ৮০, নীল ৮০, মেটেসিন্দূর ৮০, পানের বোটা ১০, কলমীলতার গ্রহি (গাঁইট) ১০ ও মরিচ ১০ আধ তোলা ; একত্র করিয়া আদার রস বা গোড়ালেবুর (অম্বর) রসে মর্দন করিয়া দিবাভাগে প্রলেপ লাগাইবে ।

লবঙ্গযোগ । বালকের প্রীহা-বৃদ্ধি ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এই যোগ জলসহ প্রাতে প্রয়োগ করিবে । প্রীহার সঙ্গে অর থাকিলে অরের অল্প পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগ করিবে । ইহা শিশুর পক্ষে প্রয়োজ্য নহে । অস্থপান দুগ্ধ ।

লবঙ্গযোগ । সীজের ক্ষীর শোধন করিয়া তদ্বারা লবঙ্গচূর্ণ তিনবার ভাবনা দিয়া প্রয়োগ করিবে । যাত্রা—১ রতি হইতে ৬ রতি অর্থাৎ এক আনা পর্য্যন্ত ।

রসোনযোগ । বালকগণের প্রীহারোগে এই যোগটী অতি ফলপ্রদ । ইহা প্রয়োগে দান্তপরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি ও বলবৃদ্ধি হয় এবং প্রীহা ক্রমশঃ হ্রাস পায় । অস্থপান—জল ।

রসোনযোগ । খোসাছাড়ান রসুন, কাঁঠালের ভোতাভস্ম (কোন কোন দেশে ইহাকে ভুসলা কহে) ও গৃহধূম অর্থাৎ ঘুল (কোন কোনস্থলে ইহাকে আন্দু কহে) প্রত্যেকের সমভাগ, জলে মর্দন । যাত্রা—এক আনা বা দুই আনা ।

মুসব্বরযোগ । প্রীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, কঠিন অথবা বেদনাবিশিষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে, ইহা সাধারণ ঔষধের মধ্যে অতি ফলপ্রদ । অনেকস্থলে প্রীহারোগের প্রথম অবস্থায় কেবলমাত্র ইহা প্রয়োগে রোগ

আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। ইহা তীক্ষ্ণগুণবিশিষ্ট ও উষ্ণবীর্য; সুতরাং জলসহ গিলিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা করিবে। বালক, যুবা ও বৃদ্ধের পক্ষেই উপযোগী; কিন্তু শিশুর পক্ষে প্রয়োজ্য নহে, কারণ তাহারা গিলিয়া খাইতে পারে না, গুলিয়া খাইতে দিলে অত্যন্ত কাল লাগে ও তজ্জন্ত শিশুর ক্রেশ হয়। ইহা ক্ষুধাবর্দ্ধক, অন্নরেচক, বলবর্দ্ধক ও রসায়ন গুণবিশিষ্ট। বহুবিজ্ঞ চিকিৎসকেরা ইহা প্রয়োগ করেন। অন্নপান—দুগ্ধ।

মুসকরযোগ। মুসকর, শোধিত হিং, বোসা ছাড়ান রহুন ও পিপুলচূর্ণ প্রত্যেকের সম-ভাগ, জলে মর্দন। বটী ৩ রতি। বয়স্ বালকের পক্ষে অর্দ্ধ আনা।

গোময়-শ্বেদ। প্রীহাসংযুক্ত জরে প্রীহা রহৎ আকার ও কঠিন বা বেদনায়ুক্ত হইলে, এই শ্বেদ উপযুক্তপরি কয়েকদিন প্রয়োগ করিলে মহোপকার সাধিত হয়; প্রীহা অত্যন্ত কোমল ও বেদনা হ্রাস হইয়া থাকে; আরোগ্য-লাভ পর্য্যন্ত প্রত্যহ একবার প্রয়োজ্য। ইহা বহু পরীক্ষিত। কেহ কেহ যকৃৎ বৃদ্ধিতে ইহা প্রয়োগ করেন, কিন্তু গোমূত্র বা গোময় পিত্তবর্দ্ধক অথচ যকৃৎ পিত্তের আধার; এই জন্ত যকৃতে কেহ কেহ ইহা প্রয়োগের পক্ষ-পাতি নহেন।

গোময়-শ্বেদ। গাই গরুর টাটকা চোনা ও গোবর একত্র সিদ্ধ করিবে, ইতোমধ্যে রোগীর প্রীহা বা যকৃৎস্থানে কিছুকণ তাম্বুলা মালিশ করিয়া ঐস্থানে একখানি ফানেল বা কাপড় রাখিয়া তদুপরি উত্তপ্ত গোময়ের পুল্টিস্ দ্বারা শ্বেদ দিবে। উত্তপ্ত গোবর নরম কলাপাতায় বা ভেরেণ্ডার পাতায় রাখিয়া তদুপরি কাপড় বিছাইয়া পুল্টিস্ দ্বারা পুনঃ পুনঃ শ্বেদ দিবে। পুল্টিস্ ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে অপর একটী লইবে।

যকৃৎমর্দন চূর্ণ। শিশু ও বালকগণের যকৃৎ ও প্রীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বেদনায়ুক্ত বা কঠিন হইলে, কিম্বা যকৃৎ বৃদ্ধির সহিত প্রীহাবৃদ্ধি, জ্বর, কাস অগ্নিমান্দ্য ও পাণ্ডুতা থাকিলে, এই ঔষধ মহোপকারী। ইহাতে দান্ত পরিষ্কার হয়। বরিশাল জেলার ইহার প্রয়োগ সমধিক প্রচলিত। রোগের প্রথম আক্রমণেও কোষ্ঠকাঠিন্জে ইহা সমধিক উপকারী। প্রীহাও ইহা সেবনে শীঘ্র প্রশমিত হয়। অন্নপান—তালের জটা ভক্ষ-ভিজান জল বা শীতল জল, শিশুর পক্ষে স্তনদুগ্ধ বা মধু।

যকৃৎমর্দনচূর্ণ। শুঠ, পিপুল, মরিচ, চই, শিপুলমূল, বনানী, বিণ্ডু হিং, যুবাকার,

রক্তচিতার মূলের ছাল, সৈন্ধবলবণ, বিটলবণ, করকচলবণ, সান্তারলবণ ও সৌবর্জললবণ ; ইহারা প্রত্যেকে সমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিবে । মাত্রা—বয়স্কের পক্ষে চারি আনা, বালকের পক্ষে দুই আনা ও শিশুর পক্ষে এক আনা বা অর্দ্ধ আনা (৩ রতি)

শঙ্খশ্বেদ । অগ্রমাস বা যক্ষ্মে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পাইলে, রোগস্থানে ক্রাপড় বিছাইয়া অতি প্রত্নাষে এই শ্বেদ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিবে ।

শঙ্খশ্বেদ । খলিয়া বিছাইয়া তদুপরি শঙ্খ ঘর্ষণ করিয়া উষ্ণ হইলে, সেই উষ্ণ শঙ্খ পুনঃ পুনঃ লাগাইবে । খলিয়া—চট্ বা ছালা ।

শিশুচাতুর্ভূজিকা । শিশুর অরাতিসারে ইহা প্রয়োগ করিবে । অন্নপান—মুখার রস ও মধু ।

শিশুচাতুর্ভূজিকা । মুখা, পিপুল, আতইচ ও কাকড়াশুঙ্গী প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, একত্র করিবে । মাত্রা এক হইতে ৩ রতি ।

বিদ্বপঞ্চক । অরাতিসার, অতীসার, গ্রহণী, রক্তাতিসার, রক্তামাশয় ও আমাশয়ে ইহা প্রয়োগ করিবে । ইহার কাথ বা চূর্ণ প্রয়োজ্য ।

বিষপঞ্চক । বেলগুঁঠ, ইন্দ্রযব, বালা, মোচরস ও মুখা প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা অথবা প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিবে । মাত্রা ১ হইতে ৩ রতি ।

ধাতক্যাদি । বালকের অরাতিসারে বমন থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করিবে ।

ধাতক্যাদি । ধাইফুল, বেলগুঁঠ, খনিয়া, লোধ, ইন্দ্রযব ও বালা প্রত্যেকে সমভাগ, মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

নাগরাদি । সর্বপ্রকার অতীসারের প্রথম অবস্থায় আমপরিপাকের নিমিত্ত ইহা প্রয়োগ করিবে ।

নাগরাদি । গুঁঠ, আতইচ, মুখা, বালা ও ইন্দ্রযব, প্রত্যেকে সমভাগ, মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

বিড়ঙ্গাদিচূর্ণ । আমাতিসার, অগ্নিমান্দ্য ও শঙ্খীর্ণরোগে ইহা প্রয়োগ করিবে । ত্রিমিশ্রিত দ্রব্য দান্তে ইহা উপকারী । অন্নপান—মধু ও তলসুগন্ধ ।

বিড়ঙ্গাদিচূর্ণ । বিড়ঙ্গের শাস, বামানী ও পিপুল প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ১ হইতে তিন রতি ।

লবঙ্গচতুঃসম । আমাশয়, আমাভীসার ও আমগ্রহণীর প্রথম অবস্থায় উদরের বেদনা নিবারণ করিতে ইহা অদ্বিতীয় । .অনুপান—মধু ও স্তনদুগ্ধ ।

লবঙ্গচতুঃসম । লবঙ্গ, জায়ফল, জীরা ও সোহাগার ষৈ, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিবে । মাত্রা—এক হইতে ৩ রতি ।

দাড়িম্বচতুঃসম । অভীসার, গ্রহণী ও প্রবাহিকারোগে রক্ত নির্গত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগে মহোপকার সাধিত হয় । অনুপান—ছাগদুগ্ধ ।

দাড়িম্বচতুঃসম । লবঙ্গচতুঃসমের চারিটি জবা সমানভাগে লইয়া ডালিমের খোসার মধ্যে ভরিবে, পরে সূতাধারা বাঁধিয়া তদুপরি মাটির লেপ দিয়া শুকাইয়া পুটপাক করিবে । পুট লালবর্ণ হইবা মাত্র ঔষধ তুলিবে । অধিকক্ষণ রাখিলে পুড়িয়া যায় । ঔষধ বাহির করিয়া ছাগদুগ্ধে বাটিয়া একরতি বটিকা করিবে ।

ক্রিমিস্ত্ররস । আমাশয় বা পকাশয়গত ক্রিমি বর্দ্ধিত হইলে এবং তজ্জন্তু অর, অরুচি, পেটে বেদনা, মুখ হইতে জল উঠা, পেটমোচ্‌ড়ান, গাবমি বঁমি, মলমূত্র চুলকান ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, স্বভাবকোষ্ঠ অর্থাৎ বাহাদের কোষ্ঠ খোলসা আছে, অথবা পাতলা দান্ত বা দম্কা ভেদ হয়, তাহাদিগকে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে । ইহা শিশু, বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভবতি স্ত্রী সকলের পক্ষেই প্রয়োজ্য । স্বর্গীয় গঙ্গাধর সেন মহোদয় প্রয়োগ করিতেন । পাতলা দান্তে মুখের রস, স্বভাবকোষ্ঠে—শরীর রস বা চাঁপায়কের ছাঁলের রস, দম্কা ভেদে—চূণের জল, শিশুর পক্ষে স্তনদুগ্ধ ও মধু । প্রাতঃকালে শূন্য উদরে ঔষধ সেব্য ।

ক্রিমিস্ত্ররস । বিড়ঙ্গ, পলাশবীজ, নিমপাতা ও রসসিন্দূর প্রত্যেকে সমভাগ, জলে বর্দন, বটা ৪ রতি । বালকের পক্ষে অর্দ্ধ ও শিশুর পক্ষে সিকিমাত্রা ।

মহাগন্ধক । শিশুদিগের পক্ষে ইহা সর্বদা ব্যবহার্য্য । ইহার দ্বায় শ্রেষ্ঠ ঔষধ নাই বলিলেই হয় । আমাশয়, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অভীসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠকাঠিন্য বা উদারাগ্রান না থাকিলে ইহা প্রয়োগ করা যায় । ইহা কিঞ্চিৎ ধারক বলিয়া উদারাগ্রান বা কোষ্ঠকাঠিন্যে প্রয়োজ্য নহে । ঐ

সকল রোগে মলের সহিত রক্ত নির্গত হইলেও ইহা দ্বারা মহোপকার হয় । ইহা আমপাচক ও শিশুদিগের বাতাজীর্ণ ও বাতিক গ্রহণী ব্যতীত সর্বপ্রকার পেটের পীড়ায় প্রশস্ত । বালকদিগের যে অবস্থায় প্রয়োজ্য, স্ত্রীদিগেরও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োজ্য । বালকদিগের পক্ষে যেমন উপকারী, স্ত্রীদিগের পক্ষেও তদ্রূপ উপকারী । অমুপান—শুষ্ঠপায়ী শিশুর পক্ষে বেলশুষ্ঠ-বসা ও মধু, বয়স্ক বালকের পক্ষে ভাজা জীরা চূর্ণ, বেলশুষ্ঠের কাথ বা মুখার রস । রক্ত নির্গত হইলে, ডালিমপাতার রস, কুশিয়ার রস, কুড়চীর ছালের রস বা লাল কাঁটানোটের মূলের রস । অগ্নাত্ত অবস্থায় অমুপান পরিবর্তন করিয়া দিবে ।

মহাপঞ্চক । প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

শিশুকুটজাবলেহ । রক্তামাশয়, রক্তগ্রহণী ও রক্তাতীসারের প্রথম অবস্থায় অগ্নাত্ত ঔষধে উপকার না হইলে, অথচ রোগ কিঞ্চিৎ পুরাতন হইলে, ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক উপকারী । অমুপান—ছাগদুগ্ধ ।

শিশুকুটজাবলেহ । কুড়চীর কাঁচাছাল ৮ তোলা, ৬৪ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ তোলা থাকিতে নামাইবে এবং উহা ছাকিয়া পুনর্বার পাক করিবে, পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে, আতইচ, আকনাদি, জীরা, বেলশুষ্ঠ, আমের আটীর শাস, শুল্কা, ধাই-ফুল, মুখা ও জায়ফল ; এত্যেকের চূর্ণ চারি আনা উহাতে মিশ্রিত করিবে । মাত্রা—৩ রতি হইতে দুই আনা ।

বৃহৎ অগ্নিকুমার । শিশু ও বালকের বাতাজীর্ণে ইহা মহোপকারী, কিন্তু গ্রহণী বা অতিসারে বিশেষ উপকার করে না । গর্ভাবস্থায় ও স্ততিকার প্রথম অবস্থায় উপকার করে । অমুপান—উষ্ণজল ।

বৃহৎ অগ্নিকুমার । প্রস্তুতবিধি ১২৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

ভুবনেশ্বর । বাতাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ এবং সাধারণ অগ্নিমান্দ্য বা বদ-হজম, চোঁয়া বা অগ্নি ঢেকুর ও দম্কাভেদ হইলে, ইহা উপকারী । ইহা গর্ভাবস্থায় ও স্ততিকার প্রথম অবস্থায় বেশ উপকার করে । অমুপান—উষ্ণজল ।

ভুবনেশ্বর । প্রস্তুতবিধি ১২৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বচাদিচূর্ণ। শিশু ও বাগকের যে কোন প্রকার কাসে ইহা প্রয়োগ করা যায়। অমুপান—মধু।

বচাদি চূর্ণ। বচ, আতাইব, বাসক ছাল, পিপুল ও কাকড়াগুড়ী প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিবে। যাত্রা ১ রতি হইতে ৩ রতি।

তিসি অর্থাৎ মসিনা বা ভূসির পোল্টিস্। নিউমোনিয়া (ফুস্-ফুস্প্রদাহ), বক্ষঃস্থলে প্লেগ্মা সঞ্চিত ও প্লেগ্মা দ্বারা বক্ষঃস্থল আবৃতবৎ বোধ এবং তজ্জন্ম খাসকষ্ট উপস্থিত হইলে, কিম্বা ঐ অবস্থায় অল্প কাস থাকিলে বা মুখদ্বারা অল্প প্লেগ্মা নির্গত হইলে, এই পোল্টিস্ রোগীর বক্ষঃস্থল আবৃত করিয়া লাগাইবে। বক্ষঃস্থলের অর্থাৎ বুকের দক্ষিণ ও বাম যে দিকে বেদনা থাকিবে, সেই দিকে অথবা উভয়দিকে কিম্বা পৃষ্ঠদেশে বেদনা থাকিলে, সেই স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া পোল্টিস্ লাগান উচিত। এই পোল্টিস্ বক্ষঃস্থল, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশের যে কোনও প্রকার বেদনায় অতি উপকারী। বাতশ্লেগ্মিক এবং সান্নিপাতিক অরে বুকে বেদনা থাকিলে, এই পোল্টিস্ ব্যবস্থা করিবে। বাতশ্লেগ্মিক ও সান্নিপাতিক অরে যথাক্রমে আয়ুর্বেদশিষ্কার ২৪ ও ৫৪ পৃষ্ঠায় বক্ষঃস্থল ক্রমশঃ সর্বদা বালুকা-স্বেদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ উভয়প্রকার অরে বুকে বালুকা-স্বেদের পরিবর্তে এই পোল্টিস্ প্রয়োগ করিবে। যে পর্য্যন্ত খাসকষ্ট ও বুক, পৃষ্ঠ বা পার্শ্ব-বেদনার লাঘব, এবং প্লেগ্মার পরিপাক না হয়, তাবৎ প্রয়োগ করা উচিত। অতীসারে বাতশ্লেগ্মার প্রকোপ বশতঃ বুকে ও পার্শ্বে বেদনা থাকিলে কিম্বা অতীসারে ও বিষ্টকাজীর্ণে (বাতাজীর্ণে) বাতশ্লেগ্মার প্রকোপহেতু উদরাগ্নান, উদরবেদনা ও মলরোধ হইলে, পোল্টিস্ প্রয়োগে অসাধারণ উপকার হয়, উদরের অবস্থা শীঘ্রই পরিবর্তিত হয়। অতীসারে যবপ্রলেপের পরিবর্তে ইহা প্রয়োজ্য। যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বেদনাবিশিষ্ট হইলে, এই পোল্টিস্ প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। ফিরঙ্গরোগে যকৃৎ ও প্লীহার নিয়ন্ত্রণ হইতে একপ্রকার গুটিকা উদ্ভূত হয়, তাহাকে সিকিলিটিক গম্বা কহে। ইহার আকার কাঁঠালের ভোতার গায়, সহসা দেখিলে যকৃৎ বা প্লীহা-বৃদ্ধি বলিয়া ভ্রম জন্মে। উহাতে বেদনা হয় এবং ঐষধ প্রয়োগ না করিলে ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে

থাকে, এই অবস্থায় এই পোল্টিস্ অতি উপকারী । মিউমোনিয়া (ফুস্ফুস-প্রদাহ) বাতপ্লেয় অর ও সন্নিপাতিক অরে ইদানীং ইউরোপীয় চিকিৎসক-দিগের মধ্যে কেহ কেহ বক্ষঃস্থলে পোল্টিসের পরিবর্তে কার্পাস তুলার গদী দ্বারা বক্ষঃস্থল আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করেন, তাঁহারা বলেন, পুনঃপুনঃ পোল্টিস্ পরিবর্তনে অথবা পোল্টিস্ ঠাণ্ডা হইয়া গেলে, বৃকে ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা, সুতরাং তুলার গদীর দ্বারা একবার আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে, ঐরূপ ঠাণ্ডা লাগিবার কোন সম্ভাবনা নাই । এতদেশেও অনেক চিকিৎসক ইদানীং এইরূপ ব্যবস্থাই করিয়া থাকেন এবং তদ্বারা বেশ সুফলও পাওয়া যায়, সুতরাং পোল্টিসের পরিবর্তে তুলার গদী ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । বৃকে, পিঠে বা পার্শ্বদেশে পোল্টিস্ দিতে হইলে, অগ্রে ঐ সকল স্থানে কাপড় বিছাইয়া তত্পরি পোস্টিস্ দিবে এবং পোল্টিস্ ঠাণ্ডা হইতে না পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে অর্থাৎ ঠাণ্ডা হইয়া আসিলেই নূতন পোল্টিসের ব্যবস্থা করিবে ।

তিসি অর্থাৎ মসিনা বা ভূসির পোল্টিস্ । তিসি খোলায় করিয়া অল্প ভাজিয়া শিলার পেষণ করিয়া বা ঢেঁকিতে কুটিয়া চূর্ণ করিবে । অনন্তর তাঁহার সহিত উষ্ণ জল মিশ্রিত করিয়া একটী কাঁসার বা পিতলের বাটিতে রাখিবে, পরে একটী জলপূর্ণ কড়াই চুল্লীর উপরে বসাইয়া জ্বাল দিবে এবং জল ফুটিয়া উঠিলে, তত্পরি ঐ বাটি রাখিবে, এমন ভাবে রাখিবে যেন বাটিটি জলের উপর ভাসমান থাকে । এইরূপে ঐ ফুটন্ত জলের উত্তাপে মসিনা গরম হইলে যে স্থানে পোলটিস দিতে হইবে, সেই স্থানের দ্বিগুণ পরিমাণ বস্ত্রখণ্ড লইবে এবং তাহার অর্দ্ধাংশে মসিনা রাখিয়া অপর অর্দ্ধাংশ দ্বারা মসিনার অপর দিক ঢাকিয়া রোগস্থানে লাগাইবে । অনেকে তিসিচূর্ণ জলে গুলিয়া লোহার হাতায় গরম করিয়া প্রয়োগ করেন, কিন্তু এই প্রক্রিয়াদ্বারা পোল্টিস্ প্রস্তুত করিয়া লাগাইলে অধিক উপকার হয় । অতিসার বা অজীর্ণে উদরের এবং বাতপ্লেয়অর ও সন্নিপাত অরে বৃকের বেদনায় উদর বা বৃক জুড়িয়া পোলটিস লাগান উচিত ।

কণ্টকার্যাদি চূর্ণ । শু ও বালকের সাধারণ কাসে ইহা প্রয়োগ করা যায় । অল্পপান—মধু ।

কণ্টকার্যাদি চূর্ণ । কণ্টকারী, জাতী বা মালতীফুল, মাগকেশর, তালীশপত্র ও বচ, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ একত্র করিবে । মাজা—এক হইত ওঁরতি ।

ধানাদি পানক । শিশু ও বালকের কাসের সহিত শ্বাস প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে ।

ধানাদিপানক । ধনিয়ার চাউল বাটা ও ইক্ষুচিনি একত্র করিয়া আতপ চাউলের জলসহ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে ।

দ্রাক্ষাদিচূর্ণ । কাসের সহিত তমকশ্বাস থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে । অমুপান—মধু ও স্তনদুগ্ধ ।

দ্রাক্ষাদিচূর্ণ । কিস্মিস্, বাসকছাল, হরীতকী ও পিপুল ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ২ রতি হইতে ৬ রতি ।

প্রাণবল্লভ রস । বাত, পিত্তাদিক যে কোন রোগে ইহা অমুপান-ভেদে প্রয়োগ করা যায় । বমি, তৃষ্ণা, শ্বাস, আক্ষেপ এবং অজ্ঞাত বায়ুবিকার, মুচ্ছা ও উদরাগ্নান প্রভৃতি রোগে ইহা পরম উপকারী, কিন্তু শ্লেষ্মসংযুক্ত বাত বা স্তন্য বাতে অথবা শ্লেষ্মপ্রধান কোন রোগেই প্রয়োজ্য নহে । অমুপান—তালিকাদৃষ্টে নানা রোগে কল্পনা করিবে । হিকারোগে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে কটকীচূর্ণ ও মধু সহ দিবে ।

প্রাণবল্লভরস । প্রস্তুতবিধি ১২৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

আত্মাস্থিযোগ । শিশু ও বালকের বমি হইলে, এই যোগ প্রয়োগ করিবে । অমুপান—স্তনদুগ্ধ ও মধু ।

আত্মাস্থিযোগ । আয়ের আঁটির শাস, ঐ চূর্ণ ও সৈন্ধব সমভাগে বাটিয়া লইবে । মাত্রা—২ রতি হইতে দুই আনা ।

পঞ্চকৌলচূর্ণ । শিশু ও বালকের স্তনদুগ্ধ বা গোধূত পুনঃ পুনঃ বমন করিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে । অমুপান—ডালিমের বা বেদানার রস ।

পঞ্চকৌলচূর্ণ । পিপুল, পিপুলমূল, চই, রক্তচিভা ও শুঠ, এত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে । মাত্রা—১ হইতে ৩ রতি ।

বাসাকাদি । জ্বর বা বিজ্বর যে কোন অবস্থায়ই হউক বালকের বুকে শ্লেষ্মা সঞ্চিত ও শুষ্ক হইয়া আবদ্ধ রহিলে ও তজ্জন্ম গলার মধ্যে ঘর্ষ ঘর্ষ শব্দ হইলে অথচ শ্লেষ্মা বাহির না হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে । ইহাতে শ্লেষ্মা ভরল হইয়া বহির্গত হয় ।

বাসাকাদি । প্রস্তুতবিধি ১১৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

পর্ণবৃন্তকাথ । যে কোন অবস্থায় হউক শিশুর বুকে প্লেগ্মা সঞ্চিত ও শুষ্ক হইয়া আবদ্ধ রহিলে, এই মহৌষধ প্রয়োগ করিবে । ইহাতে প্লেগ্মা তরল হইয়া নির্গত হয় । স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে ইহা অতীব উপকারী । পূর্ণমাত্রায় কাথ প্রস্তুত করিয়া যথোচিত মাত্রায় পান করাইবে ।

পর্ণবৃন্তকাথ । পানের বোটা ১ তোলা ও পিপুলমূল ১ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ- ৮ তোলা । এক্ষেপ পিপুলচূর্ণ ১ হইতে ৩ রতি ।

অন্নারি (সাদাচটী) । ইহা শিশু ও বালকের নানারোগে অহুপান ভেদে প্রয়োগ করা যায় । অহুপান তালিকা দৃষ্টে কল্পনা করিবে । পেট-গরম, পেট ফাপা, বমি বা বমির ভাব, বাতাজ্বীর্ণ, মূত্রকৃচ্ছ্র, হিকা, অন্নপিণ্ড, শূল, আমাশয়, প্রীহা, শোথ, কামলা, পাণ্ডু, উদরী ও বাতিক কাস প্রভৃতি রোগে ব্যবহার করা যায় ।

অন্নারি (সাদাচটী) । প্রস্তুতবিধি ১২৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

নীললেপ । প্রস্রাব বন্ধ হইলে, এই লেপ নাভির নিয়ে প্রয়োগ করিবে ।

নীললেপ । নীল, পচা আমপাতা ও জলের কলসীর নীচের মাটি প্রত্যেকের সমভাগ, একত্র বাটিয়া লইবে ।

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ । বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর ও বাতশ্লৈষ্মিক কাস প্রভৃতি রোগে শ্বাস বা হিকা প্রকাশ পাইলে ও বায়ুর অত্যধিক প্রকোপ বশতঃ কাস শুষ্ক হইলে এবং ঐ শুষ্ক প্লেগ্মা আবদ্ধ থাকাতে রোগীর বক্ষঃস্থলে শন শন শব্দ ও বেদনা, উদরাগ্নান, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । ইহা বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই মহোপকারী । ইহা বায়ুর অহুলোমকারক অর্থাৎ উর্দ্ধগামী বায়ুকে অধোপামী এবং প্লেগ্মা তরল করে ।

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

অম্বাঙ্গাবলেহ । শিশু ও বালকের জ্বর, কাস, হাম ও বসন্ত প্রভৃতি যে কোন রোগে শ্বাস ও হিকা প্রকাশ পাইলে, এই মহৌষধ প্রয়োগ করিবে ।

ইহা কাস স্বেচ্ছ প্রয়োগ করা যায়। শূল্যাদিচূর্ণ ও এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে শ্বাস ও হিকার জন্ম প্রায়শঃ অল্প ঔষধের আবশ্যকতা হয় না।

অষ্টাদশবর্ষে। প্রস্তুতবিধি ১০৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দন্তোদ্ভেদরোগান্তক। দন্তোদগম জন্ম রোগে এই মহৌষধ প্রয়োগ করিলে, অল্প কোনও ঔষধের প্রয়োগ না করিলেও চলে। দাঁত উঠিবার সময় জ্বর, আক্ষেপ, অতীসার ও বমনাদিরোগে ইহা অতি প্রশস্ত। ইহা শিশুর মাটীতে ঘর্ষণ করিলে, শীঘ্র দাঁত উঠে। অমুপান—স্তনদুগ্ধ ও মধু।

দন্তোদ্ভেদরোগান্তক। পিপুল, পিমূলমূল, চৈ, চিত্তামূল, শুঠ, বনযমানী, যমানী, হরিজা, যষ্টিমধু, দেবদারু, দারুহরিজা, বিড়ঙ্গ, এলাইচ, নাগেশ্বর, মুখা, শঠী, কাকড়াশূকী, বিটলবণ, অন্ন, শম্ভভঙ্গ, লোহ ও স্বর্ণশাকিক প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দন। বটী তুরতি।

অশ্বগন্ধা সূত। শিশু ও বালকের উদরাময় না থাকিলে, পুষ্টি ও বল বৃদ্ধির জন্ম এই মহৌষধ প্রয়োগ করিবে। দুর্বল শরীর সবল ও পুষ্ট করিতে ইহার শক্তি অসাধারণ। অমুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

অশ্বগন্ধাসূত। প্রস্তুতবিধি ৬১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শয্যামূত্র-চিকিৎসা।

শয্যায় প্রস্রাব বা মূত্রত্যাগ করা একটি রোগ। স্তন্যপায়ী বা দুগ্ধান্নভোজী শিশুগণের শয্যায় মূত্রত্যাগ স্বাভাবিক, তজ্জন্ম চিকিৎসা বা ঔষধ প্রয়োগও নিম্নপ্রয়োজন। সচরাচর বাল্যাবস্থা তিন ভাগে বিভক্ত। স্তন্যপায়ী, দুগ্ধান্ন-ভোজী ও অন্নভোজী। এক বৎসর বয়স পর্যন্ত স্তন্যপানের, দুই বৎসর পর্যন্ত দুগ্ধ ও অন্ন ভোজনের এবং দুই বৎসর হইতে ১৬ বৎসর পর্যন্ত সাধারণতঃ বালকগণের অন্নভোজনের সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে। স্তন্যপায়ী ও দুগ্ধান্নভোজী শিশুর শয্যায় মূত্রত্যাগ রোগের মধ্যে গণ্য নহে, তদুচ্চ বয়স্ক বালকগণের শয্যায় প্রস্রাব করা অস্বাভাবিক, সুতরাং উহা রোগের মধ্যে গণ্য। এই রোগ বালকের জন্মে, আবার বালিকারও জন্মে।

কারণ। রোগ উৎপন্ন হইলে সর্বাণ্ডে তাহার কারণ নির্ণয় করিবে।

মধুমেহ বা বহুমূত্র বর্তমানে এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে, কিম্বা পিতা মাতার ঐ রোগ থাকিলে সন্তানেও সংক্রামিত হইতে পারে, তদ্ব্যতীত কখনও কখনও বর্ষাকালে বৃষ্টির প্রাবল্যে কিম্বা অধিক শৈত্যসংযোগে অর্থাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগ জন্মিতে পারে । ঋতুদোষে হইলে অল্প ঋতুর আগমনে আবার রোগ প্রশমিত হয় এবং শৈত্যসংযোগে হইলে, রোগীকে একটু গরমে রাখিলে কিম্বা স্নানাহারের প্রতি ভীত দৃষ্টি রাখিলে রোগ সারিয়া যায়, কিন্তু পিতা মাতার রোগ হইতে উৎপন্ন হইলে রীতিমত চিকিৎসা করা আবশ্যক ।

লক্ষণ । এই রোগে কোন প্রকার উপসর্গ বা জ্বালাযজ্ঞণা উপস্থিত হয় না । রাত্রিকালে বা দিবাভাগে নিত্রা যাইলে, স্বপ্নদর্শন ও সঙ্গে সঙ্গে মূত্রত্যাগ হয় এবং মূত্রত্যাগে রোগীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা । প্রথমতঃ কয়েকদিন স্বর্ণসিন্দূর বা মকরধ্বজ তেলাকুচা পাতার রস ও মধু অল্পপানে প্রয়োগ করিয়া দেখা উচিত, তাহাতে উপকার না হইলে, রুহং পূর্ণচন্দ্র রস ব্যবস্থা করিবে, যদি তাহাতেও উপকার না হয়, তখন আকিং মিশ্রিত ঔষধ অর্থাৎ কালপূর্ণচন্দ্র রস প্রয়োগ করিবে ।

বিষ-চিকিৎসা ।

বিষের প্রকারভেদ । বিষ সাধারণতঃ দুই প্রকার, স্থাবর বিষ ও জঙ্গমবিষ । মূলবিষ, পত্রবিষ, ধাতুবিষ ও ফলবিষ প্রভৃতিকে স্থাবরবিষ এবং সর্প ও বিছা প্রভৃতির বিষকে জঙ্গমবিষ কহে ।

স্থাবর ও জঙ্গম বিষের সংখ্যা ও প্রকার ভেদ । স্থাবর বিষ দশ প্রকার এবং জঙ্গমবিষ ষোল প্রকার ।

মূলে, পত্রে, ফলে, পুষ্পে, ছালে, ক্বীরে, সারে, নির্ঘাসে, ধাতুদ্রব্যে এবং কন্দে যে বিষ থাকে তাহাকে স্থাবর এবং সাপ, কাকলাস ও বিছা প্রভৃতি নানাবিধ প্রাণীর দৃষ্টি, নিঃশ্বাস, দংষ্ট্রা, নখ, মল, মূত্র, শুক্র, লালা, আর্দ্রব, আল, স্নান্দংশ, বাতকর্শ, গুহ, অস্থি, পিত্ত এবং শূক (শুমার) যে বিষ থাকে, তাহাকে জঙ্গমবিষ কহে ।

স্হাবর বিষের সাধারণ ক্রিয়া । স্হাবর বিষ উদরস্থ হইলে রোগীর অর, হিকা, দন্ত-হর্ষ, গলায় ব্যথা, ফেন-বমন, অরুচি, শ্বাস ও মুচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

জঙ্গমবিষের সাধারণ ক্রিয়া । জঙ্গমবিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, রোগীর নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্লান্তি, অতীসার এবং দণ্ডস্থানে বা বিষলিপ্ত স্থানে দাহ, পাক এবং রোমাঞ্চ ও শোথ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

স্হাবরবিষের ক্রিয়া ।

মূলবিষের ক্রিয়া । বৃক্ষ লতাদির বিষাক্ত মূল শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, রোগীর দণ্ডাদি দ্বারা মর্দনবৎ ব্যথা, মোহ এবং প্রলাপ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

পত্রবিষের ক্রিয়া । বৃক্ষ লতাদির বিষাক্ত পত্র শরীরে প্রবিষ্ট হইলে রোগীর হাই উঠে এবং কম্প ও শ্বাস হয় ।

ফলবিষের ক্রিয়া । বৃক্ষ লতাদির বিষাক্ত ফল শরীরে প্রবিষ্ট হইলে রোগীর অণ্ডকোষে শোথ, দাহ এবং ভোজনে অনিচ্ছা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

পুষ্পবিষের ক্রিয়া । বৃক্ষলতাদির বিষাক্ত পুষ্প শরীরে প্রবিষ্ট হইলে রোগীর বমন, উদরাগ্নান এবং মুচ্ছা প্রকাশ পায় ।

ত্বকুবিষ, সারবিষ ও নির্যাসবিষের ক্রিয়া । বৃক্ষলতাদির বিষাক্ত ছাল, সার ও আঠা শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, রোগীর মুখে দুর্গন্ধ, শরীরের কর্কশতা বা রুক্ষতা, শিরঃপীড়া ও কফস্রাব এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

ক্ষীরবিষের ক্রিয়া । বৃক্ষলতাদির বিষাক্ত ক্ষীর শরীরে প্রবিষ্ট হইলে রোগীর মলভেদ, জিহবার শুষ্কতা ও মুখ হইতে ফেণা নির্গত হয় ।

ধাতুবিষের ক্রিয়া । বিষাক্ত ধাতু শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, রোগীর হৃদয়ে বেদনা ও তালুতে দাহ জন্মে ।

কন্দবিষের ক্রিয়া । কন্দবিষ অতিশয় উগ্র, স্তম্ভরাৎ শীঘ্র প্রাণ-নাশক ।

মূলাদি নয়টি বিষের অসাধ্য লক্ষণ । স্থাবর বিষের মধ্যে ষাটবিধ-
ব্যতীত মূল হইতে কন্দ পর্য্যন্ত নয়টি বিধ দেহে প্রবিষ্ট হইলে এবং যথাসময়ে
চিকিৎসা না করিলে, পরিণামে প্রাণনষ্ট করে ।

জঙ্গমবিষের ক্রিয়া ।

লুতাবিষের ক্রিয়া । লুতা মাকড়শা জাতীয় প্রাণী । লুতা নানাবিধ,
উহার দংশন করিলে, দষ্টস্থান দুর্গন্ধযুক্ত এবং ঐ স্থান হইতে রক্তস্রাব হয়,
পরন্তু রোগীর জ্বর, দাহ, অতীসার, ত্রিদোষজনিত নানাবিধ পীড়া, নানা
আকারের পিড়কা বহির্গত, বিস্তৃত মণ্ডলাকার চিহ্নের উৎপত্তি এবং রক্তবর্ণ
বা শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট অথচ কোমল ও প্রসরণশীল বৃহৎ শোথ জন্মে ।

মূষিক বিষের ক্রিয়া । মূষিকের শুক্রেই কেবল বিষ অবস্থান করে
এমন নহে, মূষিকের দংশনেও বিষের লক্ষণ প্রকাশ পায় । সাধারণ মূষিকে
দংশন করিলে, দষ্টস্থান হইতে রক্ত নির্গত হয় এবং রোগীর জ্বর, অরুচি
রোমাঞ্চ, দাহ ও গাত্রে পাণ্ডুবর্ণ গোলাকার চিহ্ন উৎপন্ন হয়, কিন্তু একজাতীয়
মূষিক আছে, তাহার দংশন করিলে, দষ্টব্যক্তির মূর্ছা, শরীরে মূষিকের
আকৃতি বিশিষ্ট শোথ, শরীরের বিবর্ণতা, রোগীর বধিরতা, জ্বর, মস্তকের
গুরুতা এবং মুখ হইতে লাল নির্গত ও রক্ত বমন হইয়া থাকে, এমন কি
ইহাতে রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে ।

কুকলাসবিষের ক্রিয়া । কাকলাস দংশন করিলে, দষ্টস্থান কৃষ্ণ বা
অন্তবর্ণবিশিষ্ট শোণযুক্ত এবং রোগীর মোহ ও মল ভেদ হইয়া থাকে ।

বৃশ্চিক বিষের ক্রিয়া । বিছা দংশন করিলে, অগ্নিদগ্ধবৎ জ্বালা ও
সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা হয় এবং দংশন করিবামাত্র বিধ উর্দ্ধগামী হইয়া পশ্চাৎ
দাশিত স্থানে অবস্থিতি করে ।

মণ্ডুকবিষের ক্রিয়া । সবিশ মণ্ডুক দংশন করিলে, দষ্টস্থানে বেদনা
যুক্ত অথচ পীতবর্ণ শোথ জন্মে এবং রোগীর তৃষ্ণা, নিদ্রাধিক্য ও বমি
হইয়া থাকে ।

মৎস্তবিষের ক্রিয়া । সবিশ মৎস্য দংশন করিলে দষ্টস্থানে জ্বালা, শোথ ও বেদনা হয় ।

জলৌকাবিষের ক্রিয়া । সবিশ জলৌকা দংশন করিলে, দংশিত-স্থানে কণ্ডু এবং শোথ জন্মে, পরন্তু রোগীর জ্বর ও মুচ্ছা হইয়া থাকে ।

গৃহ-গোধিকাবিষের ক্রিয়া । গৃহগোধিকা অর্থাৎ টিক্‌টিকির বিষে জ্বালা, শোথ, সূচীবিন্ধবৎ বেদনা ও ঘর্ষ নির্গত হয় ।

শতপদীবিষের ক্রিয়া । শতপদী নামক কীট দংশন করিলে, ঘর্ষ, বেদনা ও জ্বালা হয় ।

মশকবিষের ক্রিয়া । মশক দংশন করিলে, দংশিত স্থানে কণ্ডু, অল্প শোথ ও অল্প বেদনা হয় ।

মক্ষিকাবিষের ক্রিয়া । মক্ষিকা দংশন করিলে, দংশিত স্থানে শ্রামল পিড়কা উৎপন্ন হয় এবং ঐ পিড়কা হইতে স্ফুটন প্রবাহ নির্গত হয় ।

• ব্যাঘ্রাদিবিষের ক্রিয়া । ব্যাঘ্রাদি চতুষ্পদ জন্তু এবং বনমামুস প্রভৃতি দ্বিপদ প্রাণীর নখ বা দন্ত দ্বারা আঘাত করিলে, আহতস্থান পাকে এবং পচে, পরন্তু ঐ স্থান হইতে পুষ্ণ নির্গত এবং রোগীর জ্বর হইয়া থাকে ।

সর্পদন্ড-ব্যক্তির অসাধ্য লক্ষণ । যে সর্পদন্ড ব্যক্তির শরীরে অন্ত-প্রয়োগ করিলেও শোণিত নির্গত হয় না এবং লতা বা বেত্র দ্বারা আঘাত করিলেও রৈখা পতিত হয় না, কিম্বা শীতল জল সেচন করিলেও রোমাঞ্চ হয় না, তাহার জীবনের আশা থাকে না । পরন্তু সর্পদন্ড ব্যক্তির মুখ যদি বক্র হয়, চুল ধরিয়া টানিলে যদি চুল উঠিয়া যায় কিম্বা গ্রীবা বা নাসা ভঙ্গ হয়, তাহারও মৃত্যু হয় । এতদ্ব্যতীত রোগীর মুখ হইতে বর্ধির ঝায় লালা নির্গত হইলে বা তাহার মুখ ও মলদ্বার হইতে রক্ত নির্গত হইলে, তাহারও জীবনের আশা থাকে না ।

বিষমুক্ত মানবের লক্ষণ । বিষরোগী আরোগ্য হইলে, দোষের প্রস্রবতা, শাতুর স্বাভাবিকতা, অন্ন ভক্ষণে ইচ্ছা, যথোচিতরূপে মলমূত্রের

নির্গম, বর্ণের প্রসন্নতা, ইন্দ্রিয়ের পটুতা ও মনের প্রসন্নতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

বিষ-চিকিৎসা-বিধি ।

বিষ দুই প্রকার, স্থাবর ও জঙ্গম । স্থাবর শব্দে স্থিতিশীল এবং জঙ্গম শব্দে গমনশীল পদার্থ বুঝায় । পদার্থ তিন প্রকার, চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ । এক স্থান হইতে অত্র গমনশীল প্রাণীদিগকে চেতন, প্রাণহীন পদার্থকে অচেতন এবং জীবন সম্বন্ধে যাহারা একস্থান হইতে অত্র গমনাগমন করিতে সক্ষম নহে, তাহাদিগকে উদ্ভিদ বলা যায় । চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ এই ত্রিবিধ পদার্থে বিষ অবস্থান করে । উদ্ভিদ ও অচেতন পদার্থে যে সকল বিষ অবস্থান করে, তাহাদিগকে স্থাবর এবং চেতন পদার্থে যেসকল বিষ অবস্থান করে, তাহাদিগকে জঙ্গম বিষ বলা যায় ।

স্থাবর বিষ দশ প্রকার, যথা—বৃক্ষ লতাদির মূল, পাতা, ফল, ফুল, ছাল, ক্ষীর, সার, নির্ঘাস (আঠা) এবং কন্দ ও ধাতু বিষ । মূলবিষ আট প্রকার, যেমন—অমৃত (মিঠা), ধূতুরা মূল ও গুঞ্জা মূল অর্থাৎ কঁচ মূল প্রভৃতি । পত্র বিষ পাঁচ প্রকার যথা—বিষ পত্র অর্থাৎ জয়পাল বীজের মধ্যস্থ পত্র প্রভৃতি । ফলবিষ দ্বাদশ প্রকার, যেমন ধূতুর ফল, কদবী ফল প্রভৃতি । পুষ্পবিষ পাঁচ প্রকার, যেমন কদম্ব পুষ্প প্রভৃতি । এইরূপ করন্তাদি সাত প্রকার বিষ আছে, তাহাদের ছাল, সার ও নির্ঘাস (আঠা) বিষ । ক্ষীর (শ্বেতরস) বিষ তিন প্রকার, যথা—মনসা সীজের ক্ষীর প্রভৃতি । ধাতু-বিষ দুই প্রকার, যথা, দারমুজ্জ অর্থাৎ সৈকো ও হরিতাল । কালকূট, বৎসনাভ এবং হলহল ও শৃঙ্গীবিষ প্রভৃতি ১৩ প্রকার কন্দ বিষ । সর্বসমেত স্থাবর বিষ ৫৫ প্রকার ।

জঙ্গম প্রাণীর দৃষ্টি, নিঃশ্বাস, দংশন, নখ, মল, মূত্র, শুক্র, লালা, স্পর্শ, আর্দ্রব, মুখসন্দেশ, বাতকর্ম্ম, শুহ, অস্থি, পিত্ত ও শূক বা শূন্য বিষ ।

কোন কোন সর্পের দৃষ্টি ও নিঃশ্বাসে বিষ, কোন কোন সর্পের দন্তে বিষ, বিড়াল, কুকুর, বানর, মকর, ব্যাং, গিরগিটি এবং অন্যান্য চতুষ্পদ কীটের

দস্ত ও নখে বিষ, মুর্বিকের শুক্রে বিষ, বিছা, ভ্রমর, মধুমক্ষিকা ও বোলতা প্রভৃতির আলে অর্থাৎ হলে বিষ, লুতা অর্থাৎ মাকড়শা প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণীর লাল, মুত্র, মল, দংশন, স্পর্শ, গুরু ও আর্দ্রব সকলই বিষাক্ত, মক্ষিকা ও জলৌকা প্রভৃতির মুখে বিষ, বিষদ্বারা হত প্রাণীর অস্থিতে বিষ, মৎস্তের পিণ্ডে বিষ, এবং শূয়াপোকা প্রভৃতির শূক্রে অর্থাৎ গায়ে শূলাতে বিষ। এইরূপে জঙ্গমবিষ সর্বসমেতে ষোল প্রকার।

স্থাবর ও জঙ্গমবিষের ক্রিয়া ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে। স্থাবর বিষের মধ্যে ১৩ প্রকার কন্দবিষ দশগুণযুক্ত, সূতরাং অতিশয় উগ্র ও শীঘ্র প্রাণনাশক। আবার জঙ্গমবিষের মধ্যে কালসর্প অর্থাৎ কেউটে, গোক্ষুরা ও জাতিসর্প প্রভৃতির বিষ ত্রয়োদশ প্রকার কন্দ বিষের ত্রায় দশগুণযুক্ত, সূতরাং শীঘ্র মারাত্মক। ফলতঃ স্থাবর বিষই হউক বা জঙ্গম বিষই হউক, তাহা দশগুণবিশিষ্ট এবং উদরস্থ হইলে মৃত্যু অনিবার্য, তবে অবিলম্বে সূচিকিৎসার বন্দোবস্ত করিলে, কচিং জীবন রক্ষা হইলেও হইতে পারে। যেহেতু দশগুণযুক্ত বিষ রক্ত, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, স্থল, আণ্ডকারী, ব্যাবায়ী, বিকাশি, বিশুদ্ধ, লঘু ও অপাকী, সূতরাং শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, রক্ততাবশতঃ বায়ুর প্রকোপ জন্মায়, উষ্ণতাপ্রযুক্ত পিত্তবৃদ্ধি ও রক্ত দূষিত করে, তীক্ষ্ণতাপ্রযুক্ত মনোমোহ জন্মায় ও শরীরের সমস্ত বন্ধন শিথিল করে, স্থলতাবশতঃ সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে অতি শীঘ্র প্রসারিত করে ও শরীরের বিকৃতি জন্মায়, আণ্ডকারিত্ব হেতু ঐ সকলকার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন ও জীবন নষ্ট করে, ব্যাবায়ি বলিয়া সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মুহূর্ত্তমধ্যে প্রসারিত হয়, বিকাশি বলিয়া শরীরস্থ দোষ, ধাতু ও মলক্ষয় করে, বিশদ বলিয়া বিরেচক, লঘু বলিয়া দৃষ্টিকিংশ্র এবং অপাকী বলিয়া শীঘ্র জীর্ণ হয় না, সূতরাং দীর্ঘকাল যাবৎ ক্লেশ প্রদান করে।

স্থাবর ও জঙ্গম উভয়প্রকার বিষ অত্যন্ত পুরাতন হইলে, কিম্বা দাবায়ি, বায়ু অথবা সূর্য্য কিরণে শোণিত বীৰ্য্যহীন হইলে, অথবা ভক্ষিত বিষ বিষয় ঔষধের প্রভাবে বীৰ্য্যহীন বা নিস্তেজ হইলে, বা শরীরে ঐ বিষের কিয়দংশ রহিয়া গেলে কিম্বা বিষ স্বভাবতঃই দশটি গুণের একটি, দুইটি বা তিনটি গুণ হীন হইলে তাহাকে দুবি বিষ কহে। দুবিবিষ অল্প বীৰ্য্য বলিয়া

জীবন নষ্ট না করিলেও, শ্লেষ্মাকে আশ্রয় করিয়া বহুকাল শরীরে অবস্থান করে, স্তত্রাং ঐ বিধে পীড়িত ব্যক্তির মলভেদ, শরীর বিবর্ণ, মুখ দুর্গন্ধযুক্ত, বিরস, এবং পিপাসা, মূচ্ছা, ভ্রম, বাক্যের জড়তা ও বমন হয় ।

উদরস্থ দুর্বিধি আমাশয়ে অবস্থান করিলে, রোগীর বাত ও শ্লেষ্মাজনিত বিবিধ রোগ জন্মে, পক্ষাণয়ে অবস্থান করিলে, বাত ও পিত্তজনিত রোগ উৎপন্ন হয়, পরন্তু রোগীর কেশ ও লোম পতিত হয় । দুর্বিধি শরীরে দীর্ঘকাল অবস্থান করিলে, রস রক্তাদি সপ্ত ধাতুকে আশ্রয় করে এবং যে ধাতুকে আশ্রয় করে, সেই ধাতুগত রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে ।

বন জঙ্গলে ভ্রম প্রাণীর পরিত্যক্ত বিষকে দুর্বিধি বা চলিত কথায় এড়াবিধ কহে । ইহা কোন অঙ্গে লাগিলে, সেই স্থান শীঘ্রই ফুলিয়া উঠে, পরন্তু ঐ স্থান কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা শ্ৰামবর্ণ অথচ দক্ষিণস্থানের ত্রায় দুই হইয়া থাকে, এবং ঐ স্থান পাকে ও রোগীর জ্বর হয় । হীনবীৰ্য্য না হইলে, এই বিষের প্রভাবও সামান্য নহে, এমন কি উহা হস্ত পদাদি অঙ্গে লাগিলে, সময় সময় ঐ সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছেদন করিয়া ফেলিতে হয়, নচেৎ ক্রমশঃ অগ্নাশ্ব নির্বিষ বা সুস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংক্রামিত হইয়া পচিতে আরম্ভ করে, এবং তজ্জন্ত রোগীর জীবন রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠে ।

স্বাভাব ও জঙ্গমভেদে বিষ সাধারণতঃ দ্বিবিধ, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । এই উভয়বিধ বিষের মধ্যে কতকগুলি স্বভাবতঃ অতিশয় উগ্র বলিয়া শীঘ্র প্রাণনাশক এবং কতগুলি স্বভাবতঃ হীনবীৰ্য্য বলিয়া প্রাণনাশক নহে, কিন্তু রোগোৎপাদক । বিষ সাধারণতঃ প্রাণনাশক বা এবন্ধি অপকারী হইলেও যথানিয়মে শোধন করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, আবার অমৃতের ত্রায় উপকারী বা অমৃতবৎ ফলপ্রদান করে । বিকারগ্রস্ত রোগীর যখন আর জীবনের কোন আশা থাকে না, মৃত্যু অনিবার্য্য, তখন বিষ-প্রয়োগেই তাহার জীবন রক্ষা হয় । এই জন্য আয়ুর্বেদীয় ঔষধের অধিকাংশে ত্রব্যই শোধন করিয়া প্রয়োগ করিতে হয় । অল্পই হউক বা অধিকই হউক, বিবাক্ত ত্রব্য শোধন করিয়া প্রয়োগ করিলে, তাহা বিষশূন্য হয়, এবং শীঘ্র রোগ বিনষ্ট করে । তামা, দারম্ভ বা সৈকো ও হরিতাল প্রভৃতি ষাটুবিষ, জয়মাল বীজ, আকিং ও ধূতুরাকলপ্রভৃতি কল ঘিৎ এবং সর্পবিষ অতি উগ্র ।

তজ্জন্য ঐ দ্রব্যগুলি উত্তমরূপে শোধন করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। উত্তমরূপে শোধন না করিয়া প্রয়োগ করিলে তন্মধ্যে বিষের প্রভাব বর্তমান থাকে ও প্রয়োগ করিলে বিষক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। তদ্ব্যতীত বিষ অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলেও বিষক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। কোন কোন বিকারগ্রস্ত রোগীর এই কারণে মস্তকের চুল এবং গাত্রের লোম উঠিয়া যায়।

স্বাবর বিষের সাধারণ চিকিৎসা। স্বাবর বিষ উদরস্থ হইলে, সর্বাঙ্গে বমনই প্রশস্ত, কারণ বমন দ্বারা পাকাশয়ের বিষ সহজে এবং শীঘ্র নির্গত হয় বলিয়া পরিপাক হইতে বা অনিষ্ট করিতে পারে না। বমনকারক ঔষধের মধ্যে তুতিয়া-চূর্ণ ই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তুতিয়া সর্ববিধ বিষ-নাশক, তদভাবে বিষবজ্রপাতরস বেশীমাত্রায় প্রয়োগ করিলেও চলে। কিন্তু তাহা উদরস্থ হইলে, স্বভাবতই প্রথমে বমন ও পরে ভেদ হয়, সুতরাং ঐ অবস্থায় তুতিয়া বা তীব্র বিরচন প্রয়োগ না করিয়া উষ্ণ জলে যথেষ্ট লবণ অথবা সরিষা-চূর্ণ মিশাইয়া আকর্ষ পান করাইবে। ইহাতেই বমন হইয়া বিষ নির্গত হয়। যাবৎ বাস্ত পদার্থে ভক্ষিত বিষ বা তাহার গন্ধ নির্গত হইবে, তাবৎ পুনঃ পুনঃ বমন করাইবে এবং বমন করাইতে করাইতে যখন কেবলমাত্র স্বচ্ছ জল নির্গত হইবে, তখন বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ করিবে। বমনের পর বিরচনের প্রয়োজন হইলে, ক্যাষ্টর অয়েল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অন্যান্য ধাতুবিষ অর্থাৎ শঙ্খবিষ শেঁকো ও হরিতাল উদরস্থ হইলে, মুখ হইতে ফেণা নির্গত, তালুপ্রদাহ ও মুচ্ছা হয়, ইহাতেও প্রথমে বমন, তৎপরে বিরচন প্রশস্ত। বমনের পর গরম দুগ্ধ, ভাতের মাড়ি কিম্বা বার্লি পথ্য দিবে। কার্বলিক গ্যাসিড বা সল্ফিউরিক গ্যাসিড উদরস্থ হইলে, তৎক্ষণাৎ বমন করাইবে, কিন্তু বিলম্ব হইলে গ্যাসিডের ক্রিয়া প্রকাশ পায়, অর্থাৎ গলনলী ও পাকাশয় প্রভৃতি দগ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং তখন বমন করান নিফল, ঐ অবস্থায় কিঞ্চিৎ গরম দুগ্ধ সহ বাদামের তৈল, জলপাইয়ের তৈল কিম্বা তদভাবে তিলতৈল, নারিকেলতৈল বা ক্যাষ্টর অয়েল, বা অণ্ড লাল অর্থাৎ ডিমের লাল প্রভৃতি সেবন করাইবে। ঐ অবস্থায় চুণের স্বচ্ছ জল ও সোডা অতি উপকারী। এই সকল ঔষধে শীঘ্র প্রদাহ প্রশমিত হয়। প্রদাহ নিবারণ অথবা বিরচনের জন্য ক্যাষ্টর অয়েল প্রয়োগ করা

বাইতে' পারে। অমৃত অর্থাৎ মিঠা বিষ উদরস্থ হইলেও এইরূপ চিকিৎসা করিবে। বিষের প্রভাবে মুচ্ছা হইলে, অবিলম্বে নস্য প্রয়োগ দ্বারা মুচ্ছা-ভঙ্গ করিবে এবং যাবৎ মুচ্ছাভঙ্গ না হয়, তাবৎ পিচকারীতে করিক্স ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যে কোন বিষ যে কোন প্রকারেই হউক উদরস্থ হইলে, মস্তকে ও সর্বাঙ্গে শীতল জলের ধারা দিবে, এবং বিষের প্রভাব অল্প লক্ষিত হইলে সৈন্ধবাদিচূর্ণ ও কুষ্ঠাদিচূর্ণ ঘৃত ও মধু সহ মর্দন করিয়া দুগ্ধ সহ পুনঃ পুনঃ সেবন করাইবে। কিন্তু বিষের প্রভাব অত্যধিক লক্ষিত হইলে, অবিলম্বে বিষবজ্রপাতয়স এবং ভীমরুদ্রয়স প্রয়োগ করা উচিত। স্থাবর বা জঙ্গম-বিষের মধ্যে শীঘ্র জীবন-নাশক বিষের প্রভাব বিনষ্ট করিতে ঐ দুইটি মহৌষধ।

এতদ্ব্যতীত স্থাবরবিষে পীড়িত ব্যক্তিকে জঙ্গম বিষ ষটিত ঔষধ এবং জঙ্গম বিবে পীড়িত ব্যক্তিকে স্থাবর বিষ ষটিত ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিষ বিনষ্ট হয়। কোন কোন মাদক দ্রব্য অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলেই মাদকতার সঙ্গে সঙ্গে বিষের ক্রিয়া প্রকাশ পায়; আফিং, ধূতুরা ও সুর প্রভৃতি এই শ্রেণীর।

সুরা, ধূতুরা ও অহিফেনের বিষ-ক্রিয়া। অধিক পরিমাণে আফিং ভক্ষণ করিলে, শীঘ্রই তাহার মাদক ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং অবিলম্বে নিদ্রাবেশ হয় ও সেই নিদ্রা সুস্থিতে পরিণত হয়, তখন রোগী অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে, মন্দ মন্দ শ্বাস বহিতে থাকে, পরন্তু শ্বাসের সহিত গলার মধ্যে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হইতে থাকে। এই অবস্থায় রোগীর মুখমণ্ডল মলিন, চক্ষু আরক্তিম এবং মুদিত, কনৌনিকা কুঞ্চিত, নাড়ী স্থূল অথচ কোমল-বোধ হয় এবং মৃদু বেগে স্পন্দিত হইতে থাকে। উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে রোগী চৈতন্য-লাভ করিলেও জাগরিত হইতে বা কথা কহিতে নিতান্তই অনিচ্ছা প্রকাশ করে। সুরাপানে অভিভূত ব্যক্তিও এই প্রকার অচেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তবে উভয়ের প্রভেদ এই, সুরাপায়ীকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে, অসঙ্গত উত্তর প্রদান করে, কিন্তু অহিফেনভোজী সত্ত্বর প্রদান করে। পরন্তু সুরাপায়ীর নিঃশ্বাসে, ঘর্ষে ও বাস্ত পদার্থে সুরার গন্ধ নির্গত হয়।

চিকিৎসা। আফিং সেবনে বিষের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, সর্বাঙ্গে বমন করাইবে, পরে ষ্ট্যাক পম্প প্রয়োগ করিয়া পাকস্থলী ধৌত করিবে।

এই দ্বিবিধ প্রক্রিয়া ব্যতীত কেবল বমন দ্বারা সমস্ত আফিং নির্গত হয় না, আবার কেবল ষ্টমাক পম্প দ্বারাও আফিংয়ের বৃহৎ খণ্ডসকল নির্গত হইতে পারে না। বমনের জন্ত তুতিয়াচূর্ণ উষ্ণ জল সহ সেবন করাইবে এবং যাবৎ বমনে অহিফেনের গন্ধ ও তিক্তাশ্বাদবিহীন অথচ স্বচ্ছ জল নির্গত না হয়, তাবৎ অধিক লবণ সংযুক্ত উষ্ণ জল বার বার সেবন করাইবে। মস্তকে যথেষ্ট পরিমাণে শীতল জলের দ্বারা দিবে এবং কোনমতেই নিদ্রা যাইতে দিবে না। দুই জনে দুই হাত ধরিয়া অনবরত ভ্রমণ করাইবে। মদ্যপায়ী ব্যক্তিকে লবণ মিশ্রিত উষ্ণ জল আকর্ষণ পান করাইয়া বমন করাইবে। অনন্তর কিঞ্চিৎ স্নাত, চিনির সহিত সেবন করিতে দিবে। ধূতুরা সেবীকে লবণ সংযুক্ত জল আকর্ষণ পান করাইয়া বমন করাইবে, পরে চিনি মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিতে দিবে।

কুচিলার বিষ-ক্রিয়া। কুচিলা অধিক মাত্রায় সেবন করিলে শীঘ্রই শরীর বিবাক্ত হইয়া ধনুষ্টিকারের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন পা হইতে মস্তকের সমস্ত পেশী দ্রুতবেগে আকৃষ্ট হইতে হইতে কঠিন হইয়া উঠে, ঐবিদেশের পেশীর আক্ষেপ বশতঃ মস্তক পশ্চাৎ দিকে বক্র হইয়া যায়, চোয়াল একপভাবে সংলগ্ন ও বদ্ধ হয় যে কোন মতেই মুখ ধোলা যায় না। এ অবস্থায়, বলপূর্বক মুখ খুলিবার চেষ্টা করিলে, দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু তথাপি কার্য্যসিদ্ধি হয় না, পরন্তু মুখমণ্ডলের পেশী সমূহের আক্ষেপবশতঃ মুখমণ্ডল বিকৃত হয় এবং করতল দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ ও পৃষ্ঠদেশস্থ পেশীর আক্ষেপবশতঃ সমুদ্রীয় শরীর ধনুকের জায় পশ্চাৎ দিকে বক্র হইয়া যায়।

চিকিৎসা। ইহাতেও পাকাশয় ধোত করা প্রয়োজন, অতএব তুতিয়াচূর্ণ উষ্ণ জল সহ প্রয়োগ করিয়া বমন করাইবে এবং যাবৎ তিক্ততা বিহীন স্বচ্ছ জল নির্গত না হইবে, তাবৎ অধিক লবণ সংযুক্ত উষ্ণ জল পুনঃ পুনঃ পান করাইবে।

জঙ্গমবিষ-চিকিৎসা। সর্পে হস্তে বা পদে দংশন করিলে, দষ্টস্থানের চারি অঙ্গুলি উর্দ্ধে রক্ত দ্বারা জোরে বন্ধন করিবে, ইহাতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয় বলিয়া বিষ সমগ্র শরীরে পরিব্যাপ্ত হইতে পারে না। অতঃপর দুষ্টস্থান

অঙ্গদ্বারা চিরিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। অপরাজিতার মূল বাটিয়া ঘৃত ও মধু সহ মর্দন করিয়া দুগ্ধ অম্বুপানে সেবন করাইবে। সৈন্ধবাদি চূর্ণ এবং কুষ্ঠাদিচূর্ণ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু বিষের অত্যধিক প্রভাব দৃষ্ট হইলে, বিষ-বজ্রপাতরস ও ভীমরুদ্ররস অবশ্যই প্রয়োগ করিবে।

কুকুরবিষ । কুকুরে কামড়াইলে শিরীষবীজ মনসাসীজের দ্বীপে বসিয়া দণ্ডস্থানে তৎক্ষণাৎ প্রলেপ দিবে এবং ধূতুরা পাতার রস, ঘৃত, গুড় ও দুগ্ধ ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা একত্র করিয়া অথবা ধূতুরা মূল চারি আনা বাটিয়া দুগ্ধসহ পান করাইবে। এই নিয়মে ১০। ১৫ দিন ঔষধ সেবন করান কণ্ডব্য।

বৃশ্চিকবিষ । বৃশ্চিক বা বিছা দংশন করিলে, উষ্ণ ঘৃত ও সৈন্ধব একত্র করিয়া দণ্ডস্থানে মালিশ করিবে, কিম্বা জীরা বাটিয়া ঘৃত ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে।

মক্ষিকাবিষ । ঘোমাছি কিম্বা ভীমরুল ও বোলতা প্রভৃতি দংশন করিলে, দণ্ডস্থানে মধু বা ঘৃত ও সৈন্ধব মালিশ করিবে।

মূষিকবিষ । ইন্দুরে কামড়াইলে, ঝুল, মঞ্জিষ্ঠা, হলুদ ও সৈন্ধব সমান ভাগে জলদ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

দূষিবিষ-চিকিৎসা । দূষি অর্থাৎ এড়া-বিষ কোন অঙ্গে লাগিলে ঐ স্থানের তৎ চুলকাইতে চুলকাইতে লালবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে, এই অবস্থায় শিরীষগাছের মূল, ছাল, পাতা, ফুল ও ফল ইহাদের মধ্যে ২০। ৩ বা ৪। ৫ টি যাহা পাওয়া যায়, সমান ভাগে লইয়া জলদ্বারা বাটিয়া অবিলম্বে এক আঙ্গুল পুরু করিয়া প্রলেপ দিবে।

বিষে—ঔষধ ।

সৈন্ধবাদি চূর্ণ । স্থাবর বা জলম যে কোন বিষে পীড়িত হইলে এবং বিষের প্রভাব অল্প লক্ষিত হইলে, বমন ও বিরেচনের পর এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অম্বুপান—ঘৃত ও মধু।

সৈন্ধবাদি চূর্ণ। সৈন্ধব লবণ, মরিচ ও নিমবীজ চূর্ণ প্রত্যেকে সমান ভাগ একত্র করিবে। মাত্রা—দুই আনা।

কুষ্ঠাদি চূর্ণ। স্থাবর বা জঙ্গম বিষ দ্বারা পীড়িত হইলে এবং বিষের প্রভাব অল্প লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

কুষ্ঠাদি চূর্ণ। হুড় ও তগরপাটকার চূর্ণ সমভাগে একত্র করিবে। মাত্রা—দুই আনা।

বিষ বজ্রপাত রস। স্থাবর বা জঙ্গম বিষের অত্যধিক প্রভাব দৃষ্ট হইলে, সৈন্ধবাদি চূর্ণ ও কুষ্ঠাদি চূর্ণের পরিবর্তে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—জল।

বিষবজ্রপাত রস। হরিদ্রা, সোহাগার ঝৈ, জয়িত্রী ও শোধিত ভুতে প্রত্যেকে সম-ভাগ, ঘোষালতার রসে মর্দন। বটী দুই আনা।

ভীমরুদ্র রস। স্থাবর বা জঙ্গম বিষের প্রবল প্রভাব দৃষ্ট হইলে, সৈন্ধবাদি চূর্ণ ও কুষ্ঠাদি চূর্ণের পরিবর্তে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—শীতল জল।

ভীমরুদ্র রস। শোধিত মনঃশিলা, হরিতাল, মরিচ, দারুমূল, হিঙ্গুল, আপাং মূল, ধূতুরা মূল, করবী মূল ও শিরিষ বৃক্ষের মূল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ। রুদ্রাক্ষের কাথ ও অপরাজিতার মূলের কাথে সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ৩ রতি।

বিষে—পথ্যাপথ্য।

বিষার্ণ ব্যক্তিকে পলতা প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্য, খুলকুড়ী শাক, নটেশাক, স্নগুণীশাক, পুইশাক, পুরাতন চাউলের অন্ন, ঘোল ও ঘূতে স্নাতনান ঘটরের ডাইল প্রভৃতি পথ্য দিবে। হুঙ্ক, ঘৃত ও মাখন প্রভৃতি স্নিগ্ধদ্রব্য বিষার্ণ ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।

রসায়ন

রসায়ন ঔষধসমূহ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, কতকগুলি ঔষধ কেবলমাত্র ব্যাধি বিনাশের জন্যই প্রয়োগ করা যায়, এবং কতকগুলি সুস্থাবস্থায় সেবনের ব্যবস্থা করা হয় । সুস্থাবস্থায় ঔষধ আবার দুইভাগে বিভক্ত, রসায়ন ও বাজীকরণ । সুস্থাবস্থায় যে সকল ঔষধ সেবনে জরা অর্থাৎ অকাল-বার্দ্ধক্য উপনীত হইতে পারে না, অথচ রস রক্তাদি সঞ্চারিত পুষ্টি ও পরমায়ু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহারা রসায়ন নামে অভিহিত ; আর সুস্থাবস্থায় যে সকল ঔষধ সেবন করিলে রতিক্রিয়ায় পুরুষের অধের জায় সামর্থ্য জন্মে, তাহারা বাজীকরণ নামে খ্যাত । রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধ সমূহের রোগ বিনাশের শক্তি অপেক্ষা জরা বিনাশের ও রতিক্রিয়ায় সামর্থ্য জন্মাইবার শক্তি অসাধারণ । রসায়ন সেবনে মানবের পরমায়ু, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বল, শ্রুতি ও মেধা বৃদ্ধি এবং আরোগ্য, যৌবন ও কান্তি লাভ হইতে পারে ।

যৌবনের প্রারম্ভে বা যৌবনের শেষে রসায়ন প্রয়োগ করা উচিত । যুবক বা প্রৌঢ় ব্যতীত বালক ও বৃদ্ধকে রসায়ন প্রয়োগ করিবে না, কারণ বালকেরা রসায়ন ঔষধের প্রভাব সহ্য করিতে অসমর্থ এবং বৃদ্ধেরা স্বভাবতই জরাগ্রস্ত, এমতাবস্থায় যাহারা ঔষধের প্রভাবই সহ্য করিতে পারে না, তাহাদিগকে প্রয়োগ করাই কর্তব্য নহে, আর যাহারা স্বভাবতই জরাগ্রস্ত, তাহাদিগেরও রসায়নের প্রভাবে বার্দ্ধক্য মোচন হওয়া সম্ভবপর নহে, তবে চ্যবন-প্রাশ প্রভৃতি ঔষধ রোগ বিনাশ ও বলবৃদ্ধির জন্য শিশু ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকেও প্রয়োগ করা যায় ।

রসায়ন সেবন না করার দোষ । যৌবনে বা যৌবনের শেষে রসায়ন সেবন না করিলে, শীঘ্র দেহ ও ইন্দ্রিয় দুর্বল, আয়ুঃক্ষয় এবং কান্তি, মেধা ও শ্রুতি হ্রাস হয় ও তৎসঙ্গে অকালে জরা আসিয়া দেহ জীর্ণ করিয়া ফেলে ।

রসায়ন প্রয়োগের পূর্বে বমন ও বিরেচন দ্বারা দেহ বিশুদ্ধ করিয়া লইবে, কারণ মলিন বস্ত্রে রং দিলে যেমন সেই বস্ত্র সূর্যজিত হয় না, তদ্রূপ মলিন দেহে রসায়ন প্রয়োগ করিলেও, তাহা শরীরের উপর বর্ধোচিত ক্রিয়া করে না ।

যে সকল দ্রব্য মধুর রস বিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, আয়ুষ্কর, পুষ্টিজনক, গুরুপাক ও ঐতিহিকর, সেই সকল দ্রব্যই রসায়নগুণবিশিষ্ট। ভূমিকুয়াণ্ড, শতমূলী, ভৃঙ্গরাজ, গুলঞ্চ, তালমূলী, যষ্টিমধু, কেতুযো, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, খুলকুড়ী শাক, কুম্ভতিল, বুদ্ধদারকবীজ, হস্তিকর্ণপলাশ বৃক্ষের মূলের ছাল, বিস্তৃক স্বর্ণভস্ম, লৌহভস্ম ও অন্নভস্ম বা তৎসংযুক্ত ঔষধ, আহাৰ্য্য দ্রব্যের মধ্যে দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, চিনি ও অন্যান্য মিষ্টদ্রব্য মাত্রেই রসায়ন। দুগ্ধ এবং তজ্জাত দ্রব্যসকল অর্থাৎ ঘৃত, মাখন, ক্ষীর, সর, ননী ও ছানা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট রসায়ন। এই সকল দ্রব্য আহাৰ্য্য করিলে, অকালে জরা উপনীত হয় না।

ঔষধ ।

রসায়নের জন্য নানাবিধ মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করা যায়। প্রত্যাহ হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদের কোন একটি বা দুই তিনটি একত্র করিয়া ভক্ষণ করিলে মহোপকার সাধিত হয়। তিনটি সেবন করিতে হইলে, মধ্যাহ্নে আহাৰ্য্যের পূর্বে বহেড়াচূর্ণ, আহাৰ্য্যান্তে আমলকীচূর্ণ ও আহাৰ্য্য পরিপাক হইলে, হরীতকীচূর্ণ সেবন করিবে। ভীমরাজের রস বা চূর্ণ, খুলকুড়ীর রস, যষ্টিমধু চূর্ণ, গুলঞ্চের রস ও শঙ্খপুষ্পী চূর্ণ এই সকল দ্রব্যের কোনও একটি দুগ্ধ বা ঘৃতসহ সেবন করিলে, মেধা, বল, বর্ধ ও কাস্তি বৃদ্ধি পায়। অখগন্ধা উৎকৃষ্ট রসায়ন, উহার চূর্ণ বায়ুপ্রধান শরীরে কিঞ্চিৎ তিল তৈল সহ, পিত্তপ্রধান শরীরে দুগ্ধ সহ, বাতপিত্তপ্রধান শরীরে ঘৃতসহ ও শ্লেষ্মপ্রধান বা বাতশ্লেষ্মপ্রধান শরীরে উষ্ণজল সহ সেবন করিলে, পরমায়ু বৃদ্ধি পায় ও শরীর হৃষ্ট পুষ্টি হয়। অখগন্ধার ন্যায় পুষ্টিকারক ঔষধ বিরল। ভৃঙ্গরাজ চূর্ণ এক ভাগ, তিল অর্দ্ধভাগ ও আমলকী চূর্ণ অর্দ্ধভাগ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শীঘ্র জরা উপনীত হইতে পারে না, পরন্তু কেশ কুম্ভবর্ণ, ইন্দ্রিয়-সকল নির্মল ও দেহ নীরোগ হয়। বুদ্ধদারকের মূল চূর্ণ করিয়া শতমূলীর রসে ৭ দিন ভাবনা দিয়া চারি আনা বা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং অকালে বার্দ্ধক্য উপনীত হইতে পারে না। হস্তিকর্ণ পলাশ বৃক্ষের মূল-চূর্ণ ঘৃত বা মধুসহ ভক্ষণ করিলে, মেধা, পরমায়ু ও রতিশক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

উষাপান । প্রত্যহ সূর্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে কেবল জল মুখ বা নাসিকা দ্বারা পানের অভ্যাস করিলে, কাস, শ্বরভ্রম, নাসাস্রাব এবং বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মজনিত নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়, অধিকন্তু পরমায়ু এবং দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে । ধারোক্ষ দুগ্ধ প্রত্যহ উষাকালে মুখদ্বারা পান করিলেও ঐরূপ ফললাভ হয় । উষাকালে ঐরূপ দুগ্ধ বা জল-পান বাত বা পিত্ত অথবা বাতপিত্তপ্রধান শরীরেই সহ্য হয়, শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে সহ্য হয় না । শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে পান করিলে, সর্দি, কাস এবং জ্বর ও পেটের পীড়া প্রভৃতি পীড়া হইতে পারে ।

ঋতুহরীতকী । হরীতকীর চূর্ণ প্রত্যেক ঋতুতে পৃথক পৃথক অমুপানে সেবন করার নাম ঋতু হরীতকী বা হরীতকীরসায়ন । মাত্রা—দুই আনা হইতে অর্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত । বর্ষাকালে কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ সহ, শরৎ ও গ্রীষ্মকালে শীতল জলসহ এবং হেমন্ত, শীত ও বসন্তকালে গরম জল অমুপানে সেব্য । ঋতুহরীতকী বাতশ্লেষ্মাধিক বা শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ধমান সমধিক ফলপ্রদ । বাতিক ও পৈত্তিক ধাতুতে বা কৃশ শরীরে উহা সেবনে বিশেষ ফললাভ হয় না ।

ধাত্রী-রসায়ন । আমলকী চূর্ণ কাঁচা আমলকীর অরসে একশ বার ভাবনা দিয়া উৎকৃষ্ট মধু ও স্নাত প্রত্যেকে আমলকী চূর্ণের সমান এবং ইক্ষুচিনি আমলকী চূর্ণের চারি ভাগের এক ভাগ ও শিপুল চূর্ণ আমলকী চূর্ণের আট ভাগের এক ভাগ তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া বর্ষার প্রারম্ভে ধাত্রীরাশির মধ্যে স্থাপন করিবে ও বর্ষান্তে উদ্ধৃত করিয়া ভক্ষণ করিবে । ইহা সেবনে নানাপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হয়, জরা উপনীত হইতে পারে না এবং রূপ, বর্ণ, কান্তি, বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি সম্বন্ধিত হইয়া থাকে ।

গুড়চ্যাদি চূর্ণ । গুলঞ্চ, আপাং, বিড়ঙ্গ, শযপুন্দ্রী, বচ, হরীতকী, কুড় ও শতবুলী ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া বধামাত্রায় ভক্ষণ করিলে মেধা বৃদ্ধি হয় ।

শাস্ত্রী রসায়ন । কচি শিমুল গাছের মূল চূর্ণ করিবে, অনন্তর উক্ত শিমুল মূলের রস নামা চূর্ণের বিগুণ ইক্ষুচিনি গুলিয়া পাক করিবে এবং পাড় হইলে নামাইয়া মোদকের স্তায় প্রস্তুত করিবে । ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন । পোহুসহ প্রত্যহ সেব্য । মাত্রা অর্দ্ধতোলা ।

এতদ্ব্যতীত রসায়নের অল্প নানা প্রকার বটিকা, মোদক ও স্নাত প্রয়োগ করা যায় । যদি সবল থাকিলে, স্নাত প্রয়োগে অতি শীঘ্র সমধিক ফললাভ

হয়, কিন্তু পেটের পীড়া বর্তমানে যত সহ্য হয় না, ঐ অবস্থায় অধিবর্জক রসায়ন অর্থাৎ সিদ্ধি সংযুক্ত মোদক এবং ধাতুঘটিত নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। আর চিকিৎসোক্ত ত্রৈলোক্য চিন্তামণি, মহা লক্ষ্মীবিলাস ও মকরধ্বজ, বাটিকা, আমবাতোক্ত মকরধ্বজ রস ও অমৃতপ্রাশ যত, যক্ষ্মা রোগোক্ত বৃহৎ অখণ্ডা যত, বৃহৎ বসন্ততিলক, বৃহৎ মকরধ্বজ, ও বসন্ত-কুম্ভাকর রস, কাস রোগোক্ত চ্যবনপ্রাশ ও বসন্ততিলক, গ্রহণীরোগোক্ত বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস, জ্বরকাদি মোদক, শ্রীকামেশ্বরমোদক, শ্রীমদনানন্দ মোদক, বাতব্যাধি রোগোক্ত বৃহৎ নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস, নারদীয় মহা লক্ষ্মীবিলাস ও বৃহৎ ছাগলাদ্যায়ত প্রভৃতি ঔষধ শ্রেষ্ঠ রসায়ন। এই সকল ঔষধের মধ্যে সিদ্ধিসংযুক্ত মোদকে বাজীকরণ গুণ অত্যধিক বিদ্যমান।

বাজীকরণ ।

যে ঔষধের প্রভাবে পুরুষ রতিক্রমে অথবা গ্রাম শক্তিশালী হয়, তাহাই বাজীকরণ নামে অভিহিত।

যে ব্যক্তি বাজীকর ঔষধ সেবন করে না অথচ অধিক গুরুত্ব করে, তাহার রানি, কম্প, অবসাদ, ক্রুশতা, ইন্দ্রিয়-দৌর্বল্য, শোথ, শ্বাস, জ্বর, অর্শ, সর্ব ধাতুর ক্ষীণতা এবং বাতজ রোগসকল জন্মে, এমন কি ধ্বজভঙ্গও হইতে পারে। সুতরাং বাজীকর ঔষধ সেবন করা উচিত, কারণ নানা প্রকার চিন্তা, ব্যগ্রি, অমজনককর্ম, উপবাস ও স্ত্রী সহবাস প্রভৃতি কারণে গুরু দৈনন্দিন জ্বর হইয়া থাকে। সুতরাং বাজীকর ঔষধ সেবন করিলে গুরুত্ব-জন্ম ঐ সকল রোগ উপস্থিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ বিলাসী, ধনবান, রূপবান, যুবক, বহুস্ত্রীর পতি, বৃদ্ধ অথচ রতিক্রিয়াভিলাষী এবং স্ত্রীদিগের প্রিয় হইতে ইচ্ছুক ও অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাসে দুর্বল, ক্ষীণত্ব এবং ক্লীব এই সকল ব্যক্তির পক্ষে বাজীকর ঔষধ অবশ্য সেব্য। যৌল বৎসরের ন্যূন এবং সন্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে বাজীকর ঔষধ সেবন কর্তব্য নহে। ষিষ্ট, ষিদ্ধ, পুষ্টিকর, জীবনী-শক্তিবর্ধক ও প্রীতিকর, এই সমস্ত দ্রব্যই বাজীকরণ গুণবিশিষ্ট।

গ্রহণীযোগেজ্ঞ জীরকাদি মোদক, কামেশ্বর মোদক ও শ্রীকামেশ্বর-মোদক শ্রেষ্ঠ বাজীকরণ। এতদ্ব্যতীত বাজীকরণের জন্ত নানা প্রকার বটিকা, স্নাত ও মোদক প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায়। পেটের পীড়া বর্জ্যমানে বা স্নাত সহ না হইলে, বটিকা ও মোদকাদি প্রয়োজ্য।

ঔষধ ।

মকরধ্বজ রস । প্রমেহ সংযুক্ত অগ্নিমান্দ্য ও ধাতুদৌর্বল্য, লিঙ্গ-শৈথিল্য এবং ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতিতে এই ঔষধ মহোপকারী। পরন্তু ইহা রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অমুপান—পানের রস ও মধু বা স্নাত ও মধু।

মকরধ্বজ রস । স্বর্ণ ভস্ম ২ তোলা এবং বঙ্গ, মুক্তা, কান্তলোহ, জয়িত্রী, জায়ফল, ক্রুপা, কঁসা, রসসিন্দূর, প্রবাল, কন্তুরী, কপূর ও অভ্র ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা ও স্বর্ণসিন্দূর ৪ তোলা। পানের রসে মর্দন। বটা ২ রতি।

স্বল্প চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ । মকরধ্বজ যে অবস্থায় প্রয়োজ্য, ইহাও সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। ইহা সর্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ। অমুপান—পানের রস ও মধু বা পেটের পীড়া না থাকিলে মাখন ও মিশ্রীচূর্ণ।

স্বল্প চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ : জাতীফল, জয়িত্রী, কপূর ও মরিচ প্রত্যেকে ১ তোলা এবং স্বর্ণভস্ম ও কন্তুরী প্রত্যেকে দুই আনা ও স্বর্ণসিন্দূর ৪০ তোলা। পানের রসে মর্দন। বটা ৪ রতি।

বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ । ইহা সাধারণ ব্যবহার্য্য ঔষধ। স্বল্প চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনবীৰ্য্য। মকরধ্বজ যে অবস্থায় প্রয়োজ্য, ইহাও সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। অমুপান—পানের রস ও মধু বা মাখন ও মিশ্রী চূর্ণ।

বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ । বিগুড় স্বর্ণপত্র ১ তোলা, পারদ ৮ তোলা ও গন্ধক ১৬ তোলা, এই সকল জব্য দ্বারা স্বর্ণসিন্দূর পাক করিবে। উক্ত স্বর্ণসিন্দূর ৮ তোলা, কপূর ৮ তোলা, জায়ফল ৮ তোলা, জয়িত্রী ৮ তোলা, লবঙ্গ ৮ তোলা এবং কন্তুরী অর্দ্ধ তোলা একত্র পানের রসে মর্দন করিবে। বটা ২ রতি।

মন্মথান্নরস । ইহাও সাধারণ ব্যবহার্য্য ঔষধ। ধাতুদৌর্বল্য, লিঙ্গ-

শৈথিল্য ও ধ্বংসপ্রভৃতি রোগে প্রয়োজ্য । সহপান—মধু ও অম্লপান—উষ্ণ দুগ্ধ ।

মধুখণ্ড রস । পারদ, গন্ধক ও অত্র প্রত্যেকে ৪ তোলা, কপূর অর্দ্ধ তোলা, বঙ্গ ১ তোলা, ত্র্যম্বক অর্দ্ধ তোলা, লৌহ ২ তোলা এবং বিস্তারক বীজ, জীরা, ভূমিকুয়াণ্ড, শত-মূলী, কুলেখাড়ার বীজ, খেতবেড়োলা, আলকুশীর বীজ, আঁঠেব, জয়ন্তী, জায়ফল, লবঙ্গ, সিদ্ধি-বীজ, খেতপুনা ও খমানী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধতোলা । জলে মর্দন । বটা ২ রতি ।

নারসিংহ চূর্ণ । ইহা শ্রেষ্ঠরসায়ন ও বাজীকর । অম্লপান—উষ্ণ দুগ্ধ ।

নারসিংহচূর্ণ । শতমূলীর চূর্ণ দুইসের, গোক্ষুরচূর্ণ দুই সের, বারাহী কন্দ (তদভাবে চামার আলু) আড়াই সের, গুলঞ্চ চূর্ণ তিন সের অর্দ্ধ গোয়া, রক্তচন্দনচূর্ণ চারি সের, চিতা-মূলচূর্ণ সোয়াসের, কৃষ্ণ তিলের তণ্ডুল বাটা দুই সের, শুঠ, পিপুল ও মরিচ চূর্ণ সমভাগে মিলিত এক সের, চিনি গোনে নয় সের, উৎকৃষ্ট মধু চারি সের দেড় গোয়া, ঘৃত দুই সের তিন ছটাক ও ভূমিকুয়াণ্ড চূর্ণ দুই সের । এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পুতাস্ত্র পাত্রে এক মাস বন্ধ করিয়া রাখিবে । মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা হইতে ১ তোলা ।

গোক্ষুরাদ্য চূর্ণ । এই চূর্ণ অত্যন্ত রতিশক্তিবর্ধক । সন্ধ্যাকালে সেব্য সহপান—মধু ও অম্লপান—গরম দুগ্ধ ।

গোক্ষুরাদ্য চূর্ণ । গোক্ষুর, কুলেখাড়া-বীজ, শতমূলী, আলকুশী-বীজ, গোরক্ষ চাকুলে ও খেত বেড়োলায় মূল ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে । মাত্রা—দুই আনা হইতে চারি আনা বা অর্দ্ধ তোলা ।

রতিবল্লভ মোদক । বাজীকরণ ঔষধের মধ্যে ইহা সদ্যঃ ফলপ্রদ অথচ অতি শ্রেষ্ঠ । যাহাদের প্রবল কোন রোগ বা রক্ত-দোষ বিদ্যমান নাই, অথচ শরীর দুর্বল, লিঙ্গ শিথিল, ক্ষুধামান্দ্য বা পাতলা দান্ত বর্তমান, তাহাদের পক্ষে ইহা অতি উপকারী । ফিরঙ্গ প্রভৃতি কারণে রক্তদোষ বিদ্যামানে ইহা প্রয়োজ্য নহে । অম্লপান—উষ্ণ দুগ্ধ ।

রতিবল্লভ মোদক । প্রথমতঃ লৌহ বা বৃত্তিকা নির্মিত পাত্রে করিয়া মূহ অগ্নির উত্তাপে ৩২ তোলা গব্য ঘৃত চড়াইবে, পরে ঘৃত নিষ্কেন হইলে, উন্নধ্যে সিদ্ধি বীজ চূর্ণ ৪০ তোলা নিঃক্ষেপ ও অল্প সন্তলন করিবে । অনন্তর শতমূলীর রস চারি সের, কাঁচা সিদ্ধির রস বা শুষ্ক সিদ্ধির কাথ চারি সের, গোহুঙ্ক চারি সের ও ছাগহুঙ্ক চারি সের একত্র করিয়া তাহাতে ইক্ষু-চিনি চারি সের গুলিয়া স্পাতল্লা কাপড় দ্বারা ছাকিয়া উক্ত কটাহে নিঃক্ষেপ করিয়া পাক

করিবে । এইরূপে পাক করিতে করিতে কিঞ্চিৎ গাঢ় হইয়া আসিলে, আমলকী, জীরা, কৃষ্ণ-জীরা, দারুচিনি, ছোট এলাচি, তেজপাতা, নাগেশ্বর, আলকুশী-বীজ, গোরক্ষচাকুলে, তালানুসর, কেশুর, পানিকল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ধনে, অভ্র, বঙ্গ, হরীতকী, কিসুম্বি, কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী, পিণ্ডী খেজুর, কুলেখাড়া-বীজ, কটকী, যষ্টিমধু, কুড়, লবঙ্গ, সৈন্ধব, ধম্বানী, বন-যমানী, জীবন্তী ও গজ পিপুল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া ঠেঁস্তময়ণে মাড়িবে । পাক শেষে কিঞ্চিৎ কন্তুরী ও মধু মিশ্রিত করিয়া স্তুতাক্ত পাত্রে রাখিবে । ঝাড়া—অর্দ্ধ তোলা হইতে এক তোলা ।

কামাগ্নি সন্দীপন মোদক । ইহার প্রয়োগবিধি রতিবল্লভের
গ্রন্থ । বিশেষতঃ ইহা অধিক কাম ও অগ্নিদীপক । অমুপান—দুগ্ধ ।

কামাগ্নি সন্দীপন মোদক । পারদ, পঙ্কজ, অভ্র, যবক্ষার, সাতিকার, চিতামূল, পঞ্চ লবণ, শঠী, যমানী, বনযমানী, বিড়ঙ্গ ও ভালীশপত্র ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, জীরা, দারু-চিনি, তেজপত্র, ছোট এলাচি, নাগেশ্বর, লবঙ্গ ও জাতীফল ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা, বিস্তারক বীজ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬তোলা, ধনে, যষ্টিমধু, মৌরী ও কেশুর ইহাদের প্রত্যেকের ৮তোলা এবং শতমূলী, ভূমিকুয়াণ্ড, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হস্তিকর্ণপলাশ বৃক্ষের মূলের ছাল, গোরক্ষচাকুলে, আলকুশীবীজ ও গোক্ষুর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১০ তোলা । সমস্ত চূর্ণের সমান সবীজ সিদ্ধি চূর্ণ ও সিদ্ধি চূর্ণসহ সমস্ত চূর্ণের সমান চিনি । চিনি জলে বা দুগ্ধে গুলিয়া পাতলা কাপড় দ্বারা ছাকিয়া আলে চড়াইবে এবং লেহবৎ ঘনীভূত হইয়া আসিলে, সমস্ত চূর্ণ উহাতে মিশাইয়া মোদক বান্ধিবে, অথবা অগ্রে চিনির সমান স্তুত চড়াইয়া তাহাতে সিদ্ধি চূর্ণ জ্ববৎ সন্তলন করিয়া চিনিগোলা কল বা দুগ্ধ নিঃক্ষেপ করিবে এবং গাঢ় হইয়া আসিলে অগ্ন্যাক্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিবে ।

মহা কামেশ্বর মোদক । ইহার প্রয়োগপ্রণালী রতিবল্লভ মোদ-কের গ্রন্থ । সন্ধ্যাকালে সেব্য । অমুপান—উষ্ণ দুগ্ধ ।

মহাকামেশ্বর মোদক । অভ্র ১ তোলা, লৌহ অর্দ্ধ তোলা, বঙ্গ চারি আনা এবং জয়িত্রী, জায়কল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মৃধা, দারুচিনি, ছোটএলাচি, তেজপত্র, নাগেশ্বর, সৈন্ধব লবণ, ভীষ্মরাজ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, গুঁঠোলা, জটামাংসী, শতমূলী, কুড়, বংশলোচন, কিসুম্বিবাটা, লবঙ্গ, বহেড়া ; গোরক্ষচাকুলে, চই, দেবদারু, যমানী, গুলকা, আলকুশীবীজ, বেলশুঁঠ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, তালানুসর, সোহাগার বৈ, শালপাণী, গোক্ষুর, চিতামূল, কন্দুরখোচী, মুরামাংগী, পুনর্ব্বা, অধগন্ধামূল, মোচরস, গজ-পিপুল, কটকল, তাল বৃক্ষের মাতি, যষ্টিমধু, মৌরী, ভালীশপত্র, অনন্তমূল, প্রিয়লু, বালা, বিস্তারকবীজ, শিমুলমূল, শিওপেজুর, ভূইকুমড়া, চাকুলে, গুণ্ডাকর্ষ, কুলেখাড়াবীজ, মেথী,

পরুষকল, রক্তচন্দন, মরিচ, কৃষ্ণতিলের তড়ুলবাটা, কাকড়াশূলী, সরলকাঠ, কপূর ও গুঁঠ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, সমস্ত চূর্ণের অর্ধেক সৰীষ সিদ্ধিচূর্ণ এবং সিদ্ধিচূর্ণ সহ সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি। প্রথমে চিনি জলে গুলিয়া পাক করিবে, পরে চিনি পাক হইলে, উহাতে চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে এবং উক্তরূপে মিশাইয়া ঘৃত মধু সহযোগে মোদক প্রস্তুত করিয়া ঘৃতাক্ত পাত্রে রাখিবে।

বৃহৎ শতাবরীমোদক । ইহার প্রয়োগবিধি রতিবল্লভের জ্ঞায়।

অল্পপান—দুগ্ধ ও চিনি।

বৃহৎ শতাবরীমোদক । শতমূলী, গোক্ষুর, বেড়োলা, গোরক্ষচাকুলে, আলকুশী বীজ, কুলবাড়া বীজ ও ভূমিকুমাণ্ড ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, সৰীষ সিদ্ধিচূর্ণ সাড়েতিন-সের, মাছিব ছন্ধ দুইসের তিন ছটাক, শতমূলীর রস দুইসের তিন ছটাক, ভূমি কুমাণ্ডের রস চারিসের ও ইক্ষুচিনি পঁচিশসের। প্রথমে দুগ্ধ, শতমূলীর রস ও ভূমি কুমাণ্ডের রসে চিনি গুলিয়া কাপড়ে ছাকিয়া জালে চড়াইবে পরে উক্ত চূর্ণগুলি প্রক্ষেপ দিবে, অনন্তর পাড় হইয়া আসিলে, উহার মধ্যে গুঁঠ, পিপুল, হরীতকী বহেড়া দন্তীমূল, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট এলাচি, সৈন্ধব, শটী, ধনে, বালা, মুখা, কন্তুরী, জাম্বাবাটা, বংশলোচন, জয়িত্রী, জায়ফল, জটাশাংসী, তেজপত্র, গেঠোলা, শুল্ফা, চই, দারুহরিজা, প্রিয়ঙ্গু, লবঙ্গ, সরলকাঠ, শৈলজ, কুড়, জাতীকল, যমানী, কটকল, নাগেশ্বর, মেথী, ষষ্টিমধু, দেবদারু, মোরী, তালীশ-পত্র, শিঙীবেজুর, পারদ, পদ্মক, রক্তচন্দন, তগরশাহুকা ও যবকার ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া ঘৃত মধু সহযোগে মোদক বান্ধিবে।

বীৰ্য্যস্তুভ ।

রসায়ন ও বাজীকরণের জ্ঞায় বীৰ্য্যস্তুভকর ঔষধও সুস্থাবস্থায় সেবন করা যায়। রসায়ন সেবনে জরা বিনষ্ট ও শরীর পুষ্ট হয়, বাজীকরণ সেবনে রতিকর্মে অধের জগ্নি সামর্থ্য জন্মে এবং বীৰ্য্যস্তুভকর ঔষধ সেবনে শুক্র শীঘ্র স্থলন হয় না। বীৰ্য্যস্তুভের লক্ষ চটকাণ্ডযোগ, অহিফেণ যোগ, নাগবল্লাদি-চূর্ণ, শুক্রবল্লভ রস ও কামিনী বিদ্রাবণ রস প্রভৃতি ঔষধগুলি অত্যন্ত ফলপ্রসূ। বীৰ্য্যস্তুভকর অহিফেণ সংযুক্ত ঔষধ স্বপ্নদোষে উপকারী।

চটকাণ্ডযোগ। চড়ুই গুাবীর ডিম কতকগুলি সংগ্রহ করিবে এবং তাহা ভাঙ্গিয়া তাহার বেড় তরলাংশ বাদ দিয়া কুহ্মন আতপ চাউলে মাখাইয়া রৌদ্রে শুকাইবে, পরে এক

ছটাক বা অর্দ্ধপোয়া ঐ শুষ্ক তণ্ডুল দ্বারা দুগ্ধ ও চিনি সহযোগে পায়স প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করাইবে । ইহা অত্যধিক গুরুত্বকর ।

অহিকেশ যোগ । আকরকরা, শুঁঠ, লবঙ্গ, কুঙ্কুম, পিপুল, জাতীফল, জাতী বা মালতী ফুল ও রক্তচন্দন ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ একতোলা এবং অহিকেশ ৪ তোলা । জলে মর্দন । বটা ৩ রতি । মধুসহ মর্দন করিয়া দুগ্ধ অম্লপানে সেব্য ।

নাগবল্লাদি চূর্ণ । পান, খেতবেড়েলার মূল, মূর্ঝামূল, জয়িত্রী, জায়ফল, মুরামাংসী, আপাঙ্গের বীজ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, রক্তচন্দন, বেণারমূল, বটমধু ও বচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিবে । মাত্রা—এক হইতে দুই আনা । ঘৃত ও মধুসহ মর্দন করিয়া দুগ্ধ অম্লপানে সন্ধ্যাকালে সেব্য ।

শুকুবল্লভ রস । পারদ, গন্ধক, লৌহ, রৌপ্য, স্বর্ণ ও স্বর্ণমাক্ষিক, ইহাদের প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা, বংশলোচন দুই তোলা এবং সিদ্ধিবীজচূর্ণ ৮ তোলা । সমস্তচূর্ণ সিদ্ধির রসে বা কাথে মর্দন করিয়া একআনা বটা করিবে । মধুসহ মর্দন করিয়া দুগ্ধ অম্লপানে ভক্ষণ করিবে ।

কামিনী বিদ্রাবণ রস । আকরকরা, শুঁঠ, লবঙ্গ, কুঙ্কুম, পিপুল, জায়ফল, জয়িত্রী ও রক্তচন্দন, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, হিজল ও বিগুজ আমলাস। গন্ধক প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা এবং আফিং ৮ তোলা । জলে মর্দন । বটা ৩ রতি । মধুসহ মর্দন করিয়া দুগ্ধ অম্লপানে বটিকা সেব্য ।

পুং জননেন্দ্রিয়ের রোগ ।

পুংজননেন্দ্রিয় । পুংজননেন্দ্রিয়ের অপর নাম মেট্র, উপস্থ ও শিখ ।

ইহার অবয়ব কতকগুলি উত্থানশীল তন্তু বা সূত্র দ্বারা গঠিত, শিখের তিনটি অংশ তিন নামে অভিহিত, লিঙ্গমূল, লিঙ্গ-শরীর ও লিঙ্গ-মুণ্ড । লিঙ্গ-মূল ও লিঙ্গ-মুণ্ডের মধ্যভাগকে লিঙ্গ-শরীর বলা যায় । যে সকল উত্থানশীল পৈশিক সূত্রদ্বারা ইহার অবয়ব গঠিত, সেই সকল সূত্রের আভ্যন্তরে আবার বহু সংখ্যক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তবাহিনী শিরা আছে, উভেজনার কারণ উপস্থিত হইলেই, ঐ সকল শিরার মধ্যে দ্রুতবেগে রক্ত প্রবাহিত হয় ও পুম্ব উথিত হইয়া থাকে । লিঙ্গমুণ্ডের অগ্রভাগস্থ ছিদ্রের নাম প্রস্রাব-দ্বার । যে ছিদ্র বা পথদ্বারা প্রস্রাব নির্গত হয়, তাহাকে মূত্রনলী, মূত্রমার্গ বা মূত্র-পথ বলা যায় । বস্তি অর্থাৎ মূত্রাশয় হইতে মূত্র-নলী আরম্ভ হইয়া লিঙ্গ-মুণ্ডে শেষ হইয়াছে ।

অণুকোষ । অণুদ্বয়ই শুক্রের আধার অর্থাৎ উহাদ্বারা ই শুক্র প্রস্তুত হয় । অণুদ্বয় দুইটি চর্ম-কোষ বা চর্ম-স্থলীর মধ্যে অবস্থিত এবং দুইটি রক্তদ্বারা লম্বিত ।

শুক্রকোষ । একপ্রকার গ্রন্থি পুরুষের বস্তি অর্থাৎ মূত্রাশয়ের গ্রীবা-দেশকে বেষ্টিত করিয়া থাকে, তাহাকে ইংরাজিতে প্রোষ্টেট গ্রন্থি কহে । প্রোষ্টেটগ্রন্থি মোট দুইটি । এই গ্রন্থিদ্বয়ের নিম্নভাগ সরলাস্ত্রের উপর অবস্থিত । উক্ত দুইটি গ্রন্থির মূলে দুইটি শুক্রকোষ, এই শুক্রকোষে শুক্র সঞ্চিত হয় এবং মৈথুনকালে তাহা হইতে নির্গত হইয়া থাকে । শুক্রে একপ্রকার বহুসংখ্যক স্থল স্থল কীট অবস্থিতি করে, তদ্বারা সন্তান উৎপত্তি হয় । ইহাকে ইংরাজীতে স্পার্মাটোজোয়া কহে ।

ধাতুদৌৰ্বল্য ও লিঙ্গ-শৈথিল্য ।

যাহারা সুস্থাবস্থায়ও রসায়ন কিম্বা বাজীকরণ ঔষধ সেবন করেন না, অথচ অতিরিক্ত শুক্রপাত করেন, তাঁহাদিগের অধিক শুক্রক্ষয় হেতু লিঙ্গ-শৈথিল্য ও ধাতুদৌৰ্বল্য হইতে পারে । অস্বাভাবিক উপায়ে বা অত্যধিক মৈথুনদ্বারা শুক্রপাত করিলেও, ধাতুদৌৰ্বল্য উৎপন্ন হয় । এই রোগে আক্রান্ত হইলে, স্বপ্নদোষ, মনের অস্থিরতা বা চাঞ্চল্য, রতিশক্তিহীনতা, শুক্রমেহ বা তরল শুক্র সময় সময় নির্গত হওয়া, ধ্বজভঙ্গ, স্মৃতিশক্তির অভাব, কপালের চর্ম কুঞ্চিত, অসন্তোষের ভাব, কেশের অকাল পকতা, দৃষ্টিভ্রা, কেশোদগম, অণুকোষে পুষ্টিবিহীনতা, কার্যে অনিচ্ছা, দৃষ্টির হ্রাস, অজীর্ণ, অন্নোদগার, দংশ-পিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন, অল্প শ্রমে শ্রম বোধ শরীরের অবসন্নতা, বিমর্ষতা, হাত, পা, চক্ষু ও ব্রহ্মরন্ধ্র জ্বালা, রক্তহীনতা, বিবর্ণতা, গাত্রচর্মের শিথিলতা, স্ত্রীবৎ শুক্র নিঃসরণ, উদরে বায়ু সঞ্চিত হওয়া ও মাথাঘোরা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয় । এই অবস্থায় অবিলম্বে রসায়ন ও বাজীকরণ সেবন করা উচিত, না করিলে ধ্বজভঙ্গ পর্য্যন্তও হইতে পারে ।

পুরুষের বক্ষ্যতা । শুক্র দূষিত হইলে পুরুষের বক্ষ্যতা জন্মে । বিষাক্ত শুক্র দ্বারা গত্তৃসঞ্চার এবং সন্তানোৎপন্ন হয়, যেহেতু এই শুক্রে জীব বা জীবাণু বিশিষ্ট রূপে অবস্থিতি করে, কিন্তু শুক্র দূষিত হইলে, তাহা দ্বারা

গর্তসঞ্চার হয় না । যে শুক্র ক্ষটিকের ন্যায় নির্মল, চকচকে, মধুর রসবিশিষ্ট ও মধুর ত্রায় গন্ধযুক্ত, তাহাই বিশুদ্ধ ও গর্তসঞ্চারের উপযোগী । ইহার বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট শুক্র দূষিত, স্তূতরাং তদ্বারা গর্তসঞ্চার হয় না, ইহাই পুরুষের বক্ষ্যতার কারণ । যেমন দ্বন্ধের বা ইক্ষুর সর্বাংগব্যব ব্যাপিয়া যথাক্রমে ঘৃত বা গুড় অবস্থিতি করে এবং মন্থন ও পীড়ন দ্বারা দ্বন্ধ হইতে ঘৃত ও ইক্ষু হইতে গুড় উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ কামাতাবাপন্ন হইয়া জীর্ণগণকে দর্শন, স্পর্শন, বা চিন্তা করিলে, কিম্বা তাহাদের শব্দ শ্রবণ অথবা স্ত্রীতে উপগত হইলে, শুক্রক্ষরণ হয় । বস্তি বা মূত্রাশয়ের অধোভাগে দক্ষিণদিকে দুই অঙ্গুলি অন্তরে যে মূত্র-নলী আছে তদ্বারা পুরুষের শুক্র-ক্ষরণ হইয়া থাকে ।

ডাক্তারেরা বলেন, শুক্রে স্পার্মাটোজোয়া নামক যে জীবাণু থাকে, তাহা কোন ফারণে অসুস্থ বা মৃত হইলে অধিক বীৰ্য্যবান্ ব্যক্তিরও সম্ভানোৎপাদিকা শক্তি বিনষ্ট হয় ।

চিকিৎসা । শুক্রদুষ্টিরোগে বৃহৎছাগলাস্তম্বত, বৃহৎ অশ্বগন্ধাস্থত ও অমৃতপ্রাশয়ত প্রশস্ত । ঘৃত সহ না হইলে বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, বৃহৎ বজ্রেশ্বর, বসন্ত কুম্মাকর ও বসন্ততিলক প্রভৃতি বটিকা ব্যবস্থা করিবে ।

শুক্র মেহ । অস্বাভাবিক উপায়ে শুক্রপাত বা হস্তমৈথুন প্রভৃতি নানা কারণে শুক্রমেহ উৎপন্ন হয় । এই রোগ উৎপন্ন হইলে জননেন্দ্রিয় এতই শিথিল হইয়া পড়ে যে বিনা উল্লেজনায় শুক্র-ক্ষরণ এমন কি নিমিত্তা-বস্থায় বা দিব্যভাগে কিম্বা মলমূত্র-ত্যাগকালে অথবা যানারোহণে অধিক ভ্রমণ করিলে, অর্থাৎ অল্প উল্লেজনায় কারণ উপস্থিত হইলেই জলের ন্যায় তরল শুক্র নির্গত হয় । রোগ সাতিশয় প্রবল হইলে অল্প ভ্রমণ করিলে কিম্বা অধিকক্ষণ উপবেশন করিলেও শুক্র নিঃসৃত হইয়া থাকে । এই রোগেও নানাবিধ শুক্রাশ্রিতার ও শুক্র বিকৃতির লক্ষণ উপস্থিত হয় । কার্যে অনিচ্ছা, আলস্য, ঔদাস্য, পরিপাকশক্তির হীনতা, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য এবং মেধা, স্মৃতি, বল, ধৈর্য্য ও শৈথর্য্য প্রভৃতি বিনষ্ট, উদরাদান অনুরোগ, শিরঃপীড়া, অস্থিরতা, চিত্তচাঞ্চল্য ও স্বপদোষ প্রভৃতি নানা উপসর্গ উপস্থিত হয় । রোগী নির্জনে ও নীরবে থাকিতে ভালবাসে, অল্প কারণে ভীত লা বিযুক্ত হয় এবং দ্রুতবেগে

কৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হয় ও অল্প শব্দ শুনিলে চমকাইয়া উঠে । পরন্তু উগ্রস্বভাব ও বীভৎস স্বপ্ন দর্শন প্রভৃতি এই রোগের লক্ষণ । সাধারণতঃ লিঙ্গের শিথিল অবস্থায় অর্থাৎ লিঙ্গের উত্থান না হইয়া যদি বীৰ্য্য পাত হয়, তাহা হইলে, শুক্রমেহ হইয়াছে বুঝিতে হইবে ।

• চিকিৎসা । এইরোগে বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস, স্বল্পচন্দ্রোদয় মকরধ্বজ এবং অশ্বগন্ধা ও অমৃতপ্রাশ প্রভৃতি দ্রুত ব্যবস্থা করা যায় ।

কামোন্মাদ ।

কামোন্মাদ এক প্রকার রোগ বিশেষ । রতিসন্তোগেচ্ছা অত্যধিক বল-বতী হইলে, লজ্জা, ভয়, মান ও গায় অগায় বিচার ক্ষমতা থাকে না, হুঁণিবার কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য মন অতিশয় ব্যাকুল হয় । ইহার চিকিৎসা ও লক্ষণ উন্মাদরোগে দ্রষ্টব্য ।

• হস্তমৈথুন । অবৈধ বা অস্বাভাবিক উপায়ে রতিসন্তোগ-সুখ উৎপাদনকে হস্তমৈথুন কহে । পুরুষ ও স্ত্রী উভয় জাতিই এই কুকর্ম্মের বশীভূত হয়, কিন্তু তন্মধ্যে বালকবালিকার সংখ্যাই অধিক । তরুণ বয়স্ক বালকদিগের লিঙ্গ চর্মে ও বালিকাদিগের ভগ চর্মে উত্তেজনার উৎপাদক কারণ বর্তমান থাকায় তাহারা স্বভাবতই হস্তদ্বারা ঐ সকল স্থান নাড়া চাড়া করে, এবং উদ্ভ্রান্তে তাহাদের সুখ বোধ হইয়া থাকে, এইজন্যই উহারা কদর্য্য হস্তমৈথুনে লিপ্ত হয় ও ক্রমশঃ এত অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে, সহজে আর ঐ অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারে না । অনেক স্থলে কুসংসর্গবশতও হস্তমৈথুনে অভ্যস্ত হইয়া যায় । স্ত্রীলোকের মধুমেহ রোগ বশতঃ যোনির বহির্ভাগে যে কণ্ডু উৎপন্ন হয়, কণ্ডুয়ন বশত তাহা সর্বদা চুলকাইতে ইচ্ছা হয় স্ততরাং এই অবস্থায়ও হস্তমৈথুনে প্রবৃত্তি জন্মে ।

হস্তমৈথুনে আসক্ত ব্যক্তিদিগের মানসিক বিকার জন্মে, মনের স্থিরতা থাকে না, চিন্তা-চঞ্চল্য উপস্থিত হয়, একাকী থাকিতে ইচ্ছা হয়, অগ্নের সঙ্গ ভাল লাগে না, সাতিলয় লজ্জা ও নানাপ্রকার অমূলক চিন্তা উপস্থিত হয়,

কাজকর্মে দৃঢ়তা থাকে না, বুদ্ধিবৃত্তি ও মেধা ক্রমশঃ ক্ষীণ হয় এবং মায় দৌর্বল্য, ধাতু-দৌর্বল্য, শুক্রমেহ, শিরঃপীড়া ও প্রবল স্বপ্নদোষ উপস্থিত হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা । হস্তমৈথুন পরিত্যাগ ও অমৃতপ্রাশন্য বা বৃহৎস্বপ্নদোষ-বৃত্ত প্রভৃতি ধাতুপোষক বৃত্ত ও বাটিকা প্রভৃতি সেবন এবং যিদ্ধ অথচ ধাতু-পোষক তৈল সর্বাঙ্গে মর্দন প্রশস্ত ।

স্বপ্নদোষ । চঞ্চলমতি যুবকগণের মনোবিকার এই রোগের মুখ্য কারণ, স্মৃতির মনের স্থিরতা ব্যতীত এই রোগের আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ অসম্ভব । কুচিন্তার পরিবর্তে সদালাপ, সংচিন্তা ও সাধু-সঙ্গ করা উচিত, কুংসিং আমোদ প্রমোদ, বাক্যালাপ ও কু-সংসর্গ সর্বথা পরিত্যাগ করা কর্তব্য । হস্তমৈথুন অভ্যাস করিলে, তাহা হইতেও এই কদর্য্য রোগের উৎপত্তি হয় । এই অবস্থা অতীব শোচনীয়, এই অবস্থায় প্রত্যহ ২।৩ বারও স্বপ্নদোষ হয়, শরীর কঙ্কালসার হয়, মন সর্বদা হু হু করে, কোন কাজে প্রযুক্তি থাকে না, কিছুই ভাল লাগে না, নির্জ্ঞানে থাকিতে ও সময় সময় আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হয়, অনির্কচনীয় মনঃকষ্ট উপস্থিত হয়, আদৌ মনের স্বচ্ছন্দতা থাকে না । এই অবস্থায় চিকিৎসিত না হইলে ক্রমশঃ ধাতু-দৌর্বল্য জন্মে ।

চিকিৎসা । বীর্য়ান্ত্রক ঔষধ সেবন ও যিদ্ধ তৈল সর্বাঙ্গে মর্দন স্বপ্নদোষে ব্যবস্থা করিবে ।

ক্লীবতা বা ধ্বজভঙ্গ ।

যে রোগে পুরুষ পুংস্কের উত্তেজনার অভাবে মৈথুন করিতে সমর্থ হয় না, তাহাকে ক্লীব্য বা ধ্বজভঙ্গ বলা যায় । এই রোগ সাত প্রকার । ১। ভয়াদি কারণ বশতঃ অথবা স্ত্রীর প্রতি বিবেষ প্রযুক্ত ধ্বজ উত্তিত না হইলে, তাহাকে মানস ক্লীব্য কহে । ২। অধিক লবণ, অন্ন, কটু ও উষ্ণদ্রব্য ভোজন করিলে, শুক্র ক্ষয় বশতঃ ধ্বজভঙ্গ হইলে, তাহাকে পিত্তজ ক্লীব্য কহে ।

২। রসায়ন ও বাজীকর ঔষধ সেবন না করিয়া অতিরিক্ত গুরুপাত করিলে, যে ধ্বজভঙ্গ হয়, তাহাকে ক্ষয়জ ক্লেব্য কহে । ৪। পুষ্পে ফিরঙ্গাদি রোগ জন্মিলে, তজ্জন্ম যে ধ্বজভঙ্গ হয়, তাহাকে রোগজ ক্লেব্য কহে । ৫। বীৰ্য্যবাহিনী শিরা ছিন্ন হইলে, পুষ্পের ক্ষুদ্রতাবশতঃ ধ্বজভঙ্গ হয় । ৬। নলবান্ ব্যক্তি কামাসক্ত হইয়া মৈথুন না করিলে, গুরু স্তম্ভিত হইয়া ধ্বজভঙ্গ হয় । ৭। জন্মাবধি ধ্বজভঙ্গ হইলে তাহাকে সহজ ক্লেব্য বলা যায় ।

অসাধ্য লক্ষণ । জন্ম হইতে জাত ক্লেব্য অসাধ্য । বীৰ্য্যবাহিনী শিরা ছিন্ন হইয়া ধ্বজভঙ্গ জন্মিলে তাহাও অসাধ্য ।

ধ্বজভঙ্গ-চিকিৎসা-বিধি ।

ধ্বজভঙ্গ হইলে অগ্রে তাহার কারণ নির্ণয় করিবে । শোক, ভয় অথবা স্ত্রীর প্রতি বিরক্তি বা অনাসক্তি বশতঃ অনেক স্থলে আদৌ জনেনেন্দ্রিয় উত্তীত হয় না বা হইলে এরূপ ক্ষণস্থায়ী হয় যে, ঐ অবস্থায় সহবান্ অসম্ভব হয় । মনোবিকৃতির কারণ অবগুই দূরীভূত করিবে । গাঁজা, আকিং ও সুরা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য অধিক মাত্রায় বা দীর্ঘকাল সেবনে অথবা কোন ক্ষয়কর রোগ হইতেও ধ্বজভঙ্গ হইতে পারে । মাদক দ্রব্য সেবনে হইলে, মাদক পরিত্যাগ ব্যতীত উপায়ান্তর থাকে না । রোগবশতঃ হইলে, রোগ-নাশক ঔষধ অবগুই ব্যবহার্য্য । দীর্ঘকাল হস্তমৈথুন করিলে, ধ্বজভঙ্গ হয়, এই অবস্থায় হস্তমৈথুন বন্ধ করিয়া, ঔষধ সেবন করা কর্তব্য । ধ্বজভঙ্গে মদনানন্দ, কামাগ্নি সন্দীপন, রতিবল্লভ ও মহাকাশেশ্বর প্রভৃতি মোদক, স্বল্প চন্দ্রোদয়-মকরধ্বজ, অমৃতপ্রাশ স্নাত ও বৃহৎ অষ্টগন্ধা স্নাত প্রভৃতি ঔষধ সাধারণতঃ সর্বদা ব্যবহার্য্য । এতদ্ব্যতীত গোক্ষুরাদ্য মোদক, কামিনী দর্পণ, কামদীপক ও সিদ্ধশাল্মলীকল্প প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা যায় ।

ধ্বজভঙ্গে—ঔষধ ।

গোক্ষুরাদ্য মোদক । অগ্নিমান্দ্য না থাকিলে, ইহা প্রয়োজ্য ।
অল্পপান—দুগ্ধ ।

গোমূত্রাদ্য যোদক । গোমূত্র, কুলেখাড়াবীজ, অৰণ্ধা, শতমূলী, তালমূলী, আলকন্থী-বীজ, যষ্টিমধু, গোরক্ষচাকুলে ও বেড়োলা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমান ভাগ । চূর্ণ-সমষ্টির সমান প্রত্যন্ত ও বিগুণ গোদুগ্ধ । প্রথমে চূর্ণগুলি দ্রুত দ্বারা অল্প সাতলাইয়া পরে দুগ্ধে চিনি গুলিয়া পাক করিয়া যোদক বান্ধিবে । মাত্রা—দুই আনা হইতে চারি আনা ।

কামিনী দর্পন । রক্তদোষ ব্যতীত ইহা অগ্নাশ্র অবস্থায় বা প্লুহা-বস্থায় প্রয়োজ্য । চিনির সহিত সেব্য ।

কামিনী দর্পন । বিগুণ আমলাসাগন্ধক একতোলা ও পারদ একতোলা কঙ্কলী করিয়া তাহার সহিত বিগুণ ধুতুরার বীজচূর্ণ একতোলা মিশ্রিত করিবে এবং ধুতুরার তৈল ঝুলি মর্দন করিয়া দুইরতি বটিকা করিবে ।

কামদীপক । পিত্তাধিক শরীরে বা হস্ত, পদ ও গাত্রে দাহ কিম্বা অগ্নিপিত্ত রোগ থাকিলে, ইহা প্রয়োজ্য নহে । অমুপান—দুগ্ধ ও ইক্ষুচিনি ।

কামদীপক । শ্বেতপুনর্নবার মূল চূর্ণ ৪ তোলা কচি শিমুলমূলের রসে সাতবার ভাবনা দিয়া তৎসহ মোচরস চূর্ণ ৪ তোলা ও বিগুণ আমলাসাগন্ধক ৪ তোলা মিশ্রিত করিবে । মাত্রা—এক আনা হইতে দুই আনা ।

সিদ্ধশাল্মলী কল্প । ইহার প্রয়োগ প্রণালী কামদীপকের ঠায়া । অমুপান—স্বত ও মধু ।

সিদ্ধশাল্মলী কল্প । ভূমি কুয়াণ্ড, তালমূলী, আমলকী ও শ্বেতপুনর্নবা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং বিগুণ আমলাসাগন্ধক অর্ধতোলা ও পারদ চারি আনা এই উভয়ের কঙ্কলী, এই সকল একত্র করিয়া কচি শিমুলমূলের রসে সাতবার ও মহিব দুগ্ধে সাতবার ভাবনা দিয়া শুকাইয়া চূর্ণ করিবে । মাত্রা—দুই হইতে চারি আনা ।

সম্পূর্ণ ।

